

概率论与数理统计 A 复习题

一. 选择填空

1. $P(A)=0.6, P(A-B)=0.2$, 则 $P(B|A)=$ _____

A. 1/3; B. 2/3; C. 3/4; D. 4/5.

解 $P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.6-P(AB)=0.2$, 所以 $P(AB)=0.6-0.2=0.4$ 。

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0.4}{0.6}=\frac{2}{3}. \text{ 所以选 B}$$

2. $P(A)=0.4, P(A \cup B)=0.9$, A 与 B 互斥, 则 $P(B)=$ _____

A. 0.2; B. 0.3; C. 0.4; D. 0.5.

解 因为 A 与 B 互斥, 所以 $P(AB)=0$ 。 $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.4+P(B)-0$,

结合 $P(A \cup B)=0.9$, 所以 $P(B)=0.5$

3. $P(A \cup B)=0.6, P(B)=0.2$ 且 A 与 B 相互独立, 则 $P(AB)=$ _____

A. 0.1; B. 0.2; C. 0.3; D. 0.4.

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) \\ \text{解} \quad &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ &= P(A) + 0.2 - 0.2P(A) \end{aligned}$$

将 $P(A \cup B)=0.6$ 代入上式, 解出 $P(A)=0.5$. 结合 $P(B)=0.2$,

$$P(AB)=P(A)P(B)=0.5 \times 0.2=0.1, \text{ 所以选 A}$$

4. 设 A, B, C 是三个随机事件。事件“ A, B, C 至少有两个发生”用 A, B, C 表示为 _____

A. $A \cup B \cup C$; B. $AB \cup BC \cup CA$; C. $A \cap B \cap C$; D. $AB \cap BC \cap CA$.

解 选 B

5. 设 A, B, C 是三个随机事件。事件“ A, B, C 都不发生”用 A, B, C 表示为 _____

A. $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$; B. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$; C. $\bar{A}B \cup \bar{B}C \cup \bar{C}A$; D. $AB \cap BC \cap CA$.

解 选 B

6. 已知随机变量 X 在 $[0,1]$ 上服从均匀分布, 则 $E(2X)=$ _____

A. 1/2; B. 1; C. 2; D. 3.

解 因为 X 在 $[0,1]$ 上服从均匀分布, 所以 $E(X)=1/2$, 则 $E(2X)=2E(X)=2 \times \frac{1}{2}=1$, 即答

案为 B.

7. 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 且 $E(X)=1.6, E(X^2)=3.84$, 则 $p=$ _____

A. 0.6; B. 0.5; C. 0.3; D. 0.2.

解 由已知 $E(X)=np=1.6$ 。根据方差的性质 $D(X)=np(1-p)=E(X^2)-[E(X)]^2$,

将 $E(X)=1.6, E(X^2)=3.84$ 代入上式, $D(X)=np(1-p)=E(X^2)-[E(X)]^2=3.84-1.6^2=1.28$, 再将

$np=1.6$ 代入本式, 得到 $1.6(1-p)=1.28$, 解出 $p=0.2$, 因此选 D

8. 如果随机变量 X 与 Y 不相关, 则_____成立。

A. X 与 Y 相互独立; B. $P(XY=0)=0$; C. $EXY=EX \cdot EY$; D. $EXY=0$.

解 由 X 与 Y 不相关的定义, 即 $\rho_{XY}=0$, 而相关系数 ρ_{XY} 的定义为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{EXY - EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}, \text{ 结合 } \rho_{XY}=0, \text{ 所以 } EXY = EX \cdot EY, \text{ 即选 C.}$$

9. 对任意两个随机变量 X 和 Y , 如果 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则有 ()

A. X 与 Y 相互独立; B. X 和 Y 不相关; C. $D(XY) = D(X)D(Y)$; D. $D(XY) = 0$

解 参见上一题, 如果 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 $\rho_{XY}=0$, 因此随机变量 X 与 Y 不相关, 即选 B。

10. 已知随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$, 且 $E[(X-1)(X-2)]=1$, 则 $\lambda =$ _____.

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.

解 根据数学期望的性质 $E[(X-1)(X-2)] = E(X^2 - 3X + 2) = E(X^2) - 3E(X) + 2$, 结合条件

$E[(X-1)(X-2)]=1$, 得到 $E(X^2) - 3E(X) + 2 = 1$, 即 $E(X^2) - 3E(X) + 1 = 0$ 。由 $X \sim \pi(\lambda)$,

得到 $E(X)=\lambda$, $D(X)=\lambda$, 而 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$, 将 $E(X)=\lambda$, $D(X)=\lambda$ 代入, 得到

$E(X^2)=\lambda+\lambda^2$ 。将 $E(X^2)=\lambda+\lambda^2$ 和 $E(X)=\lambda$ 代入到 $E(X^2)-3E(X)+1=0$ 中, 得到

$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$, 解出 $\lambda = 1$ 。因此选 A。

11. 已知随机变量 $X \sim N(3, 16)$, $Y = 2X - 3$, 则 Y 服从_____.

A. $N(3, 16)$; B. $N(3, 64)$; C. $N(3, 55)$; D. $N(6, 64)$.

解 Y 也服从正态分布, 且

$$EY = E(2X - 3) = 2EX - 3 = 2 \times 3 - 3 = 3, \quad DY = D(2X - 3) = 2^2 DX = 4 \times 16 = 64,$$

所以 $Y \sim N(3, 64)$, 即选 B。

二. 甲、乙、丙三台机床加工同样零件, 其废品率分别为 0.03, 0.02, 0.01。现有一批零件共 180 个, 甲、乙、丙机床分别加工 90 件、60 件和 30 件, 在这批零件中任取一件, 求它是合格品的概率。

解 任取一件是废品的概率 $p = 0.03 \times 90/180 + 0.02 \times 60/180 + 0.01 \times 30/180 = 0.023$, 所以是合格品的概率为 $1 - 0.023 = 0.977$ 。本题应用了全概率公式。

三. 一个保险公司把其产品购买者分为高、中、低收入三类, 调查结果是这三类分别占总户数

的 10%、60%、30%，而家庭资产在一百万元以上的户数占三类中的比例为 100%、60%、5%，求：

- (1) 任取一个产品购买者，其家庭资产在一百万元以上的概率.
- (2) 一个家庭资产在一百万元以上的居民户属于高收入的概率.

解 设 A_1, A_2, A_3 依次表示任选一个购买者属于高、中、低收入，则

$$P(A_1)=10\%, P(A_2)=60\%, P(A_3)=30\%$$

设 B 表示任选一个购买者，其家庭资产在一百万以上，则

$$P(B|A_1)=100\%, P(B|A_2)=60\%, P(B|A_3)=5\%$$

任取一个产品购买者，其家庭资产在一百万元以上的概率为

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 10\% \times 100\% + 60\% \times 60\% + 30\% \times 5\% \\ &= 0.475 \end{aligned}$$

一个家庭资产在一百万元以上的居民户属于高收入的概率为

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{10\% \times 100\%}{0.475} = 0.21$$

四. 已知随机变量 X 与 Y 的联合分布律为

X \ Y	Y		
	-1	1	2
-1	a	0.5	0
1	0.1	b	0.2

已知 $E(X) = -0.2$ ，求(1) a, b 的值； (2) $P\{X+Y \leq 2\}$ ； (3) $Z = XY$ 的分布律；

(4) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

解 (1) 由联合分布律中概率之和为 1 这个性质， $a+0.5+0+0.1+b+0.2=1$ ，则 $a+b=0.2$ 。

再由 $E(X) = -0.2$ 和 $E(X) = -1 \times (a+0.5) + 1 \times (0.1+b+0.2) = b-a-0.3$ ，则 $b-a-0.2 = -0.2$ ，

即 $b-a=0$ 。结合 $a+b=0.2$ ，解出 $a=0.1, b=0.1$

$$(2) P\{X+Y \leq 2\} = 1 - P\{X+Y > 2\} = 1 - P\{X=1, Y=2\} = 1 - 0.2 = 0.8$$

(3) 分布律为

Z	-2	-1	1	2
P	0	0.6	0.2	0.2

(4) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

$P\{X=-1\}=0.6, P\{Y=-1\}=0.2, P\{X=-1, Y=-1\}=0.1 \neq P\{X=-1\}P\{Y=-1\}$ ，所以不独立。

五. 已知随机变量 X 与 Y 的联合分布律为

Y \ X	-1	0	1
0	0.15	0.1	0.15
1	0.05	0.35	0.20

求：(1) X, Y 各自的边缘分布律; (2) X 与 Y 的协方差和相关系数; (3) 用合适的理由判断 X 与 Y 是否相互独立.

解 (1)

X	0	1
p	0.4	0.6

Y	-1	0	1
p	0.2	0.45	0.35

(2)

$$\begin{aligned} E(XY) &= 0 \times (-1) \times 0.15 + 0 \times 0 \times 0.1 + 0 \times 1 \times 0.15 \\ &\quad + 1 \times (-1) \times 0.05 + 1 \times 0 \times 0.35 + 1 \times 1 \times 0.2 \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$E(X) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.6 = 0.6, \quad E(Y) = (-1) \times 0.2 + 0 \times 0.45 + 1 \times 0.35 = 0.15$$

$$\text{协方差 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.15 - 0.6 \times 0.15 = -0.075$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0.4 + 1^2 \times 0.6 = 0.6, \quad E(Y^2) = (-1)^2 \times 0.2 + 0^2 \times 0.45 + 1^2 \times 0.35 = 0.55$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.24, \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 0.5275$$

相关系数为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \frac{-0.075}{\sqrt{0.24} \sqrt{0.5275}} = -0.2108$$

(3) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

$$P\{X=1\}=0.6, \quad P\{Y=1\}=0.35, \quad P\{X=1, Y=1\}=0.2 \neq P\{X=1\}P\{Y=1\}=0.6 \times 0.35=0.21,$$

所以不独立。

六. 随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-x-2y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) A 的值; (2) $P\{X+Y \leq 1\}$; (3) 边缘密度函数

解 (1)

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} A e^{-x-2y} dx dy = A \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_0^{+\infty} e^{-2y} dy = A \times \frac{1}{2} = 1, \text{ 所以 } A=2$$

(2)

$$P\{X+Y \leq 1\} = 2 \int_0^1 e^{-x} dx \int_0^{1-x} e^{-2y} dy = 1 - e^{-1} - e^{-2}$$

(3) 边缘密度函数

$$f_X(x) = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-2y} dy = e^{-x}, \quad x > 0$$

$$f_X(x) = 0, \quad x \leq 0$$

$$f_Y(y) = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-2y} dx = 2e^{-2y}, \quad y > 0$$

$$f_Y(y) = 0, \quad y \leq 0$$

七. 一批电子元件的合格率为 80%，任取 100 件，其中合格品数超过 90 件的概率为多少？试用中心极限定理求解。

解 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & i \text{ 元件合格} \\ 0, & i \text{ 元件不合格} \end{cases}$$

$$P(X_i = 1) = 0.8, P(X_i = 0) = 0.2, E(X_i) = 0.8, D(X_i) = 0.2 \times 0.8 = 0.16$$

$$E\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 100 \times 0.8 = 80, D\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 100 \times 0.16 = 16$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i > 90\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 80}{\sqrt{16}} > \frac{90-80}{\sqrt{16}}\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 80}{\sqrt{16}} > 2.5\right\} = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

八. 设总体 X 的分布律为

X	0	1	2
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $0 < \theta < 1$, 已知取得的样本观测值为 0, 1, 1, 2, 试求 (1) 参数 θ 的矩估计值; (2) 极大似然估计值;

(3) 判断矩估计量是否为参数 θ 的无偏估计量。

$$\text{解: (1) } EX = 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times (1-\theta)^2 = 2 - 2\theta$$

$$\text{令 } 2 - 2\theta = \bar{X}, \text{ 则 } \hat{\theta} = \frac{2-\bar{X}}{2}, \text{ 计算 } \bar{x} = 1, \text{ 则 } \theta \text{ 的矩估计值 } \hat{\theta} = \frac{1}{2}.$$

$$(2) L(\theta) = \theta^2 \times 2\theta(1-\theta) \times 2\theta(1-\theta) \times (1-\theta)^2 = 4\theta^4(1-\theta)^4$$

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 4\ln \theta + 4\ln(1-\theta)$$

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 4\frac{1}{\theta} - 4\frac{1}{1-\theta} = 0$$

$$\text{解出 } \hat{\theta} = \frac{1}{2}$$

$$(3) \theta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2-\bar{X}}{2}, E\hat{\theta} = E\left(\frac{2-\bar{X}}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2}E(\bar{X})$$

$$\text{因为 } EX = 2 - 2\theta, \text{ 所以 } E(\bar{X}) = 2 - 2\theta, \hat{\theta} = 1 - \frac{1}{2}E(\bar{X}) = 1 - \frac{1}{2}(2 - 2\theta) = \theta$$

所以 $\hat{\theta} = \frac{2-\bar{X}}{2}$ 是 θ 的无偏估计量。

九. 总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, 密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求参数 λ 的矩估计量和极大似然估计量。

解: $EX = \lambda = \bar{X}$, 即 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 为矩估计量

$$L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i$$

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = n \frac{1}{\lambda} - \sum x_i = 0$$

$$\text{所以最大似然估计量为 } \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i}$$

十. 某车间生产的滚珠直径可以认为是服从正态分布, 且方差是 0.06。从某天的产品中随机抽取 6 个, 测得直径为 (单位: 毫米)

14.93 15.10 14.98 14.85 15.15 15.01

正常情况下, 滚珠直径为 15 毫米, 现通过假设检验方法来检验当天滚珠直径是否正常, (1) 写出原假设和相应的拒绝域; (2) 利用上述样本数据推断滚珠直径是否正常 ($\alpha = 0.05$)。 (已知 $\Phi(1.96) = 0.975$)

$$\text{解: (1) 原假设 } H_0: \mu = 15, \text{ 拒绝域为 } \left| \frac{\bar{x} - 15}{\sqrt{\frac{0.06}{6}}} \right| \geq z_{0.025}$$

$$(2) \bar{x} = 15.003, \text{ 则 } \left| \frac{\bar{x} - 15}{\sqrt{\frac{0.06}{6}}} \right| = 0.03 < z_{0.025} = 1.96, \text{ 所以接受原假设, 即推断滚珠直径正常。}$$

十一. 已知某种尼纶的纤度正常条件下服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 某次取 5 根测试, 测得纤度为 1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44, 需要检验这批尼纶纤度是否高于 1.50, (1) 写出原假设和相应的拒绝域; (2) 利用上述样本数据在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下推断原假设是否成立。 $t_{0.05}(4) = 2.1318$, $t_{0.05}(5) = 2.015$

解：（1）原假设 $H_0: \mu \leq 1.5$, 拒绝域为 $\frac{\bar{X}-1.5}{\frac{s}{\sqrt{5}}} \geq t_{0.05}(4)$

（2） $\bar{x} = 1.414$, $s = 0.0882$, 则 $\frac{\bar{X}-1.5}{\frac{s}{\sqrt{5}}} = -2.18 < t_{0.05}(4)$, 所以接受原假设, 即认为尼纶纤度不高于 1.50.

十二. 某商品价格 x 与销售量 y 的对应数据如下

y	13.1	12.2	12	11.5	11.2
x	2	2.5	3	3.5	4

假定 y 与 x 之间的经验公式为 $y = a + b\frac{1}{x}$, 试估计 a , b 的值, 并估计当价格 $x = 5$ 时的销售量值。

解：令 $x^* = \frac{1}{x}$, 则

$$\hat{b} = \frac{\sum x_i^* y_i - n \bar{x}^* \bar{y}}{\sum (x_i^*)^2 - n \bar{x}^{*2}} = 8.79$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}^* = 8.89$$

$x = 5$ 时, $\hat{y} = 8.89 + 8.79 \frac{1}{5} = 10.65$