

Quiz

6-1-1. 다음 문장은 어떤 정보를 조회하는지 설명해 보세요.

```
SELECT a.employee_id  
      ,a.first_name || ' ' || a.last_name emp_name  
      ,a.job_id  
      ,a.salary  
      ,( SELECT AVG(b.salary)  
          FROM employees b  
          WHERE a.job_id = b.job_id  
          GROUP BY b.job_id  
        ) avg_salary  
FROM employees a;
```

정답 :

이 쿼리는 메인 쿼리에서는 사원의 일반정보와 급여를 조회하고 스칼라 서브쿼리를 사용해 employees 테이블에서 job_id 별 평균 급여를 구하는 쿼리입니다. 즉, 각 사원의 급여와 해당 사원의 job_id 별 평균 급여를 같이 조회하는 쿼리입니다.

Quiz

6-1-2. 다음 쿼리를 LATERAL 키워드를 사용해 같은 결과를 조회하도록 변경해 보세요.

```
SELECT b.department_name, loc.street_address, loc.country_name
FROM departments b
      ,( SELECT l.location_id, l.street_address, c.country_name
          FROM locations l, countries c
          WHERE l.country_id = c.country_id ) loc
WHERE b.location_id = loc.location_id;
```

정답 :

```
SELECT b.department_name, loc.street_address, loc.country_name
FROM departments b
      ,LATERAL ( SELECT l.location_id, l.street_address, c.country_name
                  FROM locations l, countries c
                  WHERE l.country_id = c.country_id
                     AND b.location_id = l.location_id
                ) loc;
```

Quiz

6-1-3. 다음 문장을 IN 대신 EXISTS 연산자를 사용해 같은 결과를 조회하도록 변경해 보세요.

```
SELECT employee_id,  
       job_id, salary  
FROM employees  
WHERE (job_id, salary ) IN ( SELECT job_id, min_salary  
                           FROM jobs);
```

정답 :

```
SELECT employee_id, job_id, salary  
FROM employees a  
WHERE EXISTS ( SELECT 1  
              FROM jobs b  
              WHERE a.job_id = b.job_id  
                AND a.salary = b.min_salary );
```

Quiz

6-1-4. 다음은 ANTI 조인 문장입니다. 이 문장은 employees 테이블에 할당되지 않은 부서정보를 조회하려는 문장인데, 실행하면 데이터가 조회되지 않습니다. 해당 부서정보를 조회하도록 이 쿼리를 수정해 보세요.

```
SELECT *  
FROM departments  
WHERE department_id NOT IN ( SELECT a.department_id  
                             FROM employees A  
                           );
```

정답 :

```
SELECT *  
FROM departments  
WHERE department_id NOT IN  
      ( SELECT department_id  
        FROM employees  
        WHERE department_id IS NOT NULL );
```

Quiz

6-1-5. covid19 테이블을 사용해 월별, 대륙별, 국가별 감염수와 각 국가가 속한 대륙을 기준으로 감염수 비율을 구하는 쿼리를 작성하시오.

MONTHS	CONTINENT	COUNTRY	NEW_CASES	CONTINENT_CASES	RATES
2019-12	Asia	China	27	27	100
2020-01	Asia	China	9687	9766	99.19
2020-01	Asia	Japan	14	9766	0.14
2020-01	Asia	Thailand	14	9766	0.14
2020-01	Asia	Singapore	13	9766	0.13
2020-01	Asia	Taiwan	9	9766	0.09
2020-01	Asia	Malaysia	8	9766	0.08
2020-01	Asia	South Korea	7	9766	0.07
2020-01	Asia	Vietnam	5	9766	0.05
2020-01	Asia	United Arab Emirates	4	9766	0.04
2020-01	Asia	Sri Lanka	1	9766	0.01
2020-01	Asia	Nepal	1	9766	0.01
2020-01	Asia	India	1	9766	0.01
2020-01	Asia	Cambodia	1	9766	0.01
2020-01	Asia	Philippines	1	9766	0.01
2020-01	Europe	France	6	15	40
2020-01	Europe	Germany	5	15	33.33
2020-01	Europe	Italy	3	15	20
2020-01	Europe	Finland	1	15	6.67
2020-01	North America	United States	6	11	54.55
2020-01	North America	Canada	3	11	27.27
2020-01	North America	Mexico	2	11	18.18
2020-01	Oceania	Australia	7	7	100
2020-02	Africa	Egypt	1	3	33.33
2020-02	Africa	Nigeria	1	3	33.33
2020-02	Africa	Algeria	1	3	33.33
2020-02	Asia	China	69641	73473	94.78
2020-02	Asia	South Korea	2924	73473	3.98

```
SELECT a.months, a.continent, a.country, a.new_cases, b.continent_cases
      ,DECODE(b.continent_cases, 0, 0,
              ROUND(a.new_cases / b.continent_cases * 100,2)) rates
FROM ( SELECT country, continent
      ,TO_CHAR(dates, 'yyyy-mm') months
      ,SUM(new_cases) new_cases
      FROM COVID19
      GROUP BY TO_CHAR(dates, 'yyyy-mm'), country, continent
    ) a
,( SELECT continent
   ,TO_CHAR(dates, 'yyyy-mm') months
   ,SUM(new_cases) continent_cases
   FROM COVID19
   GROUP BY TO_CHAR(dates, 'yyyy-mm'), continent
 ) b
WHERE a.months = b.months
AND a.continent = b.continent
AND a.new_cases > 0
ORDER BY 1, 2, 4 DESC ;
```

Quiz

6-1-6. covid19 테이블을 사용해 2020년 한국의 월별 검사수, 확진자수, 확진율을 구하는 쿼리를 작성하시오.

MONTHS	검사수	확진자수	확진율
01	144	7	4.86
02	85144	2924	3.43
03	228952	6855	2.99
04	167487	979	0.58
05	228833	703	0.31
06	365429	1332	0.36
07	260256	1505	0.58
08	334347	5642	1.69
09	382650	3865	1.01
10	257653	2459	0.95

```
SELECT TO_CHAR(dates, 'MM') months,  
       NVL(SUM(new_tests),0) 검사수,  
       NVL(SUM(new_cases),0) 확진자수,  
       ROUND(NVL(SUM(new_cases),0) / NVL(SUM(new_tests),0) * 100,2) 확진율  
FROM covid19  
WHERE ISO_CODE = 'KOR'  
      AND TO_CHAR(dates, 'YYYY') = '2020'  
GROUP BY TO_CHAR(dates, 'MM')  
ORDER BY 1;
```

Quiz

6-2-1. Covid19 테이블에서 2020년 전체 가장 많은 확진자가 나온 상위 5개 국가를 구하는 쿼리를 작성하시오.

```
SELECT *  
FROM ( SELECT country,  
            NVL(SUM(new_cases),0) cases  
        FROM covid19  
        WHERE to_char(dates, 'YYYY') = '2020'  
        AND country <> 'World'  
        GROUP BY country  
      )  
ORDER BY cases DESC  
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

	COUNTRY	CASES	DEATH_NUM
1	United States	8858024	227700
2	India	8040203	120527
3	Brazil	5468270	158456
4	Russia	1563976	26935
5	France	1235132	35785

Quiz

6-2-2. Covid19 테이블에서 2020년 인구대비 사망률이 가장 많은 상위 20개 국가를 구하는 쿼리를 작성하시오.

↕ COUNTRY	↕ POPU	↕ DEATH	↕ RATES
1 San Marino	33938	42	0.12376
2 Peru	32971846	34315	0.10407
3 Belgium	11589616	11050	0.09534
4 Andorra	77265	72	0.09319
5 Spain	46754783	35466	0.07586
6 Brazil	212559409	158456	0.07455
7 Bolivia	11673029	8694	0.07448
8 Chile	19116209	14032	0.0734
9 Ecuador	17643060	12608	0.07146
10 Mexico	128932753	90309	0.07004
11 United States	331002647	227700	0.06879
12 United Kingdom	67886004	45675	0.06728
13 Argentina	45195777	30071	0.06653
14 Italy	60461828	37905	0.06269
15 Panama	4314768	2663	0.06172
16 Colombia	50882884	30753	0.06044
17 Sweden	10099270	5927	0.05869
18 France	65273512	35785	0.05482
19 Sint Maarten (Dutch part)	42882	22	0.0513
20 Macedonia	2083380	963	0.04622

```
SELECT *
FROM ( SELECT country,
              NVL(MAX(population),0) popu,
              NVL(SUM(new_deaths),0) death,
              DECODE(NVL(MAX(population),0),0,0,ROUND(NVL(SUM(new_deaths),0)
/ NVL(MAX(population),0) * 100,5)) rates
        FROM covid19
        WHERE 1=1
          AND TO_CHAR(dates, 'YYYY') = '2020'
        GROUP BY country
      )
WHERE rates <> 0
ORDER BY rates desc
FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;
```


Quiz

6-3-1. Covid19 테이블에서 2020년 각 대륙별 확진자 수를 분기별로 다음과 같이 조회하는 쿼리를 작성하시오.

CONTINENT	Q1	Q2	Q3	Q4
Africa	4951	372314	1064429	273878
Asia	170010	2089185	8293587	2906584
Europe	436839	1916626	2621437	4082409
North America	177215	2890315	5484360	1940461
Oceania	5324	4020	23971	7542
South America	12355	2168694	5824788	1505996

```
SELECT continent,
      SUM(CASE WHEN quarter = '1' THEN cases else 0 end) Q1,
      SUM(CASE WHEN quarter = '2' THEN cases else 0 end) Q2,
      SUM(CASE WHEN quarter = '3' THEN cases else 0 end) Q3,
      SUM(CASE WHEN quarter = '4' THEN cases else 0 end) Q4
FROM ( SELECT TO_CHAR(dates, 'q') quarter,
          continent,
          NVL(SUM(new_cases),0) cases,
          NVL(SUM(new_deaths),0) death_num
      FROM covid19
      WHERE TO_CHAR(dates, 'YYYY') = '2020'
      AND continent IS NOT NULL
      GROUP BY TO_CHAR(dates, 'q'), continent
    )
GROUP BY continent
ORDER BY 1;
```

Quiz

6-3-2. products 테이블에는 model_year라는 연식 컬럼이 있습니다. 다음과 같이 주문년도별 모델연식별 판매금액을 구하는 쿼리를 PIVOT 절을 사용해 작성해 보세요. (orders, order_items, products 테이블 조인)

SALE_YEAR	MODEL_2016	MODEL_2017	MODEL_2018
2016	2709484.47	0	0
2017	762372.57	3083142.45	0
2018	83220.3	481889.36	1458879.73

```
SELECT sale_year
      ,nvl(model_2016,0) as model_2016
      ,nvl(model_2017,0) as model_2017
      ,nvl(model_2018,0) as model_2018
FROM ( SELECT TO_CHAR(a.order_date, 'YYYY') sale_year
      ,c.model_year
      ,NVL(SUM(b.list_price * quantity),0) amt
FROM orders a
      ,order_items b
      ,products c
WHERE 1=1
      AND a.order_id = b.order_id
      AND b.product_id = c.product_id
GROUP BY TO_CHAR(a.order_date, 'YYYY')
      ,c.model_year
) PIVOT
( SUM(amt) for model_year in ('2016' AS model_2016,'2017' AS model_2017,
                              '2018' AS model_2018) )

ORDER BY 1;
```