Enema Kit

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Enema can be done with tubing

इसका उपयोग किस लिए होता है

Enema kit का उपयोग prescribed liquid को tubing के माध्यम से rectum में पहुँचाने के लिए किया जाता है। इसे उचित clinical direction में ही उपयोग करना चाहिए; सही patient assessment, hygienic equipment handling तथा careful monitoring से injury, infection और fluid-related complications का risk कम होता है।

मुख्य भाग

- Enema container या prescribed solution bag
- Tubing और flow-control clamp
- Patient-end nozzle या rectal tip
- Connector और seal components
- Support hook या stand, जहाँ उपलब्ध हो
- Prescribed solution, gloves, lubricant और waste supplies

शुरू करने से पहले

1. Enema kit का उपयोग केवल authorised healthcare professional के prescription या specific advice पर करें और procedure के लिए trained हों।
2. Patient की identity, prescribed solution, intended volume, route तथा relevant allergies या contraindications verify करें।
3. Severe abdominal pain, rectal bleeding, suspected bowel obstruction या recent relevant surgery जैसे warning symptoms या conditions का assessment करें, जिनमें clinical review जरूरी हो सकता है।
4. Kit packaging, expiry date जहाँ लागू हो, tubing, clamp, connectors तथा nozzle में damage या contamination जाँचें।
5. Prescribed solution को specified temperature और concentration पर तैयार करें; बिना authorisation solution बदलें या medicines न मिलाएँ।
6. Privacy दें, procedure समझाएँ, consent लें, hand hygiene करें और appropriate gloves तथा protective clothing पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Clean working area तैयार करें और जरूरत के अनुसार patient के नीचे absorbent protection रखें।
2. Instructions के अनुसार kit assemble करें और tubing तथा nozzle के सही connection की पुष्टि करें।
3. Container में केवल prescribed solution तथा specified volume भरें और contamination से बचाएँ।
4. Clamp बंद रखें और निर्देशानुसार use से पहले tubing prime करके trapped air निकालें।
5. Clinician के निर्देशानुसार patient को position करें; appropriate होने पर सामान्यतः बाईं करवट और आराम से मुड़े घुटनों वाली position उपयोग की जाती है।
6. Approved procedure में निर्देशित होने पर nozzle पर suitable water-soluble lubricant लगाएँ।
7. हर step समझाएँ और clinical protocol के अनुसार nozzle को धीरे insert करें; resistance होने पर कभी force न करें।

8. Clamp धीरे खोलें और prescribed rate पर solution administer करते हुए patient के comfort तथा response को monitor करें।
9. Patient को significant pain, bleeding, dizziness, distress या unexpected resistance हो तो flow तुरंत रोकें।
10. Pressure न बढ़ाएँ, solution को force न करें और prescribed volume या clinical instructions से आगे जारी न रखें।
11. Administration के बाद prescribed retention तथा toileting instructions follow करें और जरूरत के अनुसार सहायता दें।
12. Single-use components को safely dispose करें; reusable components केवल तभी साफ करें जब वे specifically reuse के लिए designed तथा approved हों।
13. Hand hygiene करें, solution, volume, time, patient response और complications document करें तथा concerns responsible clinician को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Procedure केवल appropriate clinical direction में trained personnel या ऐसे patient द्वारा किया जाए जिसे healthcare professional ने specifically instructions दिए हों।
- Contraindications होने पर या severe abdominal pain, unexplained rectal bleeding, suspected obstruction अथवा अन्य urgent warning sign होने पर medical assessment के बिना enema न करें।
- Nozzle या solution को resistance के विरुद्ध force न करें; significant pain या bleeding होने पर तुरंत रोकें।
- केवल prescribed solution, concentration, volume तथा administration rate उपयोग करें; कुछ solutions के गलत उपयोग से गंभीर electrolyte या fluid complications हो सकती हैं।
- Clinical protocol के अनुसार aseptic या clean technique अपनाएँ और single-use components को patients के बीच share न करें।
- Tubing, connectors या nozzle attachments का improvised उपयोग न करें और kit को pressurised equipment से कभी connect न करें।
- Severe pain, fainting, significant bleeding, breathing difficulty या अन्य गंभीर symptoms होने पर urgent clinical help लें।

देखभाल और रखरखाव

- Use से पहले packaging integrity, expiry dates तथा components की condition जाँचें।
- Kit तथा prescribed supplies को manufacturer instructions के अनुसार और contamination से दूर store करें।
- Single-use items को एक बार उपयोग के बाद discard करें और clinical waste को local procedures के अनुसार dispose करें।
- Reusable components को केवल manufacturer की validated instructions के अनुसार clean तथा disinfect करें।
- Damaged kits, missing components या suspected contamination report करें और use से पहले replace करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unprescribed solution, गलत volume या unsuitable temperature उपयोग करना।
- Resistance या pain होने पर nozzle को force करना या flow बढ़ाना।
- Single-use components reuse करना या hygiene बनाए रखने में चूक करना।
- Contraindications, warning symptoms या unexpected patient reactions को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।