

# 科学计算笔记

任云玮

## 目录

<b>1</b>	<b>绪论</b>	<b>2</b>
1.1	计算机数值计算基本原理 . . . . .	2
1.1.1	实数的存贮方法 . . . . .	2
1.1.2	实数的基本运算原理 . . . . .	3
1.2	误差的来源与估计 . . . . .	4
1.2.1	误差的来源 . . . . .	4
1.2.2	误差与有效数字 . . . . .	4
1.2.3	数值运算的误差估计 . . . . .	5
1.2.4	数字求和的舍入误差分析 . . . . .	6
1.3	避免算法失效的基本原则 . . . . .	7
<b>2</b>	<b>函数的多项式插值与逼近</b>	<b>9</b>
2.1	问题的提出 . . . . .	9
2.2	Lagrange 插值法 . . . . .	10
2.3	Runge 现象 . . . . .	11
2.4	Newton 插值法 . . . . .	11
2.5	Hermite 插值 . . . . .	13
<b>3</b>	<b>附录</b>	<b>14</b>
3.1	不等式 . . . . .	14

# 1 绪论

## 1.1 计算机数值计算基本原理

### 1.1.1 实数的存贮方法

1 定义 (二进制浮点数系)<sup>1</sup> 实数在计算机内部为近似存贮, 采用二进制浮点数系

$$F(2, n, L, U) = \{\pm 0.a_1a_2 \dots a_n \times 10^m\} \cup \{0\}$$

其中  $a_1 = 1$ ,  $a_i \in \{0, 1\}$ . 指数  $m$  满足  $L \leq m \leq U$ . 称  $n$  为其字长, 2 表示采用二进制。

## 2 标准 (IEEE)

1. 单精度:  $t = 24, L = -126, U = 127$

2. 双精度:  $t = 53, L = -1022, U = 1023$

3. Underflow Limit:  $UFL = 0.1 \times 2^L$ . 若  $0 < x < UFL$ , 则  $fl(x) = 0$ .

4. Overflow Limit:  $OFL = 0.11 \dots 1 * 2^U$ . 若  $x > OFL$ , 则  $fl(x) = \infty$ .

5. 舍入: 若  $UFL \leq x \leq OFL$ , 则  $fl(x)$  为舍入所得浮点数。舍入规则如下: 设  $x = 0.a_1a_2 \dots a_n \dots \times 2^m$ . 若  $a_{n+1} = 1$ , 则  $d_t + 1$  并舍弃其后项; 否则直接舍弃其后项。

3 定义 (机器精度) 下仅考虑舍去的情况。

$$\begin{aligned} x - fl(x) &= 2^m \times 0.0 \dots 0a_{n+2} \dots \\ &= 2^m \times [2^{-(t+2)} + 2^{-(t+3)} + \dots] \\ &= 2^m \times 2^{-(t+1)} \end{aligned}$$

其相对误差满足

$$\frac{x - fl(x)}{x} < \frac{x - fl(x)}{0.5 \times 2^m} = 2^{-t}$$

记为  $\varepsilon$ , 称之为机器精度。

## 4 命题

$$fl(x) = x(1 + \delta), \text{ 其中 } |\delta| \leq \varepsilon$$

---

<sup>1</sup>floating Number System

### 1.1.2 实数的基本运算原理

加法 + 硬件实现  $\Rightarrow$  四则运算。

**5 实现  $(x + y)$**  设  $x, y$  为浮点数, 则  $x + y$  的实现方式如下:

1. 对阶: 将指数  $m$  化为两者中较大者;
2. 尾数相加;
3. 舍入;
4. 溢出分析等……
5. 结果输出。

**评注** 由  $fl(x) + fl(y) = x(1 + \delta_x) + y(1 + \delta_y)$  可知, 当一个大数与一个小数相加时, 小数有可能被忽略, 所以应当避免大数小数间的相加。

## 1.2 误差的来源与估计

### 1.2.1 误差的来源

1. 模型问题。例：近似地球为球体来计算。
2. 测量误差。例：测量地球半径时的误差。
3. 方法误差（截断误差）。例：对于  $y = f(x)$ ，求  $f(x^*)$  时使用 Taylor 展开。
4. 舍入误差（rounding-off）。例：计算机计算时的误差。

### 1.2.2 误差与有效数字

**6 定义 (绝对误差)** 设  $x$  为给定实数， $x^*$  为其近似值。定义绝对误差为

$$e(x^*) = x^* - x.$$

称  $\varepsilon^*$  为其误差上界，若

$$|e(x^*)| \leq \varepsilon^*$$

**7 定义 (相对误差)** 对于同上的  $x$  和  $x^*$ ，定义其相对误差

$$e_r(x^*) = \frac{x^* - x}{x}$$

称  $\varepsilon_r^*$  为其相对误差界，若

$$|e_r(x^*)| \leq \varepsilon_r^*$$

**评注** 在实际应用中， $x$  通常是未知的，所以会采用

$$\bar{e}_r(x^*) = \frac{x^* - x}{x^*}$$

来代替相对误差。对于分子，使用绝对误差界来替代，有如下不等式

$$|\bar{e}_r(x^*)| \leq \frac{\varepsilon^*}{|x^*|}.$$

这两种相对误差界间的差别，当  $\varepsilon^* \ll 1$  时，满足

$$|e_r - \bar{e}_r| = O((\varepsilon_r^*)^2)$$

**8 定义 (有效数字)** 设  $x \in R$ ， $x^* = 0.a_1a_2 \cdots a_k \times 10^m$  为其近似值。称  $x^*$  相对于  $x$  有  $n$  ( $n \leq k$ ) 位有效数字，若  $n$  是满足下式的  $n$  的最大值。

$$|x^* - x| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n}$$

**评注** 在实践中，一般可以采用更加简便的方法，对于归一化以后的  $x^*$ ，在尾数部分有  $n$  位，则称其有  $n$  位有效数字。注意，此方法对于错误的舍入结果是不适用的，对于错误的情况，需要再减去一位有效数字。

**9 定理 (误差与有效数字)** 若  $x = 0.a_1a_2 \dots a_n \times 10^m$  有  $n$  位有效数字，则

$$\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{1-n}.$$

反之，若

$$\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2(1+a_1)} \times 10^{1-n},$$

则  $x^*$  至少有  $n$  位有效数字。

**证明** 对于前者，只需利用有效数字的定义，以及利用  $x \geq 0.a_1$ （仅考虑  $a_1 \neq 0$  的情况）。对于后者，证明是类似的。

### 1.2.3 数值运算的误差估计

以下内容都假设运算无误差。

**10 定理 (四则运算误差估计)**

1. 加/减法:  $\varepsilon(x^* \pm y^*) \leq \varepsilon_x^* + \varepsilon_y^*$
2. 乘法:  $\varepsilon(x^* y^*) \leq |x^*| \varepsilon_y^* + |y^*| \varepsilon_x^*$
3. 除法:  $\varepsilon\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \leq \frac{|x^*| \varepsilon_y^* + |y^*| \varepsilon_x^*}{|y^*|^2}$

**证明** 考虑加法的误差估计。对于  $x, y$  及其近似值  $x^*, y^*$ ，计算  $x^* \pm y^*$  和  $x \pm y$  间的误差。

$$\begin{aligned} |x^* \pm y^* - (x \pm y)| &\leq |x^* - x| + |y^* - y| \leq \varepsilon_x^* + \varepsilon_y^* \\ \Rightarrow \varepsilon(x^* \pm y^*) &\leq \varepsilon_x^* + \varepsilon_y^* \end{aligned}$$

对于其他的运算，证明是类似的。（证明中可用  $+1-1$  技巧）

**11 定理 (运算的误差估计)** 设  $A = f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， $\mathbf{x}^*$  是  $\mathbf{x}$  的估计值。利用带 Peano 余项的 Taylor 展开，可知  $A$  的绝对误差满足

$$\begin{aligned} e(A^*) &= f(\mathbf{x}^*) - f(\mathbf{x}) \\ &= \sum_{p=1}^q d^p f(\mathbf{x}^*) + o(\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|^q) \\ \text{取 } q=1, \text{ 则} \\ &= \sum_{k=1}^n \partial_k f(\mathbf{x}^*)(x_k^* - x_k) + o(\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|) \end{aligned}$$

利用上式，可知

$$\begin{aligned}\varepsilon(A^*) &\approx \sum_{k=1}^n |\partial_k f(\mathbf{x}^*)| \varepsilon(x^*) \\ \varepsilon_r(A^*) &= \frac{\varepsilon(A^*)}{|A^*|}\end{aligned}$$

**评注** 对于定义在  $\mathbf{R}$  上的函数，即为

$$\varepsilon(f(x^*)) \approx |f'(x^*)| \varepsilon(x^*)$$

#### 1.2.4 数字求和的舍入误差分析

**12 命题**  $n$  个浮点数相加，若将它们从小到大排列后相加，则可以减小舍入误差。

**证明** 考虑浮点数的求和  $S_n = \sum_i^n a_i$ ，在计算机中的过程表现为

$$\begin{aligned}S_2^* &= fl(a_1 + a_2) = (a_1 + a_2)(1 + \varepsilon_2), \quad |\varepsilon_2| \leq \varepsilon = 2^{-t} \\ &\dots\dots\dots \\ S_n^* &= fl(S_{n-1}^* + a_n)(1 + \varepsilon_n), \quad |\varepsilon_n| \leq \varepsilon\end{aligned}$$

对于  $S_n^*$  的误差，若定义  $\varepsilon_1 = 0$ ，则

$$S_n^* = \sum_{k=1}^n a_k \prod_{p=k}^n (1 + \varepsilon_p)$$

对误差进行估计，舍去高阶无穷小，有

$$\prod_{i=k}^n (1 + \varepsilon_k) \approx 1 + \sum_{i=k}^n \varepsilon_k$$

综合上两式，有

$$\begin{aligned}S_n^* &\approx \sum_{k=1}^n a_k (1 + \sum_{p=k}^n \varepsilon_p) \\ &= S_n + \sum_{k=1}^n a_k \sum_{p=k}^n \varepsilon_p\end{aligned}$$

进行移项，并取绝对值，再利用三角不等式，以及  $|\varepsilon_i| \leq \varepsilon$ ，得

$$|S_n^* - S_n| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| \sum_{p=k}^n |\varepsilon_p| \leq \varepsilon \sum_{k=1}^n |a_k| (n - k + 1)$$

其中  $n - k + 1$  关于  $k$  单调减少，所以根据排序不等式 [引理34]，即可知命题成立。■

### 1.3 避免算法失效的基本原则

#### 13 定理 (原则)

1. 避免两数相除/相减, 否则会严重损失有效数字。
2. 避免两相近数相减。
3. 避免绝对值很小的数做除数。
4. 避免大数与小数相加;
5. 简化计算步骤。

#### 14 算法 (高效计算 $e^A$ ) 高效计算 $e^A$ , 其中 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 。首先有

$$e^A = e^{(A/2^n)2^n} = B^{2^n}$$

只需要得到  $B$ , 即可以利用倍乘的方法快速得到  $B^{2^n}$ 。下对于  $B$  进行估计。当  $x \rightarrow 0$  时,  $e^x$  有 Taylor 展开

$$e^x = 1 + x + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

而取足够大的  $n$ , 即可以使得  $A/2^n \approx 0$ , 则可以对它展开得

$$B \approx I + C + \frac{1}{2}C^2, \text{ 其中 } C = A/2^n$$

而对于倍乘, 考虑  $B^2$ , 展开平方得

$$B^2 \approx I + 2(C + \frac{1}{2}C^2) + (C + \frac{1}{2}C^2)^2$$

从右至左相加即可。

#### 15 算法 (秦九韶, 多项式估值) 设有多项式 (1), 计算 $p(z), z \in \mathbf{R}$ 的值。

$$p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \quad (1)$$

定义  $b_n$  满足

$$b_0 = a_0, \quad b_k = a_k + b_{k-1}z$$

则  $b_n$  即为所要求的值。并且成立

$$p'(z) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k z^{n-1-k}$$

**证明** 用  $x - z$  去除  $p(x)$ , 记所得余数为  $b_n(x)$ , 即

$$p(x) = (x - z)q(x) + b_n(x),$$

代入  $x = z$ , 则左侧第一项为 0, 可知  $p(z) = b_n(z)$ 。将两边的式子展开, 利用对应系数相等, 即可得算法中  $b_n$  的递推式。

**16 定理 (外推法)** 设  $x_0, x_1$  是  $x$  的两个估计值, 且  $x_1$  相较于  $x_0$  更接近  $x$ , 则可以通过恰当的权值  $\omega$ , 使得它们的加权平均

$$\bar{x} = x_1 + \omega(x_1 - x_0)$$

更加接近精确值  $x$ 。

**17 算法 ( $\pi$  的估计)** 考虑单位圆, 其面积为  $\pi$ , 设  $\pi_n$  为单位圆的内接正  $2n$  边形的面积, 以及

$$\tilde{\pi}_n = \frac{1}{3}(4\pi_{2n} - \pi_n)$$

则  $\pi_n$  与  $\tilde{\pi}_n$  与  $\pi$  的误差满足

$$|\pi_n - \pi| = O\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad |\tilde{\pi}_n - \pi| = O\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

**证明** 对于  $\pi_n$ .

$$\pi_n = n \sin \frac{\pi}{n} = \pi - \frac{\pi^3}{3!} \frac{1}{n^2} + \frac{\pi^5}{5!} \frac{1}{n^4} - \cdots \Rightarrow |\pi_n - \pi| = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

对于  $\tilde{\pi}_n$ .

$$\begin{aligned} \tilde{\pi}_n &= \pi_{2n} + k(\pi_{2n} - \pi_n) = (1+k)\pi_{2n} - k\pi_n \\ &= (1+k)\left(\pi - \frac{\pi^3}{3!} \frac{1}{4n^2} + \cdots\right) - k\left(\pi - \frac{\pi^3}{3!} \frac{1}{n^2} + \cdots\right) \\ &= \pi - \left(\frac{k+1}{4} - k\right) \frac{\pi^3}{3!} \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \end{aligned}$$

为使式子的第二项为零, 取  $k = \frac{1}{3}$ , 则成立

$$|\tilde{\pi}_n - \pi| = O\left(\frac{1}{n^4}\right) \quad \blacksquare$$

**评注** 在实际中,  $\pi_n$  也是没有办法直接计算而得的, 但是对于  $n = 3$ , 即 6 边形的情况, 可以知道  $\pi_3 = 3\sqrt{3}/2$ 。同时有递推公式

$$\pi_{2n} = \sqrt{2n(n - \sqrt{n^2 - \pi_n^2})},$$

而开平方可以通过迭代的方式实现, 从而即计算得到足够精确的  $\pi_{2n}$  和  $\pi_n$ 。



## 2 函数的多项式插值与逼近

### 2.1 问题的提出

**18 定义 (插值)** 设函数  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上有定义, 且已知在点  $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$  处的函数值  $y_i = f(x_i)$ , 若存在一简单函数  $P(x)$ , 成立

$$P(x_i) = y_i,$$

则称  $P(x)$  为  $f(x)$  的插值函数, 点  $x_1, x_2, \dots, x_n$  称为插值节点,  $[a, b]$  称为插值区间, 求  $P(x)$  的方法被称为插值法。

若  $P(x) \in P_n$  为次数不超过  $n$  的多项式, 则称为多项式插值。

**19 定理 (唯一性)** 给定满足定义18的  $n+1$  个点上的函数值, 则次数不超过  $n$  的插值多项式  $P_n(x)$  存在且唯一。

**证明** 利用待定系数法, 设多项式的系数为  $a_0, \dots, a_n$ , 则有线性方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1x_1 + \cdots + a_nx_1^n = y_1, \\ \quad \quad \quad \dots\dots\dots \\ a_0 + a_1x_n + \cdots + a_nx_n^n = y_n, \end{cases}$$

其系数矩阵为 Vandermonde 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}$$

根据定义18中对于  $x_i$  的要求, 矩阵行列式成立

$$\det A = \prod_{i,j=0, i>j}^n (x_i - x_j) \neq 0.$$

所以该方程组有唯一解。

**评注** 虽然插值多项式是唯一的, 但是根据基函数的选取的不同, 系数是不相同的, 所以才需要不同的插值方法。

## 2.2 Lagrange 插值法

20 定理 (Lagrange 插值法) 定义

$$l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)}$$
$$(L_n f)(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x),$$

则  $L_n f$  即为  $f$  的插值多项式。

**证明** 考虑构造  $l_i \in P_n$ , 满足条件  $l_i(x_j) = \delta_{ij}$ , 这样  $L_n f = \sum y_i l_i$  满足要求。改写条件为 (以  $l_0$  为例)

$$l_0(x) = \alpha(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$
$$l_0(x_0) = 1$$

解得

$$\alpha = \frac{1}{(x_0 - x_1) \cdots (x_0 - x_n)} \quad \blacksquare$$

**评注** 这样构造插值多项式的动机在于在取定插值节点后, 插值实际上相当于构造一个从  $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^{n+1}$  到  $y^*(x) \in P_n$  的一个映射  $\mathcal{F}$ , 并且可以证明,  $\mathcal{F}$  是线性的。因此成立

$$\mathcal{F}(\mathbf{y}) = \mathcal{F}\left(\sum_{i=0}^n y_i \mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=0}^n y_i \mathcal{F}(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x).$$

21 定理 (Lagrange 余项公式) 设符号含义同定理20且  $f$  充分光滑, 则对于每一个固定的  $x$  成立

$$f(x) - (L_n f)(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中  $\xi \in (a, b)$  且

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n).$$

**证明** 固定  $x \neq x_i$ , 定义  $R(x)$  满足

$$f(x) - (L_n f)(x) = R(x) \omega_{n+1}(x).$$

构造辅助函数  $g(t)$

$$g(t) = f(t) - (L_n f)(t) - R(x) \omega_{n+1}(t).$$

根据插值法与  $R(x)$  的定义, 成立

$$g(x_i) = 0, \quad g(x) = 0,$$

即函数  $g(t)$  有  $n+2$  个零点。反复应用 Rolle 定理, 可知存在  $\xi \in (a, b)$ , 成立  $g^{(n+1)} = 0$ , 即

$$\begin{aligned} g^{(n+1)}(\xi) &= f^{(n+1)}(\xi) - R(x)(n+1)! = 0 \\ \Rightarrow R(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \end{aligned}$$

结合  $R(x)$  的定义式即可知命题成立。■

**评注** 当已知  $f^{(n+1)}$  有界时, 可以使用此公式进行估计。

## 2.3 Runge 现象

**22 定理** 对于复函数  $f(z)$ , 如果存在  $r_0 > \frac{3}{2}(b-a)$ , 使得  $f(z)$  在  $B_{r_0}(\frac{a+b}{2})$  内解析, 则  $P_n(x) = L_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛与  $f(z)$ . 这里  $B_{r_0}(\frac{a+b}{2})$  为以  $\frac{a+b}{2}$  为圆心,  $r_0$  为半径的圆。

## 2.4 Newton 插值法

**23 例**  $n=2$  时问题的求解。

设  $y^*(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$ , 根据  $y^*(x_0) = y_0$ ,  $y^*(x_1) = y_0$ , 得  $a_0 = f(x_0)$ ,  $a_0 + a_1(x_1-x_0) = f(x_1)$ , 即

$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

可以发现  $a_1$  为割线的斜率。同理可知

$$a_2 = \frac{f(x_2) - f(x_0) - a_1(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1}$$

为斜率的斜率。

**24 定义 (差商)** 递归  $f(x)$  在  $x_i, \dots, x_{i+n}$  的各阶差商为:  $f[x_i] = f(x_i)$ , 第  $k$  阶差商为

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

**25 定理 ( $n$  次 Newton 插值法)**  $x_0, \dots, x_n$  为互异插值点, 则函数  $f(x)$  满足

$$\begin{aligned} f(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots \\ &\quad + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0) \cdots (x-x_{n-1}) + R_n(x). \end{aligned}$$

其中  $R_n(x)$  为其 Newton 插值多项式的余项, 为

$$R_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x](x-x_0) \cdots (x-x_n).$$

**证明** 根据差商的定义, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= f[x_0] + f[x_0, x](x - x_0) \\ f[x_0, x] &= f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x](x - x_1) \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$f[x_0, \dots, x_{n-1}, x] = f[x_0, \dots, x_n] + f[x_0, \dots, x_n, x](x - x_n)$$

将上述式子反复代入它上面的式子, 记得 Newton 插值公式。

**评注** Newton 插值法的优点在于, 当插值点的个数增加时, 无需重新计算原有的系数, 即 Newton 插值多项式是可以递归计算的。

**26 定理** 根据 Newton 插值公式, 可以得到如下差商的性质。

1.

$$f[x_0, \dots, x_m] = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$$

2. 设  $i_0, \dots, i_m$  为  $0, \dots, m$  的任意一个排列, 则

$$f[x_0, \dots, x_m] = f[x_{i_0}, \dots, x_{i_m}].$$

3. 广义 Lagrange 中值定理

$$f[x_0, \dots, x_m] = \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}, \quad \xi \in (\min\{x_i\}, \max\{x_i\})$$

**证明** 交换插值节点的顺序后,  $n$  次 Newton 插值多项式的  $n$  次项系数不变, 所以 [2.] 成立。同 Lagrange 插值多项式 ( $m-1$  次) 比较第  $m-1$  次项系数及其余项, 即可得到 [1.] 和 [3.]

**评注** 根据 [3.] 可知, 对于一个  $n$  次多项式,  $n$  阶差商即为其  $n$  次项系数,  $k(k > n)$  阶差商为零。

**27 定义** 给定序列  $\{f_k\}$ ,  $f_k$  表示  $f$  在  $x = x_k$  处的值, 定义

1. 前向差分算符  $\Delta f_k = f_{k+1} - f_k$ ,

2. 移位算符  $E f_k = f_{k+1}$ ,

3. 恒等算符  $I f_k = f_k$ .

**28 定理 (算符二项式定理)** 对于算符  $A, B$ , 若它们可交换, 则成立二项式定理

$$(A + B)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$$

**29 命题** 根据定义27和定理28可知

$$\begin{aligned}\Delta &= E - I \\ \Delta^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-I)^{n-k} E^k \\ E^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \Delta^k\end{aligned}$$

**30 定理 (均匀插值)** 设  $x_0, x_1, \dots, x_n$  满足  $x_k = x_0 + kh$ , 则有

$$\begin{aligned}f[x_k, x_{k+1}] &= \frac{\Delta f_k}{h} \\ f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] &= \frac{\Delta^2 f_k}{2h^2} \\ &\dots\dots\dots \\ f[x_k, \dots, x_{k+m}] &= \frac{\Delta^m f_k}{m!h^m}\end{aligned}$$

**31 定理 (Newton 前插公式)** 设记号同定理30, 另  $x = x_0 + th$ ,  $t \in \mathbf{R}$ , 代入定理25, 则成立

$$N_n(x) = f_0 + t\Delta f_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!}\Delta^n f_0.$$

其余项为

$$R_n(x) = \frac{t(t-1)\dots(t-n)}{(n+1)!}h^{n+1}f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_n)$$

**评注** 利用广义二项式定理, 有

$$\begin{aligned}f(x) &= f(x_0 + th) = E^t f(x_0) = (I + \Delta)^t f(x_0) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{t}{k} \Delta^k f_0\end{aligned}$$

## 2.5 Hermite 插值

**32 定理** 设  $f \in C^n[a, b]$ ,  $x_0, x_1, \dots, x_n$  为  $[a, b]$  上的互异节点, 则  $f[x_0, \dots, x_n, x]$  在  $[a, b]$  上连续。

**33 定理 (Hermite 插值)** 若给出  $m+1$  个插值条件 (含函数值和导数值) 可构造出次数不超过  $m$  次的多项式。

**评注** 可以利用待定系数法或者基函数法求的 Hermite 插值多项式。

### 3 附录

#### 3.1 不等式

34 引理 (排序不等式) 对于满足下述条件的  $\{a_n\}, \{b_n\}$ ,

$$0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$$

$$0 \leq b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$$

则同序相乘求和值最大, 逆序最小, 即

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{k_i} \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1}$$

35 引理 (算数-几何均值不等式)

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

当且仅当  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$  时等号成立。

**证明** 因为有齐次性, 所以不妨设  $\prod a_i = 1$ , 并令

$$a_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_2}, \quad \dots, \quad a_{n-1} = \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n}, \quad a_n = \frac{\alpha_n}{\alpha_1}$$

则只需证明下式即可。

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{\alpha_1} \geq n$$

不妨设  $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \cdots \leq \alpha_n$ , 则根据排序不等式

$$\text{L.H.S} \geq \alpha_1 \frac{1}{\alpha_1} + \cdots + \alpha_n \frac{1}{\alpha_n} = n \quad \blacksquare$$