

Studijní text DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Jan Engler

(Poslední změna: 28. září 2026)

Obsah

Obsah	ii
1 Limity a Derivace	1
1.1 Paradox pohybu	1
1.2 Limity	3
1.3 Derivace	8
2 Co je diferenciální rovnice?	14
2.1 Volný pád	14
2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu	14
3 Exponenciální růst	15
3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru.	15
3.2 Zavedení funkce exp	15
3.3 Nevlastní limity	17
3.4 Zavedení funkce ln	20
3.5 Vyčíslení funkce exp	23
3.6 Obecná mocnina	24
4 Harmonický oscilátor	26
4.1 Závaží na pružině	26
4.2 Zavedení funkcí sin, cos	26
4.3 Komplexní exponenciála	30
4.4 Kruhový pohyb	31
4.5 Tlumený oscilátor	33
5 Pohyby planet	36
5.1 Kuželosečky	36
5.2 Polární souřadnice	39
5.3 Newtonův gravitační zákon	40
6 Integrál	44
6.1 Plocha pod grafem	44
6.2 Primitivní funkce	44
6.3 Objemy	44
7 Lineární rovnice	45
7.1 Lineární homogenní rovnice	45
7.2 Lineární nehomogenní rovnice	45
7.3 Metoda integračního faktoru.	45

7.4	Soustavy lineárních rovnic	45
8	Metoda separace proměnných	46
9	Numerické řešení diferenciálních rovnic	47
9.1	Explicitní Eulerova metoda	47
9.2	Aproximace čísla π	47
10	Mocninné řady	48
11	WIP	49
11.1	Závěr	50
	Summary and Outlook	53

1 Limity a Derivace

1.1 Paradox pohybu

Na základní škole se učí, že pokud auto mezi časy $t, t + \Delta t$ urazí vzdálenost Δx , jeho rychlost (v časovém intervalu $(t, t + \Delta t)$) je

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1.1)$$

Pojďme se nad tím zamyslet. Představme si, že jedeme po nekonečně dlouhé rovné silnici, podél níž je metr, a v každém čase t můžeme na metru odečíst naši polohu $x(t)$.

Příklad 1.2. Pokud jedeme rovnoměrně, naše poloha je afinní funkcí času $x(t) = v \cdot t + x_0$. Vybereme-li si dva momenty v čase $t, t + \Delta t$, vyjde nám ze vzorečku 1.1

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{v \cdot (t + \Delta t) + x_0 - v \cdot t - x_0}{\Delta t} = v$$

a vše je v pořádku. ┘

Příklad 1.3. Zkusme jet tak, aby naše poloha byla $x(t) = t^2$. To by šlo docílit tím, že bychom jeli ve vakuu (bez odporu vzduchu) a měli stále nohu na plynu. Teprve zkusme začít měřit po 3 sekundách na 1 sekundu ($t = 3, \Delta t = 1$) :

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 1)^2 - 3^2}{1} = 7$$

Pak zkusme $t = 3, \Delta t = 3$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 3)^2 - 3^2}{3} = 9 > 7$$

Měření přes delší časový interval nám „zvětšilo“ rychlost. Zkusme $t = 3, \Delta t = 0.5$:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + .5)^2 - 3^2}{.5} = \frac{13}{2} < 7$$

Měření přes kratší časový interval nám „zmenšilo“ rychlost. Jaká je naše skutečná rychlost? ┘

Problém je, že vzoreček 1.1 udává *průměrnou rychlost* na časovém intervalu. Ta ale závisí na volbě onoho intervalu. My chceme mluvit o rychlosti v jednom čase. To ale nedává smysl, vzoreček 1.1 vyžaduje dva časy: snažit se dosadit $\Delta t = 0$ vede na nesmyslný výraz

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t) - x(t)}{0} = \frac{0}{0} \quad (1.4)$$

Problém vyřešil Isaac Newton. On si představoval, že šíp sleduje na *velmi malém časovém intervalu*, v rámci něhož se rychlost moc nemění. Pokud je rychlost téměř konstantní, vracíme se k Příkladu 1.2 a tam vzoreček 1.1 fungoval. Dopustíme se chyby, ale čím menší interval budeme uvažovat, tím menší bude chyba. Zkusme to!

Příklad 1.5 (Pokračování Příkladu 1.3).

$$\begin{aligned} t = 3, \Delta t = 1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+1)^2 - 3^2}{1} = 7 \\ t = 3, \Delta t = 0.1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.1)^2 - 3^2}{0.1} = 6.1 \\ t = 3, \Delta t = 0.01 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.01)^2 - 3^2}{0.01} = 6.01 \\ t = 3, \Delta t = 0.001 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.001)^2 - 3^2}{0.001} = 6.001 \\ t = 3, \Delta t = h &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6 + h \end{aligned}$$

Nemůžeme sice dosadit $\Delta t = 0$, ale můžeme dosadit libovolně malé Δt , a výsledek tím bude libovolně blízko číslu 6. Je tedy rozumné definovat rychlost v čase $t = 3$ jako výsledek *limitního procesu*, při kterém pořád zmenšujeme Δt . Výsledek limitního procesu značíme

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6$$

a říkáme mu *derivace funkce* $x(t) = t^2$ v bodě $t = 3$. Derivace značíme čárkou, píšeme $x'(3) = 6$. ┘

Obecně definujeme derivaci funkce f v bodě x

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Pak platí

$$\begin{aligned} f'(x) &\approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ \Rightarrow f(x+h) &\approx f(x) + hf'(x) \quad \text{a aproximace je tím lepší, čím lepší je } h \end{aligned}$$

Například

$$(3+h)^2 \approx 9 + 6h$$

Úloha 1.6. Nakreslete bod $(3, 9)$, grafy funkcí $f(x) = x^2$ a $g(x) = 9 + 6(x-3)$. Co vidíte? Umíte to zopakovat pro bod (x_0, x_0^2) ? Jak to souvisí s tím, kde je funkce klesající, roustoucí a kde nabývá minima? ┘

1.2 Limity

V této sekci si zavedeme derivace a naučíme se je počítat. Před tím nás ale čekají přípravné práce.

Definice 1.7 (Funkce). Funkce (= zobrazení) se skládá z následujících dat:

- Množiny A , zvané *definiční obor*,
- Množiny B , zvané *obor hodnot*,
- Pravidla, které každému prvku $a \in A$ přiřadí právě jeden prvek $f(a) \in B$. Tomuto pravidlu říkáme předpis funkce.

Značení $f: A \rightarrow B$ znamená, že A je definiční obor funkce f a B je její obor hodnot.

Příklad 1.8. $A = \{\text{Leden, Únor, Březen, ..., Prosinec}\}$, $B = \{28, 30, 31\}$,

$$f(\text{Leden}) = 31$$

$$f(\text{Únor}) = 28$$

$$f(\text{Březen}) = 31$$

$$\vdots$$

Funkce $f: A \rightarrow B$ udává počet dnů v měsíci v nepřestupném roce. Není daná žádným matematickým vzorečkem, její definiční obor neobsahuje čísla. ┘

Definice 1.9 (Limita funkce). Necht $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a její definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta) \setminus \{c\}$ pro nějaké $\Delta > 0$. Limita funkce f v bodě c , pokud existuje, je číslo L splňující

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Značíme ho

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) := L$$

Příklad 1.10. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = ?$

Řešení: V sekci 1.1 jsme nahlédli, že výsledek má být 6. Pojdme si to spočítat z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$$

zjednodušíme zlomek:

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: 6 + h \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon) \quad (1.11) \quad \downarrow$$

↳ Teď je to snadné, s volbou $\delta := \varepsilon$ bude výrok 1.11 pravdivý. ┘

Poznámka 1.12.

- Všimněte si, že $f(h) = \frac{(3+h)^2-3^2}{h}$ nelze definovat v bodě $h = 0$, opravdu jsme tedy spočítali něco netriviálního.
- Součástí řešení příkladu 1.10 bylo uhodnutí, jak má řešení vyjít. To jsme prováděli na základě numerického experimentu. Níže si vybudujeme nástroje, pomocí kterých ke stejnému výsledku dojdeme mechanickým počítáním. ┘

Úloha 1.13. Necht $f(x) = 2x + 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$ ┘

Úloha 1.14. Necht $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

A $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis $g(x) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = ?$ ┘

Příklad 1.15. Necht $f(x) = x^2$. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = ?$

Řešení: uhadneme, že výsledek má být 9. Spočítejme to z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta) \setminus \{3\}: x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

Očividně, pokud $x = 3$, pak $x^2 = 9 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$, takže si nijak neuškodíme, pokud budeme dokazovat

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta): x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

neboli

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < \varepsilon$$

↴

↳ **Jak vymyslet důkaz.** Rozepíšeme si výraz na pravé straně, který chceme odhadovat:

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{\text{co s tímto?}}$$

Myšlenka je následující: $|x - 3| < \delta$ znamená, že x je blízko číslu 3. Pokud je x blízko číslu 3, bude $|x + 3|$ blízko číslu 6. Konkrétně využijeme odhad $|x + 3| < 6 + \delta$. Pokud půjdeme dost blízko ($\delta \leq 1$), umíme například zaručit, že $|x + 3| < 7$. Pak dostáváme

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{< 7} < 7\delta$$

takže pro $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ bychom formálně dostali

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon.$$

Pozor, na odhad členu $|x - 3|$ jsme využili $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ a na odhad členu $|x + 3|$ zase $\delta \leq 1$ a není jasné, jestli jedna z nerovností plyne z druhé (to závisí na tom, jak velké je ε). Musíme tedy zaručit obě nerovnosti.

Důkaz. Zvolme $\delta := \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$. Pak platí

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x + 3| < 6 + \delta \leq 7$$

Takže

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon$$

□

┘

Poznámka 1.16.

- Odhadnout funkci $f(x)$ znamená omezit ji nějakým číslem nebo jinou funkcí, to jest ukázat nerovnost typu

$$|f(x)| \leq C, \quad C \text{ je číslo, nebo } |f(x)| \leq g(x), \quad g \text{ je funkce.}$$

Nemá to nic společného s „hádáním“.

- Všimněme si, že vymýšlení důkazu může probíhat opačně, než jak je sepsaný hotový důkaz. V tomto případě jsme museli přijít na to, jak zvolit δ , aby nám vycházeli nerovnosti.

┘

Příklad 1.17. Necht $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

Řešení: ukážeme, že limita neexistuje.

┘

↳ **Důkaz.** Pro spor předpokládejme, že existuje $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ (na které ale později budeme klást požadavky) najdeme $\delta > 0$ tak, že

$$\begin{aligned} & \forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \Rightarrow & \begin{cases} \forall x \in (-\delta, 0) \setminus \{0\}: & 0 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \forall x \in (0, \delta) \setminus \{0\}: & 1 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \end{cases} \end{aligned}$$

Obě čísla 0, 1 musí ležet v intervalu $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, který má délku 2ε , takže

$$1 = |1 - 0| \leq 2\varepsilon$$

jenže $\varepsilon > 0$ bylo libovolné. Volbou $\varepsilon = \frac{1}{3}$ dostáváme $1 \leq \frac{2}{3}$, spor. $\square$

Poznámka 1.18. Obrat použitý v Příkladu 1.17 je častý: prvně pracujeme s obecným $\varepsilon > 0$ a později na něj klademe další požadavky tak, abychom dostali, co chceme. Můžeme se tak vyvarovat ad hoc volbám na začátku důkazu, jako například $\delta \leq \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$ v Příkladu 1.10. Čtenáři tak usnadníme práci, protože je jasné vidět, ve kterém kroku se použila specifická volba δ nebo ε . $\lrcorner$

Vidíme, že pokud se nesnažíme konstruovat funkce s patologickým předpisem, nebo násilím odebranými body z definičního oboru, většinou platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definice 1.19 (Spojitá funkce). Mějme $c \in \mathbb{R}$ a funkci f , jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a jejíž definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta)$ pro nějaké $\Delta > 0$. Říkáme, že f je spojitá v bodě c , pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c), \text{ neboli } \lim_{h \rightarrow 0} f(c + h) = f(c).$$

Říkáme, že f je spojitá na (a, b) , pokud její definiční obor obsahuje (a, b) a je spojitá v bodě c pro všechna $c \in (a, b)$.

Dále ukážeme, že polynomy jsou spojité funkce.

Definice 1.20 (Součet, součin a podíl funkcí, násobek funkce). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Pak definujeme funkce $f + g$, $f \cdot g$, αf tak, že

- $f + g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $f \cdot g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha f: A \rightarrow \mathbb{R}$
- $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$, $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$, $(\alpha f)(x) := \alpha \cdot f(x)$

Dále definujeme funkci $\frac{f}{g}$ tak, že

- $\frac{f}{g}: \{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$

Polynomy jsou právě ty funkce, které lze z funkcí $f(x) = 1$ a $f(x) = x$ získat operacemi sčítání, násobení (dvou funkcí) a násobku (číslo a funkce). Už víme, že funkce 1 a x jsou spojité. Pokud tedy ukážeme, že výše popsané operace zachovávají spojitost funkcí (například pokud f a g jsou spojité, pak $f + g$ je spojitá), dostaneme, že všechny polynomy jsou spojité.

Věta 1.21 (Limita součtu, součinu, podílu a násobku). Nechť $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pokud existují limity

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

Pak existují i příslušné limity pro $f + g$, $f \cdot g$, αf a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = L + M, \quad (1.22)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = L \cdot M, \quad (1.23)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (\alpha f)(x) = \alpha L, \quad (1.24)$$

Pokud navíc $M \neq 0$, existuje limita i pro $\frac{f}{g}$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{L}{M} \quad (1.25)$$

Důkaz. Od tohoto důkazu dál nebudeme podrobně vysvětlovat myšlenkový postup, jak k důkazu dojít, a budeme psát už hotový důkaz. Jednak to usnadní práci autorovi, a také to donutí čtenáře se nad důkazem zamyslet.

První dokažme rovnost 1.22. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\}: |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

a dále $\delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\}: |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dále dokažme rovnost 1.23. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$, $\delta_3 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\}: |f(x) - L| \leq 1$$

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\}: |f(x) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2|M|}$$

$$\forall x \in (c - \delta_3, c + \delta_3) \setminus \{c\}: |g(x) - M| \leq \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)}$$

↴

↳ Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - f(x)M + f(x)M - LM| \\ &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - M| + |f(x) - L| \cdot |M| \\ &\leq (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2|M|} \cdot |M| = \varepsilon \end{aligned}$$

Rovnost 1.24 plyne z 1.23, pokud za g vezmeme konstantní funkci. Rovnost 1.25 se dokazuje podobně jako 1.23 a je ponecháno jako cvičení pilnému čtenáři. $\square$

Důsledek 1.26.

- Pokud f, g jsou spojité na (a, b) , $\alpha \in \mathbb{R}$, pak jsou na (a, b) spojité i funkce

$$f + g, \quad f \cdot g, \quad \alpha f$$

Navíc pokud $g \neq 0$ na (a, b) , je na (a, b) spojitá i $\frac{f}{g}$.

- Polynomy jsou spojité funkce na celém $\mathbb{R}$.

Příklad 1.27. Ukažte, že $f(x) = \sqrt{x}$ je spojitá na $(0, \infty)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} - \sqrt{x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{\lim_{h \rightarrow 0} h}{\lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{0}{2\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

1.3 Derivace

Definice 1.28 (Derivace funkce). Mějme funkci $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$. Derivace funkce f v bodě x , pokud existuje, je číslo

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Také značíme $\frac{df}{dx}(x) = f'(x)$. Dále definujeme derivace vyšších řádů

$$\begin{aligned} f'' &:= (f')', \quad f^{(3)} := (f'')', \quad \dots, \quad f^{(n)} := (f^{(n-1)})', \\ \text{nebo taky} \quad \frac{d^2 f}{dx^2} &:= f'', \quad \frac{d^3 f}{dx^3} := f^{(3)}, \quad \dots, \quad \frac{d^n f}{dx^n} := f^{(n)}. \end{aligned}$$

Úloha 1.29. $f(x) = C$ (konstanta). $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.30. $f(x) = ax + b$. $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.31. $f(x) = x^2$. $f'(x) = ?$ $f''(x) = ?$ $f^{(3)}(x) = ?$ ┘

Příklad 1.32. $f(x) = x^n, n \geq 2$. $f'(x) = ?$

Řešení: Roznásobením závorek v $(x + h)^n$ dostáváme členy typu $x^a h^b$, $a + b = n$.

$$(x + h)^n = (x + h) \cdot \dots \cdot (x + h) = x^n + nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n$$

Členy $x^a h^b$, $b \geq 2$ nás příliš netrápí, protože k limitě $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ nepřispějí. Důležité je, že u členu $x^{n-1}h$ je koeficient n , protože tolik existuje možností, jak si z jedné závorky „vybrat“ h a z ostatních x . Tedy

$$(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n}{h} = nx^{n-1}$$

┘

Věta 1.33 (Existence derivace implikuje spojitost). Pokud f má v bodě x derivaci, je v tomto bodě spojitá.

Důkaz.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} h \right) \\ &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(x) + f'(x) \cdot 0 = f(x) \end{aligned}$$

□

Dále nás bude zajímat, jak se derivace chovají, když funkce sčítáme a násobíme. Asi nás nepřekvapí, že bude platit $(f + g)' = f' + g'$. Na první pohled ale není jasné, jak má vyjít $(fg)'$. Představme si, že prodáváme chleba, a za jeden týden prodáme 300 kg chleba za 100 Kč/kg. Další týden prodáme o 5 kg chleba víc a zdrazíme ho o 10 Kč/kg. O kolik víc vyděláme? Samozřejmě odpověď je triviální, ale pojďme ji spočítat přibližně bez toho, aniž bychom přímo násobili 305×110 . Za chleba navíc bychom (při staré ceně) vydělali $5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$ a zdražením (při původní kiláži prodaného chleba) bychom vydělali $300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč}$, tedy změna výdělku jde aproximovat jako

$$300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč} + 5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$$

Chyba, které jsme se dopustili, činí $5 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč/kg}$, a tudíž je zanedbatelná.

Obecně vznikne tento vzorec následovně: pro dvě funkce f, g vyčíslené v bodě x

(v němž mají derivaci) a h malé platí

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) &\approx (f(x) + hf'(x))(g(x) + hg'(x)) \\ &= f(x)g(x) + h[f(x)g'(x) + f'(x)g(x)] + h^2f'(x)g'(x) \\ (fg)(x+h) &\approx (fg)(x) + h[(fg)'(x)] \\ \Rightarrow (fg)'(x) &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Chyba, které jsme se dopustili, je řádově h^2 , a tudíž je zanedbatelná.

Věta 1.34 (Derivace součtu, součinu a násobku). Necht $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (1.35)$$

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \quad (1.36)$$

$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \quad (1.37)$$

existují-li čísla napravo (tedy existují-li $f'(x)$, $g'(x)$).

Důkaz. Rovnost 1.35 se dokáže následovně:

$$\begin{aligned} (f + g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x + h) - (f + g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x) + g(x + h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

Rovnost 1.36 plyne z výpočtu

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x + h) - (fg)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x + h)g(x) + f(x + h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \frac{g(x + h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} g(x) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \right) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \right) + \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right) g(x) \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Rovnost 1.37 plyne z 1.36, pokud za g vezmeme konstantní funkci. $\square$

Důsledek 1.38.

$$(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1.$$

Příklad 1.39. Najděte rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ v bodě $(1, f(1))$.

Řešení: Směrnice tečny je $f'(1) = -2$, tedy její rovnice je $y = -2x + b$ pro dosud neznámé $b \in \mathbb{R}$. Tečna prochází bodem $(x, y) = (1, f(1)) = (1, 0)$, z toho $b = 2$. ▮

Příklad 1.40. $f(x) = \sqrt{x}$. $f'(x) = ?$

Řešení:

$$\begin{aligned} \sqrt{x}\sqrt{x} &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \sqrt{x}(\sqrt{x})' + (\sqrt{x})'\sqrt{x} &= 1 \\ 2\sqrt{x}(\sqrt{x})' &= 1 \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \text{neboli } (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} \end{aligned}$$

Vidíme, že ač za definiční obor pro $f(x) = \sqrt{x}$ můžeme vzít $[0, \infty)$, derivace existuje jen na $(0, \infty)$. Postup má jednu nevýhodu: při používání věty o derivaci součinu jsme předpokládali, že derivace $\sqrt{x}$ existuje. Tedy ve skutečnosti je výsledek našeho výpočtu následující: pokud derivace $\sqrt{x}$ existuje, pak musí být rovna $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. ▮


Úloha 1.41. Spočítejte $(\sqrt{x})'$ přímo z definice a tím ověřte, že existuje. ▮

Úloha 1.42. $f(x) = \frac{1}{x}$. $f'(x) = ?$ Spočítejte přímo z definice a pomocí triku využívajícího větu o derivaci součinu. ▮

Úloha 1.43. Dokážete podobným trikem jako v Příkladu 1.40 a Úloze 1.42 odvodit vzoreček pro $(\frac{f}{g})'$? ▮

Definice 1.44 (Složená funkce). Nechtě $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou funkce. Pak složená funkce $g \circ f$ má

- definiční obor A a obor hodnot C ,
- předpis $(g \circ f)(x) := g(f(x))$



Příklad 1.45. $f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = 9x + 5$, $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $g(x) = \sqrt{x}$. Složená funkce je $g \circ f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ s předpisem $(g \circ f)(x) = \sqrt{9x + 5}$. ▮

Věta 1.46 (Derivace složené funkce). Nechť $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$, kde $A, B, C \subset \mathbb{R}$. Pak pro $x \in A$ platí

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

existuje-li číslo napravo (tedy existují-li $g'(f(x))$ a $f'(x)$).

Náčrt Důkazu.

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x)+k) - g(f(x))}{k} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= g'(f(x)) f'(x) \end{aligned}$$

Pro dokončení důkazu bychom museli vysvětlit, proč jde na druhém řádku rozšířit zlomek číslem $f(x+h) - f(x)$ (číslo musí být nenulové), a že můžeme od limity $h \rightarrow 0$ přejít substitucí $k := f(x+h) - f(x)$ na limitu $k \rightarrow 0$. $\square$

Příklad 1.47 (Pokračování příkladu 1.45). $h(x) = \sqrt{9x+5}$. $h'(x) = ?$

Řešení: $h = g \circ f$ z Příkladu 1.45, takže

$$(\sqrt{9x+5})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x+5}} \cdot 9 = \frac{9}{2\sqrt{9x+5}}$$

┘

Příklad 1.48. Najděte rovnici tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $(3, 4)$.

Řešení: stačí místo kružnice uvažovat graf funkce $h(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Ta se napíše jako $h = g \circ f$, $g(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = 25 - x^2$. Z toho máme

$$(\sqrt{25 - x^2})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{25 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

Protože $h'(3) = -\frac{3}{4}$, tečna má rovnici $y = -\frac{3}{4}x + b$. Dosazením bodu $(3, 4)$ dostaneme $b = \frac{25}{4}$. Rovnice jde napsat v elegantním tvaru $3x + 4y = 25$. $\square$

Definice 1.49 (Vlastnosti funkce). Necht $f: A \rightarrow \mathbb{R}, x \in A$. Říkáme, že

- f je na A rostoucí, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) < f(z)$,
- f je na A klesající, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) > f(z)$,
- f má na A minimum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \leq f(y)$. Značíme ho $\min_{y \in A} f(y) := f(x)$,
- f má na A maximum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \geq f(y)$. Značíme ho $\max_{y \in A} f(y) := f(x)$,
- f má na A lokální minimum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \leq f(y)$,
- f má na A lokální maximum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \geq f(y)$,
- f má na A lokální extrém v bodě x , pokud v něm má lokální minimum nebo lokální maximum.

Úloha 1.50. $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte doplněním na čtverec. ┘

Úloha 1.51. Nabývá funkce $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ na $[0, \infty)$ minima/maxima? Pokud ano, najděte je. ┘

Následující věta intuitivně říká: pokud je směrnice tečny kladná, funkce roste, pokud záporná, funkce klesá. Pokud je tečna vodorovná (má nulovou směrnici), funkce se v tom bodě „otáčí“, má buď lokální minimum nebo lokální maximum.

Věta* 1.52 (Vlastnosti funkce plynoucí z derivace). Necht $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ má na (a, b) derivaci. Pak

- Pokud $f' > 0$ na (a, b) , je f rostoucí na (a, b)
- Pokud $f' < 0$ na (a, b) , je f klesající na (a, b)
- Pokud má f lokální extrém v bodě $x \in (a, b)$, platí $f'(x) = 0$.
- Pokud $f'(x) = 0$ a existuje $\varepsilon > 0$ takové, že f je klesající na $(x - \varepsilon, x)$ a rostoucí na $(x, x + \varepsilon)$, má f v bodě x lokální minimum. Podobně pro lokální maximum.

Úloha 1.53 (Pokračování Úlohy 1.50). $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte využitím Věty 1.52. ┘

Úloha 1.54. Načrtněte graf funkce $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 2$ tak, že najdete lokální extrémy a intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající. ┘

Co je diferenciální rovnice?

Newton nám ukázal, že zákon je pouze nezbytný vztah mezi současným stavem světa a stavem, který na něj bezprostředně navazuje. Všechny ostatní zákony, které byly od té doby objeveny, nejsou ničím jiným; v podstatě se jedná o diferenciální rovnice.

– Henri Poincaré

2.1 Volný pád

2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu

3 Exponenciální růst

V následujících dvou kapitolách si představíme základní funkce $\exp$, $\sin$, $\cos$, které jistě už znáte. Narozdíl od SŠ (a i většiny kurzů na VŠ) si je ale „nevycucáme z prstu“, ale systematicky odvodíme jako řešení diferenciálních rovnic. Z příslušných rovnic pak vyčteme všechny vlastnosti těchto funkcí.

3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru

3.2 Zavedení funkce $\exp$

Definice 3.1 (Funkce $\exp$). Funkce $\exp(t)$ je jednoznačné řešení úlohy

$$\begin{aligned}x'(t) &= x(t) \\ x(0) &= 1\end{aligned}$$

Číslo $e := \exp(1)$ nazýváme *Eulerovo číslo*.

Věta 3.2 (Vlastnosti funkce $\exp$).

- (i) Funkce $\exp$ je dobře definovaná na celém $\mathbb{R}$
- (ii) $(\exp(t))' = (\exp(t))'' = \dots = (\exp(t))^{(n)} = \dots = \exp(t)$, $\exp(0) = 1$
- (iii) $\exp(t + s) = \exp(t) \cdot \exp(s)$
- (iv) $\forall n \in \mathbb{N}: \exp(n \cdot t) = \exp(t)^n$. Speciálně $\exp(n) = e^n$
- (v) $\exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)}$
- (vi) $\exp$ je kladná a rostoucí na $\mathbb{R}$

Důkaz. Bod (i) plyne z Picard-Lindelöfovy věty. Bod (ii) plyne přímo z definice opakovaným derivováním $\exp$. Bod (iii) dokážeme následovně: definujeme $x_1(t) := \exp(t + s)$, $x_2(t) := \exp(t) \cdot \exp(s)$ a ukážeme, že obě funkce řeší úlohu

$$\begin{aligned}x'(t) &= x(t) \\ x(0) &= \exp(s)\end{aligned}$$

z Picard-Lindelöfovy věty pak vyplyne, že $\forall t \in \mathbb{R}: x_1(t) = x_2(t)$. Pro funkci x_1

↳ dostaneme užitím Věty 1.46

$$\begin{aligned}x_1'(t) &= (\exp(t+s))' = \exp(t+s) \cdot (t+s)' = \exp(t+s) = x_1(t) \\x_1(0) &= \exp(0+s) = \exp(s)\end{aligned}$$

A pro funkci x_2

$$\begin{aligned}x_2'(t) &= (\exp(t)\exp(s))' = \exp(s)(\exp(t))' = \exp(s)\exp(t) = x_2(t) \\x_2(0) &= \exp(0)\exp(s) = \exp(s)\end{aligned}$$

Bod (iv) plyne z bodu (iii) následovně:

$$\exp(n \cdot t) = \exp(\underbrace{t + \dots + t}_{n \text{ krát}}) = \underbrace{\exp(t) \cdot \dots \cdot \exp(t)}_{n \text{ krát}} = \exp(t)^n$$

Bod (v) plyne taky z (iii):

$$\begin{aligned}\exp(t + (-t)) &= \exp(t)\exp(-t) \\ \exp(0) &= \exp(t)\exp(-t) \\ 1 &= \exp(t)\exp(-t) \Rightarrow \exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)}\end{aligned}$$

Abychom dokázali (vi), stačí podle Věty 1.52 ukázat, že $\forall t \in \mathbb{R}: \exp(t) > 0$. Pro spor předpokládejme, že existuje nějaké $t^* \in \mathbb{R}$ splňující $\exp(t^*) \leq 0$. Pokud $\exp(t^*) < 0$, můžeme mezi 0 a t^* najít jiný bod $t^{**} \in \mathbb{R}$, pro který $\exp(t^{**}) = 0$ (to plyne z toho, že $\exp$ má derivaci, tudíž je spojitá, takže můžeme použít Větu 3.19).

Jenže pak

$$1 = \exp(0) = \exp(t^{**} - t^{**}) = \exp(t^{**})\exp(-t^{**}) = 0 \cdot \exp(-t^{**}) = 0,$$

spor. □

Úloha 3.3. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x'(t) &= 3x(t) \\ x(0) &= 4\end{aligned}$$

tak, že uvažujete *ansatz* $x(t) = a \exp(bt)$ a nastavíte správně konstanty $a, b \in \mathbb{R}$. ┘

Poznámka 3.4. Ansatz znamená uhodnutí, v jakém tvaru má vycházet řešení matematické úlohy, s dosud neurčenými parametry (stupněmi volnosti). Parametry se pak dopočítávají tak, aby řešení opravdu odpovídalo zadání. ┘

Úloha 3.5. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\x(0) &= 1 \\x'(0) &= -3\end{aligned}$$

pomocí ansatzu $x(t) = \exp(\lambda t)$. ┘

Úloha 3.6. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\x(0) &= 2 \\x'(0) &= -2.\end{aligned}$$

┘

Úloha 3.7. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\x(0) &= 3 \\x'(0) &= -7.\end{aligned}$$

┘

Úloha 3.8. Dokažte: pokud x_1, x_2 řeší rovnici

$$a_2x''(t) + a_1x'(t) + a_0 = 0$$

a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pak stejnou rovnici řeší i $\alpha x_1 + \beta x_2$. ┘

Úloha 3.9. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = 0$$

┘

Úloha 3.10. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0$$

První zkuste ansatz $x(t) = \exp(\lambda t)$. Pak zkuste substituci $y(t) := \exp(-t)x(t)$ ┘

3.3 Nevlastní limity

Důležitá vlastnost exponenciálního růstu je, že roste nade všechny meze, tj. není shora ohraničený žádným číslem. Pokud funkce $f(x)$ pro zvětšující se x roste nade

všechny meze, píšeme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

Definice 3.11 (Nevlastní limity, limity v nevlastním bodě). Mějme funkci f , bod $c \in \mathbb{R}$ a číslo $L \in \mathbb{R}$ tak, aby „vše dávalo smysl“. Definujeme limity v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)\end{aligned}$$

nevlastní limity $\pm\infty$ ve vlastních bodech ($c \in \mathbb{R}$) vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (N, \infty) \\ \lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (-\infty, N)\end{aligned}$$

a nevlastní limity $\pm\infty$ v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) \in (N, \infty) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) \in (N, \infty) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) \in (-\infty, N) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) \in (-\infty, N).\end{aligned}$$

„Aby vše dávalo smysl“ znamená kupříkladu, že pokud chceme mluvit o limitě $\lim_{x \rightarrow \infty}$, musí definiční obor f obsahovat interval (x_0, ∞) pro nějaké $x_0 \in \mathbb{R}$.

Úloha 3.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = ?$ ┐

Úloha 3.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = ?$ ┐

Úloha 3.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+5}{x-10} = ?$ ┐

Úloha 3.15. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x-2|} = ?$ ┐

Úloha 3.16. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = ?$ ┐

Úloha 3.17. Dokažte: pro $f, g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\left(\forall t \in (0, \infty): f(t) \geq g(t) \text{ a } \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty \right) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \infty$$

┐

Úloha 3.18 (Věta o dvou strážnících). Dokažte: pro $f, g, h: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\left(\forall t \in (0, \infty): h(t) \leq f(t) \leq g(t) \text{ a } \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \right) \\ \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = L.$$

┘

Pro nás bude důležité, že $\exp$ je rostoucí bijekce (díky tomu pak zkonstruujeme logaritmus). To si níže dokážeme, ale budeme na to potřebovat technickou větu, jejíž důkaz je nad rámec textu. Intuitivně říká, že spojitě funkce „neskáčou“, tj. že pokud funkce nabývá hodnot $f(a)$ a $f(b)$, musí nabývat i všech hodnot mezi.

Věta* 3.19 (Věta o nabývání mezihodnot). Nechť $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá, $a, b \in A$. Pak

$$\forall z \in (\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}) \exists c \in (a, b): f(c) = z.$$

Věta níže říká, že $\exp$ roste rychleji než jakýkoliv polynom.

Věta 3.20 (Asymptotika funkce $\exp$).

- (i) $\forall n \in \mathbb{N} \forall t \in (0, \infty): \exp(t) > 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \dots + \frac{1}{n!}t^n$
- (ii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty, \lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = 0$
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N}: \lim_{t \rightarrow \infty} t^n \exp(-t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^n}{\exp(t)} = 0$
- (iv) $\exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ je bijekce

Důkaz. Funkce

$$\begin{aligned} f_1(t) &:= \exp(t) - 1 - t \\ f_2(t) &:= \exp(t) - 1 - t - \frac{1}{2}t^2 \\ &\vdots \\ f_n(t) &:= \exp(t) - 1 - t - \frac{1}{2}t^2 - \dots - \frac{1}{n!}t^n \end{aligned}$$

splňují

$$\begin{aligned} f'_1(t) &= \exp(t) - 1 > 0 \text{ na } (0, \infty), f_1(0) = 0 \Rightarrow f_1(t) > 0 \text{ na } (0, \infty) \\ f'_2(t) &= f_1(t) > 0 \text{ na } (0, \infty), f_2(0) = 0 \Rightarrow f_2(t) > 0 \text{ na } (0, \infty) \\ &\vdots \\ f'_n(t) &= f_{n-1}(t) > 0 \text{ na } (0, \infty), f_n(0) = 0 \Rightarrow f_n(t) > 0 \text{ na } (0, \infty), \end{aligned}$$

┘

↳ z toho plyne bod (i). Bod (ii) ukážeme z bodu (i):

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} 1 + t = \infty, \exp(t) > 1 + t &\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty \\ &\Rightarrow \lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \exp(-t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\exp(t)} = 0. \end{aligned}$$

Bod (iii) taktéž plyne z bodu (i), protože

$$0 < \frac{t^n}{\exp(t)} < \frac{t^n}{1 + t + \dots + \frac{1}{(n+1)!} t^{n+1}} < \frac{t^n}{\frac{1}{(n+1)!} t^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{t}$$

Protože obě funkce 0 a $\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{t}$ jdou v limitě $t \rightarrow \infty$ k nule, a $\frac{t^n}{\exp(t)}$ je jimi ohraničená, musí jít také v limitě k nule.

Dokažme bod (iv). Protože $\exp$ je rostoucí, musí být injektivní. Zbývá tedy ukázat, že je surjektivní. Protože $\lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty$, umíme pro libovolné $\varepsilon \in (0, 1)$, $N \in (1, \infty)$ najít $t_0 < 0$, $t_1 > 0$ takové, že

$$\exp(t_0) < \varepsilon, \exp(t_1) > N$$

Pak z Věty 3.19 umíme najít $t_0^* \in (t_0, 0)$, $t_1^* \in (0, t_1)$ takové, že

$$\exp(t_0^*) = \varepsilon, \exp(t_1^*) = N$$

Tedy podle Věty 3.19 funkce $\exp$ na intervalu (t_0^*, t_1^*) nabývá všech hodnot na intervalu (ε, N) . Protože $\varepsilon > 0$, $N > 0$ byly libovolné, dostáváme, že $\exp$ na $(-\infty, \infty)$ nabývá všech hodnot na intervalu $(0, \infty)$. Důkaz je hotov. $\square$

3.4 Zavedení funkce $\ln$

Definice 3.21 (Inverzní funkce). Nechť $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$. Řekneme, že g je inverzní k f , pokud

$$\forall b \in B: f(g(b)) = b$$

$$\forall a \in A: g(f(a)) = a$$

Věta 3.22 (Existence inverzní funkce). Ke každé bijekci $f: A \rightarrow B$ existuje jednoznačně určená inverzní funkce $f^{-1}: B \rightarrow A$, která je taky bijekce.

Důkaz. Nechť $b \in B$. Protože f je surjektivní, existuje $a \in A$ takové, že $f(a) = b$. Protože f je injektivní, existuje takové a jen jedno: pokud by existovala a_1, a_2 taková, že $f(a_1) = b = f(a_2)$, z injektivní plyne $a_1 = a_2$. Označme $f^{-1}(b) := a$. Pokud toto provedeme pro všechna $b \in B$, dostaneme funkci $f^{-1}: B \rightarrow A$, která

↳ je k f inverzní:

$$f(f^{-1}(b)) = f(a) = b$$

a z definice $f^{-1}(f(a))$ je takový prvek $x \in A$, pro který platí $f(x) = f(a)$, tedy $x = a$. Zkonstruovali jsme inverzní funkci.

f^{-1} je injektivní:

$$f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) \Rightarrow f(f^{-1}(b_1)) = f(f^{-1}(b_2)) \Rightarrow b_1 = b_2$$

f^{-1} je surjektivní, protože ke každému $a \in A$ umíme najít $b \in B$ takové, že $f^{-1}(b) = a$ – přeci $b = f(a)$.

Nyní dokažme jednoznačnost inverzní funkce. Tedy pokud g_1, g_2 jsou inverzní k f , platí $\forall b \in B$

$$f(g_1(b)) = b = f(g_2(b)) \xrightarrow{f \text{ injektivní}} g_1(b) = g_2(b)$$

□

Definice 3.23 (Přirozený logaritmus). Definujeme funkci $\ln: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jako funkci inverzní k $\exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$.

Věta 3.24 (Vlastnosti přirozeného logaritmu).

- (i) $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
- (ii) $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- (iii) $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$
- (iv) $\ln(x^n) = n \ln(x)$
- (v) $\ln: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ je rostoucí bijekce
- (vi) $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$

Náčrt Důkazu. Ukažme si trik, kterým dospějeme k (i):

$$\begin{aligned} \exp(\ln(x)) &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \exp(\ln(x)) \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ x \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ (\ln(x))' &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Opět tento postup není matematicky rigorózní, protože už předpokládá, že derivace $\ln(x)$ existuje.

↴

↳ Body (ii)-(vi) plynou z Věty 3.2. Ukažme si například, jak se získá (ii): Pro $x, y > 0$ najdeme $t, s \in \mathbb{R}$ takové, že $x = \exp(t)$, $y = \exp(s)$ (to jde, protože $\exp$ je surjektivní funkce $\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$.) Pak

$$\ln(xy) = \ln(\exp(t) \exp(s)) = \ln(\exp(t+s)) = t+s = \ln(x) + \ln(y)$$

□

Úloha 3.25. $(\ln(x^3 + 5))' = ?$

┘

Úloha 3.26. Vyřešte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ úlohu

$$x'(t) = 3x(t)$$

$$x(0) = 4.$$

┘

Úloha 3.27. Najděte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0.$$

┘

Příklad 3.28 (Poločas přeměny). Počet jader $N(t)$ radioaktivního materiálu, které se v čase t dosud nepřeměnila, splňuje

$$N'(t) = -\lambda N(t)$$

$$N(0) = N_0$$

kde $\lambda > 0$, $N_0 > 0$. Za jakou dobu zbude jen polovina nepřeměněných jader? Za jakou dobu jich zbude osmina?

Řešení: Řešení rovnice je

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$$

Hledáme čas $t_{1/2}$, pro který bude platit

$$\begin{aligned} N(t_{1/2}) &= \frac{1}{2} N_0 \\ N_0 \exp(-\lambda t_{1/2}) &= \frac{1}{2} N_0 \\ \exp(-\lambda t_{1/2}) &= \frac{1}{2} \\ \Rightarrow t_{1/2} &= -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\ln(2)}{\lambda} \end{aligned}$$

Podobně můžeme spočítat čas $t_{1/8}$, po kterém zbude osmina materiálu:

$$t_{1/8} = \frac{\ln(8)}{\lambda}$$

Z vlastností logaritmu plyne, že $t_{1/8} = 3t_{1/2}$. Obecně $t_{1/2^n} = nt_{1/2}$.

┘

3.5 Vyčíslení funkce exp

Zdefinovali jsme si speciální funkce a dokázali řadu elegantních vlastností, ale naše nové funkce neumíme *vyčíslit*. Pojďme to napravit.

Víme, že pro malé h platí

$$\frac{\exp(t+h) - \exp(t)}{h} \approx (\exp(t))' = \exp(t)$$

Takže

$$\exp(t+h) \approx \exp(t) + h \cdot \exp(t) = (1+h)\exp(t)$$

a aproximace je tím lepší, čím menší je h . Můžeme tedy začít od $t = 0$ a malými krůčky h se posouvat:

$$\begin{aligned}\exp(h) &\approx (1+h)\exp(0) = 1+h \\ \exp(2h) &\approx (1+h)\exp(h) = (1+h)^2 \\ \exp(3h) &\approx (1+h)\exp(2h) = (1+h)^3 \\ &\vdots\end{aligned}$$

Pokud chceme vyčíslit $\exp(x)$, rozdělíme si interval $[0, x]$ na malé krůčky $h = \frac{x}{N}$, kde $N \in \mathbb{N}$ je velké:

$$0, \frac{x}{N}, 2\frac{x}{N}, 3\frac{x}{N}, \dots, x$$

a tudíž

$$\exp(x) \approx \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N$$

Příklad 3.29. Aproximujeme si Eulerovo číslo $e = \exp(1)$. Červeně jsou vyznačeny správné cifry (zatím nevíme, jak sami spočítat počet správných cifer, porovnáváme to s hodnotou ve standardních softwarových knihovnách).

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{10}\right)^{10} &\approx 2.5937424601000023 \\ \left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100} &\approx 2.7048138294215285 \\ \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} &\approx 2.7169239322355936 \\ \left(1 + \frac{1}{10^4}\right)^{10^4} &\approx 2.7181459268249255 \\ \left(1 + \frac{1}{10^5}\right)^{10^5} &\approx 2.7182682371922975 \\ \left(1 + \frac{1}{10^6}\right)^{10^6} &\approx 2.7182804690957534\end{aligned}$$

┘

3.6 Obecná mocnina

Definice mocniny z $a > 0$ pro exponent $n \in \mathbb{N}$ je přímočará:

$$a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ krát}} \quad (3.30)$$

Pro takto zavedenou mocninu si můžeme všimnout, že platí

$$a^{n+m} = a^n a^m, \quad n, m \in \mathbb{N} \quad (3.31)$$

což je v analogii s

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y), \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Jak rozšířit definici 3.30 pro $n, m \notin \mathbb{N}$? Pokud bychom měli definovat a^0 tak, aby pořád platilo 3.31, musí být

$$a^n = a^{n+0} = a^n a^0 \Rightarrow a^0 := 1 \quad (3.32)$$

Pokud bychom měli definovat a^{-n} , $n \in \mathbb{N}$ tak, aby pořád platilo 3.31 a 3.32, musí být

$$1 = a^0 = a^{n-n} = a^n a^{-n} \Rightarrow a^{-n} := \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3.33)$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$a^{n \cdot m} = (a^n)^m, \quad n, m \in \mathbb{Z}. \quad (3.34)$$

Pokud bychom měli definovat $a^{\frac{n}{m}}$, $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tak, aby pořád platilo 3.34, musí být

$$(a^{\frac{n}{m}})^m = a^{\frac{n}{m} \cdot m} = a^n \Rightarrow a^{\frac{n}{m}} := \sqrt[m]{a^n}. \quad (3.35)$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$\begin{aligned} m \cdot \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) &= \ln\left((a^{\frac{n}{m}})^m\right) = \ln(a^n) = n \ln(a) \Rightarrow \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) = \frac{n}{m} \ln(a) \\ &\Rightarrow \ln(a^q) = q \ln(a), \quad q \in \mathbb{Q} \end{aligned} \quad (3.36)$$

Pokud bychom měli definovat a^x , $x \in \mathbb{R}$ tak, aby pořád platilo 3.36, musí být

$$\ln(a^x) = x \ln(a) \Rightarrow a^x := \exp(x \ln(a)).$$

Definice 3.37 (Obecná mocnina a logaritmus). Definujeme pro $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$ mocninu o základu a

$$a^x := \exp(x \ln(a))$$

Dále pro $a > 1$ definujeme *logaritmus o základu a* jako funkci inverzní k $f(x) = a^x$, značíme ji $\log_a(x) := f^{-1}(x)$.

Věta 3.38 (Vlastnosti obecné mocniny a logaritmu).

- (i) Funkce $f(x) = a^x$, $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ má vlastnosti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36.
- (ii) $(a^x)' = \ln(a)a^x$
- (iii) a^x je rostoucí bijekce pro $a > 1$, konstantní pro $a = 1$ a klesající bijekce pro $a < 1$
- (iv) Pro $a > 1$ platí $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$
Pro $a < 1$ platí $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$
- (v) Speciálně $\exp(x) = e^x$.
- (vi) Funkce $g(x) = \log_a(x)$ $g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ splňuje $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$. Proto sdílí s přirozeným logaritmem všechny vlastnosti z Věty 3.24 až na to, že $(\log_a(x))' = \frac{1}{\ln(a)x}$
- (vii) Speciálně $\ln(x) = \log_e(x)$.

Důkaz. Cvičení. Vše plyne z vlastností $\ln$ a $\exp$. □

Poznámka 3.39. Odtěď budeme značit exponenciálu e^x místo $\exp(x)$. ┘

4 Harmonický oscilátor

V následující kapitole budeme analyzovat systémy, jejichž chování se pravidelně opakuje. Zavedeme si pro to funkce $\sin$ a $\cos$.

4.1 Závaží na pružině

Mějme závaží na pružině, na kterou nepůsobí vnější síly, zpočátku v rovnovážné poloze. Sledujme jeho výchylku od rovnovážné polohy $x(t)$. Můžeme provést dva experimenty:

(A) Závaží vychýlíme o $x(0) = x_0$

(B) Závaží nevychýlíme, ale strčíme do něj, aby mělo rychlost $x'(0) = v_0$.

Proti nám působí síla pružiny $F = -kx$ snažící se vrátit závaží do rovnovážné polohy. Z druhého Newtonova zákona tedy dostáváme

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -kx(t) \\ x''(t) + \frac{k}{m}x(t) &= 0 \\ \boxed{x''(t) + \omega^2 x(t) = 0}, \end{aligned} \tag{4.1}$$

kde jsme definovali $\omega := \sqrt{\frac{k}{m}}$. Rovnice 4.1 se nazývá *rovnice harmonického oscilátoru*. Její řešení teď budeme studovat, zatím pro $\omega = 1$. Později povolíme $\omega \neq 1$ a vysvětlíme si význam tohoto parametru.

Ze zkušenosti víme, že kmitání pružiny je periodické. Tuto vlastnost budeme matematicky studovat.

Definice 4.2 (Periodická funkce). Funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je periodická, pokud existuje $T > 0$ splňující

$$\forall t \in \mathbb{R}: f(t+T) = f(t). \tag{4.3}$$

Perioda funkce je nejmenší číslo splňující 4.3.

4.2 Zavedení funkcí $\sin$, $\cos$

Definice 4.4. Mějme úlohy

$$\begin{array}{ll} x''(t) + x(t) = 0 & x''(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = 0 & x(0) = 1 \\ x'(0) = 1 & x'(0) = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(A)} \\ \text{(B)} \end{array}$$

Řešení úlohy (A) nazveme $\sin(t)$, řešení úlohy (B) nazveme $\cos(t)$.

Poznámka 4.5. Pojdme se zamyslet, jak se asi bude řešení vyvíjet. Uvažujme $\sin(t)$. Závaží má počáteční polohu $x(0) = 0$ a rychlost $x'(0) = 1$, takže ze začátku bude výchylka růst přibližně lineárně:

Todo. obrazek

Jenže pak $x > 0$, takže $x'' = -x < 0$, takže závaží začne zpomalovat.

Pořád je $x > 0$, takže rychlost se pořád zmenšuje a někdy musí dosáhnout hodnoty 0. Tedy $\exists t^* > 0: x'(t^*) = 0$.

Jenže pořád je $x > 0$, takže rychlost získá záporné znaménko. Závaží se vrací k rovnovážné poloze.

Závaží se vrátí do rovnovážné polohy, tedy $\exists t^{**} > t^*: x(t^{**}) = 0$.

Situace v čase t^{**} je podobná jako v čase 0, jen rychlost míří opačným směrem, uděláme proto oblouček opačným směrem. V nějakém čase $t^{***} > t^{**}$ se vrátíme do rovnovážné polohy $x(t^{***}) = 0$.

Níže si dokážeme, že naše kvalitativní analýza je správně. Mimo jiné i zjistíme, že $t^* = 2t^*$, $x(t^*) = 1$, $x'(t^{**}) = -x'(0)$, $x(t + 2t^{**}) = x(t)$, ..., což zatím nejde vidět. Z toho pak plyne, že při druhém návratu do rovnovážné polohy v čase t^{***} se začne závaží pohybovat stejně, jak v čase 0. Děj je tedy periodický s periodou t^{***} , a navíc $t^{***} = 2t^{**}$. Číslo t^{**} už dobře znáte – je to *Ludolfovo číslo* π . ┘

Úloha 4.6. Najděte řešení úlohy

$$\begin{array}{l} x''(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{array}$$

┘

Věta 4.7 (Vlastnosti $\sin$, $\cos$).

- (i) $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$
- (ii) $(\sin(t))' = \cos(t)$, $(\cos(t))' = -\sin(t)$, tedy obě funkce mají derivace všech řádů

- (iii) $\sin(t+s) = \sin(t)\cos(s) + \cos(t)\sin(s)$
 $\cos(t+s) = \cos(t)\cos(s) - \sin(t)\sin(s)$
- (iv) $\sin(-t) = -\sin(t)$, $\cos(-t) = \cos(t)$
- (v) $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$
- (vi) $\forall t \in \mathbb{R}: -1 \leq \sin(t) \leq 1, -1 \leq \cos(t) \leq 1$
- (vii) $\exists$ číslo $\pi > 0$ takové, že $\sin$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,
 $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\sin(\pi) = 0$, $\sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$, $\sin(2\pi) = 0$
 $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$, $\cos(\pi) = -1$, $\cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$, $\cos(2\pi) = 1$

Todo. zarovnat, prejmenovat x,y,x,y -> x,y,z,w

- (viii) $\sin, \cos$ jsou periodické funkce s periodou 2π .

Důkaz. Bod (i) plyne z definice. Dokažme bod (ii). Označme $x(t) := \sin(t)$, $y(t) := (\sin(t))'$. Pak platí

$$\begin{array}{lll} x''(t) + x(t) = 0 & x'''(t) + x'(t) = 0 & y''(t) + y(t) = 0 \\ x(0) = 0 & \implies x'(0) = 1 & \implies y(0) = 1 \\ x'(0) = 1 & x''(0) = -x(0) = 0 & y'(0) = 0 \end{array}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $(\sin(t))' = \cos(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Dokažme bod (iii). Označme $x(t) := \sin(t+s)$. Znamená to, že sledujeme pořád to stejné kmitání, ale zapli jsme stopky v čase s . Za čas s se sice změnila poloha a rychlost, ale pořád sledujeme to stejné kmitání, takže bude popsáno kombinací funkcí $\sin$ a $\cos$ stejně, jako v úloze 4.6. V matematických symbolech: $x(t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(t+s))' = \cos(t+s), \\ x''(t) &= (\cos(t+s))' = -\sin(t+s) = -x(t), \end{aligned}$$

takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= \sin(s) \\ x'(0) &= \cos(s). \end{aligned}$$

Stejnou úlohu řeší i $y(t) := \sin(t)\cos(s) + \sin(s)\cos(t)$, z Picard-Lindelöfovy věty tedy $x(t) = y(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Ukažme bod (iv). Funkce $x(t) = \sin(-t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(-t))' = -\cos(-t) \\ x''(t) &= (-\cos(-t))' = -\sin(-t) = -x(t) \end{aligned}$$

↴

↳ takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\x(0) &= 0 \\x'(0) &= -1.\end{aligned}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $x(t) = -\sin(t)$. Podobně $\cos(t) = \cos(-t)$.

Bod (v) plyne z bodů (iii), (iv):

$$1 = \cos(t - t) = \cos(t) \cos(-t) - \sin(t) \sin(-t) = \cos^2(t) + \sin^2(t)$$

Bod (vi) plyne z bodu (v).

Dokažme body (vii) a (viii). Protože $\sin'(0) = 1$ a $\sin'(t) = \cos(t)$ je spojitá, platí

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \sin'(t) = 1 &\Rightarrow \exists \delta > 0 \forall t \in (-\delta, \delta): \sin'(t) > 0 \\&\Rightarrow \exists \delta > 0: \sin \text{ je rostoucí na } (-\delta, \delta)\end{aligned}$$

Možná je $\sin(t)$ rostoucí na větším intervalu, než $(-\delta, \delta)$. Necht (a, b) je největší interval takový, že $0 \in (a, b)$ a $\sin(t)$ je rostoucí na (a, b) . Protože $\sin(t)$ je lichá funkce, musí platit $a = -b$ (pokud je totiž lichá funkce rostoucí na $(0, b)$, je rostoucí i na $(-b, 0)$, a pokud je rostoucí na $(a, 0)$, je rostoucí i na $(0, -a)$). Označme $\pi := 2b$. Tedy

$$\begin{aligned}\sin(t) \text{ je rostoucí na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0: \sin(t) \text{ není rostoucí na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right) \\ \Rightarrow \cos(t) > 0 \text{ na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0: \cos(t) \leq 0 \text{ na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right).\end{aligned}$$

Ze spojitosti $\cos(t)$ dostáváme $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. Skutečně, pokud by $\cos(\frac{\pi}{2}) < 0$, musel by mít $\cos(t)$ „skok“ z $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, kde je kladný, na zápornou hodnotu v $\frac{\pi}{2}$. Z podobného důvodu nemůže být $\cos(\frac{\pi}{2}) > 0$. Teď využijeme bod (v):

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + \underbrace{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=0} = 1 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pm 1$$

a protože $\sin$ je na $(0, \frac{\pi}{2})$ rostoucí, platí $\sin(\frac{\pi}{2}) > \sin(0) = 0$, takže $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. Nyní ze součtových vzorců postupně odvodíme

$$\begin{aligned}\sin(\pi) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \\ \cos(\pi) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 \\ \sin(2\pi) &= \sin(\pi + \pi) = \sin(\pi) \cos(\pi) + \cos(\pi) \sin(\pi) = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = 0 \\ \cos(2\pi) &= \cos(\pi + \pi) = \cos(\pi) \cos(\pi) - \sin(\pi) \sin(\pi) = (-1) \cdot (-1) - 0 \cdot 0 = 1, \\ \sin(t + 2\pi) &= \sin(t) \cos(2\pi) + \cos(t) \sin(2\pi) = \sin(t) \cdot 1 + \cos(t) \cdot 0 = \sin(t) \\ \cos(t + 2\pi) &= \cos(t) \cos(2\pi) - \sin(t) \sin(2\pi) = \cos(t) \cdot 1 - \sin(t) \cdot 0 = \cos(t)\end{aligned}$$

Důkaz je hotov. □

4.3 Komplexní exponenciála

Zkusme rovnici $x'' + x = 0$ řešit způsobem stejným jako v sekci 3.2, ansatzem $e^{\lambda t}$:

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\ \lambda^2 e^{\lambda t} + e^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda^2 + 1 &= 0.\end{aligned}$$

Pokud bychom pokračovali čistě formálně, dostali bychom

$$\begin{aligned}\lambda &= \pm i \\ \Rightarrow x(t) &= C_1 e^{it} + C_2 e^{-it}.\end{aligned}$$

Jenže zároveň víme, že řešení dané rovnice má jít napsat ve tvaru $D_1 \sin(t) + D_2 \cos(t)$. Čili musí existovat nějaký přepočít mezi $\{\sin(t), \cos(t)\}$ a $\{e^{it}, e^{-it}\}$. Pokud by pravidla pro derivování reálných funkcí splňovala i e^{it} , musí platit $(e^{it})' = i e^{it}$. Tedy e^{it} řeší úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= e^{i \cdot 0} = 1 \\ x'(0) &= i e^{i \cdot 0} = i\end{aligned}$$

a tudíž $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$. Tomuto vzorci se říká *Eulerova identita*, a konkrétně dosazením $t = \pi$ z něj plyne zvláštní rovnost

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

která kombinuje nejdůležitějších pět čísel v matematice: $0, 1, i, \pi, e$. My si tedy definujeme e^{it} jako $\cos(t) + i \sin(t)$, a tím ospravedlníme výše provedené výpočty.

Definice 4.8 (Komplexní exponenciála). Definujeme pro komplexní číslo $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$

$$e^z = e^{a+bi} := e^a (\cos(b) + i \sin(b)).$$

Věta 4.9 (Vlastnosti komplexní exponenciály).

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}: (e^{tz})' = z e^{tz}$ (derivujeme podle t)
- (ii) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$
- (iii) $\forall t \in \mathbb{R}: |e^{it}| = 1$, kde $|\bullet|$ značí velikost komplexního čísla

Důkaz. Cvičení. □

Úloha 4.10. Vyjádřete $\sin(t)$, $\cos(t)$ pomocí e^{it} , e^{-it} . ┘

Úloha 4.11. Pomocí komplexní exponenciály řešte úlohy

$$\begin{array}{ll} mx''(t) + kx(t) = 0 & mx''(t) + kx(t) = 0 \\ x(0) = 0 & x(0) = x_0 \quad (\text{B}) \\ x'(0) = v_0 & x'(0) = 0 \end{array} \quad (\text{A})$$

jakou periodu mají řešení? ┘

Úloha 4.12. Jak bychom definovali a^z , $a > 0, z \in \mathbb{C}$? Vyjádřete 2^i pomocí již známých funkcí. ┘

4.4 Kruhový pohyb

Pojďme si vyjasnit, jak kmitající pružiny souvisí s jednotkovou kružnicí a pravoúhlými trojúhelníky.

Předpokládejme, že se pohybujeme v rovině a naše trajektorie je parametricky daná vektorem

$$\vec{r}(t) := \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

Po jaké křivce se to pohybujeme? Velikost vektoru, tj. našet vzdálenost od $(0, 0)$, je

$$|\vec{r}(t)| = \sqrt{[R \cos(\omega t)]^2 + [R \sin(\omega t)]^2} = R,$$

takže se pohybujeme po kružnici se středem $(0, 0)$ a poloměrem R . Jak rychle se pohybujeme? Naše poloha je vektor, takže rychlost je také vektor. Vektor derivujeme tak, že zderivujeme jeho složky.

Definice 4.13 (Derivace vektorové funkce). Derivaci vektorové funkce $\vec{r}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (nebo $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$) definujeme takto:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}, \quad (\text{analogicky ve 3D})$$

Velikost vektoru rychlosti je

$$v = |\vec{r}'(t)| = \left| \begin{pmatrix} (R \cos(\omega t))' \\ (R \sin(\omega t))' \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \right| = R\omega.$$

Pohybujeme se tedy po kružnici konstantní rychlostí. Za daný časový úsek Δt tudíž urazíme vzdálenost $v \cdot \Delta t$. Z toho za prvé plyne, že obvod kružnice je

$$o = v \cdot T = R\omega \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi R$$

a za druhé, že délka oblouku mezi body $(1, 0)$ a $(R \cos(\omega t), \sin(R\omega t))$ je

$$l = v \cdot t = R \cdot \omega t$$

Dále uvažujme jednotkovou kružnici: $R = 1$. Protože délka oblouku l je úměrná úhlu θ , který svírá polopřímka procházející body $(0, 0)$, $(\cos(t), \sin(t))$ s kladnou poloosou x , máme

$$\exists C > 0: \omega t = l = C \cdot \theta \quad (4.14)$$

kde konstanta úměrnosti C závisí na tom, jakou používáme jednotku úhlu. Protože pohyb je periodický, v čase $t = T$ se vrátíme na začátek a tudíž obejdeme plný úhel. Dostáváme

$$\begin{aligned} \omega T &= C \cdot (\text{plný úhel}) \\ \Rightarrow 2\pi &= C \cdot (\text{plný úhel}). \end{aligned} \quad (4.15)$$

Pracujme tedy v jednotkách úhlu, kde plný úhel je 2π . Takovou jednotku nazveme *radián*. Pro radián z 4.15 plyne $C = 1$, takže dostáváme z rovnosti 4.14 vztah $\theta = \omega t$. Dokázali jsme

Věta 4.16 (Ekvivalence definic $\sin$, $\cos$ pomocí diferenciálních rovnic a pomocí jednotkové kružnice). Bod $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ v rovině je bod na jednotkové kružnici ležící na polopřímce, která svírá s kladnou poloosou x úhel θ v radiánech.

Poznámka 4.17.

- (i) Můžete si ke kružnici domyslet pravoúhlý trojúhelník, který dá klasické definice

$$\cos(\theta) = \frac{\text{přilehlá}}{\text{přepona}}, \quad \sin(\theta) = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}}$$

- (ii) Od teď budeme pracovat s úhly jen v radiánech. Důvod je ten, že v jiných jednotkách úhlu se ošklivě derivují naše oblíbené funkce $\sin(x)$, $\cos(x)$:

$$\begin{aligned} \sin(x^\circ) &= \sin\left(\frac{2\pi}{360} x\right) \\ \Rightarrow (\sin(x^\circ))' &= \left(\sin\left(\frac{2\pi}{360} x\right)\right)' = \frac{2\pi}{360} \cos\left(\frac{2\pi}{360}\right) = \frac{2\pi}{360} \cos(x^\circ) \end{aligned}$$

- (iii) Pro kruhový pohyb tedy úhel splňuje $\theta(t) = \omega t$, což je v analogii s rovnoměrným přímočarým pohybem $x(t) = vt$. Pro obecný pohyb na kružnici tedy definujeme

$$\omega(t) := \theta'(t) = \frac{d\theta}{dt}$$

a funkci $\omega(t)$ říkáme *úhlová rychlost*.

↴

Úloha 4.18. Ukažte, že funkce $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ tak, že ji zderivujete.

Definice 4.19 (arctan). Funkce $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ je definovaná jako inverzní k funkci $\tan: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$.

Úloha 4.20. Nakreslete si pravoúhlý trojúhelník, kde jeden úhel je $\theta = \arctan(t)$, k němu přilehlá strana 1, a tudíž protilehlá t . Spočítejte

$$\sin(\arctan(t)) = \sin(\theta) = ?$$

$$\cos(\arctan(t)) = \cos(\theta) = ?$$

Tyto vzorečky hned využijeme.

Úloha 4.21. Jakou periodu T má řešení úlohy

$$x''(t) + \omega^2 x(t) = 0$$

$$x(0) = x_0$$

$$x'(0) = v_0 ?$$

Spočtěte amplitudu $A := \max_{t \in [0, T]} x(t)$. (Hint: $\max_{t \in [0, T]} x(t) = x(t^*)$, kde $x'(t^*) = 0$.) Využijte vzorečky pro $\sin(\arctan(t))$, $\cos(\arctan(t))$. Najděte úhel φ_0 takový, že

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

4.5 Tlumený oscilátor

Když vychýlíme skutečnou pružinu, nebude kmitat donekonečna. Proti pohybu totiž působí třecí síla, která způsobí, že se amplituda zmenšuje. Neexistuje obecný vzorec, který by ve všech situacích uměl popsat chování třecích sil. V jistém režimu (vzduch není moc rychlý, nevíří se) se dá uvažovat matematický model

$$F_{\text{třecí}} = -cx'$$

Druhý Newtonův zákon pak říká

$$mx''(t) = -kx(t) - cx'(t)$$

$$x''(t) + \frac{c}{m} x'(t) + \frac{k}{m} x(t) = 0$$

$$x''(t) + 2\zeta\omega_0 x'(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

kde jsme zavedli

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{přirozená úhlová rychlost}), \quad \zeta := \frac{c}{2m\omega_0} \quad (\text{poměrné tlumení})$$

Pojďme tuto rovnici vyřešit. Ansatz $e^{\lambda t}$ vede na

$$\begin{aligned} \lambda^2 + 2\zeta\omega_0\lambda + \omega_0^2 &= 0 \\ \lambda &= (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0 \end{aligned}$$

(A) *případ* $\zeta = 0$ je harmonický oscilátor s úhlovou rychlostí ω_0 .

(B) *případ* $\zeta \in (0, 1)$:

$$\begin{aligned} \lambda &= (-\zeta \pm \sqrt{1 - \zeta^2}i)\omega_0 \\ \Rightarrow x(t) &= C_1 e^{(-\zeta + \sqrt{1 - \zeta^2}i)\omega_0 t} + C_2 e^{(-\zeta - \sqrt{1 - \zeta^2}i)\omega_0 t} \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} (C_1 e^{\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 i t} + C_2 e^{-\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 i t}) \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} \left[i(C_1 - C_2) \sin(\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 t) + (C_1 + C_2) \cos(\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 t) \right] \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} [D_1 \sin(\omega t) + D_2 \cos(\omega t)] = e^{-\zeta\omega_0 t} A \sin(\omega t + \varphi_0), \end{aligned}$$

kde jsme zavedli

$$D_1 := i(C_1 - C_2), \quad D_2 := (C_1 + C_2), \quad \omega := \sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0,$$

a konstanty $A > 0$, φ_0 , které jdou spočítat stejně jako v úloze 4.21.

Řešení osciluje mezi kladnými a zápornými hodnotami, ale v absolutní hodnotě klesá:

$$|x(t)| \leq e^{-\zeta\omega_0 t} A \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

Z Úlohy 3.18 plyne, že $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$.

(C) *případ* $\zeta = 1$: rovnice má dvojitý kořen $\lambda = -\omega_0$, takže řešení bude tvaru

$$x(t) = C_1 e^{-\omega_0 t} + C_2 t e^{-\omega_0 t}$$

Z Věty 3.20 máme $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} = 0$, takže $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ pro případ $\zeta = 1$.

(D) *případ* $\zeta \in (1, \infty)$:

$$\lambda = (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0$$

protože $\sqrt{\zeta^2 - 1} < \zeta$, dostáváme, že oba kořeny rovnice jsou záporné. Tedy

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

(E) *případ* $\zeta \in (-1, 0)$: Výpočet je stejný jako v případě $\zeta \in (-1, 0)$:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Jenže $\zeta < 0$, takže oscilace $x(t)$ se bude časem zvětšovat: v časech $t_k = \frac{2k\pi}{\omega} - \varphi_0$ platí

$$x(t_k) = \left(e^{-\frac{2\pi\zeta\omega_0}{\omega}}\right)^k e^{\zeta\omega_0\varphi_0} A \sin(2\pi) = B \cdot C^k, \quad B > 0, \quad C > 1$$

a tato posloupnost čísel roste nade všechny meze.

- (F) *případ* $\zeta = -1$: Pracujeme s funkcemi $e^{\omega_0 t}$, $t e^{\omega_0 t}$, obě z nichž mají $\lim_{t \rightarrow \infty} = \infty$. Tedy v závislosti na počátečních podmínkách půjde řešení do $+\infty$ nebo $-\infty$.
- (G) *případ* $\zeta \in (-\infty, -1)$ vyjde stejně jako případ $\zeta = -1$, akorát se tam pracuje s funkcemi $e^{\lambda_1 t}$, $e^{\lambda_2 t}$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.

Vidíme, že pro $\zeta < 0$ se systém chová nefyzikálně. Tento případ totiž odpovídá $c < 0$, což by znamenalo, že síla $F_{\text{třecí}} = -cx'$ míří na stejný směr jako rychlost, tj. hmotný bod neustále zrychluje. Proto se neustále zvětšuje amplituda.

Dále tudíž budeme uvažovat $\zeta \geq 0$. Máme čtyři režimy:

- (1) $\zeta = 0$ je netlumený oscilátor s úhlovou rychlostí $\omega = \omega_0$

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

- (2) $\zeta \in (0, 1)$ je podkriticky tlumený oscilátor s $\omega = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0 < \omega_0$

$$x(t) = A e^{-\zeta\omega_0 t} \sin(\omega t + \varphi_0)$$

- (3) $\zeta = 1$ je kriticky tlumený oscilátor, který nekmitá

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_0 t}$$

- (4) $\zeta \in (1, \infty)$ je nadkriticky tlumený oscilátor, který taktéž nekmitá.

$$x(t) = C_1 e^{-\lambda_1 t} + C_2 e^{-\lambda_2 t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0.$$

Todo. příklady z praxe

Pohyby planet

*Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
pan Kepler rozepsal nebeské zákony,
hledal, až našel v hvězdářských triedrech
tajemství, která teď neseme na bedrech.*

– Jaromír Nohavica

V této kapitole si dokážeme, že planety obíhají Slunce po kuželosečkách. V úloze bude hrát roli více proměnných závislých na čase, setkáme se tak s první *soustavou diferenciálních rovnic*.

5.1 Kuželosečky

Nakonec budeme počítat, že se planety pohybují po kuželosečkách. Na to si prvně musíme definovat, co je to kuželosečka, a naučit se s nimi pracovat v polárních souřadnicích.

Definice 5.1 (Elipsa, hyperbola, parabola).

(i) Elipsa je množina bodů X v rovině, které splňují

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a$$

pro nějaké body F_1, F_2 a číslo $a > 0$. Body F_1, F_2 nazýváme *ohniska* a a nazýváme *hlavní poloosa*.

(ii) Hyperbola je množina bodů X v rovině, které splňují

$$||XF_1| - |XF_2|| = 2a$$

pro nějaké body F_1, F_2 a číslo $a > 0$ (terminologie stejná jako pro elipsu).

(iii) Parabola je množina bodů X v rovině splňující

$$|XF| = |Xd|$$

pro nějaký bod F a přímku d . F nazýváme ohnisko, d řídící přímka.

Níže si odvodíme rovnici elipsy a hyperboly. Zvolme souřadnou soustavu tak, že $F_1 = (-e, 0)$, $F_2 = (e, 0)$, kde $2e = |F_1F_2|$. Pak pro bod $X = (x, y)$ na

elipse/hyperbole platí ($\pm$ je pro elipsu $+$ a pro hyperbolu $-$)

$$\begin{aligned}
 \sqrt{(x+e)^2 + y^2} \pm \sqrt{(x-e)^2 + y^2} &= 2a \\
 2x^2 + 2e^2 + 2y^2 \pm 2\sqrt{(x+e)^2 + y^2}\sqrt{(x-e)^2 + y^2} &= 4a^2 \\
 \pm \sqrt{(x+e)^2 + y^2}\sqrt{(x-e)^2 + y^2} &= 2a^2 - x^2 - e^2 - y^2 \\
 [(x+e)^2 + y^2][(x-e)^2 + y^2] &= [2a^2 - x^2 - e^2 - y^2]^2 \\
 &\vdots \\
 a^2x^2 + a^2y^2 - x^2e^2 &= a^4 - a^2e^2 \\
 \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - e^2} &= 1
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

Jaký je mezi elipsou a hyperbolou rozdíl? Pro elipsu je $e < a$. Označme $(0, b)$ bod na kladné poloose y procházející elipsou. Z 5.2 plyne

$$\frac{0^2}{a^2} + \frac{b^2}{a^2 - e^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad b = \sqrt{a^2 - e^2}$$

a rovnice elipsy se přepíše na

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Číslu b říkáme *vedlejší poloosa*.

Todo. obrazek a,b,e

Pro hyperbolu ale platí $e > a$, takže žádný bod $(0, b)$ tam ležet nemůže. Rovnici 5.2 je tedy vhodné přepsat na

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{e^2 - a^2} = 1$$

a definovat $b := \sqrt{e^2 - a^2}$, takže

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{5.3}$$

Všimněme si, že pro x, y velké můžeme psát

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \approx 0 \quad \Rightarrow \quad y \approx \frac{b}{a}x \quad \text{nebo} \quad y \approx -\frac{b}{a}x$$

Význam parametru b pro hyperbolu je tedy, že kontroluje směrnici tečen v nekonečnu („asymptot“).

Úloha 5.4. Z rovnice 5.3 vyjádřete $y = y(x)$ ($y > 0$) a spočítejte $\lim_{x \rightarrow \infty} y'(x)$. $\perp$

Pojďme spočítat rovnici paraboly. Nechť d je přímka $y = 0$, $F = (0, p)$, $X = (x, y)$:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x^2 + (y-p)^2} &= y \\
 x^2 + y^2 - 2yp + p^2 &= y^2 \\
 x^2 &= 2yp - p^2 \\
 y &= \frac{x^2}{2p} + \frac{p}{2}
 \end{aligned} \tag{5.5}$$

Nazvěme *vrchol paraboly* bod, ve kterém parabola prochází kladnou poloosou y . Z 5.5 plyne $V = (0, \frac{p}{2})$. Ukázali jsme

Věta 5.6 (Rovnice kuželoseček). Pro každou kuželosečku existuje kartézská soustava souřadnic (x, y) , ve které se dá kuželosečka vyjádřit rovnicí

(1) Elipsa

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(2) Hyperbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(3) Parabola

$$y = \frac{x^2}{2p} + \frac{p}{2}$$

Úloha 5.7. Kde je řídicí přímka paraboly $y = x^2$? ┘

Úloha 5.8. Jaká kuželosečka je daná rovnicí $y = \frac{1}{x}$? Proveďte změnu souřadnic

$$\bar{x} := \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad \bar{y} := \frac{-x+y}{\sqrt{2}}$$

a vyjádřete rovnici v nových souřadnicích. ┘

Úloha 5.9. Řešte úlohy

$$x''(t) - x(t) = 0$$

$$x(0) = 0 \quad (\text{A})$$

$$x'(0) = 1$$

$$x''(t) - x(t) = 0$$

$$x(0) = 1 \quad (\text{B})$$

$$x'(0) = 0$$

Řešení úlohy (A) nazvěte $\sinh(t)$, řešení úlohy (B) nazvěte $\cosh(t)$. Dokažte

(i) $\sinh(0) = 0, \cosh(0) = 1$

(ii) $(\sinh(t))' = \cosh(t), (\cosh(t))' = \sinh(t)$

(iii) $\sinh(-t) = -\sinh(t), \cosh(-t) = \cosh(t)$

(iv) $\cosh^2(t) - \sinh^2(t) = 1$

Tudíž body $(\cos(t), \sin(t))$ obíhají jednotkovou kružnici $x^2 + y^2 = 1$, zatímco body $(\cosh(t), \sinh(t))$ obíhají (jednu větev) *jednotkové hyperboly* $x^2 - y^2 = 1$. Proto se funkcím říká *hyperbolický sinus* a *hyperbolický kosinus*. ┘

5.2 Polární souřadnice

Dále budeme kromě kartézských souřadnic $X = (x, y)$ pracovat v polárních souřadnicích (r, φ) , kde r značí vzdálenost bodu $X = (x, y)$ od $\mathcal{O} = (0, 0)$ a φ značí úhel mezi kladnou poloosou x a polopřímkou $\mathcal{O}X$. Platí

$$\begin{aligned} x &= r \cos(\varphi) & r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ y &= r \sin(\varphi) & \tan(\varphi) &= \frac{y}{x} \\ x, y &\in \mathbb{R} & r &> 0, \varphi \in [0, 2\pi) \end{aligned}$$

Úloha 5.10. Najdi rovnici kružnice se středem v $(0, 0)$ v polárních souřadnicích. ┘

Úloha 5.11. Co za útvar je rovnice $r = \varphi$? ┘

Příklad 5.12. Najděme rovnici elipsy s ohnisky $F_1 = (0, 0)$, $F_2 = (2e, 0)$ a hlavní poloosou a , tj. vyjádřeme $r = r(\varphi)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \frac{(x - e)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{(r \cos(\varphi) - e)^2}{a^2} + \frac{r^2 \sin^2(\varphi)}{b^2} &= 1 \quad | \cdot a^2 b^2 \\ (r^2 \cos^2(\varphi) + 2er \cos(\varphi) + e^2)b^2 + r^2 \sin^2(\varphi)a^2 &= a^2 b^2 \\ r^2(b^2 \cos^2(\varphi) + a^2 \sin^2(\varphi)) + r(2eb^2 \cos(\varphi)) + (e^2 b^2 - a^2 b^2) &= 0 \\ r^2(b^2 + e^2 \sin^2(\varphi)) + r(2eb^2 \cos(\varphi)) - b^4 &= 0 \end{aligned}$$

Řešení této kvadratické rovnice je

$$\begin{aligned} r(\varphi) &= \frac{-2b^2 e \cos(\varphi) \pm \sqrt{4b^4 e^2 \cos^2(\varphi) + 4b^4(b^2 + e^2 \sin^2(\varphi))}}{2(b^2 + e^2 \sin^2(\varphi))} \\ &= \frac{2b^2 \left[-e \cos(\varphi) \pm \sqrt{e^2 \cos^2(\varphi) + b^2 + e^2 \sin^2(\varphi)} \right]}{2(a^2 - e^2 \cos^2(\varphi))} \\ &= \frac{2b^2 [-e \cos(\varphi) \pm a]}{2(a^2 - e^2 \cos^2(\varphi))} = \frac{b^2(a - e \cos(\varphi))}{a^2 - e^2 \cos^2(\varphi)} = \frac{b^2}{a + e \cos(\varphi)} \\ &= \frac{\frac{b^2}{a}}{1 + \frac{e}{a} \cos(\varphi)} \end{aligned} \tag{5.13}$$

kde jsme z $\pm$ vybrali $+$ tak, aby $r > 0$. ┘

5.3 Newtonův gravitační zákon

Mějme tělesa A o hmotnosti M v bodě $\vec{r}_1$ a těleso B o hmotnosti m v bodě $\vec{r}_2$. Pak těleso A působí na B *gravitační silou*

$$\vec{F}_{\text{grav}} = \frac{mMG}{|\vec{r}|^3} \vec{r},$$

kde $\vec{r} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ a $G = 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$ je *univerzální gravitační konstanta*.

Podle 2. Newtonova zákona je trajektorie $\vec{r}_1$ tělesa B řešením rovnice

$$m\vec{r}_1''(t) = \frac{mMG}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$$

Problém s touto je, že v ní vystupuje $\vec{r}_2$ (schované v $\vec{r}$). Tedy zároveň musíme vyřešit rovnici

$$m\vec{r}_2''(t) = \frac{mMG}{|\vec{r}|^3} (-\vec{r})$$

(znaménko $-$ je u $\vec{r}$ protože se prohodily role těles). Jenže tato rovnice má stejný problém, zase v ní vystupuje $\vec{r}_1$. Tedy musíme řešit obě rovnice najednou:

$$\begin{aligned} m\vec{r}_1''(t) &= \frac{mMG}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \\ M\vec{r}_2''(t) &= \frac{mMG}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \end{aligned}$$

Když rozepíšeme vektory do $\vec{r}_1(t) = (x_1(t), y_1(t), z_1(t))$, $\vec{r}_2(t) = (x_2(t), y_2(t), z_2(t))$, dostaneme *soustavu 6 diferenciálních rovnic pro 6 neznámých funkcí*

$$\begin{aligned} mx_1''(t) &= \frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (x_2 - x_1) \\ my_1''(t) &= \frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (y_2 - y_1) \\ mz_1''(t) &= \frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (z_2 - z_1) \\ Mx_2''(t) &= -\frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (x_2 - x_1) \\ My_2''(t) &= -\frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (y_2 - y_1) \\ Mz_2''(t) &= -\frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (z_2 - z_1). \end{aligned}$$

Abychom mohli pokračovat dál, uděláme zjednodušující předpoklad:

Těleso A je o mnohem těžší než B, takže jeho zrychlení je zanedbatelné.

Pak můžeme najít vztažnou soustavu takovou, že $x_2(t) = y_2(t) = z_2(t) = 0$, a zbude soustava 3 diferenciálních rovnic

$$\begin{aligned}x_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} x_1 \\y_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} y_1 \\z_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} z_1\end{aligned}$$

spolu s počátečními podmínkami

$$\begin{aligned}x_1(0) &= x_0 \quad y_1(0) = y_0 \quad z_1(0) = z_0 \\x_1'(0) &= v_{0x} \quad y_1'(0) = v_{0y} \quad z_1'(0) = v_{0z}.\end{aligned}$$

Vektory $\vec{r}_1(0), \vec{r}_1'(0)$ jsou dva vektory v třírozměrném prostoru, proto k nim lze vždy nalézt vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ takový, že $\vec{r}_1(0) \perp \vec{a}$ a $\vec{r}_1'(0) \perp \vec{a}$. Natočme souřadnou soustavu tak, aby osa z mířila ve směru vektoru $\vec{a}$. Pak platí $z_1(0) = z_1'(0) = 0$, takže $z_1(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}z_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} z_1 \\z_1(0) &= 0 \\z_1'(0) &= 0\end{aligned}$$

a tudíž z Picard-Lindelöfovy věty $\forall t \in [0, \infty): z_1(t) = 0$. Úlohu jsme zredukovali na soustavu 2 diferenciálních rovnic (nebudeme psát indexy 1, tj $x := x_1, y := y_1$):

$$\begin{aligned}x''(t) &= -\frac{MG}{[x^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}} x \\y''(t) &= -\frac{MG}{[x^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}} y\end{aligned}$$

Všimněme si už teď, že pokud $x^2 + y^2 = a^2 = \text{konst.}$, dostáváme rovnici harmonického oscilátoru s frekvencí $\omega_0^2 = \frac{MG}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{MG}{a^3}$, jejíž řešení jsou sin a cos, které opravdu obíhají kružnici. Pro takové řešení platí 3. Keplerův zákon

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \omega_0^2 = \frac{MG}{a^3} \quad \Rightarrow \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{M^2 G^2} = \text{univerzální konstanta},$$

ale to předbíháme. Tedy jedno z řešení je pohyb po kružnici s frekvencí $\sqrt{\frac{MG}{a^3}}$. Existuje i nějaké jiné?

Komplikovaný člen v rovnici je $(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}$. To je, protože používáme špatné souřadnice. Pojďme rovnici přepsat do polárních souřadnic:

$$x(t) = r(t) \cos(\varphi(t))$$

$$y(t) = r(t) \sin(\varphi(t))$$

Zavedeme opět úhlovou rychlost $\omega := \varphi'$:

$$x' = r' \cos(\varphi) - r\omega \sin(\varphi)$$

$$x'' = r'' \cos(\varphi) - 2r'\omega \sin(\varphi) - r\omega' \sin(\varphi) - r\omega^2 \cos(\varphi)$$

$$y' = r' \sin(\varphi) + r\omega \cos(\varphi)$$

$$y'' = r'' \sin(\varphi) + 2r'\omega \cos(\varphi) + r\omega' \cos(\varphi) - r\omega^2 \sin(\varphi)$$

Tudíž v polárních rovnicích vypadá naše soustava následovně:

$$r'' \cos(\varphi) - 2r'\omega \sin(\varphi) - r\omega' \sin(\varphi) - r\omega^2 \cos(\varphi) = -\frac{MG}{r^2} \cos(\varphi) \quad (5.14)$$

$$r'' \sin(\varphi) + 2r'\omega \cos(\varphi) + r\omega' \cos(\varphi) - r\omega^2 \sin(\varphi) = -\frac{MG}{r^2} \sin(\varphi) \quad (5.15)$$

Abychom se zbavili sinů a kosinů, násobíme a sčítáme rovnice následovně:

$$\cos(\varphi) \cdot (5.14) + \sin(\varphi) \cdot (5.15) \Rightarrow r'' - r\omega^2 = -\frac{MG}{r^2} \quad (5.16)$$

$$-\sin(\varphi) \cdot (5.14) + \cos(\varphi) \cdot (5.15) \Rightarrow 2r'\omega + r\omega' = 0 \quad (5.17)$$

Z rovnice 5.16 plyne

$$(r^2\omega)' = 2rr'\omega + r^2\omega' = r \underbrace{(2r'\omega + r\omega')}_{\stackrel{5.17}{=} 0} = 0$$

takže $L := r^2\omega$ se zachovává. Tomuto číslu (ve skutečnosti $m \cdot L$) se říká *moment hybnosti*, právě jsme dokázali *zákon zachování momentu hybnosti*.

My nebudeme hledat řešení $r(t), \varphi(t)$, ale jen tvar trajektorie $r(\varphi)$. Tedy další zjednodušení rovnice bude, že z ní *eliminujeme čas*. Zatím jsou derivace podle času, musíme je přepočítat na derivace podle φ :

$$\frac{d}{dt} r(\varphi(t)) = \frac{dr}{d\varphi}(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}(t) \quad \text{nebo zkráceně} \quad \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \omega$$

Rovnou u toho uděláme substituci $U(\varphi) = \frac{1}{r(\varphi)}$.

$$\begin{aligned} \frac{dU}{d\varphi} &= \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2} \frac{\frac{dr}{dt}}{\omega} = -\frac{1}{L} \frac{dr}{dt} \\ \frac{d^2U}{d\varphi^2} &= \frac{d}{d\varphi} \left(\underbrace{-\frac{1}{L} \frac{dr}{dt}}_{= \text{konst.}} \right) = -\frac{1}{L} \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right)}{\frac{d\varphi}{dt}} = -\frac{1}{L\omega} \frac{d^2r}{dt^2}. \end{aligned}$$

Rovnice 5.17 tedy přechází na

$$\begin{aligned} -L\omega \frac{d^2U}{d\varphi^2} - r\omega^2 &= -\frac{MG}{r^2} \\ -L \frac{d^2U}{d\varphi^2} - r^2\omega \frac{1}{r} &= -\frac{MG}{r^2\omega} \\ -L \frac{d^2U}{d\varphi^2} - LU &= -\frac{MG}{L} \\ \frac{d^2U}{d\varphi^2} + U &= \frac{MG}{L^2} \end{aligned}$$

toto je rovnice harmonického oscilátoru, až na to, že pravá strana je $\neq 0$. Vyřešíme ji substitucí $U = \frac{MG}{L^2} + u$, což vede na rovnici

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = 0$$

Řešení této rovnice je $u(\varphi) = A \cos(\varphi + \varphi_0)$ pro nějaká $A > 0, \varphi_0$, které jsou dány počátečními podmínkami. Dosadíme zpátky:

$$\begin{aligned} U(\varphi) &= \frac{MG}{L^2} + u(\varphi) = \frac{MG}{L^2} + A \cos(\varphi + \varphi_0) \\ \Rightarrow r(\varphi) &= \frac{1}{\frac{MG}{L^2} + A \cos(\varphi + \varphi_0)} = \frac{\frac{L^2}{MG}}{1 + A \frac{L^2}{MG} \cos(\varphi + \varphi_0)} \end{aligned}$$

Porovnáním s 5.13 Vidíme, že dráha je kuželosečka s geometrickými parametry

$$\frac{b^2}{a} = \frac{L^2}{MG}, \quad \frac{e}{a} = A \frac{L^2}{MG}$$

Integrál

Po letech, kdy mi matematika připadala snadná, jsem se konečně dostal k integrálnímu počtu a narazil jsem na překážku. Uvědomil jsem si, že dál už se nedostanu, a dodnes se mi nepodařilo tuto hranici překročit.

– Isaac Asimov

Doteď jsme řešili diferenciální rovnice tak, že jsme řešení buď uhodli, nebo jsme si vymysleli novou funkci a tu jsme nazvali řešením. V příštích dvou kapitolách se naučíme, jak (některé) rovnice řešit systematicky. Zkonstruujeme operaci, která umí v diferenciální rovnici „odstranit“ derivaci. Této operaci se říká *integrál*.

6.1 Plocha pod grafem

6.2 Primitivní funkce

6.3 Objemy

7 Lineární rovnice

„Velký, složitý lineární problém lze vždy rozdělit na menší, lépe zvládnutelné části. Každou část pak lze vyřešit samostatně a všechny dílčí výsledky lze následně zkombinovat, aby se vyřešil celý problém. U lineárního problému se celek přesně rovná součtu jednotlivých částí.“

– Steven H. Strogatz

V této kapitole si ukážeme, že řešení jistého typu diferenciálních rovnic má jednoduchou geometrickou strukturu: strukturu vektorového prostoru.

7.1 Lineární homogenní rovnice

7.2 Lineární nehomogenní rovnice

7.3 Metoda integračního faktoru

7.4 Soustavy lineárních rovnic

Metoda separace proměnných

9 Numerické řešení diferenciálních rovnic

Neexistuje obecná metoda, jak řešit diferenciální rovnice na papíře. Pokud chceme vyčíslit řešení složitějších rovnic, musíme napsat počítačový program, který řešení spočítá přibližně.

9.1 Explicitní Eulerova metoda

9.2 Aproximace čísla π

Mocninné řady

WIP 11

Třetí paradox je ... že letící šíp je v klidu, což vyplývá z předpokladu, že čas se skládá z okamžiků ... Říká, že pokud je vše, co zabírá pořád stejný prostor, v klidu, a pokud to, co je v pohybu, se vždy nachází v „nyní“, pak je letící šíp nehybný.

– Aristoteles (Fyzika, 239b30)

Za jasného denního světla matematici prověřují své rovnice a důkazy a při hledání matematické přesnosti nenechávají nic náhodě. V noci však, za svitu úplňku, sní, vznášejí se mezi hvězdami a žasnou nad zázrakem nebes. Nacházejí inspiraci. Bez snů není umění, není matematika, není život.

– Michael Atiyah

Stojí před námi hádanka, která lidstvo trápila 2000 let. Antickým filosofům z Eleje se zdál pojem pohybu tak zvláštní, že ho zavrhnli a řekli, že žádný pohyb vlastně neexistuje. Zenón Elejský vymyslel několik paradoxů, které měli prokázat logickou nesmyslnost pohybu. Bohužel se nedochovali jeho původní spisy a musíme čerpat z Aristotelova komentáře. Aristoteles mluví o čtyřech paradoxech, přičemž ten čtvrtý je velmi vágní, pojďme si představit první tři.

Paradox 11.1 (První Zenónův paradox: Dichotomie (dělení na poloviny)). Závodíte na Olympijských hrách ve sprintu na 100 m. Abyste uběhli 100 m, musíte uběhnout prvních 50 m. Pak musíte uběhnout dalších 25 m, pak dalších 12.5 m atd. Po n krocích tohoto procesu uběhnete

$$50 \text{ m} + 25 \text{ m} + \dots + \frac{100}{2^{n-1}} \text{ m} = \left(100 - \frac{100}{2^{n-1}}\right) \text{ m} < 100 \text{ m}$$

Tedy po konečně mnoho krocích neuběhnete 100 m. Nekonečně mnoho kroků nelze provést, tudíž nelze uběhnout 100 m. ┘

Paradox 11.2 (Druhý Zenónův paradox: Achilles a želva). Achilles běží rychlostí 1 m/s, želva 0.1 m/s. Závodí spolu, přičemž želva dostane náskok 9 s, takže když vystartuje Achilles, želva už urazila 0.9 m. Doběhne Achilles želvu? Když Achilles urazí vzdálenost 0.9 m, o kterou měla želva náskok, bude mu to trvat 0.9 s a želva mezi tím urazí vzdálenost 0.09 m. O tuto vzdálenost navíc musí Achilles dobíhat želvu, bohužel, za 0.09 s k tomu potřebných želva urazí zase 0.009 m. Po n krocích urazí běžci vzdálenosti

$$\text{Želva: } 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m} + 9 \cdot 10^{-n} \text{ m}$$

$$\text{Achilles: } 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m}$$

a tudíž Achilles želvu nikdy nedoběhne. ┘

Paradox 11.3 (Třetí Zenónův paradox: Letící šíp). Představme si letící šíp. Šíp letí nějaký čas, který se skládá z jednotlivých momentů. V každém jednotlivém momentu šíp neurazí žádnou vzdálenost. Tudíž šíp za celkový čas nemůže urazit žádnou vzdálenost. Pohyb je nemožný. ┘

Všechny tři paradoxy rozdělují pohyb na nekonečně mnoho dílčích částí a pak tvrdí, že na realizaci „pohybu“ bychom nějak museli těchto nekonečně mnoho částí složit dohromady, a že to nejde. V paradoxech 11.1 a 11.2 se sčítá nekonečně mnoho čísel, což se později naučíme pomocí pojmu *nekonečné řady*. V paradoxu 11.3 se sčítá „nulový pohyb“ přes všechny momenty v čase, a tvrdí se, že se nemůže nasčítat na nenulový pohyb. My se to ale naučíme: této operaci se říká *integrál*.

11.1 Závěr

(1) Můžeme provádět teoretickou analýzu řešení:

- (i) Existuje řešení? Je jednoznačné? Je definované globálně nebo jen na konečném časovém intervalu?
- (ii) Je řešení omezené? Jak se chová pro $t \rightarrow \infty$? (Asymptotika)
- (iii) Když změníme počáteční podmínky, budou se řešení s různými počátečními podmínkami vzdalovat, oddalovat? Co když změníme koeficienty rovnice? (Stabilita)

(2) Můžeme napsat počítačový program, který spočítá řešení přibližně. Pak nás zajímá:

- (i) Jak blízko je to, co spočítal program, skutečnému řešení? (Chyba aproximace)
- (ii) Jak napsat program tak, aby počítal rychle? (Efektivita metody, řád metody)
- (iii) Pokud má skutečné řešení nějakou vlastnost, například omezenost, má tuto vlastnost i výstup našeho programu? (Numerické metody zachovávají strukturu, ...)

Teoretická analýza je úzce provázaná s vývojem numerických metod. Například pokud chci mluvit o tom, že přibližné řešení je „blízko“ skutečnému řešení, potřebuji existenci a jednoznačnost skutečného řešení. Pokud rovnice není stabilní, to jest dvě blízka řešení se průběhem času vzdalují, musíme na to dávat pozor v numerickém řešení, protože to pravděpodobně znamená, že s časem bude růst chyba aproximace. Pokud počítám pohyb hmotného bodu, při kterém se zachovává energie, chci použít numerickou metodu, která tento požadavek respektuje.

Definice 11.4 (Kuželosečka).

Rovina je množina bodů $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ taková, že $ax + by + cz = d$ pro nějaké $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Půdorysna je rovina s rovnicí $z = 0$.

Kuželová plocha je množina bodů $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ taková, že $z^2 = k^2(x^2 + y^2)$ pro nějaké $k > 0$. Povrchové přímky kuželu jsou přímky, které náleží kuželové ploše.

Kuželosečka je průsečík kuželové plochy s rovinou.

Z definice plyne, že kuželosečka slňuje

$$\begin{aligned} cz &= d - ax - by \\ \Rightarrow k^2 \alpha^2 (x^2 + y^2) &= (d - ax - by)^2 \end{aligned}$$

a naopak by šlo ukázat, že množina řešení jakékoliv rovnice tvaru

$$a_0 x^2 + a_1 xy + a_2 y^2 + a_3 x + a_4 y + a_5 = 0$$

je buď prázdná, nebo se dá vyjádřit jako kuželosečka. Zatím ale není jasné, co geometricky znamenají koeficienty $a_0, \dots, a_5$. Pojďme na tom zapracovat.

Věta 11.5 (Dandelin-Queteletova věta). Mějme kuželovou plochu $\mathcal{P}$ a rovinu ρ . Označme α úhel, který svírá ρ s půdorysnou, a β úhel, který svírají povrchové přímky $\mathcal{P}$ s půdorysnou. Prvně předpokládejme $\alpha \neq \beta$. Sestrojme obě koule κ_1, κ_2 vepsané $\mathcal{P}$ a ρ . Body dotyku koulí s rovinou ρ nazvěme F_1, F_2 . Průnik koulí a roviny jsou dvě kružnice $k_1 := \kappa_1 \cap \rho$, $k_2 := \kappa_2 \cap \rho$. Zvolme libovolnou povrchovou přímku $p \subset \mathcal{P}$ a označme $P_1 := p \cap k_1$, $P_2 := p \cap k_2$, $2a := |P_1 P_2|$. Pak platí:

(i) Pokud $\alpha < \beta$, každý bod X na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a \quad (\text{elipsa})$$

(ii) Pokud $\alpha > \beta$, každý bod X na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$||XF_1| - |XF_2|| = 2a \quad (\text{hyperbola})$$

Pokud $\alpha = \beta$, můžeme sestrojit jen jednu vepsanou kouli κ , $F := \kappa \cap \rho$, $k := \kappa \cap \mathcal{P}$. Necht π je rovina určená kružnicí k , označme průsečnici rovin $d := \pi \cap \rho$. Pak každý bod na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$|XF| = |Xd| \quad (\text{parabola})$$

Todo. obrazek

Důkaz. Použijeme pozorování, že pro kružnici k a bod X vně k můžeme sestrojit dvě tečny ke k procházející bodem X , a body doteku tečen s kružnicí P_1, P_2 splňují

$$|PP_1| = |PP_2| \quad (11.6)$$

Dokazujeme bod (i). Pro bod X na kuželosečce označme $p^X \subset \mathcal{P}$ povrchovou přímkou, která prochází bodem X . Označme $P_1^X := p^X \cap k_1$, $P_2^X := p^X \cap k_2$. Definujme $2a := |P_1^X P_2^X|$. Z 11.6 plyne

$$|XF_1| = |XP_1^X|, \quad |XF_2| = |XP_2^X|$$

Na druhou stranu z rotační symetrie $\mathcal{P}$ a k_1, k_2 plyne

$$\forall X \in \mathcal{P} \cap \rho: |P_1^X P_2^X| = |P_1 P_2| = 2a,$$

takže

$$|XF_1| + |XF_2| = |XP_1^X| + |XP_2^X| = |P_1^X P_2^X| = 2a.$$

Bod (ii) se ukáže stejně, akorát $|P_1^X P_2^X| = ||XP_1^X| - |XP_2^X||$. Ukažme (iii). $\square$

Summary and Outlook

Summary and Outlook.