

Studijní text DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Jan Engler

(Poslední změna: 8. října 2026)

Obsah

Obsah	ii
1 Limity a Derivace	1
1.1 Paradox pohybu	1
1.2 Limity	3
1.3 Derivace	8
2 Co je diferenciální rovnice?	14
2.1 Volný pád	14
2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu	17
3 Exponenciální růst	19
3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru.	19
3.2 Vyčíslení funkce exp	19
3.3 Vlastnosti funkce exp	20
3.4 Nevlastní limity	23
3.5 Zavedení funkce ln	25
3.6 Obecná mocnina	28
4 Harmonický oscilátor	30
4.1 Závaží na pružině	30
4.2 Zavedení funkcí sin, cos	30
4.3 Komplexní exponenciála	34
4.4 Kruhový pohyb	35
4.5 Tlumený oscilátor	37
5 Pohyby planet	40
5.1 Kuželosečky	40
5.2 Polární souřadnice	43
5.3 Newtonův gravitační zákon	45
6 Integrál	51
6.1 Plocha pod grafem	51
6.2 Primitivní funkce	51
6.3 Plochy a Objemy	51
6.4 Metoda integračního faktoru.	51
7 Metoda separace proměnných	52

8	Geometrická struktura diferenciálních rovnic	53
8.1	Lineární homogenní rovnice	53
8.2	Lineární nehomogenní rovnice	53
8.3	Soustavy lineárních rovnic	53
9	Numerické řešení diferenciálních rovnic	54
9.1	Explicitní Eulerova metoda	54
9.2	Aproximace čísla π	54
10	Mocninné řady	55
11	WIP	56
11.1	Závěr	57
	Summary and Outlook	64

1 Limity a Derivace

1.1 Paradox pohybu

Na základní škole se učí, že pokud auto mezi časy $t, t + \Delta t$ urazí vzdálenost Δx , jeho rychlost (v časovém intervalu $(t, t + \Delta t)$) je

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1.1)$$

Pojďme se nad tím zamyslet. Představme si, že jedeme po nekonečně dlouhé rovné silnici, podél níž je metr, a v každém čase t můžeme na metru odečíst naši polohu $x(t)$.

Příklad 1.2. Pokud jedeme rovnoměrně, naše poloha je afinní funkcí času $x(t) = v \cdot t + x_0$. Vybereme-li si dva momenty v čase $t, t + \Delta t$, vyjde nám ze vzorečku 1.1

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{v \cdot (t + \Delta t) + x_0 - v \cdot t - x_0}{\Delta t} = v$$

a vše je v pořádku. ┘

Příklad 1.3. Zkusme jet tak, aby naše poloha byla $x(t) = t^2$. To by šlo docílit tím, že bychom jeli ve vakuu (bez odporu vzduchu) a měli stále nohu na plynu. Teprve zkusme začít měřit po 3 sekundách na 1 sekundu ($t = 3, \Delta t = 1$) :

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 1)^2 - 3^2}{1} = 7$$

Pak zkusme $t = 3, \Delta t = 3$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 3)^2 - 3^2}{3} = 9 > 7$$

Měření přes delší časový interval nám „zvětšilo“ rychlost. Zkusme $t = 3, \Delta t = 0.5$:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + .5)^2 - 3^2}{.5} = \frac{13}{2} < 7$$

Měření přes kratší časový interval nám „zmenšilo“ rychlost. Jaká je naše skutečná rychlost? ┘

Problém je, že vzoreček 1.1 udává *průměrnou rychlost* na časovém intervalu. Ta ale závisí na volbě onoho intervalu. My chceme mluvit o rychlosti v jednom čase. To ale nedává smysl, vzoreček 1.1 vyžaduje dva časy: snažit se dosadit $\Delta t = 0$ vede na nesmyslný výraz

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t) - x(t)}{0} = \frac{0}{0} \quad (1.4)$$

Problém vyřešil Isaac Newton. On si představoval, že auto sleduje na *velmi malém časovém intervalu*, v rámci něhož se rychlost moc nemění. Pokud je rychlost téměř konstantní, vracíme se k Příkladu 1.2 a tam vzoreček 1.1 fungoval. Dopustíme se chyby, ale čím menší interval budeme uvažovat, tím menší bude chyba. Zkusme to!

Příklad 1.5 (Pokračování Příkladu 1.3).

$$\begin{aligned} t = 3, \Delta t = 1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+1)^2 - 3^2}{1} = 7 \\ t = 3, \Delta t = 0.1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.1)^2 - 3^2}{0.1} = 6.1 \\ t = 3, \Delta t = 0.01 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.01)^2 - 3^2}{0.01} = 6.01 \\ t = 3, \Delta t = 0.001 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.001)^2 - 3^2}{0.001} = 6.001 \\ t = 3, \Delta t = h &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6 + h \end{aligned}$$

Nemůžeme sice dosadit $\Delta t = 0$, ale můžeme dosadit libovolně malé Δt , a výsledek tím bude libovolně blízko číslu 6. Je tedy rozumné definovat rychlost v čase $t = 3$ jako výsledek *limitního procesu*, při kterém pořád zmenšujeme Δt . Výsledek limitního procesu značíme

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6$$

a říkáme mu *derivace funkce* $x(t) = t^2$ v bodě $t = 3$. Derivace značíme čárkou, píšeme $x'(3) = 6$. ┘

Obecně definujeme derivaci funkce f v bodě x

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Pak platí

$$\begin{aligned} f'(x) &\approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ \Rightarrow f(x+h) &\approx f(x) + hf'(x) \quad \text{a aproximace je tím lepší, čím lepší je } h \end{aligned}$$

Například

$$(3+h)^2 \approx 9 + 6h$$

Úloha 1.6. Nakreslete bod $(3, 9)$, grafy funkcí $f(x) = x^2$ a $g(x) = 9 + 6(x-3)$. Co vidíte? Umíte to zopakovat pro bod (x_0, x_0^2) ? Jak to souvisí s tím, kde je funkce klesající, roustoucí a kde nabývá minima? ┘

1.2 Limity

V této sekci si zavedeme derivace a naučíme se je počítat. Před tím nás ale čekají přípravné práce.

Definice 1.7 (Funkce). Funkce (= zobrazení) se skládá z následujících dat:

- Množiny A , zvané *definiční obor*,
- Množiny B , zvané *obor hodnot*,
- Pravidla, které každému prvku $a \in A$ přiřadí právě jeden prvek $f(a) \in B$. Tomuto pravidlu říkáme *předpis funkce*.

Značení $f: A \rightarrow B$ znamená, že A je definiční obor funkce f a B je její obor hodnot.

Příklad 1.8. $A = \{\text{Leden, Únor, Březen, ..., Prosinec}\}$, $B = \{28, 30, 31\}$,

$$f(\text{Leden}) = 31$$

$$f(\text{Únor}) = 28$$

$$f(\text{Březen}) = 31$$

$$\vdots$$

Funkce $f: A \rightarrow B$ udává počet dnů v měsíci v nepřestupném roce. Není daná žádným matematickým vzorečkem, její definiční obor neobsahuje čísla. ┘

Definice 1.9 (Limita funkce). Necht $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a její definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta) \setminus \{c\}$ pro nějaké $\Delta > 0$. Limita funkce f v bodě c , pokud existuje, je číslo L splňující

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Značíme ho

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) := L$$

Příklad 1.10. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = ?$

Řešení: V sekci 1.1 jsme nahlédli, že výsledek má být 6. Pojdme si to spočítat z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$$

zjednodušíme zlomek:

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: 6 + h \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon) \quad (1.11) \quad \downarrow$$

↳ Teď je to snadné, s volbou $\delta := \varepsilon$ bude výrok 1.11 pravdivý. ┘

Poznámka 1.12.

- Všimněte si, že $f(h) = \frac{(3+h)^2-3^2}{h}$ nelze definovat v bodě $h = 0$, opravdu jsme tedy spočítali něco netriviálního.
- Součástí řešení příkladu 1.10 bylo uhodnutí, jak má řešení vyjít. To jsme prováděli na základě numerického experimentu. Níže si vybudujeme nástroje, pomocí kterých ke stejnému výsledku dojdeme mechanickým počítáním.

┘

Úloha 1.13. Necht $f(x) = 2x + 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$ ┘

Úloha 1.14. Necht $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

A $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis $g(x) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = ?$ ┘

Příklad 1.15. Necht $f(x) = x^2$. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = ?$

Řešení: uhadneme, že výsledek má být 9. Spočítejme to z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta) \setminus \{3\}: x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

Očividně, pokud $x = 3$, pak $x^2 = 9 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$, takže si nijak neuškodíme, pokud budeme dokazovat

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta): x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

neboli

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < \varepsilon$$

┘

↳ **Jak vymyslet důkaz.** Rozepíšeme si výraz na pravé straně, který chceme odhadovat:

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{\text{co s tímto?}}$$

Myšlenka je následující: $|x - 3| < \delta$ znamená, že x je blízko číslu 3. Pokud je x blízko číslu 3, bude $|x + 3|$ blízko číslu 6. Konkrétně využijeme odhad $|x + 3| < 6 + \delta$. Pokud půjdeme dost blízko ($\delta \leq 1$), umíme například zaručit, že $|x + 3| < 7$. Pak dostáváme

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{< 7} < 7\delta$$

takže pro $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ bychom formálně dostali

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon.$$

Pozor, na odhad členu $|x - 3|$ jsme využili $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ a na odhad členu $|x + 3|$ zase $\delta \leq 1$ a není jasné, jestli jedna z nerovností plyne z druhé (to závisí na tom, jak velké je ε). Musíme tedy zaručit obě nerovnosti.

Důkaz. Zvolme $\delta := \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$. Pak platí

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x + 3| < 6 + \delta \leq 7$$

Takže

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon$$

□

┘

Poznámka 1.16.

- Odhadnout funkci $f(x)$ znamená omezit ji nějakým číslem nebo jinou funkcí, to jest ukázat nerovnost typu

$$|f(x)| \leq C, \quad C \text{ je číslo, nebo } |f(x)| \leq g(x), \quad g \text{ je funkce.}$$

Nemá to nic společného s „hádáním“.

- Všimněme si, že vymýšlení důkazu může probíhat opačně, než jak je sepsaný hotový důkaz. V tomto případě jsme museli přijít na to, jak zvolit δ , aby nám vycházeli nerovnosti.

┘

Příklad 1.17. Necht $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

Řešení: ukážeme, že limita neexistuje.

┘

↳ **Důkaz.** Pro spor předpokládejme, že existuje $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ (na které ale později budeme klást požadavky) najdeme $\delta > 0$ tak, že

$$\begin{aligned} & \forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \Rightarrow & \begin{cases} \forall x \in (-\delta, 0) \setminus \{0\}: & 0 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \forall x \in (0, \delta) \setminus \{0\}: & 1 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \end{cases} \end{aligned}$$

Obě čísla 0, 1 musí ležet v intervalu $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, který má délku 2ε , takže

$$1 = |1 - 0| \leq 2\varepsilon$$

jenže $\varepsilon > 0$ bylo libovolné. Volbou $\varepsilon = \frac{1}{3}$ dostáváme $1 \leq \frac{2}{3}$, spor. □

Poznámka 1.18. Obrat použitý v Příkladu 1.17 je častý: prvně pracujeme s obecným $\varepsilon > 0$ a později na něj klademe další požadavky tak, abychom dostali, co chceme. Můžeme se tak vyvarovat ad hoc volbám na začátku důkazu, jako například $\delta \leq \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$ v Příkladu 1.10. Čtenáři tak usnadníme práci, protože je jasné vidět, ve kterém kroku se použila specifická volba δ nebo ε . ┘

Vidíme, že pokud se nesnažíme konstruovat funkce s patologickým předpisem, nebo násilím odebranými body z definičního oboru, většinou platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definice 1.19 (Spojitá funkce). Mějme $c \in \mathbb{R}$ a funkci f , jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a jejíž definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta)$ pro nějaké $\Delta > 0$. Říkáme, že f je spojitá v bodě c , pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c), \text{ neboli } \lim_{h \rightarrow 0} f(c + h) = f(c).$$

Říkáme, že f je spojitá na (a, b) , pokud její definiční obor obsahuje (a, b) a je spojitá v bodě c pro všechna $c \in (a, b)$.

Dále ukážeme, že polynomy jsou spojitě funkce.

Definice 1.20 (Součet, součin a podíl funkcí, násobek funkce). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Pak definujeme funkce $f + g$, $f \cdot g$, αf tak, že

- $f + g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $f \cdot g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha f: A \rightarrow \mathbb{R}$
- $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$, $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$, $(\alpha f)(x) := \alpha \cdot f(x)$

Dále definujeme funkci $\frac{f}{g}$ tak, že

- $\frac{f}{g}: \{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$

Polynomy jsou právě ty funkce, které lze z funkcí $f(x) = 1$ a $f(x) = x$ získat operacemi sčítání, násobení (dvou funkcí) a násobku (číslo a funkce). Už víme, že funkce 1 a x jsou spojité. Pokud tedy ukážeme, že výše popsané operace zachovávají spojitost funkcí (například pokud f a g jsou spojité, pak $f + g$ je spojitá), dostaneme, že všechny polynomy jsou spojité.

Věta 1.21 (Limita součtu, součinu, podílu a násobku). Nechť $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pokud existují limity

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

Pak existují i příslušné limity pro $f + g$, $f \cdot g$, αf a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = L + M, \quad (1.22)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = L \cdot M, \quad (1.23)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (\alpha f)(x) = \alpha L, \quad (1.24)$$

Pokud navíc $M \neq 0$, existuje limita i pro $\frac{f}{g}$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{L}{M} \quad (1.25)$$

Důkaz. Od tohoto důkazu dál nebudeme podrobně vysvětlovat myšlenkový postup, jak k důkazu dojít, a budeme psát už hotový důkaz. Jednak to usnadní práci autorovi, a také to donutí čtenáře se nad důkazem zamyslet.

První dokažme rovnost 1.22. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\}: |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

a dále $\delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\}: |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dále dokažme rovnost 1.23. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$, $\delta_3 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\}: |f(x) - L| \leq 1$$

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\}: |f(x) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2|M|}$$

$$\forall x \in (c - \delta_3, c + \delta_3) \setminus \{c\}: |g(x) - M| \leq \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)}$$

↴

↳ Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - f(x)M + f(x)M - LM| \\ &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - M| + |f(x) - L| \cdot |M| \\ &\leq (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2|M|} \cdot |M| = \varepsilon \end{aligned}$$

Rovnost 1.24 plyne z 1.23, pokud za g vezmeme konstantní funkci. Rovnost 1.25 se dokazuje podobně jako 1.23 a je ponecháno jako cvičení pilnému čtenáři. $\square$

Důsledek 1.26.

- Pokud f, g jsou spojité na (a, b) , $\alpha \in \mathbb{R}$, pak jsou na (a, b) spojité i funkce

$$f + g, f \cdot g, \alpha f$$

Navíc pokud $g \neq 0$ na (a, b) , je na (a, b) spojitá i $\frac{f}{g}$.

- Polynomy jsou spojité funkce na celém $\mathbb{R}$.

Příklad 1.27. Ukažte, že $f(x) = \sqrt{x}$ je spojitá na $(0, \infty)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} - \sqrt{x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{\lim_{h \rightarrow 0} h}{\lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{0}{2\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

1.3 Derivace

Definice 1.28 (Derivace funkce). Mějme funkci $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$. Derivace funkce f v bodě x , pokud existuje, je číslo

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Také značíme $\frac{df}{dx}(x) = f'(x)$. Dále definujeme derivace vyšších řádů

$$\begin{aligned} f'' &:= (f')', \quad f^{(3)} := (f'')', \quad \dots, \quad f^{(n)} := (f^{(n-1)})', \\ \text{nebo taky} \quad \frac{d^2 f}{dx^2} &:= f'', \quad \frac{d^3 f}{dx^3} := f^{(3)}, \quad \dots, \quad \frac{d^n f}{dx^n} := f^{(n)}. \end{aligned}$$

Úloha 1.29. $f(x) = C$ (konstanta). $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.30. $f(x) = ax + b$. $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.31. $f(x) = x^2$. $f'(x) = ?$ $f''(x) = ?$ $f^{(3)}(x) = ?$ ┘

Příklad 1.32. $f(x) = x^n, n \geq 2$. $f'(x) = ?$

Řešení: Roznásobením závorek v $(x + h)^n$ dostáváme členy typu $x^a h^b$, $a + b = n$.

$$(x + h)^n = (x + h) \cdot \dots \cdot (x + h) = x^n + nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n$$

Členy $x^a h^b, b \geq 2$ nás příliš netrápí, protože k limitě $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ nepřispějí. Důležité je, že u členu $x^{n-1}h$ je koeficient n , protože tolik existuje možností, jak si z jedné závorky „vybrat“ h a z ostatních x . Tedy

$$(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n}{h} = nx^{n-1}$$

┘

Věta 1.33 (Existence derivace implikuje spojitost). Pokud f má v bodě x derivaci, je v tomto bodě spojitá.

Důkaz.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} h \right) \\ &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(x) + f'(x) \cdot 0 = f(x) \end{aligned}$$

□

Dále nás bude zajímat, jak se derivace chovají, když funkce sčítáme a násobíme. Asi nás nepřekvapí, že bude platit $(f + g)' = f' + g'$. Na první pohled ale není jasné, jak má vyjít $(fg)'$. Představme si, že prodáváme chleba, a za jeden týden prodáme 300 kg chleba za 100 Kč/kg. Další týden prodáme o 5 kg chleba víc a zdražíme ho o 10 Kč/kg. O kolik víc vyděláme? Samozřejmě odpověď je triviální, ale pojďme ji spočítat přibližně bez toho, aniž bychom přímo násobili 305×110 . Za chleba navíc bychom (při staré ceně) vydělali $5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$ a zdražením (při původní kiláži prodaného chleba) bychom vydělali $300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč}$, tedy změna výdělku jde aproximovat jako

$$300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč} + 5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$$

Chyba, které jsme se dopustili, činí $5 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč/kg}$, a tudíž je zanedbatelná.

Obecně vznikne tento vzorec následovně: pro dvě funkce f, g vyčíslené v bodě x

(v němž mají derivaci) a h malé platí

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) &\approx (f(x) + hf'(x))(g(x) + hg'(x)) \\ &= f(x)g(x) + h[f(x)g'(x) + f'(x)g(x)] + h^2f'(x)g'(x) \\ (fg)(x+h) &\approx (fg)(x) + h[(fg)'(x)] \\ \Rightarrow (fg)'(x) &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Chyba, které jsme se dopustili, je řádově h^2 , a tudíž je zanedbatelná.

Věta 1.34 (Derivace součtu, součinu a násobku). Necht $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (1.35)$$

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \quad (1.36)$$

$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \quad (1.37)$$

existují-li čísla napravo (tedy existují-li $f'(x)$, $g'(x)$).

Důkaz. Rovnost 1.35 se dokáže následovně:

$$\begin{aligned} (f + g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x + h) - (f + g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x) + g(x + h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

Rovnost 1.36 plyne z výpočtu

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x + h) - (fg)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x + h)g(x) + f(x + h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \frac{g(x + h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} g(x) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \right) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \right) + \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right) g(x) \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Rovnost 1.37 plyne z 1.36, pokud za g vezmeme konstantní funkci. $\square$

Důsledek 1.38.

$$(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1.$$

Příklad 1.39. Najděte rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ v bodě $(1, f(1))$.

Řešení: Směrnice tečny je $f'(1) = -2$, tedy její rovnice je $y = -2x + b$ pro dosud neznámé $b \in \mathbb{R}$. Tečna prochází bodem $(x, y) = (1, f(1)) = (1, 0)$, z toho $b = 2$. ▮

Příklad 1.40. $f(x) = \sqrt{x}$. $f'(x) = ?$

Řešení:

$$\begin{aligned} \sqrt{x}\sqrt{x} &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \sqrt{x}(\sqrt{x})' + (\sqrt{x})'\sqrt{x} &= 1 \\ 2\sqrt{x}(\sqrt{x})' &= 1 \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \text{neboli } (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} \end{aligned}$$

Vidíme, že ač za definiční obor pro $f(x) = \sqrt{x}$ můžeme vzít $[0, \infty)$, derivace existuje jen na $(0, \infty)$. Postup má jednu nevýhodu: při používání věty o derivaci součinu jsme předpokládali, že derivace $\sqrt{x}$ existuje. Tedy ve skutečnosti je výsledek našeho výpočtu následující: pokud derivace $\sqrt{x}$ existuje, pak musí být rovna $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. ▮


Úloha 1.41. Spočítejte $(\sqrt{x})'$ přímo z definice a tím ověřte, že existuje. ▮

Úloha 1.42. $f(x) = \frac{1}{x}$. $f'(x) = ?$ Spočítejte přímo z definice a pomocí triku využívajícího větu o derivaci součinu. ▮

Úloha 1.43. Dokážete podobným trikem jako v Příkladu 1.40 a Úloze 1.42 odvodit vzoreček pro $(\frac{f}{g})'$? ▮

Definice 1.44 (Složená funkce). Nechtě $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou funkce. Pak složená funkce $g \circ f$ má

- definiční obor A a obor hodnot C ,
- předpis $(g \circ f)(x) := g(f(x))$



Příklad 1.45. $f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = 9x + 5$, $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $g(x) = \sqrt{x}$. Složená funkce je $g \circ f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ s předpisem $(g \circ f)(x) = \sqrt{9x + 5}$. ▮

Věta 1.46 (Derivace složené funkce). Nechť $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$, kde $A, B, C \subset \mathbb{R}$. Pak pro $x \in A$ platí

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

existuje-li číslo napravo (tedy existují-li $g'(f(x))$ a $f'(x)$).

Náčrt Důkazu.

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x)+k) - g(f(x))}{k} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= g'(f(x)) f'(x) \end{aligned}$$

Pro dokončení důkazu bychom museli vysvětlit, proč jde na druhém řádku rozšířit zlomek číslem $f(x+h) - f(x)$ (číslo musí být nenulové), a že můžeme od limity $h \rightarrow 0$ přejít substitucí $k := f(x+h) - f(x)$ na limitu $k \rightarrow 0$. $\square$

Příklad 1.47 (Pokračování příkladu 1.45). $h(x) = \sqrt{9x+5}$. $h'(x) = ?$

Řešení: $h = g \circ f$ z Příkladu 1.45, takže

$$(\sqrt{9x+5})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x+5}} \cdot 9 = \frac{9}{2\sqrt{9x+5}}$$

┘

Příklad 1.48. Najděte rovnici tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $(3, 4)$.

Řešení: stačí místo kružnice uvažovat graf funkce $h(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Ta se napíše jako $h = g \circ f$, $g(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = 25 - x^2$. Z toho máme

$$(\sqrt{25 - x^2})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{25 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

Protože $h'(3) = -\frac{3}{4}$, tečna má rovnici $y = -\frac{3}{4}x + b$. Dosazením bodu $(3, 4)$ dostaneme $b = \frac{25}{4}$. Rovnice jde napsat v elegantním tvaru $3x + 4y = 25$. $\square$

Definice 1.49 (Vlastnosti funkce). Necht $f: A \rightarrow \mathbb{R}, x \in A$. Říkáme, že

- f je na A rostoucí, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) < f(z)$,
- f je na A klesající, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) > f(z)$,
- f má na A minimum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \leq f(y)$. Značíme ho $\min_{y \in A} f(y) := f(x)$,
- f má na A maximum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \geq f(y)$. Značíme ho $\max_{y \in A} f(y) := f(x)$,
- f má na A lokální minimum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \leq f(y)$,
- f má na A lokální maximum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \geq f(y)$,
- f má na A lokální extrém v bodě x , pokud v něm má lokální minimum nebo lokální maximum.

Úloha 1.50. $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte doplněním na čtverec. ┘

Úloha 1.51. Nabývá funkce $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ na $[0, \infty)$ minima/maxima? Pokud ano, najděte je. ┘

Následující věta intuitivně říká: pokud je směrnice tečny kladná, funkce roste, pokud záporná, funkce klesá. Pokud je tečna vodorovná (má nulovou směrnici), funkce se v tom bodě „otáčí“, má buď lokální minimum nebo lokální maximum.

Věta* 1.52 (Vlastnosti funkce plynoucí z derivace). Necht $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ má na (a, b) derivaci. Pak

- Pokud $f' > 0$ na (a, b) , je f rostoucí na (a, b)
- Pokud $f' < 0$ na (a, b) , je f klesající na (a, b)
- Pokud má f lokální extrém v bodě $x \in (a, b)$, platí $f'(x) = 0$.
- Pokud $f'(x) = 0$ a existuje $\varepsilon > 0$ takové, že f je klesající na $(x - \varepsilon, x)$ a rostoucí na $(x, x + \varepsilon)$, má f v bodě x lokální minimum. Podobně pro lokální maximum.

Úloha 1.53 (Pokračování Úlohy 1.50). $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte využitím Věty 1.52. ┘

Úloha 1.54. Načrtněte graf funkce $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 2$ tak, že najdete lokální extrémy a intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající. ┘

2 Co je diferenciální rovnice?

Newton nám ukázal, že zákon je pouze nezbytný vztah mezi současným stavem světa a stavem, který na něj bezprostředně navazuje. Všechny ostatní zákony, které byly od té doby objeveny, nejsou ničím jiným; v podstatě se jedná o diferenciální rovnice.

– Henri Poincaré

V této kapitole se podíváme na první diferenciální rovnici: *druhý Newtonův zákon*. Pomocí něho spočítáme polohu hmotného bodu v homogenním gravitačním poli tak, že ji „uhodneme“. Pak se zamyslíme nad tím, jestli je tato operace „uhodnutí“ legitimní a dostaneme se tak k principu determinismu.

2.1 Volný pád

Mějme hmotný bod pohybující se po přímce, nechť $x(t)$ je jeho poloha v čase t . Pak rychlost dostaneme derivováním x podle času:

$$v(t) := x'(t) = \frac{dx}{dt}(t)$$

a zrychlení derivováním v podle času:

$$a(t) := v'(t) = \frac{dv}{dt}(t) = x''(t) = \frac{d^2x}{dt^2}(t),$$

tedy zrychlení je druhá derivace polohy. Druhý Newtonův zákon pak můžeme napsat ve tvaru

$$mx''(t) = F \quad \text{neboli} \quad m \frac{d^2x}{dt^2} = F.$$

Úloha je tedy následující: někdo nám zadá sílu působící na hmotný bod (a tudíž zrychlení, což se triviálně dopočítá jako $\frac{F}{m}$), a chceme zjistit polohu hmotného bodu. Jinak řečeno, někdo nám zadá $x''(t)$ a my chceme spočítat $x(t)$. Takové úloze říkáme *diferenciální rovnice*. Obecná diferenciální rovnice se dá napsat ve tvaru

$$\phi(t, x, x', x'', \dots, x^{(n)}) = 0 \tag{2.1}$$

kde ϕ je nějaká funkce (tedy výraz, kde se může objevovat $t, x, \dots, x^{(n)}$ různými způsoby). V následujících kapitolách si ukážeme například, jak řešit rovnice

$$\begin{aligned} x'(t) &= e^t \sin(t) \\ x'(t) - x(t) &= 0 \\ x''(t) + x(t) &= 0 \\ x'(t) &= \sqrt{x(t)} \end{aligned}$$

a nebo si ukážeme, že funkce $x(t) = \sin(t)$ řeší rovnici

$$x(t)^2 + (x'(t))^2 = 1.$$

Abychom mohli druhý Newtonův zákon napsat ve tvaru rovnice 2.1, musíme pracovat s F závislejícím nějak na čase, poloze, rychlosti, zrychlení, ...

Budeme dále předpokládat, že $F = F(t, x, x')$. Tedy

Druhý Newtonův zákon: $mx''(t) = F(t, x(t), x'(t))$

Pořád ale máme problém, něco nám chybí. To uvidíme v následujícím příkladu.

Příklad 2.2 (Rovnoměrný přímočarý pohyb). Předpokládejme, že na nás nepůsobí žádná síla, tedy $F = 0$. Jak se pohybujeme?

Řešení: Platí

$$\begin{aligned} mx''(t) &= 0, \quad m \neq 0 \\ \Rightarrow x''(t) &= 0 \end{aligned}$$

Hledáme funkci, jejíž druhá derivace je 0. Pokud budeme pracovat s rychlostí $v(t) := x'(t)$, znamená to, že derivace rychlosti je $v'(t) = x''(t) = 0$. Známe nekonečně mnoho funkcí, jejíž derivace je 0, jsou to konstantní funkce. Tedy uhadneme, že

$$\begin{aligned} v(t) &= C = \text{konst.} \\ \Rightarrow x'(t) &= C \end{aligned}$$

Tím pádem derivace $x(t)$ je konstanta. Známe nekonečně mnoho funkcí, jejíž derivace je konstantní, jsou to afinní funkce, jejíž směrnice je ona konstanta C . Tedy uhadneme, že

$$x(t) = C \cdot t + D.$$

Získali jsme tedy nekonečně mnoho řešení, kde důležité fyzikální veličiny poloha, rychlost a zrychlení jsou

$$\begin{aligned} x(t) &= C \cdot t + D \\ v(t) &= x'(t) = C \\ a(t) &= x''(t) = 0 \end{aligned}$$

Jak určit konstany C, D ? Očividně platí $C = v(0), D = x(0)$. Tedy pokud bychom věděli počáteční polohu a rychlost, uměli bychom přesně spočítat $x(t) = v_0 \cdot t + x_0$. Abychom tedy mohli použít druhý Newtonův zákon na určení polohy hmotného bodu v budoucnosti, musíme znát počáteční *stav* hmotného bodu, tj. jeho polohu a rychlost.

Obecně, abychom mohli určit řešení $x(t)$ diferenciální rovnice, nestačí nám samotná diferenciální rovnice, ale potřebujeme k ní *počáteční podmínky*. ┘

Pokud v rovnici vystupují nanejvýš derivace $x^{(n)}(t)$ (tedy nevystupují v ní derivace $x^{(n+1)}(t), \dots$), nazýváme ji *rovnice n -tého řádu*. Rovnice n -tého řádu vyžadují n počátečních podmínek. Například druhý Newtonův zákon vyžaduje 2 počáteční podmínky – počáteční polohu a rychlost.

Příklad 2.3 (Svislý vrh v homogenním gravitačním poli). Na hmotný bod působí síla $F = -mg$, kde g je konstanta. Počáteční poloha je x_0 a počáteční rychlost v_0 . Jak se pohybuje hmotný bod?

Řešení: Řešíme úlohu

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -mg \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0 \end{aligned}$$

Opět postupujeme tak, že odstaňujeme derivace „hádáním“:

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -mg \\ x''(t) &= -g \\ x'(t) &= -gt + C \\ x(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 + Ct + D \end{aligned}$$

Očividně $x(0) = D$, $x'(0) = C$, tedy $C = v_0$, $D = x_0$. Tedy poloha, rychlost a zrychlení hmotného bodu jsou

$$\begin{aligned} x(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0 \\ v(t) &= -gt + v_0 \\ a(t) &= -g \end{aligned}$$

┘

Příklad 2.4 (Šikmý vrh v homogenním gravitačním poli). Na hmotný bod působí síla

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix},$$

kde g je konstanta. Počáteční poloha je x_0 a počáteční rychlost v_0 . Jak se pohybuje hmotný bod?

Řešení: musíme použít druhý Newtonův zákon v x -ovém směru, kde je síla 0, a v y -ovém směru, kde je síla $-mg$. Dostaneme dvě úlohy

$$\begin{array}{ll} mx''(t) = 0 & my''(t) = -mg \\ x(0) = x_0 & y(0) = y_0 \\ x'(0) = v_{0x} & y'(0) = v_{0y} \end{array} \quad \text{a}$$

┘

↳ Tyto úlohy už umíme řešit, tedy výsledný pohyb je

$$\begin{aligned}x(t) &= v_{0x}t + x_0 \\ y(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t + y_0.\end{aligned}$$

┘

2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu

Je náš postup řešení úloh v sekci 2.1 legitimní? Našli jsme všechna řešení daných úloh? Co vlastně znamená řešit diferenciální rovnici?

Definice 2.5 (Řešení úlohy dané diferenciální rovnicí). Mějme úlohu

$$\begin{aligned}\phi(t, x, x', \dots, x^{(n)}) &= 0 \\ x(0) &= C_0 \\ x'(0) &= C_1 \\ &\vdots \\ x^{(n-1)}(0) &= C_{n-1}\end{aligned}\tag{2.6}$$

Řešením úlohy je taková funkce x , která má n derivací, splňuje

$$\forall t: \phi(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0$$

$$\text{a } x(0) = C_0, \dots, x^{(n-1)}(0) = C_{n-1}.$$

Diferenciální rovnice říká, co se děje uvnitř onoho systému, jak funguje a jak spolu interagují všechny veličiny. Dále budeme pomocí diferenciálních rovnic popisovat fyzikální zákony, rychlosti chemických reakcí, šíření pandemií nebo nárůst popularity virálních videí. Věříme, že náš svět je *deterministický*. Tudíž pokud máme správný *model*, správný matematický popis vnitřního mechanismu daného systému (=správnou diferenciální rovnici), a známe momentální stav systému (=správné počáteční podmínky), pak jsme schopni předpovědět budoucí chování systému. Pokud nejsme schopni předpovědět chování systému, pak se v něm děje něco, co neznáme nebo neumíme popsat (=máme špatnou diferenciální rovnici, nebo nemáme dost informací o počátečních podmínkách).

Matematicky je situace složitější. Dají se zkonstruovat diferenciální rovnice, které pro jisté počáteční podmínky mají víc než jedno řešení, nebo nemají řešení žádné. Těmito patologickým jevům se budeme zabývat později. Rovnice, se kterými se setkáme v příštích pár kapitolách, tuto patologii nemají, a my budeme nadále předpokládat, že řešení (splňující dané počátečních podmínek) existuje vždy právě jedno. Budeme pracovat s předběžnou verzí Picard-Lindelöfovy věty. Věta má jisté

předpoklady, které eliminují ony patologické případy, ale těmi se zatím zabývat nebudeme, protože zatím nemáme znalosti na jejich pochopení.

Věta 2.7 (Picard-Lindelöfova věta, neformálně). Diferenciální rovnice n -tého řádu má právě jedno řešení, které splňuje daných n počátečních podmínek.

Tato věta říká dvě věci:

- (i) *Existence řešení*: Můžeme mluvit o řešeních úlohy (2.6), protože víme, že nějaké řešení existuje.
- (ii) *Jednoznačnost řešení*: Když zadefinujeme funkci jako řešení úlohy (2.6), je tato definice jednoznačná. Pokud o dvou funkcích x_1, x_2 dokážeme, že obě řeší úlohu (2.6), plyne z toho $x_1 = x_2$.

Proto ji taky můžeme nazvat *Věta o existenci a jednoznačnosti řešení*.

Poznamenejme, že se v celém kurzu budeme zabývat *obyčejnými* diferenciálními rovnicemi. Slovo obyčejná znamená, že veličiny závisí jen na jednom parametru, který bude zpravidla čas. Oproti tomu existují *parciální diferenciální rovnice*, kde veličiny závisí na více parametrech a kombinují se tam derivace podle všech parametrů zvlášť, takzvané parciální derivace. Například když studujeme vývoj teploty v termosce, máme dvě možnosti:

- (i) Můžeme předstírat, že ve všech částech termosky je jedna a tatáž teplota T . Tudíž budeme zkoumat teplotu jako funkci $T(t)$ a sestavíme pro ni obyčejnou diferenciální rovnici. K tomu se dostaneme v kapitole 6.
- (ii) Můžeme uvažovat prostorové rozložení teploty, tedy zkoumat $T(t, x, y, z)$. Pro tuto funkci sestavíme parciální diferenciální rovnici, takzvanou rovnici vedení tepla, a tu pak vyřešíme. Problém je, že pokud termoska nemá nějaký speciální tvar, neumíme rovnici řešit na papíře a musíme se uspokojit s řešením na počítači. Navíc kromě počátečních podmínek musíme uvažovat *okrajové podmínky*: nejspíš bude záležet na tom, jestli termosku položíme na radiátor, nebo ji hodíme do ledového rybníku.

Existují další typy diferenciálních rovnic. Například pokud studujete vývoj populace, kde doba těhotenství je $\tau = 9$ měsíců, bude růst populace $x'(t)$ záviset ne na veličinách v čase t , ale v čase $t - \tau$ (domyslete si ony veličiny). Takovým rovnicím se říká *rovnice s prodlevou*. Pokud zkoumáme ceny komodit na světových trzích, nikdy nemůžeme znát všechny veličiny, které vstupují do systému. Naši neznalost modelujeme pomocí náhodných jevů (akcie chodí sporadicky nahoru a dolů), takovým rovnicím říkáme *stochastické diferenciální rovnice*. Pokud se v úloze objevuje nějaká nerovnost (letíme si v klidu rovnoměrným přímočarým pohybem a najednou narazíme do zdi), řešíme takzvanou *subdiferenciální inkluzi*. Matematici toho vymysleli hodně.

Pokud chcete porozumět světu okolo sebe, čtěte dál, a studujte diferenciální rovnice.

3 Exponenciální růst

V následujících dvou kapitolách si představíme základní funkce $\exp$, $\sin$, $\cos$, které jistě už znáte. Narozdíl od SŠ (a i většiny kurzů na VŠ) si je ale „nevycucáme z prstu“, ale systematicky odvodíme jako řešení diferenciálních rovnic. Z příslušných rovnic pak vyčteme všechny vlastnosti těchto funkcí.

3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru

Definice 3.1 (Funkce $\exp$). Funkce $\exp(t)$ je jednoznačné řešení úlohy

$$x'(t) = x(t)$$

$$x(0) = 1$$

Číslo $e := \exp(1)$ nazýváme *Eulerovo číslo*.

3.2 Vyčíslení funkce $\exp$

Zadefinovali jsme si funkci jako abstraktní objekt, který řeší nějakou diferenciální rovnici. To není příliš uspokojující, protože z toho není jasné, jak hodnotu funkce vyčíslit (kromě $\exp(0)$, což je z definice 1). Pojďme si ukázat, jak se dá $\exp(t)$ spočítat.

Víme, že pro malé h platí

$$\frac{\exp(t+h) - \exp(t)}{h} \approx (\exp(t))' = \exp(t)$$

Takže

$$\exp(t+h) \approx \exp(t) + h \cdot \exp(t) = (1+h)\exp(t)$$

a aproximace je tím lepší, čím menší je h . Můžeme tedy začít od $t = 0$ a malými křůčky h se posouvat:

$$\begin{aligned}\exp(h) &\approx (1+h)\exp(0) = 1+h \\ \exp(2h) &\approx (1+h)\exp(h) = (1+h)^2 \\ \exp(3h) &\approx (1+h)\exp(2h) = (1+h)^3 \\ &\vdots\end{aligned}$$

Pokud chceme vyčíslit $\exp(x)$, rozdělíme si interval $[0, x]$ na malé krůčky $h = \frac{x}{N}$, kde $N \in \mathbb{N}$ je velké:

$$0, \frac{x}{N}, 2\frac{x}{N}, 3\frac{x}{N}, \dots, x$$

a tudíž

$$\exp(x) \approx \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N$$

Příklad 3.2. Aproximujeme si Eulerovo číslo $e = \exp(1)$. Červeně jsou vyznačeny správné cifry (zatím nevíme, jak sami spočítat počet správných cifer, porovnáváme to s hodnotou ve standardních softwarových knihovnách).

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{10}\right)^{10} &\approx 2.5937424601000023 \\ \left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100} &\approx 2.7048138294215285 \\ \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} &\approx 2.7169239322355936 \\ \left(1 + \frac{1}{10^4}\right)^{10^4} &\approx 2.7181459268249255 \\ \left(1 + \frac{1}{10^5}\right)^{10^5} &\approx 2.7182682371922975 \\ \left(1 + \frac{1}{10^6}\right)^{10^6} &\approx 2.7182804690957534 \end{aligned}$$

┘

Todo. graf jak geometricka posl aproximuje exp

3.3 Vlastnosti funkce exp

Věta 3.3 (Vlastnosti funkce exp).

- (i) Funkce $\exp$ je dobře definovaná na celém $\mathbb{R}$
- (ii) $(\exp(t))' = (\exp(t))'' = \dots = (\exp(t))^{(n)} = \dots = \exp(t)$, $\exp(0) = 1$
- (iii) $\exp(t + s) = \exp(t) \cdot \exp(s)$
- (iv) $\forall n \in \mathbb{N}: \exp(n \cdot t) = \exp(t)^n$. Speciálně $\exp(n) = e^n$
- (v) $\exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)}$
- (vi) $\exp$ je kladná a rostoucí na $\mathbb{R}$

Důkaz. Bod (i) plyne z Picard-Lindelöfovy věty. Bod (ii) plyne přímo z definice opakovaným derivováním $\exp$. Bod (iii) dokážeme následovně: definujeme $x_1(t) := \exp(t + s)$, $x_2(t) := \exp(t) \cdot \exp(s)$ a ukážeme, že obě funkce řeší úlohu

$$\begin{aligned}x'(t) &= x(t) \\ x(0) &= \exp(s)\end{aligned}$$

z Picard-Lindelöfovy věty pak vyplývá, že $\forall t \in \mathbb{R}: x_1(t) = x_2(t)$. Pro funkci x_1 dostaneme užitím Věty 1.46

$$\begin{aligned}x'_1(t) &= (\exp(t + s))' = \exp(t + s) \cdot (t + s)' = \exp(t + s) = x_1(t) \\ x_1(0) &= \exp(0 + s) = \exp(s)\end{aligned}$$

A pro funkci x_2

$$\begin{aligned}x'_2(t) &= (\exp(t) \exp(s))' = \exp(s)(\exp(t))' = \exp(s) \exp(t) = x_2(t) \\ x_2(0) &= \exp(0) \exp(s) = \exp(s)\end{aligned}$$

Bod (iv) plyne z bodu (iii) následovně:

$$\exp(n \cdot t) = \exp(\underbrace{t + \dots + t}_{n \text{ krát}}) = \underbrace{\exp(t) \cdot \dots \cdot \exp(t)}_{n \text{ krát}} = \exp(t)^n$$

Bod (v) plyne taky z (iii):

$$\begin{aligned}\exp(t + (-t)) &= \exp(t) \exp(-t) \\ \exp(0) &= \exp(t) \exp(-t) \\ 1 &= \exp(t) \exp(-t) \Rightarrow \exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)}\end{aligned}$$

Abychom dokázali (vi), stačí podle Věty 1.52 ukázat, že $\forall t \in \mathbb{R}: \exp(t) > 0$. Pro spor předpokládejme, že existuje nějaké $t^* \in \mathbb{R}$ splňující $\exp(t^*) \leq 0$. Pokud $\exp(t^*) < 0$, můžeme mezi 0 a t^* najít jiný bod $t^{**} \in \mathbb{R}$, pro který $\exp(t^{**}) = 0$ (to plyne z toho, že $\exp$ má derivaci, tudíž je spojitá, takže můžeme použít Větu 3.20).

Jenže pak

$$1 = \exp(0) = \exp(t^{**} - t^{**}) = \exp(t^{**}) \exp(-t^{**}) = 0 \cdot \exp(-t^{**}) = 0,$$

spor. □

Úloha 3.4. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x'(t) &= 3x(t) \\ x(0) &= 4\end{aligned}$$

↴

↳ tak, že uvažujete *ansatz* $x(t) = a \exp(bt)$ a nastavíte správně konstanty $a, b \in \mathbb{R}$. ┘

Poznámka 3.5. Ansatz znamená uhodnutí, v jakém tvaru má vycházet řešení matematické úlohy, s dosud neurčenými parametry (stupněmi volnosti). Parametry se pak dopočítávají tak, aby řešení opravdu odpovídalo zadání. ┘

Úloha 3.6. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\x(0) &= 1 \\x'(0) &= -3\end{aligned}$$

pomocí ansatzu $x(t) = \exp(\lambda t)$. ┘

Úloha 3.7. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\x(0) &= 2 \\x'(0) &= -2.\end{aligned}$$

┘

Úloha 3.8. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\x(0) &= 3 \\x'(0) &= -7.\end{aligned}$$

┘

Úloha 3.9. Dokažte: pokud x_1, x_2 řeší rovnici

$$a_2 x''(t) + a_1 x'(t) + a_0 = 0$$

a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pak stejnou rovnici řeší i $\alpha x_1 + \beta x_2$. ┘

Úloha 3.10. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = 0$$

┘

Úloha 3.11. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0$$

První zkuste ansatz $x(t) = \exp(\lambda t)$. Pak zkuste substituci $y(t) := \exp(-t)x(t)$ ┘

3.4 Nevlastní limity

Důležitá vlastnost exponenciálního růstu je, že roste nade všechny meze, tj. není shora ohraničený žádným číslem. Pokud funkce $f(x)$ pro zvětšující se x roste nade všechny meze, píšeme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

Definice 3.12 (Nevlastní limity, limity v nevlastním bodě). Mějme funkci f , bod $c \in \mathbb{R}$ a číslo $L \in \mathbb{R}$ tak, aby „vše dávalo smysl“. Definujeme limity v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)\end{aligned}$$

nevlastní limity $\pm\infty$ ve vlastních bodech ($c \in \mathbb{R}$) vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (N, \infty) \\ \lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (-\infty, N)\end{aligned}$$

a nevlastní limity $\pm\infty$ v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) \in (N, \infty) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) \in (N, \infty) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) \in (-\infty, N) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) \in (-\infty, N).\end{aligned}$$

„Aby vše dávalo smysl“ znamená kupříkladu, že pokud chceme mluvit o limitě $\lim_{x \rightarrow \infty}$, musí definiční obor f obsahovat interval (x_0, ∞) pro nějaké $x_0 \in \mathbb{R}$.

Úloha 3.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = ?$ ┐

Úloha 3.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = ?$ ┐

Úloha 3.15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+5}{x-10} = ?$ ┐

Úloha 3.16. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x-2|} = ?$ ┐

Úloha 3.17. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = ?$ ┐

Úloha 3.18. Dokažte: pro $f, g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\left(\forall t \in (0, \infty): f(t) \geq g(t) \text{ a } \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty \right) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \infty$$

┐

Úloha 3.19 (Věta o dvou strážnících). Dokažte: pro $f, g, h: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\left(\forall t \in (0, \infty): h(t) \leq f(t) \leq g(t) \text{ a } \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \right) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = L.$$

┐

Pro nás bude důležité, že $\exp$ je rostoucí bijekce (díky tomu pak zkonstruujeme logaritmus). To si níže dokážeme, ale budeme na to potřebovat technickou větu, jejíž důkaz je nad rámec textu. Intuitivně říká, že spojitě funkce „neskáčou“, tj. že pokud funkce nabývá hodnot $f(a)$ a $f(b)$, musí nabývat i všech hodnot mezi.

Věta* 3.20 (Věta o nabývání mezihodnot). Nechť $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá, $a, b \in A$. Pak

$$\forall z \in (\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}) \exists c \in (a, b): f(c) = z.$$

Věta níže říká, že $\exp$ roste rychleji než jakýkoliv polynom.

Věta 3.21 (Asymptotika funkce $\exp$).

- (i) $\forall n \in \mathbb{N} \forall t \in (0, \infty): \exp(t) > 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \dots + \frac{1}{n!}t^n$
- (ii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty, \lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = 0$
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N}: \lim_{t \rightarrow \infty} t^n \exp(-t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^n}{\exp(t)} = 0$
- (iv) $\exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ je bijekce

Důkaz. Funkce

$$\begin{aligned} f_1(t) &:= \exp(t) - 1 - t \\ f_2(t) &:= \exp(t) - 1 - t - \frac{1}{2}t^2 \\ &\vdots \\ f_n(t) &:= \exp(t) - 1 - t - \frac{1}{2}t^2 - \dots - \frac{1}{n!}t^n \end{aligned}$$

┐

↳ splňují

$$\begin{aligned} f_1'(t) &= \exp(t) - 1 > 0 \text{ na } (0, \infty), f_1(0) = 0 \Rightarrow f_1(t) > 0 \text{ na } (0, \infty) \\ f_2'(t) &= f_1(t) > 0 \text{ na } (0, \infty), f_2(0) = 0 \Rightarrow f_2(t) > 0 \text{ na } (0, \infty) \\ &\vdots \\ f_n'(t) &= f_{n-1}(t) > 0 \text{ na } (0, \infty), f_n(0) = 0 \Rightarrow f_n(t) > 0 \text{ na } (0, \infty), \end{aligned}$$

z toho plyne bod (i). Bod (ii) ukážeme z bodu (i):

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} 1 + t = \infty, \exp(t) > 1 + t &\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty \\ &\Rightarrow \lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \exp(-t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\exp(t)} = 0. \end{aligned}$$

Bod (iii) taktéž plyne z bodu (i), protože

$$0 < \frac{t^n}{\exp(t)} < \frac{t^n}{1 + t + \dots + \frac{1}{(n+1)!} t^{n+1}} < \frac{t^n}{\frac{1}{(n+1)!} t^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{t}$$

Protože obě funkce 0 a $\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{t}$ jdou v limitě $t \rightarrow \infty$ k nule, a $\frac{t^n}{\exp(t)}$ je jimi ohrazená, musí jít také v limitě k nule.

Dokažme bod (iv). Protože $\exp$ je rostoucí, musí být injektivní. Zbývá tedy ukázat, že je surjektivní. Protože $\lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty$, umíme pro libovolné $\varepsilon \in (0, 1)$, $N \in (1, \infty)$ najít $t_0 < 0$, $t_1 > 0$ takové, že

$$\exp(t_0) < \varepsilon, \exp(t_1) > N$$

Pak z Věty 3.20 umíme najít $t_0^* \in (t_0, 0)$, $t_1^* \in (0, t_1)$ takové, že

$$\exp(t_0^*) = \varepsilon, \exp(t_1^*) = N$$

Tedy podle Věty 3.20 funkce $\exp$ na intervalu (t_0^*, t_1^*) nabývá všech hodnot na intervalu (ε, N) . Protože $\varepsilon > 0$, $N > 0$ byly libovolné, dostáváme, že $\exp$ na $(-\infty, \infty)$ nabývá všech hodnot na intervalu $(0, \infty)$. Důkaz je hotov. $\square$

3.5 Zavedení funkce $\ln$

Definice 3.22 (Inverzní funkce). Necht $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$. Řekneme, že g je inverzní k f , pokud

$$\begin{aligned} \forall b \in B: f(g(b)) &= b \\ \forall a \in A: g(f(a)) &= a \end{aligned}$$

Věta 3.23 (Existence inverzní funkce). Ke každé bijekci $f: A \rightarrow B$ existuje jednoznačně určená inverzní funkce $f^{-1}: B \rightarrow A$, která je taky bijekce.

Důkaz. Necht $b \in B$. Protože f je surjektivní, existuje $a \in A$ takové, že $f(a) = b$. Protože f je injektivní, existuje takové a jen jedno: pokud by existovala a_1, a_2 taková, že $f(a_1) = b = f(a_2)$, z injektivní plyne $a_1 = a_2$. Označme $f^{-1}(b) := a$. Pokud toto provedeme pro všechna $b \in B$, dostaneme funkci $f^{-1}: B \rightarrow A$, která je k f inverzní: platí totiž

$$f(f^{-1}(b)) = f(a) = b$$

a z definice $f^{-1}(f(a))$ je takový prvek $x \in A$, pro který platí $f(x) = f(a)$, tedy $x = a$. Zkonstruovali jsme inverzní funkci.

f^{-1} je injektivní:

$$f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) \Rightarrow f(f^{-1}(b_1)) = f(f^{-1}(b_2)) \Rightarrow b_1 = b_2$$

f^{-1} je surjektivní, protože ke každému $a \in A$ umíme najít $b \in B$ takové, že $f^{-1}(b) = a$ – přeci $b = f(a)$.

Nyní dokažme jednoznačnost inverzní funkce. Tedy pokud g_1, g_2 jsou inverzní k f , platí $\forall b \in B$

$$f(g_1(b)) = b = f(g_2(b)) \xrightarrow{f \text{ injektivní}} g_1(b) = g_2(b)$$

□

Definice 3.24 (Přirozený logaritmus). Definujeme funkci $\ln: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jako funkci inverzní k $\exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$.

Věta 3.25 (Vlastnosti přirozeného logaritmu).

- (i) $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
- (ii) $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- (iii) $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$
- (iv) $\ln(x^n) = n \ln(x)$
- (v) $\ln: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ je rostoucí bijekce
- (vi) $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$

Náčrt Důkazu. Ukažme si trik, kterým dospějeme k (i):

$$\begin{aligned}\exp(\ln(x)) &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \exp(\ln(x)) \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ x \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ (\ln(x))' &= \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Opět tento postup není matematicky rigorózní, protože už předpokládá, že derivace $\ln(x)$ existuje.

Body (ii)-(vi) plynou z Věty 3.3. Ukažme si například, jak se získá (ii): Pro $x, y > 0$ najdeme $t, s \in \mathbb{R}$ takové, že $x = \exp(t)$, $y = \exp(s)$ (to jde, protože $\exp$ je surjektivní funkce $\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$.) Pak

$$\ln(xy) = \ln(\exp(t) \exp(s)) = \ln(\exp(t+s)) = t+s = \ln(x) + \ln(y)$$

□

Úloha 3.26. $(\ln(x^3 + 5))' = ?$

┘

Úloha 3.27. Vyřešte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ úlohu

$$\begin{aligned}x'(t) &= 3x(t) \\ x(0) &= 4.\end{aligned}$$

┘

Úloha 3.28. Najděte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0.$$

┘

Příklad 3.29 (Poločas přeměny). Počet jader $N(t)$ radioaktivního materiálu, které se v čase t dosud nepřeměnila, splňuje

$$\begin{aligned}N'(t) &= -\lambda N(t) \\ N(0) &= N_0\end{aligned}$$

kde $\lambda > 0$, $N_0 > 0$. Za jakou dobu zbude jen polovina nepřeměněných jader? Za jakou dobu jich zbude osmina?

Řešení: Řešení rovnice je

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$$

┘

↳ Hledáme čas $t_{1/2}$, pro který bude platit

$$\begin{aligned} N(t_{1/2}) &= \frac{1}{2} N_0 \\ N_0 \exp(-\lambda t_{1/2}) &= \frac{1}{2} N_0 \\ \exp(-\lambda t_{1/2}) &= \frac{1}{2} \\ \Rightarrow t_{1/2} &= -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\ln(2)}{\lambda} \end{aligned}$$

Podobně můžeme spočítat čas $t_{1/8}$, po kterém zbude osmina materiálu:

$$t_{1/8} = \frac{\ln(8)}{\lambda}$$

Z vlastností logaritmu plyne, že $t_{1/8} = 3t_{1/2}$. Obecně $t_{1/2^n} = nt_{1/2}$. ┘

3.6 Obecná mocnina

Definice mocniny z $a > 0$ pro exponent $n \in \mathbb{N}$ je přímočará:

$$a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ krát}} \quad (3.30)$$

Pro takto zavedenou mocninu si můžeme všimnout, že platí

$$a^{n+m} = a^n a^m, \quad n, m \in \mathbb{N} \quad (3.31)$$

což je v analogii s

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y), \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Jak rozšířit definici 3.30 pro $n, m \notin \mathbb{N}$? Pokud bychom měli definovat a^0 tak, aby pořád platilo 3.31, musí být

$$a^n = a^{n+0} = a^n a^0 \Rightarrow a^0 := 1 \quad (3.32)$$

Pokud bychom měli definovat a^{-n} , $n \in \mathbb{N}$ tak, aby pořád platilo 3.31 a 3.32, musí být

$$1 = a^0 = a^{n-n} = a^n a^{-n} \Rightarrow a^{-n} := \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3.33)$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$a^{n \cdot m} = (a^n)^m, \quad n, m \in \mathbb{Z}. \quad (3.34)$$

Pokud bychom měli definovat $a^{\frac{n}{m}}$, $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tak, aby pořád platilo 3.34, musí být

$$\left(a^{\frac{n}{m}}\right)^m = a^{\frac{n}{m} \cdot m} = a^n \Rightarrow a^{\frac{n}{m}} := \sqrt[m]{a^n}. \quad (3.35)$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$\begin{aligned} m \cdot \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) &= \ln\left(\left(a^{\frac{n}{m}}\right)^m\right) = \ln(a^n) = n \ln(a) \Rightarrow \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) = \frac{n}{m} \ln(a) \\ &\Rightarrow \ln(a^q) = q \ln(a), \quad q \in \mathbb{Q} \quad (3.36) \end{aligned}$$

Pokud bychom měli definovat $a^x, x \in \mathbb{R}$ tak, aby pořád platilo 3.36, musí být

$$\ln(a^x) = x \ln(a) \Rightarrow a^x := \exp(x \ln(a)).$$

Definice 3.37 (Obecná mocnina a logaritmus). Definujeme pro $a > 0, x \in \mathbb{R}$ mocninu o základu a

$$a^x := \exp(x \ln(a))$$

Dále pro $a > 1$ definujeme *logaritmus o základu a* jako funkci inverzní k $f(x) = a^x$, značíme ji $\log_a(x) := f^{-1}(x)$.

Věta 3.38 (Vlastnosti obecné mocniny a logaritmu).

- (i) Funkce $f(x) = a^x, f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ má vlastnosti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36.
- (ii) $(a^x)' = \ln(a)a^x$
- (iii) a^x je rostoucí bijekce pro $a > 1$, konstantní pro $a = 1$ a klesající bijekce pro $a < 1$
- (iv) Pro $a > 1$ platí $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$
Pro $a < 1$ platí $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$
- (v) Speciálně $\exp(x) = e^x$.
- (vi) Funkce $g(x) = \log_a(x) g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ splňuje $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$. Proto sdílí s přirozeným logaritmem všechny vlastnosti z Věty 3.25 až na to, že $(\log_a(x))' = \frac{1}{\ln(a)x}$
- (vii) Speciálně $\ln(x) = \log_e(x)$.

Důkaz. Cvičení. Vše plyne z vlastností $\ln$ a $\exp$. □

Poznámka 3.39. Odteď budeme značit exponenciálu e^x místo $\exp(x)$. ┘

4 Harmonický oscilátor

V následující kapitole budeme analyzovat systémy, jejichž chování se pravidelně opakuje. Zavedeme si pro to funkce $\sin$ a $\cos$.

4.1 Závaží na pružině

Mějme závaží na pružině, na kterou nepůsobí vnější síly, zpočátku v rovnovážné poloze. Sledujme jeho výchylku od rovnovážné polohy $x(t)$. Můžeme provést dva experimenty:

(A) Závaží vychýlíme o $x(0) = x_0$

(B) Závaží nevychýlíme, ale strčíme do něj, aby mělo rychlost $x'(0) = v_0$.

Proti nám působí síla pružiny $F = -kx$ snažící se vrátit závaží do rovnovážné polohy. Z druhého Newtonova zákona tedy dostáváme

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -kx(t) \\ x''(t) + \frac{k}{m}x(t) &= 0 \\ \boxed{x''(t) + \omega^2x(t) = 0}, \end{aligned} \tag{4.1}$$

kde jsme definovali $\omega := \sqrt{\frac{k}{m}}$. Rovnice 4.1 se nazývá *rovnice harmonického oscilátoru*. Její řešení teď budeme studovat, zatím pro $\omega = 1$. Později povolíme $\omega \neq 1$ a vysvětlíme si význam tohoto parametru.

Ze zkušenosti víme, že kmitání pružiny je periodické. Tuto vlastnost budeme matematicky studovat.

Definice 4.2 (Periodická funkce). Funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je periodická, pokud existuje $T > 0$ splňující

$$\forall t \in \mathbb{R}: f(t+T) = f(t). \tag{4.3}$$

Perioda funkce je nejmenší číslo splňující 4.3.

4.2 Zavedení funkcí $\sin$, $\cos$

Definice 4.4. Mějme úlohy

$$\begin{array}{ll} x''(t) + x(t) = 0 & x''(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = 0 \quad (\text{A}) & x(0) = 1 \quad (\text{B}) \\ x'(0) = 1 & x'(0) = 0 \end{array}$$

Řešení úlohy (A) nazveme $\sin(t)$, řešení úlohy (B) nazveme $\cos(t)$.

Poznámka 4.5. Pojďme se zamyslet, jak se asi bude řešení vyvíjet. Uvažujme $\sin(t)$. Závaží má počáteční polohu $x(0) = 0$ a rychlost $x'(0) = 1$, takže ze začátku bude výchylka růst přibližně lineárně:

Todo. obrazek

Jenže pak $x > 0$, takže $x'' = -x < 0$, takže závaží začne zpomalovat.

Pořád je $x > 0$, takže rychlost se pořád zmenšuje a někdy musí dosáhnout hodnoty 0. Tedy $\exists t^* > 0: x'(t^*) = 0$.

Jenže pořád je $x > 0$, takže rychlost získá záporné znaménko. Závaží se vrací k rovnovážné poloze.

Závaží se vrátí do rovnovážné polohy, tedy $\exists t^{**} > t^*: x(t^{**}) = 0$.

Situace v čase t^{**} je podobná jako v čase 0, jen rychlost míří opačným směrem, uděláme proto oblouček opačným směrem. V nějakém čase $t^{***} > t^{**}$ se vrátíme do rovnovážné polohy $x(t^{***}) = 0$.

Níže si dokážeme, že naše kvalitativní analýza je správně. Mimo jiné i zjistíme, že $t^* = 2t^*$, $x(t^*) = 1$, $x'(t^{**}) = -x'(0)$, $x(t + 2t^{**}) = x(t)$, ..., což zatím nejde vidět. Z toho pak plyne, že při druhém návratu do rovnovážné polohy v čase t^{***} se začne závaží pohybovat stejně, jak v čase 0. Děj je tedy periodický s periodou t^{***} , a navíc $t^{***} = 2t^{**}$. Číslo t^{**} už dobře znáte – je to *Ludolfovo číslo* π . ┘

Úloha 4.6. Najděte řešení úlohy

$$\begin{array}{l} x''(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{array}$$

┘

Věta 4.7 (Vlastnosti $\sin$, $\cos$).

- (i) $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$
- (ii) $(\sin(t))' = \cos(t)$, $(\cos(t))' = -\sin(t)$, tedy obě funkce mají derivace všech řádů

- (iii) $\sin(t + s) = \sin(t) \cos(s) + \cos(t) \sin(s)$
 $\cos(t + s) = \cos(t) \cos(s) - \sin(t) \sin(s)$
- (iv) $\sin(-t) = -\sin(t)$, $\cos(-t) = \cos(t)$
- (v) $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$
- (vi) $\forall t \in \mathbb{R}: -1 \leq \sin(t) \leq 1, -1 \leq \cos(t) \leq 1$
- (vii) $\exists$ číslo $\pi > 0$ takové, že $\sin$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,
 $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\sin(\pi) = 0$, $\sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$, $\sin(2\pi) = 0$
 $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$, $\cos(\pi) = -1$, $\cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$, $\cos(2\pi) = 1$

Todo. zarovnat, prejmenovat x,y,x,y -> x,y,z,w

- (viii) $\sin, \cos$ jsou periodické funkce s periodou 2π .

Důkaz. Bod (i) plyne z definice. Dokažme bod (ii). Označme $x(t) := \sin(t)$, $y(t) := (\sin(t))'$. Pak platí

$$\begin{array}{lll} x''(t) + x(t) = 0 & x'''(t) + x'(t) = 0 & y''(t) + y(t) = 0 \\ x(0) = 0 & \implies x'(0) = 1 & \implies y(0) = 1 \\ x'(0) = 1 & x''(0) = -x(0) = 0 & y'(0) = 0 \end{array}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $(\sin(t))' = \cos(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Dokažme bod (iii). Označme $x(t) := \sin(t + s)$. Znamená to, že sledujeme pořád to stejné kmitání, ale zapli jsme stopky v čase s . Za čas s se sice změnila poloha a rychlost, ale pořád sledujeme to stejné kmitání, takže bude popsáno kombinací funkcí $\sin$ a $\cos$ stejně, jako v úloze 4.6. V matematických symbolech: $x(t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(t + s))' = \cos(t + s), \\ x''(t) &= (\cos(t + s))' = -\sin(t + s) = -x(t), \end{aligned}$$

takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= \sin(s) \\ x'(0) &= \cos(s). \end{aligned}$$

Stejnou úlohu řeší i $y(t) := \sin(t) \cos(s) + \sin(s) \cos(t)$, z Picard-Lindelöfovy věty tedy $x(t) = y(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Ukažme bod (iv). Funkce $x(t) = \sin(-t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(-t))' = -\cos(-t) \\ x''(t) &= (-\cos(-t))' = -\sin(-t) = -x(t) \end{aligned}$$

↴

↳ takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\x(0) &= 0 \\x'(0) &= -1.\end{aligned}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $x(t) = -\sin(t)$. Podobně $\cos(t) = \cos(-t)$.

Bod (v) plyne z bodů (iii), (iv):

$$1 = \cos(t - t) = \cos(t) \cos(-t) - \sin(t) \sin(-t) = \cos^2(t) + \sin^2(t)$$

Bod (vi) plyne z bodu (v).

Dokažme body (vii) a (viii). Protože $\sin'(0) = 1$ a $\sin'(t) = \cos(t)$ je spojitá, platí

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \sin'(t) = 1 &\Rightarrow \exists \delta > 0 \forall t \in (-\delta, \delta): \sin'(t) > 0 \\&\Rightarrow \exists \delta > 0: \sin \text{ je rostoucí na } (-\delta, \delta)\end{aligned}$$

Možná je $\sin(t)$ rostoucí na větším intervalu, než $(-\delta, \delta)$. Necht (a, b) je největší interval takový, že $0 \in (a, b)$ a $\sin(t)$ je rostoucí na (a, b) . Protože $\sin(t)$ je lichá funkce, musí platit $a = -b$ (pokud je totiž lichá funkce rostoucí na $(0, b)$, je rostoucí i na $(-b, 0)$, a pokud je rostoucí na $(a, 0)$, je rostoucí i na $(0, -a)$). Označme $\pi := 2b$. Tedy

$$\begin{aligned}\sin(t) \text{ je rostoucí na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0: \sin(t) \text{ není rostoucí na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right) \\ \Rightarrow \cos(t) > 0 \text{ na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0: \cos(t) \leq 0 \text{ na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right).\end{aligned}$$

Ze spojitosti $\cos(t)$ dostáváme $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. Skutečně, pokud by $\cos(\frac{\pi}{2}) < 0$, musel by mít $\cos(t)$ „skok“ z $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, kde je kladný, na zápornou hodnotu v $\frac{\pi}{2}$. Z podobného důvodu nemůže být $\cos(\frac{\pi}{2}) > 0$. Teď využijeme bod (v):

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + \underbrace{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=0} = 1 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pm 1$$

a protože $\sin$ je na $(0, \frac{\pi}{2})$ rostoucí, platí $\sin(\frac{\pi}{2}) > \sin(0) = 0$, takže $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. Nyní ze součtových vzorců postupně odvodíme

$$\begin{aligned}\sin(\pi) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \\ \cos(\pi) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 \\ \sin(2\pi) &= \sin(\pi + \pi) = \sin(\pi) \cos(\pi) + \cos(\pi) \sin(\pi) = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = 0 \\ \cos(2\pi) &= \cos(\pi + \pi) = \cos(\pi) \cos(\pi) - \sin(\pi) \sin(\pi) = (-1) \cdot (-1) - 0 \cdot 0 = 1, \\ \sin(t + 2\pi) &= \sin(t) \cos(2\pi) + \cos(t) \sin(2\pi) = \sin(t) \cdot 1 + \cos(t) \cdot 0 = \sin(t) \\ \cos(t + 2\pi) &= \cos(t) \cos(2\pi) - \sin(t) \sin(2\pi) = \cos(t) \cdot 1 - \sin(t) \cdot 0 = \cos(t)\end{aligned}$$

Důkaz je hotov. □

4.3 Komplexní exponenciála

Zkusme rovnici $x'' + x = 0$ řešit způsobem stejným jako v sekci 3.3, ansatzem $e^{\lambda t}$:

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\ \lambda^2 e^{\lambda t} + e^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda^2 + 1 &= 0.\end{aligned}$$

Pokud bychom pokračovali čistě formálně, dostali bychom

$$\begin{aligned}\lambda &= \pm i \\ \Rightarrow x(t) &= C_1 e^{it} + C_2 e^{-it}.\end{aligned}$$

Jenže zároveň víme, že řešení dané rovnice má jít napsat ve tvaru $D_1 \sin(t) + D_2 \cos(t)$. Čili musí existovat nějaký přepočít mezi $\{\sin(t), \cos(t)\}$ a $\{e^{it}, e^{-it}\}$. Pokud by pravidla pro derivování reálných funkcí splňovala i e^{it} , musí platit $(e^{it})' = ie^{it}$. Tedy e^{it} řeší úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= e^{i \cdot 0} = 1 \\ x'(0) &= ie^{i \cdot 0} = i\end{aligned}$$

a tudíž $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$. Tomuto vzorci se říká *Eulerova identita*, a konkrétně dosazením $t = \pi$ z něj plyne zvláštní rovnost

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

která kombinuje nejdůležitějších pět čísel v matematice: $0, 1, i, \pi, e$. My si tedy definujeme e^{it} jako $\cos(t) + i \sin(t)$, a tím ospravedlníme výše provedené výpočty.

Definice 4.8 (Komplexní exponenciála). Definujeme pro komplexní číslo $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$

$$e^z = e^{a+bi} := e^a(\cos(b) + i \sin(b)).$$

Věta 4.9 (Vlastnosti komplexní exponenciály).

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}: (e^{tz})' = ze^{tz}$ (derivujeme podle t)
- (ii) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$
- (iii) $\forall t \in \mathbb{R}: |e^{it}| = 1$, kde $|\bullet|$ značí velikost komplexního čísla

Důkaz. Cvičení. Rozepište si z, z_1, z_2 do tvaru $a+bi$, $a, b \in \mathbb{R}$ a derivujte/násobte. $\square$

Úloha 4.10. Vyjádřete $\sin(t)$, $\cos(t)$ pomocí e^{it} , e^{-it} . ┘

Úloha 4.11. Pomocí komplexní exponenciály řešte úlohy

$$\begin{array}{ll} mx''(t) + kx(t) = 0 & mx''(t) + kx(t) = 0 \\ x(0) = 0 & x(0) = x_0 \quad (\text{B}) \\ x'(0) = v_0 & x'(0) = 0 \end{array} \quad (\text{A})$$

jakou periodu mají řešení? ┘

Úloha 4.12. Jak bychom definovali a^z , $a > 0, z \in \mathbb{C}$? Vyjádřete 2^i pomocí již známých funkcí. ┘

4.4 Kruhový pohyb

Pojďme si vyjasnit, jak kmitající pružiny souvisí s jednotkovou kružnicí a pravoúhlými trojúhelníky.

Předpokládejme, že se pohybujeme v rovině a naše trajektorie je parametricky daná vektorem

$$\vec{r}(t) := \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

Po jaké křivce se to pohybujeme? Velikost vektoru, tj. našet vzdálenost od $(0, 0)$, je

$$|\vec{r}(t)| = \sqrt{[R \cos(\omega t)]^2 + [R \sin(\omega t)]^2} = R,$$

takže se pohybujeme po kružnici se středem $(0, 0)$ a poloměrem R . Jak rychle se pohybujeme? Naše poloha je vektor, takže rychlost je také vektor. Vektor derivujeme tak, že zderivujeme jeho složky.

Definice 4.13 (Derivace vektorové funkce). Derivaci vektorové funkce $\vec{r}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (nebo $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$) definujeme takto:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}, \quad (\text{analogicky ve 3D})$$

Velikost vektoru rychlosti je

$$v = |\vec{r}'(t)| = \left| \begin{pmatrix} (R \cos(\omega t))' \\ (R \sin(\omega t))' \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \right| = R\omega.$$

Pohybujeme se tedy po kružnici konstantní rychlostí. Za daný časový úsek Δt tudíž urazíme vzdálenost $v \cdot \Delta t$. Z toho za prvé plyne, že obvod kružnice je

$$o = v \cdot T = R\omega \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi R$$

a za druhé, že délka oblouku mezi body $(1, 0)$ a $(R \cos(\omega t), \sin(R\omega t))$ je

$$l = v \cdot t = R \cdot \omega t$$

Dále uvažujme jednotkovou kružnici: $R = 1$. Protože délka oblouku l je úměrná úhlu θ , který svírá polopřímka procházející body $(0, 0)$, $(\cos(t), \sin(t))$ s kladnou poloosou x , máme

$$\exists C > 0: \omega t = l = C \cdot \theta \quad (4.14)$$

kde konstanta úměrnosti C závisí na tom, jakou používáme jednotku úhlu. Protože pohyb je periodický, v čase $t = T$ se vrátíme na začátek a tudíž obejdeme plný úhel. Dostáváme

$$\begin{aligned} \omega T &= C \cdot (\text{plný úhel}) \\ \Rightarrow 2\pi &= C \cdot (\text{plný úhel}). \end{aligned} \quad (4.15)$$

Pracujme tedy v jednotkách úhlu, kde plný úhel je 2π . Takovou jednotku nazveme *radián*. Pro radián z 4.15 plyne $C = 1$, takže dostáváme z rovnosti 4.14 vztah $\theta = \omega t$. Dokázali jsme

Věta 4.16 (Ekvivalence definic $\sin$, $\cos$ pomocí diferenciálních rovnic a pomocí jednotkové kružnice). Bod $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ v rovině je bod na jednotkové kružnici ležící na polopřímce, která svírá s kladnou poloosou x úhel θ v radiánech.

Poznámka 4.17.

- (i) Můžete si ke kružnici domyslet pravoúhlý trojúhelník, který dá klasické definice

$$\cos(\theta) = \frac{\text{přilehlá}}{\text{přepona}}, \quad \sin(\theta) = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}}$$

- (ii) Od teď budeme pracovat s úhly jen v radiánech. Důvod je ten, že v jiných jednotkách úhlu se ošklivě derivují naše oblíbené funkce $\sin(x)$, $\cos(x)$:

$$\begin{aligned} \sin(x^\circ) &= \sin\left(\frac{2\pi}{360} x\right) \\ \Rightarrow (\sin(x^\circ))' &= \left(\sin\left(\frac{2\pi}{360} x\right)\right)' = \frac{2\pi}{360} \cos\left(\frac{2\pi}{360}\right) = \frac{2\pi}{360} \cos(x^\circ) \end{aligned}$$

- (iii) Pro kruhový pohyb tedy úhel splňuje $\theta(t) = \omega t$, což je v analogii s rovnoměrným přímočarým pohybem $x(t) = vt$. Pro obecný pohyb na kružnici tedy definujeme

$$\omega(t) := \theta'(t) = \frac{d\theta}{dt}$$

a funkci $\omega(t)$ říkáme *úhlová rychlost*.

↴

Úloha 4.18. Ukažte, že funkce $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ tak, že ji zderivujete.

Definice 4.19 ($\arctan$). Funkce $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ je definovaná jako inverzní k funkci $\tan: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$.

Úloha 4.20. Nakreslete si pravoúhlý trojúhelník, kde jeden úhel je $\theta = \arctan(t)$, k němu přilehlá strana 1, a tudíž protilehlá t . Spočítejte

$$\sin(\arctan(t)) = \sin(\theta) = ?$$

$$\cos(\arctan(t)) = \cos(\theta) = ?$$

Tyto vzorečky hned využijeme.

Úloha 4.21. Jakou periodu T má řešení úlohy

$$x''(t) + \omega^2 x(t) = 0$$

$$x(0) = x_0$$

$$x'(0) = v_0 ?$$

Spočtěte amplitudu $A := \max_{t \in [0, T]} x(t)$. (Hint: $\max_{t \in [0, T]} x(t) = x(t^*)$, kde $x'(t^*) = 0$.) Využijte vzorečky pro $\sin(\arctan(t))$, $\cos(\arctan(t))$. Najděte úhel φ_0 takový, že

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

4.5 Tlumený oscilátor

Když vychýlíme skutečnou pružinu, nebude kmitat donekonečna. Proti pohybu totiž působí třecí síla, která způsobí, že se amplituda zmenšuje. Neexistuje obecný vzorec, který by ve všech situacích uměl popsat chování třecích sil. V jistém režimu (vzduch není moc rychlý, nevíří se) se dá uvažovat matematický model

$$F_{\text{třecí}} = -cx'$$

Druhý Newtonův zákon pak říká

$$mx''(t) = -kx(t) - cx'(t)$$

$$x''(t) + \frac{c}{m} x'(t) + \frac{k}{m} x(t) = 0$$

$$x''(t) + 2\zeta\omega_0 x'(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

kde jsme zavedli

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{přirozená úhlová rychlost}), \quad \zeta := \frac{c}{2m\omega_0} \quad (\text{poměrné tlumení})$$

Pojďme tuto rovnici vyřešit. Ansatz $e^{\lambda t}$ vede na

$$\begin{aligned} \lambda^2 + 2\zeta\omega_0\lambda + \omega_0^2 &= 0 \\ \lambda &= (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0 \end{aligned}$$

(A) *případ* $\zeta = 0$ je harmonický oscilátor s úhlovou rychlostí ω_0 .

(B) *případ* $\zeta \in (0, 1)$:

$$\begin{aligned} \lambda &= (-\zeta \pm \sqrt{1 - \zeta^2}i)\omega_0 \\ \Rightarrow x(t) &= C_1 e^{(-\zeta + \sqrt{1 - \zeta^2}i)\omega_0 t} + C_2 e^{(-\zeta - \sqrt{1 - \zeta^2}i)\omega_0 t} \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} (C_1 e^{\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 it} + C_2 e^{-\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 it}) \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} \left[i(C_1 - C_2) \sin(\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 t) + (C_1 + C_2) \cos(\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 t) \right] \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} [D_1 \sin(\omega t) + D_2 \cos(\omega t)] = e^{-\zeta\omega_0 t} A \sin(\omega t + \varphi_0), \end{aligned}$$

kde jsme zavedli

$$\begin{aligned} D_1 &:= i(C_1 - C_2), \quad D_2 := (C_1 + C_2), \quad \omega := \sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0, \\ &\text{a konstanty } A > 0, \varphi_0, \text{ které jdou spočítat stejně jako v úloze 4.21.} \end{aligned}$$

Řešení osciluje mezi kladnými a zápornými hodnotami, ale v absolutní hodnotě klesá:

$$|x(t)| \leq e^{-\zeta\omega_0 t} A \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

Z Úlohy 3.19 plyne, že $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$.

(C) *případ* $\zeta = 1$: rovnice má dvojitý kořen $\lambda = -\omega_0$, takže řešení bude tvaru

$$x(t) = C_1 e^{-\omega_0 t} + C_2 t e^{-\omega_0 t}$$

Z Věty 3.21 máme $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} = 0$, takže $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ pro případ $\zeta = 1$.

(D) *případ* $\zeta \in (1, \infty)$:

$$\lambda = (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0$$

protože $\sqrt{\zeta^2 - 1} < \zeta$, dostáváme, že oba kořeny rovnice jsou záporné. Tedy

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

(E) *případ* $\zeta \in (-1, 0)$: Výpočet je stejný jako v případě $\zeta \in (-1, 0)$:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Jenže $\zeta < 0$, takže oscilace $x(t)$ se bude časem zvětšovat: v časech $t_k = \frac{2k\pi}{\omega} - \varphi_0$ platí

$$x(t_k) = \left(e^{-\frac{2\pi\zeta\omega_0}{\omega}}\right)^k e^{\zeta\omega_0\varphi_0} A \sin(2\pi) = B \cdot C^k, \quad B > 0, \quad C > 1$$

a tato posloupnost čísel roste nade všechny meze.

- (F) *případ* $\zeta = -1$: Pracujeme s funkcemi $e^{\omega_0 t}$, $t e^{\omega_0 t}$, obě z nichž mají $\lim_{t \rightarrow \infty} = \infty$. Tedy v závislosti na počátečních podmínkách půjde řešení do $+\infty$ nebo $-\infty$.
- (G) *případ* $\zeta \in (-\infty, -1)$ vyjde stejně jako případ $\zeta = -1$, akorát se tam pracuje s funkcemi $e^{\lambda_1 t}$, $e^{\lambda_2 t}$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.

Vidíme, že pro $\zeta < 0$ se systém chová nefyzikálně. Tento případ totiž odpovídá $c < 0$, což by znamenalo, že síla $F_{\text{třecí}} = -cx'$ míří na stejný směr jako rychlost, tj. hmotný bod neustále zrychluje. Proto se neustále zvětšuje amplituda.

Dále tudíž budeme uvažovat $\zeta \geq 0$. Máme čtyři režimy:

- (1) $\zeta = 0$ je netlumený oscilátor s úhlovou rychlostí $\omega = \omega_0$

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

- (2) $\zeta \in (0, 1)$ je podkriticky tlumený oscilátor s $\omega = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0 < \omega_0$

$$x(t) = A e^{-\zeta\omega_0 t} \sin(\omega t + \varphi_0)$$

- (3) $\zeta = 1$ je kriticky tlumený oscilátor, který nekmitá

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_0 t}$$

- (4) $\zeta \in (1, \infty)$ je nadkriticky tlumený oscilátor, který taktéž nekmitá.

$$x(t) = C_1 e^{-\lambda_1 t} + C_2 e^{-\lambda_2 t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0.$$

Todo. příklady z praxe, dvere, RLC obvod

Pohyby planet

*Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
pan Kepler rozepsal nebeské zákony,
hledal, až našel v hvězdářských triedrech
tajemství, která teď neseme na bedrech.*

– Jaromír Nohavica

V této kapitole si dokážeme, že planety obíhají Slunce po elipsách. V úloze bude hrát roli více proměnných závislých na čase, setkáme se tak s první soustavou diferenciálních rovnic.

5.1 Kuželosečky

Nakonec budeme počítat, že se těleso v centrálním gravitačním poli pohybuje po kuželosečkách. Na to si prvně musíme definovat, co jsou kuželosečky, a naučit se s nimi pracovat v polárních souřadnicích.

Definice 5.1 (Elipsa, hyperbola, parabola).

(i) Elipsa je množina bodů X v rovině, které splňují

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a$$

pro nějaké body F_1, F_2 a číslo $a > 0$. Body F_1, F_2 nazýváme *ohniska* a a nazýváme *hlavní poloosa*.

(ii) Hyperbola je množina bodů X v rovině, které splňují

$$||XF_1| - |XF_2|| = 2a$$

pro nějaké body F_1, F_2 a číslo $a > 0$ (terminologie stejná jako pro elipsu).

(iii) Parabola je množina bodů X v rovině splňující

$$|XF| = |Xd|$$

pro nějaký bod F a přímku d . F nazýváme ohnisko, d řídící přímka.

Níže si odvodíme rovnici elipsy a hyperboly. Zvolme souřadnou soustavu tak, že $F_1 = (-e, 0)$, $F_2 = (e, 0)$, kde $2e = |F_1F_2|$. Pak pro bod $X = (x, y)$ na

elipse/hyperbole platí ($\pm$ je pro elipsu $+$ a pro hyperbolu $-$)

$$\begin{aligned}
 \sqrt{(x+e)^2 + y^2} \pm \sqrt{(x-e)^2 + y^2} &= 2a \\
 2x^2 + 2e^2 + 2y^2 \pm 2\sqrt{(x+e)^2 + y^2}\sqrt{(x-e)^2 + y^2} &= 4a^2 \\
 \pm \sqrt{(x+e)^2 + y^2}\sqrt{(x-e)^2 + y^2} &= 2a^2 - x^2 - e^2 - y^2 \\
 [(x+e)^2 + y^2][(x-e)^2 + y^2] &= [2a^2 - x^2 - e^2 - y^2]^2 \\
 &\vdots \\
 a^2x^2 + a^2y^2 - x^2e^2 &= a^4 - a^2e^2 \\
 \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - e^2} &= 1
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

Jaký je mezi elipsou a hyperbolou rozdíl? Pro elipsu je $e < a$. Označme $(0, b)$ bod na kladné poloose y procházející elipsou. Z 5.2 plyne

$$\frac{0^2}{a^2} + \frac{b^2}{a^2 - e^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad b = \sqrt{a^2 - e^2}$$

a rovnice elipsy se přepíše na

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Číslu b říkáme *vedlejší poloosa*.

Todo. obrazek a,b,e

Pro hyperbolu ale platí $e > a$, takže žádný bod $(0, b)$ tam ležet nemůže. Rovnici 5.2 je tedy vhodné přepsat na

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{e^2 - a^2} = 1$$

a definovat $b := \sqrt{e^2 - a^2}$, takže

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{5.3}$$

Všimněme si, že pro x, y velké můžeme psát

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \approx 0 \quad \Rightarrow \quad y \approx \frac{b}{a}x \quad \text{nebo} \quad y \approx -\frac{b}{a}x$$

Význam parametru b pro hyperbolu je tedy, že kontroluje směrnici tečen v nekonečnu („asymptot“).

Úloha 5.4. Z rovnice 5.3 vyjádřete $y = y(x)$ ($y > 0$) a spočítejte $\lim_{x \rightarrow \infty} y'(x)$. $\perp$

Pojďme spočítat rovnici paraboly. Nechť d je přímka $y = 0$, $F = (0, p)$, $X = (x, y)$:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x^2 + (y-p)^2} &= y \\
 x^2 + y^2 - 2yp + p^2 &= y^2 \\
 x^2 &= 2yp - p^2 \\
 y &= \frac{x^2}{2p} + \frac{p}{2}
 \end{aligned} \tag{5.5}$$

Nazvěme *vrchol paraboly* bod, ve kterém parabola prochází kladnou poloosou y . Z 5.5 plyne $V = (0, \frac{p}{2})$. Ukázali jsme

Věta 5.6 (Rovnice kuželoseček). Pro každou kuželosečku existuje kartézská soustava souřadnic (x, y) , ve které se dá kuželosečka vyjádřit rovnicí

(1) Elipsa

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(2) Hyperbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(3) Parabola

$$y = \frac{x^2}{2p} + \frac{p}{2}$$

Úloha 5.7. Kde je řídicí přímka paraboly $y = x^2$? ┘

Úloha 5.8. Jaká kuželosečka je daná rovnicí $y = \frac{1}{x}$? Proveďte změnu souřadnic

$$\bar{x} := \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad \bar{y} := \frac{-x+y}{\sqrt{2}}$$

a vyjádřete rovnici v nových souřadnicích. ┘

Úloha 5.9. Řešte úlohy

$$x''(t) - x(t) = 0$$

$$x(0) = 0 \quad (\text{A})$$

$$x'(0) = 1$$

$$x''(t) - x(t) = 0$$

$$x(0) = 1 \quad (\text{B})$$

$$x'(0) = 0$$

Řešení úlohy (A) nazvěte $\sinh(t)$, řešení úlohy (B) nazvěte $\cosh(t)$. Dokažte

(i) $\sinh(0) = 0, \cosh(0) = 1$

(ii) $(\sinh(t))' = \cosh(t), (\cosh(t))' = \sinh(t)$

(iii) $\sinh(-t) = -\sinh(t), \cosh(-t) = \cosh(t)$

(iv) $\cosh^2(t) - \sinh^2(t) = 1$

Tudíž body $(\cos(t), \sin(t))$ obíhají jednotkovou kružnici $x^2 + y^2 = 1$, zatímco body $(\cosh(t), \sinh(t))$ obíhají (jednu větev) *jednotkové hyperboly* $x^2 - y^2 = 1$. Proto se funkcím říká *hyperbolický sinus* a *hyperbolický kosinus*. ┘

5.2 Polární souřadnice

Dále budeme kromě kartézských souřadnic (x, y) pracovat v polárních souřadnicích (r, φ) , kde r značí vzdálenost bodu $X = (x, y)$ od $\mathcal{O} = (0, 0)$ a φ značí úhel mezi kladnou poloosou x a polopřímkou $\mathcal{O}X$. Platí

$$\begin{aligned} x &= r \cos(\varphi) & r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ y &= r \sin(\varphi) & \tan(\varphi) &= \frac{y}{x} \\ x, y &\in \mathbb{R} & r &> 0, \varphi \in [0, 2\pi) \end{aligned}$$

Úloha 5.10. Najděte rovnici kružnice se středem v $(0, 0)$ v polárních souřadnicích. $\lrcorner$

Úloha 5.11. Co za útvar je rovnice $r = \varphi$? $\lrcorner$

Příklad 5.12. Najděme rovnici elipsy s ohnisky $F_1 = (0, 0)$, $F_2 = (2e, 0)$ a hlavní poloosou a , tj. vyjádřeme $r = r(\varphi)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \frac{(x - e)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{(r \cos(\varphi) - e)^2}{a^2} + \frac{r^2 \sin^2(\varphi)}{b^2} &= 1 \quad | \cdot a^2 b^2 \\ (r^2 \cos^2(\varphi) + 2er \cos(\varphi) + e^2)b^2 + r^2 \sin^2(\varphi)a^2 &= a^2 b^2 \\ r^2(b^2 \cos^2(\varphi) + a^2 \sin^2(\varphi)) + r(2eb^2 \cos(\varphi)) + (e^2 b^2 - a^2 b^2) &= 0 \\ r^2(b^2 + e^2 \sin^2(\varphi)) + r(2eb^2 \cos(\varphi)) - b^4 &= 0 \end{aligned}$$

Řešení této kvadratické rovnice je

$$\begin{aligned} r(\varphi) &= \frac{-2b^2 e \cos(\varphi) \pm \sqrt{4b^4 e^2 \cos^2(\varphi) + 4b^4(b^2 + e^2 \sin^2(\varphi))}}{2(b^2 + e^2 \sin^2(\varphi))} \\ &= \frac{2b^2 \left[-e \cos(\varphi) \pm \sqrt{e^2 \cos^2(\varphi) + b^2 + e^2 \sin^2(\varphi)} \right]}{2(a^2 - e^2 \cos^2(\varphi))} \\ &= \frac{2b^2 [-e \cos(\varphi) \pm a]}{2(a^2 - e^2 \cos^2(\varphi))} = \frac{b^2(a - e \cos(\varphi))}{a^2 - e^2 \cos^2(\varphi)} = \frac{b^2}{a + e \cos(\varphi)} \\ &= \frac{\frac{b^2}{a}}{1 + \frac{e}{a} \cos(\varphi)} = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos(\varphi)}, \quad \varepsilon := \frac{e}{a} \in (0, 1), \quad p := \frac{b^2}{a} \end{aligned} \quad (5.13)$$

kde jsme z $\pm$ vybrali $+$ tak, aby $r > 0$. $\lrcorner$

Můžete si spočítat, že pro hyperbolu vyjde formálně stejný vzoreček, ale tam $\varepsilon = \frac{e}{a} \in (1, \infty)$. To znamená, že jmenovatel může být nulový nebo záporný, což

neodpovídá tomu, že $r > 0$. Takže vyžadujeme

$$1 + \varepsilon \cos(\varphi) > 0 \Rightarrow \cos(\varphi) > \frac{-1}{\varepsilon}$$

Definujme funkci $\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ jako inverzní k $\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$. Pak problematický úhel je $\varphi_\infty := \arccos\left(\frac{-1}{\varepsilon}\right)$ a my chceme brát jen úhly

$$\varphi \in (\varphi_\infty - \pi, \varphi_\infty).$$

Příklad 5.14. Najděme rovnici paraboly s $F = (0, 0)$ a řídicí přímkou $y = -p$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (y + p) &= \frac{x^2}{2p} + \frac{p}{2} \\ (r \sin(\varphi) + p) &= \frac{r^2 \cos^2(\varphi)}{2p} + \frac{p}{2} \\ -r^2 \frac{\cos^2(\varphi)}{2p} + r \sin(\varphi) + \frac{p}{2} &= 0 \\ r &= \frac{-\sin(\varphi) \pm \sqrt{\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi)}}{-2 \frac{\cos^2(\varphi)}{2p}} = p \frac{-\sin(\varphi) + 1}{\cos^2(\varphi)} \\ &= p \frac{(-\sin(\varphi) + 1)(1 + \sin(\varphi))}{\cos^2(\varphi)(1 + \sin(\varphi))} = \frac{p}{1 + \sin(\varphi)} \end{aligned}$$

┘

Ukázali jsme

Věta 5.15 (Rovnice kuželoseček v polárních souřadnicích). Kuželosečky lze vyjádřit v polárních souřadnicích rovnicí

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos(\varphi)}$$

s parametry

(1) Elipsa

$$\varphi \in [0, 2\pi), \quad p := \frac{b^2}{a}, \quad \varepsilon := \frac{e}{a} \in (0, 1)$$

(2) Hyperbola

$$\varphi \in (\varphi_\infty - \pi, \varphi_\infty), \quad p := \frac{b^2}{a}, \quad \varepsilon := \frac{e}{a} \in (1, \infty)$$

(3) Parabola

$$\varphi \in (0, 2\pi), \quad \varepsilon = 1$$

5.3 Newtonův gravitační zákon

Mějme těleso A o hmotnosti M v bodě $\vec{r}_1$ a těleso B o hmotnosti m v bodě $\vec{r}_2$. Pak těleso A působí na B *gravitační silou*

$$\vec{F}_{\text{grav}} = -\frac{mMG}{|\vec{r}|^3} \vec{r},$$

kde $\vec{r} := \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ a $G = 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$ je *univerzální gravitační konstanta*.

Podle 2. Newtonova zákona je trajektorie $\vec{r}_1(t)$ tělesa B řešením rovnice

$$m\vec{r}_1''(t) = -\frac{mMG}{|\vec{r}(t)|^3} \vec{r}(t)$$

Problém s touto rovnicí je, že v ní vystupuje $\vec{r}_2$ (schované v $\vec{r}$). Tedy zároveň musíme vyřešit rovnici

$$M\vec{r}_2''(t) = -\frac{mMG}{|\vec{r}(t)|^3} (-\vec{r}(t))$$

(znaménko $-$ je u $\vec{r}$ protože se prohodily role těles). Jenže tato rovnice má stejný problém, zase v ní vystupuje $\vec{r}_1$. Tedy musíme řešit obě rovnice najednou:

Todo. fix stupid ”

$$m\vec{r}_1''(t) = -\frac{mMG}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t))$$

$$M\vec{r}_2''(t) = \frac{mMG}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t))$$

Když rozepíšeme vektory do $\vec{r}_1(t) = (x_1(t), y_1(t), z_1(t))$, $\vec{r}_2(t) = (x_2(t), y_2(t), z_2(t))$, dostaneme *soustavu 6 diferenciálních rovnic pro 6 neznámých funkcí*

$$mx_1'' = -\frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (x_1 - x_2)$$

$$my_1'' = -\frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (y_1 - y_2)$$

$$mz_1'' = -\frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (z_1 - z_2)$$

$$Mx_2'' = \frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (x_1 - x_2)$$

$$My_2'' = \frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (y_1 - y_2)$$

$$Mz_2'' = \frac{mMG}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{\frac{3}{2}}} (z_1 - z_2).$$

Abychom mohli pokračovat dál, uděláme zjednodušující předpoklad:

Těleso A je o mnohem těžší než B, takže jeho zrychlení je zanedbatelné.

Pak můžeme najít vztažnou soustavu takovou, že $x_2(t) = y_2(t) = z_2(t) = 0$, a zbude soustava 3 diferenciálních rovnic

$$\begin{aligned}x_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} x_1 \\y_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} y_1 \\z_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} z_1\end{aligned}$$

spolu s počátečními podmínkami

$$\begin{aligned}x_1(0) &= x_0 & y_1(0) &= y_0 & z_1(0) &= z_0 \\x_1'(0) &= v_{0x} & y_1'(0) &= v_{0y} & z_1'(0) &= v_{0z}.\end{aligned}$$

Vektory $\vec{r}_1(0), \vec{r}_1'(0)$ jsou dva vektory v třírozměrném prostoru, proto k nim lze vždy nalézt vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ takový, že $\vec{r}_1(0) \perp \vec{a}$ a $\vec{r}_1'(0) \perp \vec{a}$. Natočme souřadnou soustavu tak, aby osa z mířila ve směru vektoru $\vec{a}$. Pak platí $z_1(0) = z_1'(0) = 0$, takže $z_1(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}z_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2 + y_1^2 + z_1^2]^{\frac{3}{2}}} z_1 \\z_1(0) &= 0 \\z_1'(0) &= 0\end{aligned}$$

a tudíž z Picard-Lindelöfovy věty $\forall t \in [0, \infty): z_1(t) = 0$. Úlohu jsme zredukovali na soustavu 2 diferenciálních rovnic (nebudeme psát indexy 1, tj $x := x_1, y := y_1$):

$$\begin{aligned}x''(t) &= -\frac{MG}{[x^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}} x \\y''(t) &= -\frac{MG}{[x^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}} y\end{aligned}$$

Všimněme si už teď, že pokud $x^2 + y^2 = a^2 = \text{konst.}$, dostáváme rovnici harmonického oscilátoru s frekvencí $\omega_0^2 = \frac{MG}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{MG}{a^3}$, jejíž řešení jsou sin a cos, které opravdu obíhají kružnici. Pro takové řešení platí 3. Keplerův zákon

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \omega_0^2 = \frac{MG}{a^3} \quad \Rightarrow \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{MG} = \text{univerzální konstanta},$$

ale to předbíháme. Tedy jedno z řešení je pohyb po kružnici s frekvencí $\sqrt{\frac{MG}{a^3}}$. Pojdme najít ta ostatní.

Komplikovaný člen v rovnici je $(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}$. To je, protože používáme špatné souřadnice. Pojďme rovnici přepsat do polárních souřadnic:

$$x(t) = r(t) \cos(\varphi(t))$$

$$y(t) = r(t) \sin(\varphi(t))$$

Zavedeme opět úhlovou rychlost $\omega := \varphi'$:

$$x' = r' \cos(\varphi) - r\omega \sin(\varphi)$$

$$x'' = r'' \cos(\varphi) - 2r'\omega \sin(\varphi) - r\omega' \sin(\varphi) - r\omega^2 \cos(\varphi)$$

$$y' = r' \sin(\varphi) + r\omega \cos(\varphi)$$

$$y'' = r'' \sin(\varphi) + 2r'\omega \cos(\varphi) + r\omega' \cos(\varphi) - r\omega^2 \sin(\varphi)$$

Tudíž v polárních souřadnicích vypadá naše soustava následovně:

$$r'' \cos(\varphi) - 2r'\omega \sin(\varphi) - r\omega' \sin(\varphi) - r\omega^2 \cos(\varphi) = -\frac{MG}{r^2} \cos(\varphi) \quad (5.16)$$

$$r'' \sin(\varphi) + 2r'\omega \cos(\varphi) + r\omega' \cos(\varphi) - r\omega^2 \sin(\varphi) = -\frac{MG}{r^2} \sin(\varphi) \quad (5.17)$$

Abychom se zbavili sinů a kosinů, násobíme a sčítáme rovnice následovně:

$$\cos(\varphi) \cdot (5.16) + \sin(\varphi) \cdot (5.17) \Rightarrow r'' - r\omega^2 = -\frac{MG}{r^2} \quad (5.18)$$

$$-\sin(\varphi) \cdot (5.16) + \cos(\varphi) \cdot (5.17) \Rightarrow 2r'\omega + r\omega' = 0 \quad (5.19)$$

Z rovnice 5.18 plyne

$$(r^2\omega)' = 2rr'\omega + r^2\omega' = r \underbrace{(2r'\omega + r\omega')}_{\stackrel{5.19}{=} 0} = 0$$

takže $L := r^2\omega$ se zachovává. Tomuto číslu (ve skutečnosti $m \cdot L$) se říká *moment hybnosti*, právě jsme dokázali *zákon zachování momentu hybnosti*.

My nebudeme hledat řešení $r(t), \varphi(t)$, ale jen tvar trajektorie $r(\varphi)$. Tedy další zjednodušení rovnice bude, že z ní *eliminujeme čas*. Zatím jsou derivace podle času, musíme je přepočítat na derivace podle φ :

$$\frac{d}{dt} r(\varphi(t)) = \frac{dr}{d\varphi}(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}(t) \quad \text{nebo zkráceně} \quad \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \omega$$

Rovnou u toho uděláme substituci $U(\varphi) = \frac{1}{r(\varphi)}$.

$$\begin{aligned} \frac{dU}{d\varphi} &= \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2} \frac{\frac{dr}{dt}}{\omega} = -\frac{1}{L} \frac{dr}{dt} \\ \frac{d^2U}{d\varphi^2} &= \frac{d}{d\varphi} \left(\underbrace{-\frac{1}{L} \frac{dr}{dt}}_{= \text{konst.}} \right) = -\frac{1}{L} \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right)}{\frac{d\varphi}{dt}} = -\frac{1}{L\omega} \frac{d^2r}{dt^2}. \end{aligned}$$

Rovnice 5.18 tedy přechází na

$$\begin{aligned} -L\omega \frac{d^2U}{d\varphi^2} - r\omega^2 &= -\frac{MG}{r^2} \\ -L \frac{d^2U}{d\varphi^2} - r^2\omega \frac{1}{r} &= -\frac{MG}{r^2\omega} \\ -L \frac{d^2U}{d\varphi^2} - LU &= -\frac{MG}{L} \\ \frac{d^2U}{d\varphi^2} + U &= \frac{MG}{L^2}. \end{aligned}$$

Toto je rovnice harmonického oscilátoru, až na to, že pravá strana je $\neq 0$. Vyřešíme ji substitucí $U = \frac{MG}{L^2} + u$, což vede na rovnici

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = 0$$

Řešení této rovnice je $u(\varphi) = A \cos(\varphi + \varphi_0)$ pro nějaká $A > 0, \varphi_0$, které jsou určené počátečními podmínkami. Dosadíme zpátky:

$$\begin{aligned} U(\varphi) &= \frac{MG}{L^2} + u(\varphi) = \frac{MG}{L^2} + A \cos(\varphi + \varphi_0) \\ \Rightarrow r(\varphi) &= \frac{1}{\frac{MG}{L^2} + A \cos(\varphi + \varphi_0)} = \frac{\frac{L^2}{MG}}{1 + A \frac{L^2}{MG} \cos(\varphi + \varphi_0)} = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos(\varphi)} \end{aligned}$$

Porovnáním s 5.13 Vidíme, že dráha je kuželosečka s geometrickými parametry

$$p = \frac{L^2}{MG}, \quad \varepsilon = A \frac{L^2}{MG},$$

což je tvrzení prvního Keplerova zákona. Zatímco M, G, L^2 jsou přímo fyzikální parametry, neznáme číslo A . Teoreticky by šlo dopočítat z počátečních podmínek (máme přeci jednoznačnost řešení...) ale moc průhledné by to nebylo. Abychom A vyjádřili z fyzikálně významných veličin, potřebujeme druhý zákon zachování – *zákon zachování mechanické energie*. Definujme mechanickou energii

$$E := \frac{1}{2} \left((r')^2 + \frac{L^2}{r^2} \right) - \frac{MG}{r}$$

a spočítejme, že má nulovou derivaci (podle času):

$$\begin{aligned} E' &= r' r'' - \underbrace{\frac{L^2}{r^3}}_{=\omega^2 r} r' + \frac{MG}{r^2} r' \\ &= r' \left(r'' - \omega^2 r + \frac{MG}{r^2} \right) \stackrel{5.18}{=} 0 \end{aligned}$$

Protože E je konstantní, počítejme ji pro φ co nejjednodušší: $\varphi = 0$:

$$\begin{aligned} r(\varphi) &= \frac{p}{1 + \varepsilon \cos(\varphi)} \\ r'(\varphi) &= \frac{p}{(1 + \varepsilon \cos(\varphi))^2} \sin(\varphi) \\ \Rightarrow r(0) &= \frac{p}{1 + \varepsilon}, \quad r'(0) = 0 \\ \Rightarrow E = E(0) &= \frac{1}{2} \frac{L^2}{\frac{p^2}{(1+\varepsilon)^2}} - \frac{MG}{\frac{p}{1+\varepsilon}} = \frac{M^2 G^2}{L^2} \left[\frac{1}{2} (1 + \varepsilon)^2 - (1 + \varepsilon) \right] = \frac{M^2 G^2}{L^2} \frac{\varepsilon^2 - 1}{2} \\ \Rightarrow \varepsilon &= \sqrt{1 + \frac{2L^2 E}{M^2 G^2}} \end{aligned}$$

Podařilo se nám oba parametry p, ε vyjádřit pomocí fyzikálně významných veličin: M, G, L, E . Zatímco M, G jsou data úlohy a dopředu je známe, L, E jsme museli odvodit ze samotné úlohy a to, že jsou to konstanty, nám umožnilo řešení dopočítat. Těmto veličinám se říká *integrály pohybu* a v pozdějších kapitolách si řekneme, jak je najít. To, že jsme potřebovali (a našli) dva integrály pohybu, souvisí s tím, že řešíme rovnici druhého řádu.

Z parametrů p, ε umíme vyjádřit ostatní parametry a, b, e . Vyjádřeme a pro elipsu:

$$\begin{aligned} b^2 &= ap \\ e^2 &= a^2 \varepsilon^2 \\ \Rightarrow a^2 &= b^2 + e^2 = a^2 \varepsilon^2 + ap \\ \Rightarrow a &= \frac{p}{1 - \varepsilon^2} = \frac{\frac{L^2}{MG}}{-\frac{2L^2 E}{M^2 G^2}} = -\frac{MG}{2E} \end{aligned}$$

Pro hyperbolu vyjde podobně $a = \frac{MG}{2E}$. Umíme dopočítat $e = a\varepsilon$ a $b = \sqrt{a^2 - e^2}$ (elipsa) resp. $\sqrt{e^2 - a^2}$ (hyperbola), tedy umíme dopočítat vše potřebné.

Jaký je význam energie E ?

Pokud $E < 0$, vychází $\varepsilon \in (0, 1)$ a řešení je elipsa. Pro $E = 0$ dostáváme $\varepsilon = 0$, tudíž parabolu, a pro $E > 0$ dostáváme hyperbolu. Elipsa je uzavřený křivkový útvar, tudíž vektor $\vec{r}$ jde omezit nějakou konstantou $|\vec{r}| \leq C$, zatímco parabola a hyperbola nikoliv, pro ně je velikost řešení $|\vec{r}|$ neomezená. S energií tedy souvisí, jestli je řešení omezené nebo nikoliv. V pozdějších kapitolách uvidíme, že to souvisí také se *stabilitou* diferenciálních rovnic.

Jaký je význam momentu hybnosti L ?

Todo. vysvětlit

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \omega = \frac{1}{2} L$$

Tudíž dostáváme, že plocha $S(t)$ je afinní funkcí času. Takže pro dva různé časy $t_1, t_2 > 0, \Delta t > 0$ platí

$$S(t_1 + \Delta t) - S(t_1) = S(t_2 + \Delta t) - S(t_2) = \frac{1}{2} L \Delta t,$$

což je druhý Keplerův zákon. Uvažujme teď případ elipsy. Za celou periodu T vektor $\vec{r}$ oběhne plochu elipsy. V příští kapitole si ukážeme, že plocha elipsy je πab . Tudíž

$$\begin{aligned} S(T) &= \pi ab \\ \frac{1}{2} LT &= \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - \varepsilon^2} \\ \frac{1}{4} L^2 T^2 &= \pi^2 a^4 (1 - \varepsilon^2) = \pi^2 a^4 \frac{-2L^2 E}{M^2 G^2} = \pi^2 a^3 \frac{L^2}{MG} \\ \Rightarrow \frac{T^2}{a^3} &= \frac{4\pi^2}{MG} \end{aligned}$$

Pro planety sluneční soustavy platí $E < 0$. Dokázali jsme tedy

Věta 5.20 (Keplerovy zákony).

- (i) *První Keplerův zákon*: planety obíhají Slunce po elipsách.
- (ii) *Druhý Keplerův zákon*: obsahy ploch opsaných vektorem $\vec{r}$ za stejný čas jsou stejné.
- (iii) *Třetí Keplerův zákon*:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{MG}$$

tedy pro všechny planety je poměr $\frac{T^2}{a^3}$ stejný.

Integrál

Po letech, kdy mi matematika připadala snadná, jsem se konečně dostal k integrálnímu počtu a narazil jsem na překážku. Uvědomil jsem si, že dál už se nedostanu, a dodnes se mi nepodařilo tuto hranici překročit.

– Isaac Asimov

Doteď jsme řešili diferenciální rovnice tak, že jsme řešení buď uhodli, nebo jsme si vymysleli novou funkci a tu jsme nazvali řešením. V příštích třech kapitolách se naučíme, jak (některé) rovnice řešit systematicky. Zkonstruujeme operaci, která umí v diferenciální rovnici „odstranit“ derivaci, a ještě k tomu ukážeme, že pomocí té samé operace jdou počítat obsahy a objemy geometrických útvarů. Této operaci říkáme *integrál*.

6.1 Plocha pod grafem

V kapitole 2 jsme odvodili

$$\begin{aligned}x''(t) = -g &\quad \Rightarrow \quad x'(t) = -gt + x'(0) \\x'(t) = -gt + x'(0) &\quad \Rightarrow \quad x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + x'(0)t + x(0).\end{aligned}$$

Obecně chceme řešit úlohu

$$\begin{aligned}x'(t) &= f(t) \\x(0) &= x_0\end{aligned}$$

6.2 Primitivní funkce

6.3 Plochy a Objemy

6.4 Metoda integračního faktoru

Metoda separace proměnných

8 Geometrická struktura diferenciálních rovnic

„Velký, složitý lineární problém lze vždy rozdělit na menší, lépe zvládnutelné části. Každou část pak lze vyřešit samostatně a všechny dílčí výsledky lze následně zkombinovat, aby se vyřešil celý problém. U lineárního problému se celek přesně rovná součtu jednotlivých částí.“

– Steven H. Strogatz

V této kapitole si ukážeme, že řešení jistého typu diferenciálních rovnic má jednoduchou geometrickou strukturu: strukturu vektorového prostoru.

8.1 Lineární homogenní rovnice

8.2 Lineární nehomogenní rovnice

8.3 Soustavy lineárních rovnic

Numerické řešení diferenciálních rovnic

Neexistuje obecná metoda, jak řešit diferenciální rovnice na papíře. Pokud chceme vyčíslit řešení složitějších rovnic, musíme napsat počítačový program, který řešení spočítá přibližně.

9.1 Explicitní Eulerova metoda

9.2 Aproximace čísla π

10 Mocninné řady

V této kapitole se naučíme sčítat nekonečně mnoho čísel a vyjadřovat funkce jako „nekonečně dlouhé polynomy“. To nám umožní řešit diferenciální rovnice čistě symbolicky. Když nekonečný proces sčítání utneme po dostatečném počtu kroků, dostaneme aproximaci daného řešení, což nám umožní počítat funkce $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\exp(x)$, $\arctan(x)$, ... a tím pádem čísla e , π , $\ln(2)$, $\sqrt{2}$, ... Tuto aproximaci můžeme dosadit do složitějších diferenciálních rovnic a tím získat rovnice jednodušší, s tou nadějí, že zjednodušené rovnice se budou chovat podobně jako rovnice původní. Nakonci kapitoly vyřešíme legendární paradoxy z antického řecka, kterými si filosofové lámali hlavu 2000 let.

WIP 11

Třetí paradox je . . . že letící šíp je v klidu, což vyplývá z předpokladu, že čas se skládá z okamžiků . . . Říká, že pokud je vše, co zabírá pořád stejný prostor, v klidu, a pokud to, co je v pohybu, se vždy nachází v „nyní“, pak je letící šíp nehybný.

– Aristoteles (Fyzika, 239b30)

Za jasného denního světla matematici prověřují své rovnice a důkazy a při hledání matematické přesnosti nenechávají nic náhodě. V noci však, za svitu úplňku, sní, vznášejí se mezi hvězdami a žasnou nad zázrakem nebes. Nacházejí inspiraci. Bez snů není umění, není matematika, není život.

– Michael Atiyah

. . . v budoucnosti se bude umění s technikou tak nějak harmonicky doplňovat – lyrickoepické verše pomohou při chemizaci likvidační praxe – periodická soustava pomůže rozvoji impresionismu – na každém technickém výrobku bude zvláštní ploška, vyhrazená pro účinný estetický vjem – komíny atomových elektráren budou pomalovány našimi nejlepšimi krajináři – dvacet tisíc mil pod mořem budou čítárny přístupné všem – diferenciální rovnice se budou psát ve verších – na střechách cyklotronů budou divadla malých forem – a v nich se budou recitovat diferenciální rovnice – tak nějak lidsky . . .

– Václav Havel, Zahradní slavnost

Stojí před námi hádanka, která lidstvo trápila 2000 let. Antickým filosofům z Eleje se zdál pojem pohybu tak zvláštní, že ho zavrhli a řekli, že žádný pohyb vlastně neexistuje. Zenón Elejský vymyslel několik paradoxů, které měli prokázat logickou nesmyslnost pohybu. Bohužel se nedochovali jeho původní spisy a musíme čerpat z Aristotelova komentáře. Aristoteles mluví o čtyřech paradoxech, přičemž ten čtvrtý je velmi vážný, pojďme si představit první tři.

Paradox 11.1 (První Zenónův paradox: Dichotomie (dělení na poloviny)). Závodíte na Olympijských hrách ve sprintu na 100 m. Abyste uběhli 100 m, musíte uběhnout prvních 50 m. Pak musíte uběhnout dalších 25 m, pak dalších 12.5 m atd. Po n krocích tohoto procesu uběhnete

$$50 \text{ m} + 25 \text{ m} + \dots + \frac{100}{2^{n-1}} \text{ m} = \left(100 - \frac{100}{2^{n-1}}\right) \text{ m} < 100 \text{ m}$$

Tedy po konečně mnoho krocích neuběhnete 100 m. Nekonečně mnoho kroků nelze provést, tudíž nelze uběhnout 100 m. ┘

Paradox 11.2 (Druhý Zenónův paradox: Achilles a želva). Achilles běží rychlostí 1 m/s, želva 0.1 m/s. Závodí spolu, přičemž želva dostane náskok 9 s, takže když vystartuje Achilles, želva už urazila 0.9 m. Doběhne Achilles želvu? Když Achilles urazí vzdálenost 0.9 m, o kterou měla želva náskok, bude mu to trvat 0.9 s a želva mezi tím urazí vzdálenost 0.09 m. O tuto vzdálenost navíc musí Achilles dobíhat želvu, bohužel, za 0.09 s k tomu potřebných želva urazí zase 0.009 m. Po n krocích urazí běžci vzdálenosti

$$\begin{aligned}\text{Želva: } & 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m} + 9 \cdot 10^{-n} \text{ m} \\ \text{Achilles: } & 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m}\end{aligned}$$

a tudíž Achilles želvu nikdy nedoběhne. ┘

Paradox 11.3 (Třetí Zenónův paradox: Letící šíp). Představme si letící šíp. Šíp letí nějaký čas, který se skládá z jednotlivých momentů. V každém jednotlivém momentu šíp neurazí žádnou vzdálenost. Tudíž šíp za celkový čas nemůže urazit žádnou vzdálenost. Pohyb je nemožný. ┘

Všechny tři paradoxy rozdělují pohyb na nekonečně mnoho dílčích částí a pak tvrdí, že na realizaci „pohybu“ bychom nějak museli těchto nekonečně mnoho částí složit dohromady, a že to nejde. V paradoxech 11.1 a 11.2 se sčítá nekonečně mnoho čísel, což se později naučíme pomocí pojmu *nekonečné řady*. V paradoxu 11.3 se sčítá „nulový pohyb“ přes všechny momenty v čase, a tvrdí se, že se nemůže nasčítat na nenulový pohyb. My se to ale naučíme: této operaci se říká *integrál*.

11.1 Závěr

(1) Můžeme provádět teoretickou analýzu řešení:

- (i) Existuje řešení? Je jednoznačné? Je definované globálně nebo jen na konečném časovém intervalu?
- (ii) Je řešení omezené? Jak se chová pro $t \rightarrow \infty$? (Asymptotika)
- (iii) Když změním počáteční podmínky, budou se řešení s různými počátečními podmínkami vzdalovat, oddalovat? Co když změním koeficienty rovnice? (Stabilita)

(2) Můžeme napsat počítačový program, který spočítá řešení přibližně. Pak nás zajímá:

- (i) Jak blízko je to, co spočítal program, skutečnému řešení? (Chyba aproximace)
- (ii) Jak napsat program tak, aby počítal rychle? (Efektivita metody, řád metody)

- (iii) Pokud má skutečné řešení nějakou vlastnost, například omezenost, má tuto vlastnost i výstup našeho programu? (Numerické metody zachovávají strukturu, ...)

Teoretická analýza je úzce provázaná s vývojem numerických metod. Například pokud chci mluvit o tom, že přibližné řešení je „blízko“ skutečnému řešení, potřebuji existenci a jednoznačnost skutečného řešení. Pokud rovnice není stabilní, to jest dvě blízká řešení se průběhem času vzdalují, musíme na to dávat pozor v numerickém řešení, protože to pravděpodobně znamená, že s časem bude růst chyba aproximace. Pokud počítám pohyb hmotného bodu, při kterém se zachovává energie, chci použít numerickou metodu, která tento požadavek respektuje.

Definice 11.4 (Kuželosečka).

Rovina je množina bodů $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ taková, že $ax + by + cz = d$ pro nějaké $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Půdorysna je rovina s rovnicí $z = 0$.

Kuželová plocha je množina bodů $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ taková, že $z^2 = k^2(x^2 + y^2)$ pro nějaké $k > 0$. Povrchové přímky kuželu jsou přímky, které náležejí kuželové ploše.

Kuželosečka je průsečík kuželové plochy s rovinou.

Z definice plyne, že kuželosečka slňuje

$$\begin{aligned} cz &= d - ax - by \\ \Rightarrow k^2 \alpha^2 (x^2 + y^2) &= (d - ax - by)^2 \end{aligned}$$

a naopak by šlo ukázat, že množina řešení jakékoliv rovnice tvaru

$$a_0 x^2 + a_1 xy + a_2 y^2 + a_3 x + a_4 y + a_5 = 0$$

je buď prázdná, nebo se dá vyjádřit jako kuželosečka. Zatím ale není jasné, co geometricky znamenají koeficienty $a_0, \dots, a_5$. Pojdme na tom zapracovat.

Věta 11.5 (Dandelin-Queteletova věta). Mějme kuželovou plochu $\mathcal{P}$ a rovinu ρ . Označme α úhel, který svírá ρ s půdorysnou, a β úhel, který svírají povrchové přímky $\mathcal{P}$ s půdorysnou. Prvně předpokládejme $\alpha \neq \beta$. Sestrojme obě koule κ_1, κ_2 vepsané $\mathcal{P}$ a ρ . Body dotyku koulí s rovinou ρ nazvěme F_1, F_2 . Průnik koulí a roviny jsou dvě kružnice $k_1 := \kappa_1 \cap \rho$, $k_2 := \kappa_2 \cap \rho$. Zvolme libovolnou povrchovou přímku $p \subset \mathcal{P}$ a označme $P_1 := p \cap k_1$, $P_2 := p \cap k_2$, $2a := |P_1 P_2|$. Pak platí:

- (i) Pokud $\alpha < \beta$, každý bod X na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a \quad (\text{elipsa})$$

- (ii) Pokud $\alpha > \beta$, každý bod X na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$||XF_1| - |XF_2|| = 2a \quad (\text{hyperbola})$$

Pokud $\alpha = \beta$, můžeme sestrojit jen jednu vepsanou kouli κ , $F := \kappa \cap \rho$, $k := \kappa \cap \mathcal{P}$. Necht π je rovina určená kružnicí k , označme průsečnici rovin $d := \pi \cap \rho$. Pak každý bod na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$|XF| = |Xd| \quad (\text{parabola})$$

Todo. obrazek

Důkaz. Použijeme pozorování, že pro kružnici k a bod X vně k můžeme sestrojit dvě tečny ke k procházející bodem X , a body doteku tečen s kružnicí P_1, P_2 splňují

$$|PP_1| = |PP_2| \quad (11.6)$$

Dokazujeme bod (i). Pro bod X na kuželosečce označme $p^X \subset \mathcal{P}$ povrchovou přímkou, která prochází bodem X . Označme $P_1^X := p^X \cap k_1$, $P_2^X := p^X \cap k_2$. Definujme $2a := |P_1^X P_2^X|$. Z 11.6 plyne

$$|XF_1| = |XP_1^X|, \quad |XF_2| = |XP_2^X|$$

Na druhou stranu z rotační symetrie $\mathcal{P}$ a k_1, k_2 plyne

$$\forall X \in \mathcal{P} \cap \rho: |P_1^X P_2^X| = |P_1 P_2| = 2a,$$

takže

$$|XF_1| + |XF_2| = |XP_1^X| + |XP_2^X| = |P_1^X P_2^X| = 2a.$$

Bod (ii) se ukáže stejně, akorát $|P_1^X P_2^X| = ||XP_1^X| - |XP_2^X||$. Ukažme (iii). $\square$

Věta 11.7. Číslo $\sqrt{2}$ je iracionální.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, kde a, b jsou nesoudělná přirozená čísla. Dostáváme

$$a^2 = 2b^2$$

Tudíž a^2 je sudé, takže a je sudé. (Liché číslo jde vyjádřit jako $2k + 1, k \in \mathbb{N}$, a to po umocnění dává $(2k + 1)^2 = 4(k^2 + k) + 1$, což je znovu liché. Tedy pokud a^2 je sudé, musí být sudé i a .) Timpádem je ale a^2 dělitelné čtyřmi, takže

$$\frac{b^2}{2} = \frac{a^2}{4} \in \mathbb{N}$$

a tudíž b^2 je sudé, takže b je sudé. Obě čísla jsou sudá, což je spor s tím, že byla nesoudělná. $\square$

Úplně stejnou logikou získáme

Věta 11.8. Číslo $\sqrt{p}$ je iracionální pro libovolné prvočíslo p .

Důkaz. Stejný jak pro $\sqrt{2}$, akorát se přepíše „sudé“ na „dělitelné p “ atd. $\square$

Věta 11.9. Číslo e je iracionální.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $e = \frac{a}{b}$, kde a, b jsou nesoudělná přirozená čísla. Víme

$$\frac{a}{b} = e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{b!} + R \quad (11.10)$$

kde zbytek R (remainder) jde odhadnout

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{(b+1)!} + \frac{1}{(b+2)!} + \frac{1}{(b+3)!} + \dots \\ &= \frac{1}{b!} \left[\frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)(b+2)} + \frac{1}{(b+1)(b+2)(b+3)} + \dots \right] \\ &\leq \frac{1}{b!} \left[\frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^3} + \dots \right] = \frac{1}{b!} \frac{\frac{1}{b+1}}{1 - \frac{1}{b+1}} = \frac{1}{b \cdot b!} \end{aligned}$$

$\square$

Vynásobením (11.10) $\cdot b!$ dostaneme

$$a(b-1)! = b! + \frac{b!}{1!} + \frac{b!}{2!} + \dots + \frac{b!}{b!} + R \cdot b!,$$

což je spor, protože $a(b-1)!, b!, \frac{b!}{1!}, \dots, \frac{b!}{b!}$ jsou celá čísla, zatímco $0 < R \cdot b! \leq \frac{1}{b} < 1$.

Abychom mohli říct, že $\frac{1}{b} < 1$, měli bychom ještě ukázat, že $b > 1$, neboli že e není přirozené číslo. To ale snadno plyne (například) z odhadu

$$\begin{aligned} e &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + R, \quad 0 < R < \frac{1}{2 \cdot 2!} \\ \Rightarrow 1 + 1 + \frac{1}{2} &< e < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 2} \\ 2.5 &< e < 2.75 \end{aligned}$$

Věta 11.11. Číslo π je iracionální.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $\pi = \frac{a}{b}$, kde a, b jsou nesoudělná přirozená čísla. Definujme

$$\begin{aligned} f_n(x) &:= \frac{b^n}{n!} x^n (a - bx)^n = \frac{b^n}{n!} x^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k (-1)^{n-k} b^{n-k} x^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{n!} \binom{n}{k} a^k (-1)^{n-k} b^{2n-k} x^{2n-k} \end{aligned}$$

$\downarrow$

↳ Substitucí v sumě $j := 2n - k, 0 \leq k \leq n \Rightarrow n \leq j \leq 2n$ dostaneme

$$f_n(x) = \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{n!} \binom{n}{2n-j} a^{2n-j} (-1)^{n+j} b^{n+j} x^{n+j}$$

Exponent u x je $\geq n$, takže platí

$$f_n(0) = f'_n(0) = \dots = f_n^{(n-1)}(0) = 0$$

Dále když $n+k$ -krát zderivujeme f_n , kde $0 \leq k \leq n$, členy $x^{n+j}, j < k$ se zderivují na nulu, x^{n+k} se zderivuje na

$$\frac{d^{n+k}}{dx^{n+k}} x^{n+k} = (n+k)(n+k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = (n+k)!$$

a členy $x^{n+j}, j > k$ se zderivují na x^{j-k} , čehož se zbavím tak, že za x dosadím nulu. Tedy

$$f_n^{(n+j)}(0) = \frac{1}{n!} \binom{n}{2n-j} a^{2n-j} (-1)^{n+j} b^{n+j} (n+j)! \in \mathbb{Z}$$

Číslo je celé, protože v $(n+j)!$ je dělitelné $n!$. Protože f_n je polynom stupně $2n$, derivace řádu $> 2n$ vyjdou vždy 0. Tedy celkem

$$\forall j \in \mathbb{N}: f_n^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$$

Dále platí

$$f_n(x) = \frac{b^{2n}}{n!} x^n (\pi - x)^n \Rightarrow f_n(\pi - x) = f_n(x),$$

takže dostáváme i

$$\forall j \in \mathbb{N}: f_n^{(j)}(\pi) \in \mathbb{Z}.$$

Definujme

$$F_n := f_n - f_n'' + f_n^{(4)} - \dots + (-1)^n f_n^{(2n)}$$

Pak platí $F_n(0), F_n(\pi) \in \mathbb{Z}$ a (protože $f_n^{(2n+2)} = 0$):

$$F_n'' + F_n = f_n.$$

Dále definujme

$$\begin{aligned} I_n &:= \int_0^\pi f_n(x) \sin(x) dx = \int_0^\pi (F_n''(x) + F_n(x)) \sin(x) dx = \\ &= \int_0^\pi (-F_n'(x) \cos(x) + F_n(x) \sin(x)) dx + [F_n'(x) \sin(x)]_0^\pi \\ &= \int_0^\pi (F_n(x)(-\sin(x)) + F_n(x) \sin(x)) dx + [F_n'(x) \sin(x)]_0^\pi - [F_n(x) \cos(x)]_0^\pi \\ &= F_n(0) - F_n(\pi) \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

↴

↳ Protože $f_n(x) > 0$, $\sin(x) > 0$ na $(0, \pi)$, platí $I_n > 0$. Zároveň ale $x(\pi - x) \leq \frac{\pi^2}{4}$ (nakreslete si parabolu), takže

$$f_n(x) = \frac{b^{2n}}{n!} x^n (\pi - x)^n \leq \frac{b^{2n}}{n!} \left(\frac{\pi^2}{4}\right)^n$$

takže

$$I_n \leq \int_0^\pi \frac{b^{2n}}{n!} \left(\frac{\pi^2}{4}\right)^n dx = \pi \frac{b^{2n}}{n!} \left(\frac{\pi^2}{4}\right)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0.$$

Tedy existuje nějaké $n_0 \in \mathbb{N}$ tak velké, že $I_{n_0} \in (0, 1)$. To je ve sporu s $I_{n_0} \in \mathbb{Z}$. $\square$

Věta 11.12. Necht X_n je aproximace řešení úlohy

$$\begin{aligned} x' &= f(t, x) \\ x(0) &= x_0 \end{aligned}$$

zkonstruovaná explicitní Eulerovou metodou s krokem τ . Předpokládejme, že f je Lipschitzovská a C^1 . Pak existuje konstanta $C = C(\tau, x, f)$ závislá jen na τ , přesném řešení x a pravé straně f , že

$$\max_{1 \leq i \leq n} |e_i| \leq C\tau$$

Důkaz. Platí

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + \tau f(t_n, x_n) + E_n \\ X_{n+1} &= X_n + \tau f(t_n, X_n) \end{aligned}$$

kde $E_n = \frac{1}{2} x''(\xi) \tau^2$, $\xi \in (t_n, t_{n+1})$. Odečtením těchto rovnic dostaneme

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= e_n + \tau[f(t_n, x_n) - f(t_n, X_n)] \\ \Rightarrow |e_{n+1} - e_n| &= \tau|f(t_n, x_n) - f(t_n, X_n)| \leq \tau C|x_n - X_n| = \tau C|e_n| \\ \Rightarrow |e_{n+1}| &\leq (1 + C\tau)|e_n| \end{aligned}$$

Protože x'' je omezená na $[0, T]$, dostáváme

$$|E_i| \leq \frac{\tau^2}{2} \|x''\|_{C[0, T]} =: M$$

↴

↳

$$\begin{aligned}
|e_1| &= |E_1| \leq M \\
|e_2| &\leq (1 + C\tau)|e_1| + |E_2| \leq [(1 + C\tau) + 1]M \\
|e_3| &\leq (1 + C\tau)|e_2| + |E_3| \leq [(1 + C\tau)^2 + (1 + C\tau) + 1]M \\
&\vdots \\
|e_n| &\leq [(1 + C\tau)^{n-1} + \dots + (1 + C\tau) + 1]M \\
&= \frac{(1 + C\tau)^n - 1}{(1 + C\tau) - 1} M = \frac{(1 + C\tau)^n - 1}{C\tau} \frac{\tau^2}{2} \|x''\|_{C[0,T]} \\
&= \frac{(1 + C\tau)^n - 1}{2C} \|x''\|_{C[0,T]} \tau
\end{aligned}$$

Podle binomické věty platí

$$\begin{aligned}
(1 + C\tau)^n &= \left(1 + \frac{CT}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{n \cdot n \cdot \dots \cdot n} \frac{(CT)^k}{k!} \leq \\
&\leq \sum_{k=0}^n \frac{(CT)^k}{k!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(CT)^k}{k!} = e^{CT},
\end{aligned}$$

takže

$$|e_n| \leq \underbrace{\frac{e^{CT} - 1}{2C} \|x''\|_{C[0,T]} \tau}_{=C(\tau, x, f)}$$

□

Summary and Outlook

Summary and Outlook.