

Álgebra matricial  
Tarea 1

1. Si  $A$  es una matriz  $m \times n$  dada por bloques de vectores columna como

$$(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)$$

y  $B$  es una matriz  $n \times p$  dada por bloques de vectores renglón como

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

demuestre que

$$AB = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

2. Sean  $A$  y  $B$  matrices cuadradas del mismo orden. Demuestre que  $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$  si y solo si  $AB = BA$ .

3. Sean  $A$  y  $B$  matrices  $n \times n$ ,  $A \neq 0$ ,  $B \neq 0$ , tales que  $AB = BA$ . Demuestre que  $A^p B^q = B^q A^p$  para cualesquiera  $p, q \in \mathbb{N}$ .

4. Se dice que una matriz cuadrada  $A$  es antisimétrica si  $A = -A^t$ . Demuestre que  $A - A^t$  es antisimétrica.

5. Demuestre que dada cualquier matriz cuadrada  $A$ , esta se puede escribir como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica.

6. Se dice que una matriz cuadrada  $P$  es idempotente si  $P^2 = P$ . Si

$$A = \begin{pmatrix} I & P \\ 0 & P \end{pmatrix}$$

y  $P$  es idempotente, encuentre  $A^{500}$ .

7. Sean  $A$  y  $B$  matrices de tamaño  $m \times n$ . Demuestre que  $\text{tr}(AB^t) = \text{tr}(A^t B)$

8. Encuentre matrices  $A$ ,  $B$  y  $C$  tales que  $\text{tr}(ABC) \neq \text{tr}(BAC)$ .

9. Sea  $L$  una matriz triangular inferior  $n \times n$ . Demuestre que  $L = L_1 L_2 \cdots L_n$  donde  $L_i$  es la matriz  $n \times n$  que se obtiene reemplazando la  $i$ -ésima columna de  $L_n$  por la  $i$ -ésima columna de  $L$ . Demuestre un resultado análogo para matrices triangulares superiores.

10. Sea  $A = (a_{ij})$  una matriz cuadrada de tamaño  $n$ , triangular superior tal que  $a_{ii} = 0$  para  $i = 1, \dots, n$ . Demuestre que para  $i = 1, \dots, n$  y  $j = 1, \dots, \min(n, i+p-1)$  se cumple que  $b_{ij} = 0$  donde  $A^p = (b_{ij})$  y  $p$  es un entero positivo.