

Maestría en Computo Estadístico
Álgebra Matricial
Tarea 3

14 de septiembre de 2020

Enrique Santibáñez Cortés

Repositorio de Git: [Tarea 3, AM.](#)

Todos los cálculos deben ser a mano.

1. Dada la matriz

$$\begin{pmatrix} -4 & 5 & -6 & 7 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

encuentre su forma escalonada reducida por renglones. Escriba todas las matrices elementales correspondientes a las operaciones que usó para llevar la matriz a la forma que obtuvo.

RESPUESTA

Para encontrar la forma escalonada reducida por renglones ocuparemos eliminación de Gauss-Jordan:

$$\begin{pmatrix} -4 & 5 & -6 & 7 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R1 \leftrightarrow R3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ -4 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R2 \rightarrow R2 + R1 \\ R3 \rightarrow R3 + 4R1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 13 & -18 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R2 \rightarrow R2/3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 13 & -18 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R3 \rightarrow R3 - 13R2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & -28/3 & 17/3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R3 \rightarrow -3R3/28} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & -17/28 \end{pmatrix}.$$

Las matrices elementales que corresponden a las operaciones que se utilizaron para llevar la matriz a la forma escalonada reducida por renglones son:

$$E_3(-3/28)E_{32}(-13)E_2(1/3)E_{31}(4)E_{21}(1)E_{13}A$$

o

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{28} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -13 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 5 & -6 & 7 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

2. Dada el sistema $Ax = b$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ a_1 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

encuentre condiciones generales sobre a_1 y a_2 para que el sistema sea consistente. Si se quiere que la solución sea exactamente $x = (3, -1, 2)^t$, ¿qué valores deben tener a_1 y a_2 ?

RESPUESTA

Recordemos que un sistema es inconsistente cuando no tiene ninguna solución. Para determinar si el sistema es inconsistente o consistente ocuparemos eliminación gaussiana para resolver el sistema. El cual consiste primero en reducir por renglones la matriz aumentada a la forma escalonada por

renglones y después sustitución hacia atrás. Reducimos la matriz aumentada a su forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ a_1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & a_2 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - a_1 R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 - 3a_1 & -3 + a_1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & a_2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & a_2 \\ 0 & -1 - 3a_1 & -3 + a_1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - (1+3a_1)R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & a_2 \\ 0 & 0 & -6 - 8a_1 & 1 - a_2 - 3a_2a_1 \end{array} \right)$$

El sistema anterior es **inconsistente o no tiene solución si** $-6 - 8a_1 = 0$ y $1 - a_2(1 + 3a_1) \neq 0$, despejando de ambos lados tenemos $a_1 = -\frac{3}{4}$ y $a_2 \neq -\frac{1}{1-3a_1} \neq \frac{4}{5}$.

Ahora, determinemos los valores de a_1 y a_2 para que la solución del sistema sea $x = (3, -1, 2)^t$. Para que $(3, -1, 2)^t$ sea solución se tiene que cumplir $A(3, -1, 2)^t = b$, es decir,

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 3 & -1 \\ a_1 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 3 \\ -1 \\ 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{c} 3 - 3 - 2 \\ 3a_1 + 1 - 6 \\ 3 - 2 + 4 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{c} -2 \\ 3a_1 + 1 - 6 \\ 3 - 2 + 4 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{array} \right)$$

Pero si observamos el primer renglón de lo anterior, notamos que $x = (3, -1, 2)^t$ no puede ser solución del sistema debido a que no cumple la primera igualdad, independientemente de los valores que tomen a_1 y a_2 . ■.

3. Encuentre la solución general, escribiéndola como combinación lineal de vectores, del sistema homogéneo $Ax = 0$ donde

$$A = \left(\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right).$$

RESPUESTA

Tenemos que $Ax = 0$, es decir,

$$\left(\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar la solución general ocupemos reducción gaussiana. Primero reduzcamos la matriz en su forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_2]{R_4 \rightarrow R_4 + R_1} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[R_3 \rightarrow -R_3/2]{R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + R_3} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow -R_4} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora realizamos sustitución hacia atrás de la matriz anterior:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \rightarrow R_2 - 4R_4 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 - R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo anterior encontramos que $x_6 = 0$ y $x_5 = 0$ del renglón 3 y 4 respectivamente. Del renglón 2 obtenemos que $x_3 = -2x_4$ y del renglón 1 $x_1 = 3x_2 + 3x_4$. Por lo que la solución general es

$$x = \begin{pmatrix} 3x_2 + 3x_4 \\ x_2 \\ -2x_4 \\ x_4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

la cual se puede escribir como combinación lineal de la siguiente forma:

$$x = \left\{ x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \blacksquare.$$

4. Encuentra la inversa de

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

RESPUESTA

Para encontrar A^{-1} , tenemos la ecuación $AX = I$ que puede verse como un conjunto de sistemas de ecuaciones $Ax_i = e_i$ donde x_i son las columnas de X . Luego con el método de Gauss, si es posible resolver cada uno de estos sistemas con solución x_i , encontramos la inversa de A dada por $X = (x_1, \dots, x_n)$. Usando Gauss Jordan

$$L(A|I) = (LA|LI) = (I|L)$$

implica que $L = A^{-1}$.

Ocupando lo anterior tenemos que:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3.5 & 1.5 & 0.5 \end{array} \right) \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 + 2R_3]{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 8 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3.5 & 1.5 & 0.5 \end{array} \right).$$

Por lo tanto la inversa es:

$$\begin{pmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 10 & 4 & 1 \\ 3.5 & 1.5 & 0.5 \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

5. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Demuestre que A es no singular y luego escriba A como producto de matrices elementales.

RESPUESTA

Reduzcamos a A en su forma escalonada:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 5R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Recordemos que si

Si $A_{n \times n}$ se puede escribir en su forma escalonada con n pivotes si solo sí es no singular (demostrado en clase).

Por lo tanto, como la forma escalonada de $A_{3 \times 3}$ tiene 3 pivotes entonces A es no singular. Otra forma de demostrarlo es calculando el determinante de A :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = (1)(2)(-4) = -8.$$

Por lo tanto, como el determinante de A es distinto de cero eso implica que A es no singular.

Ahora para escribir a A como producto de matrices elementales, hacemos reducción hacia atrás a la matriz escalonada calculada:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow -R_3/4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 - 3R_3]{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2/2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ahora, transformando las operaciones elementales por matrices elementales, tenemos que lo anterior es equivalente a:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = I \Rightarrow$$

Ahora, haciendo uso de las propiedades de las matrices inversas $((E_1 E_2 \cdots E_n)^{-1} = E_n^{-1} \cdots E_2^{-1} E_1^{-1}$, demostrada en clase), entonces

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} I \Rightarrow$$

Ahora para calcular las inversas ocupemos lo visto en clase:

Sea $A = I_n + uv^t$ una matriz elemental. Entonces A es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = I - \frac{uv^t}{1 + v^t u}.$$

Más aún, si E es elemental del tipo I, II, ó III entonces E^{-1} es elemental del mismo tipo que E .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

Para que quede más específico realizamos aquí las matrices inversas:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow -4R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & -4 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + 3R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \text{ y}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

6. i) Encuentre dos matrices que sean invertibles pero que su suma no sea invertible. ii) Encuentre dos matrices singulares cuya suma sea invertible. Justifique todas sus aseveraciones.

RESPUESTA

Recordemos que:

Si $A_{n \times n}$ se puede escribir en su forma escalonada con n pivotes si solo sí es no singular (demostrado

en clase).

Sea $A_{3 \times 3}$ y $B_{3 \times 3}$ matrices triangulares superiores, con elementos en la diagonal distintos de cero, esto implica que A y B son invertibles debido a que estan en su forma escalonada y tienen 3 pivotes:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{pmatrix}, \quad \text{donde } a_{ii} \neq 0 \text{ y } b_{ii} \neq 0.$$

Ahora haciendo que $a_{33} = -b_{33}$ y $a_{11} \neq b_{11}$, $a_{22} \neq b_{22}$, esto implicaría que:

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & -b_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ 0 & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Y por lo tanto, como $A + B$ tiene a lo más 2 pivotes esto implica que $A + B$ no se invertible.

i) Por lo anterior, **podemos proponer las siguientes dos matrices A y B tal que son invertibles y $A + B$ no sea invertible:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 0 & 9 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea $A_{3 \times 3}$ y $B_{3 \times 3}$ matrices triangulares superiores, con un elemento diagonal igual a cero pero en diferente posición en A y B ($a_{33} = 0$ y $b_{22} = 0$), esto implica que A y B no son invertibles debido a que estan en su forma escalonada y tienen 2 pivotes:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 0 & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{pmatrix}, \quad \text{donde } a_{ii} \neq 0 \text{ y } b_{ii} \neq 0.$$

Ahora considerando a $a_{11} \neq -b_{11}$, entonces:

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 0 & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} + b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{pmatrix} \quad \text{donde } a_{ii} \neq 0 \text{ y } b_{ii} \neq 0.$$

Y por lo tanto, como $A + B$ tiene 3 pivotes esto implica que $A + B$ es invertible.

ii) Por lo anterior, **podemos proponer las siguientes dos matrices A y B tal que no sean invertibles y $A + B$ sea invertible:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

7. Encuentre la descomposición LU de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

RESPUESTA

Sea T_i una matriz inferior elemental y si no se requieren intercambios de renglones se pueden hacer $n-1$ multiplicaciones por la izquierda de $A_{n \times n}$ por matrices triangulares inferiores elementales para llevar a A a una forma triangular superior, es decir:

$$T_{n-1} \cdots T_1 A = U$$

Luego

$$A = T_1^{-1} \cdots T_{n-1}^{-1} U = LU,$$

donde $L = T_1^{-1} \cdots T_{n-1}^{-1}$.

Entonces, usemos eliminación gaussiana para determinar la matriz U :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - R_1]{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & -1 & 3 & -4 \\ 0 & -3 & 7 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - 3R_2]{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & -8 & -24 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - 4R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix}.$$

Ahora determinaremos L ,

$$E_{43}(-4)E_{42}(-3)E_{32}(-1)E_{41}(-1)E_{31}(-2)A = U$$

o

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = U \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} U.$$

Y esto implica que:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir, la descomposición LU de la matriz definida es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

Para que quede más específico que se realizaron las matrices inversas a mano:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + 4R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. Encuentre la descomposición LU de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix},$$

y luego úsela para encontrar la solución del sistema $Ax = b$, donde

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

RESPUESTA

El problema anterior se resolvió utilizando la metodología vista en clase. Ahora se hará uso de un método "más sencillo" (Álgebra Lineal, Grossman (2012)). Si $A = LU$, si sabe que A se puede factorizar como:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & c & 1 & 0 \\ d & e & f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & u & v & w \\ 0 & 0 & x & y \\ 0 & 0 & 0 & z \end{pmatrix} = LU$$

Observe que el primer renglón de U es el mismo que el primer renglón de A porque al reducir A a la forma triangular, no hace falta modificar los elementos del primer renglón.

Se pueden obtener todos los coeficientes faltantes con tan sólo multiplicar las matrices. La componente 2, 1 de A es 4. De este modo, el producto escalar del segundo renglón de L y la primera columna de U es igual a 4:

$$4 = 2a \quad \text{o} \quad a = 2$$

Después se tiene:

componente 2, 2: $7 = 6 + u \rightarrow u = 1$.

De aquí en adelante se pueden insertar los valores que se encuentran en L y U :

$$\text{componente } 2, 3: 2 = -2 + v \rightarrow v = 4.$$

$$\text{componente } 2, 4: 1 = 12 + w \rightarrow w = -11.$$

$$\text{componente } 3, 1: -2 = 2b \rightarrow b = -1.$$

$$\text{componente } 3, 2: 5 = -3 + c \rightarrow c = 8.$$

$$\text{componente } 3, 3: -2 = +1 + 32 + x \rightarrow x = -35.$$

$$\text{componente } 3, 4: 0 = -6 - 88 + y \rightarrow y = 94.$$

$$\text{componente } 4, 1: 0 = 2d \rightarrow d = 0.$$

$$\text{componente } 4, 2: -4 = e \rightarrow e = -4.$$

$$\text{componente } 4, 3: 5 = -16 - 35f \rightarrow f = -3/5.$$

$$\text{componente } 4, 4: 2 = 44 - 3(94)/5 + z \rightarrow z = 72/5.$$

Por lo que:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -3/5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & -11 \\ 0 & 0 & -35 & 94 \\ 0 & 0 & 0 & 72/5 \end{pmatrix} = LU$$

Ahora, para resolver un sistema lineal $Ax = b$ cuando $A = LU$ se resuelven dos sistemas triangulares $Ly = b$ y $Ux = y$. Primero se usa una sustitución hacia adelante en $Ly = b$, y luego se resuelve el sistema $Ux = y$ usando sustitución hacia atrás (esta metodología se presentó en clase). Entonces para este problema tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -3/5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Esto implica que

$$y_1 = 1$$

$$2(1) + y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = -2$$

$$-(1) + 8(-2) + y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = 17$$

$$0 - 4(-2) - 3(17)/5 + y_4 = 4 \Rightarrow y_4 = 31/5$$

Sea ahora de realizar la sustitución hacia adelante. Ahora, de $Ux = y$ se obtiene:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 6x_4 &= 1 \\ x_2 + 4x_3 - 11x_4 &= -2 \\ -35x_3 + 94x_4 &= 17 \\ 72/5x_4 &= 31/5 \end{aligned}$$

o

$$x_4 = \frac{31}{72}$$

$$-35x_3 + 94\left(\frac{31}{72}\right) = 17, \text{ de manera que } x_3 = \frac{17 - 94\left(\frac{31}{72}\right)}{-35} = \frac{17 \cdot 72 - 94 \cdot 31}{-35 \cdot 72} = \frac{-1690}{-2520} = \frac{169}{252}$$

$$x_2 + 4x_3 - 11x_4 = -2, \text{ de manera que } x_2 = -2 + 11\left(\frac{31}{72}\right) - 4\left(\frac{169}{252}\right) = \frac{3}{56}$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 + 6x_4 = 1, \text{ de manera que } x_1 = \frac{1}{2} - 3\left(\frac{31}{72}\right) + \frac{169}{504} - 3\left(\frac{3}{112}\right) = -\frac{541}{1008}$$

Por lo tanto la solución es:

$$x = \begin{pmatrix} -\frac{541}{1008} \\ \frac{3}{56} \\ \frac{169}{252} \\ \frac{31}{72} \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

Cálculos de la simplificación de x_2 y x_1 :

$$-2 + 11 \left(\frac{31}{72} \right) - 4 \left(\frac{169}{252} \right) = -2 + \frac{341}{72} - \frac{338}{126} = \frac{-18144 + 42966 - 24336}{9000} = \frac{486}{72 * 126} = \frac{3}{56}.$$

$$\frac{1}{2} - 3 \left(\frac{31}{72} \right) + \frac{169}{504} - 3 \left(\frac{3}{112} \right) = \frac{1}{2} - \frac{31}{24} + \frac{169}{504} - \frac{9}{112} = \frac{504 - 1302 + 338 - 81}{1008} = -\frac{541}{1008}.$$

9. Encuentre la descomposición LU de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 3 & -9 & 0 & -9 \\ -1 & 2 & 4 & 7 \\ -3 & -6 & 26 & 2 \end{pmatrix},$$

Usando esta misma descomposición como ayuda, encuentre A^{-1} .

RESPUESTA

Utilizando la metodología que el ejercicio anterior. Tenemos que si $A = LU$, si se sabe que A se puede factorizar como:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 3 & -9 & 0 & -9 \\ -1 & 2 & 4 & 7 \\ -3 & -6 & 26 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & c & 1 & 0 \\ d & e & f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 0 & u & v & w \\ 0 & 0 & x & y \\ 0 & 0 & 0 & z \end{pmatrix} = LU$$

Observe que el primer renglón de U es el mismo que el primer renglón de A porque al reducir A a la forma triangular, no hace falta modificar los elementos del primer renglón.

Se pueden obtener todos los coeficientes faltantes con tan sólo multiplicar las matrices. La componente 2, 1 de A es 3. De este modo, el producto escalar del segundo renglón de L y la primera columna de U es igual a 3:

$$3 = a \quad \text{o} \quad a = 3$$

Después se tiene:

componente 2, 2: $-9 = -6 + u \rightarrow u = -3$.

De aquí en adelante se pueden insertar los valores que se encuentran en L y U :

componente 2, 3: $0 = -6 + v \rightarrow v = 6$.	componente 3, 4: $7 = 3 + y \rightarrow y = 4$.
componente 2, 4: $-9 = -9 + w \rightarrow w = 0$.	componente 4, 1: $-3 = d \rightarrow d = -3$.
componente 3, 1: $-1 = b \rightarrow b = -1$.	componente 4, 2: $-6 = 6 - 3e \rightarrow e = 4$.
componente 3, 2: $2 = 2 + -3c \rightarrow c = 0$.	componente 4, 3: $26 = 6 + 24 + 2f \rightarrow f = -2$.
componente 3, 3: $4 = 2 + x \rightarrow x = 2$.	componente 4, 4: $2 = 9 + -8 + z \rightarrow z = 1$.

Por lo que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 3 & -9 & 0 & -9 \\ -1 & 2 & 4 & 7 \\ -3 & -6 & 26 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = LU$$

Ahora, considerando la propiedad de la inversa de una matriz (demostrada en clase):

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Entonces tenemos que:

$$A^{-1} = (LU)^{-1} = U^{-1}L^{-1}$$

Calculemos la inversa de U^{-1} y L^{-1} :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - 4R_2]{R_4 \rightarrow R_4 + 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 17 & -4 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 15 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + 2R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 17 & -4 & 2 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 17 & -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -2 & -3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 4R_4]{R_1 \rightarrow R_1 + 3R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_1 \rightarrow R_1 + 2R_3]{R_2 \rightarrow R_2 - 6R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -R_2/3}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2/3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & 3 & -9 \\ 0 & -1/3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0.5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = U^{-1}L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & 3 & -9 \\ 0 & -1/3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0.5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 17 & -4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -147 & \frac{106}{3} & -15 & -9 \\ -66 & \frac{47}{3} & -7 & -4 \\ \frac{-67}{2} & 8 & \frac{-7}{2} & -2 \\ 17 & -4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \blacksquare$$

10. Encuentre la descomposición LU de la matriz por bandas

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix},$$

(Para una interesante aplicación de matrices por bandas a problemas de flujo de calor en física y la importancia de obtener su descomposición LU, ver problemas 31 y 32 de Linear Algebra, D. Lay, 4th ed., p. 131 y las explicaciones que ahí se dan.)

RESPUESTA

Para hacer un poco más fácil este problema, definamos las siguientes submatrices de A :

$$A_1^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad A_2^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}. \Rightarrow$$

$$\det(A_1^*) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad y \quad \det(A_2^*) = a_{33} \det(A_1^*) - a_{32}a_{11}a_{23}.$$

Ahora utilizando (*demostrado en clase*):

A tiene una factorización LU si y solo si todas sus submatrices principales líderes son no singulares.

Entonces para que A tenga su factorización LU asumimos que $[a_{11}]$, A_1^* y A_2^* son no singulares, es decir, $a_{11} \neq 0$, $\det(A_1^*) \neq 0$ y $\det(A_2^*) \neq 0$.

Ahora, considerando la metodología del inciso 9: Si $A = LU$, se sabe que A se puede factorizar como:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & c & 1 & 0 \\ d & e & f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & u & v & w \\ 0 & 0 & x & y \\ 0 & 0 & 0 & z \end{pmatrix} = LU$$

Observe que el primer renglón de U es el mismo que el primer renglón de A porque al reducir A a la forma triangular, no hace falta modificar los elementos del primer renglón.

Se pueden obtener todos los coeficientes faltantes con tan sólo multiplicar las matrices. La componente 2, 1 de A es a_{21} . De este modo, el producto escalar del segundo renglón de L y la primera columna de U es igual a a_{21} :

$$a_{21} = a_{11} \cdots a \quad \text{o} \quad a = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

Después se tiene:

$$\text{componente 2, 2: } a_{22} = a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}} + u \rightarrow u = a_{22} - a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

De aquí en adelante se pueden insertar los valores que se encuentran en L y U :

componente 2, 3: $a_{23} = 0 + v \rightarrow v = a_{23}$.

componente 2, 4: $0 = 0 + w \rightarrow w = 0$.

componente 3, 1: $0 = a_{11}b \rightarrow b = 0$.

componente 3, 2: $a_{32} = (a_{22} - a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}})c \rightarrow c = \frac{a_{32}a_{11}}{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}}$.

componente 3, 3: $a_{33} = a_{23} \left(\frac{a_{32}a_{11}}{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}} \right) + x \rightarrow$

$x = a_{33} - a_{23} \left(\frac{a_{32}a_{11}}{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}} \right) = \frac{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}}{\det(A_1^*)}$

componente 3, 4: $a_{34} = 0 + y \rightarrow y = a_{34}$.

componente 4, 1: $0 = a_{11}d \rightarrow d = 0$.

componente 4, 2: $0 = \left(a_{22} - a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}} \right) e \rightarrow e = 0$.

componente 4, 3: $a_{43} = \left(\frac{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}}{\det(A_1^*)} \right) f \rightarrow$

$f = \frac{a_{43}}{\frac{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}}{\det(A_1^*)}} = \frac{a_{43} \cdot \det(A_1^*)}{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}}$

componente 4, 4: $a_{44} = a_{34} \frac{a_{43} \cdot \det(A_1^*)}{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}} + z \rightarrow$

$z = a_{44} - \frac{a_{34}a_{43} \cdot \det(A_1^*)}{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}}$.

Por lo tanto:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a_{32}a_{11}}{\det(A_1^*)} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a_{43} \cdot \det(A_1^*)}{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\det(A_1^*)}{a_{11}} & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}}{\det(A_1^*)} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} - \frac{a_{34}a_{43} \cdot \det(A_1^*)}{a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}} \end{pmatrix} = LU.$$

Ahora, recordando la notación del inicio podemos ver que:

$$\det(A_2^*) = a_{33} \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}, \quad y \quad \det(A) = a_{44} \cdot (a_{33} \cdot \det(A_1^*) - a_{23}a_{32}a_{11}) - a_{34}a_{43} \det(A_1^*).$$

Es decir, el resultado anterior se puede simplificar a:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a_{32}a_{11}}{\det(A_1^*)} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a_{43} \cdot \det(A_1^*)}{\det(A_2^*)} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\det(A_1^*)}{a_{11}} & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\det(A_2^*)}{\det(A_1^*)} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\det(A)}{\det(A_2^*)} \end{pmatrix} = LU \blacksquare.$$

Algo curioso de esas matrices con bandas, es que se puede observar que tanto L y U igual son matrices por bandas.