

**Maestría en Computo Estadístico**  
**Álgebra Matricial**  
**Tarea 3**

12 de septiembre de 2020

*Enrique Santibáñez Cortés*

Repositorio de Git: [Tarea 3, AM.](#)

Todos los cálculos deben ser a mano.

1. Dada la matriz

$$\begin{pmatrix} -4 & 5 & -6 & 7 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

encuentre su forma escalonada reducida por renglones. Escriba todas las matrices elementales correspondientes a las operaciones que usó para llevar la matriz a la forma que obtuvo.

**RESPUESTA**

Para encontrar la forma escalonada reducida por renglones ocuparemos eliminación de Gauss-Jordan:

$$\begin{pmatrix} -4 & 5 & -6 & 7 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R1 \leftrightarrow R3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ -4 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R2 \rightarrow R2 + R1 \\ R3 \rightarrow R3 + 4R1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 13 & -18 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R2 \rightarrow R2/3} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 13 & -18 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R3 \rightarrow R3 - 13R2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & -28/3 & 17/3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R3 \rightarrow -3R3/28} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & -17/28 \end{pmatrix}.$$

Las matrices elementales que corresponden a las operaciones que se utilizaron para llevar la matriz a la forma escalonada reducida por renglones son:

$$E_3(-3/28)E_{32}(-13)E_2(1/3)E_{31}(4)E_{21}(1)E_{13}A$$

o

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{28} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -13 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 5 & -6 & 7 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

2. Dada el sistema  $Ax = b$ , donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ a_1 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

encuentre condiciones generales sobre  $a_1$  y  $a_2$  para que el sistema sea consistente. Si se quiere que la solución sea exactamente  $x = (3, -1, 2)^t$ , ¿qué valores deben tener  $a_1$  y  $a_2$ ?

**RESPUESTA**

Recordemos que un sistema es inconsistente cuando no tiene ninguna solución. Para determinar si el sistema es inconsistente o consistente ocuparemos eliminación gaussiana para resolver el sistema. El cual consiste primero en reducir por renglones la matriz aumentada a la forma escalonada por

renglones y después sustitución hacia atrás. Reducimos la matriz aumentada a su forma escalonada reducida:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ a_1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & a_2 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - a_1 R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 - 3a_1 & -3 + a_1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & a_2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & a_2 \\ 0 & -1 - 3a_1 & -3 + a_1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - (1+3a_1)R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & a_2 \\ 0 & 0 & -6 - 8a_1 & 1 - a_2 - 3a_2a_1 \end{array} \right)$$

El sistema anterior es **inconsistente o no tiene solución si**  $-6 - 8a_1 = 0$  y  $1 - a_2(1 + 3a_1) \neq 0$ , despejando de ambos lados tenemos  $a_1 = -\frac{3}{4}$  y  $a_2 \neq -\frac{1}{1-3a_1} \neq \frac{4}{5}$ .

Ahora, determinemos los valores de  $a_1$  y  $a_2$  para que la solución del sistema sea  $x = (3, -1, 2)^t$ . Para que  $(3, -1, 2)^t$  sea solución se tiene que cumplir  $A(3, -1, 2)^t = b$ , es decir,

$$\left( \begin{array}{ccc} 1 & 3 & -1 \\ a_1 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} 3 \\ -1 \\ 2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{array} \right) \Rightarrow \left( \begin{array}{c} 3 - 3 - 2 \\ 3a_1 + 1 - 6 \\ 3 - 2 + 4 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{array} \right) \Rightarrow \left( \begin{array}{c} -2 \\ 3a_1 + 1 - 6 \\ 3 - 2 + 4 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ a_2 \end{array} \right)$$

Pero si observamos el primer renglón de lo anterior, notamos que  $x = (3, -1, 2)^t$  no puede ser solución del sistema debido a que no cumple la primera igualdad, independientemente de los valores que tomen  $a_1$  y  $a_2$ . ■.

3. Encuentre la solución general, escribiéndola como combinación lineal de vectores, del sistema homogéneo  $Ax = 0$  donde

$$A = \left( \begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right).$$

## RESPUESTA

Transformemos

$$\left( \begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces ocupando reducción

$$\left( \begin{array}{cccccc} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1}$$

4. Encuentra la inversa de

$$\left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{array} \right).$$

**RESPUESTA**

Para encontrar  $A^{-1}$ , tenemos la ecuación  $AX = I$  que puede verse como un conjunto de sistemas de ecuaciones  $Ax_i = e_i$  donde  $x_i$  son las columnas de  $X$ . Luego con el método de Gauss, si es posible resolver cada uno de estos sistemas con solución  $x_i$ , encontramos la inversa de  $A$  dada por  $X = (x_1, \dots, x_n)$ . Usando Gauss Jordan

$$L(A|I) = (LA|LI) = (I|L)$$

implica que  $L = A^{-1}$ .

Ocupando lo anterior tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 4 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & | & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 7 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3.5 & 1.5 & 0.5 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 + 2R_3]{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 8 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 10 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3.5 & 1.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto la inversa es:

$$\begin{pmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 10 & 4 & 1 \\ 3.5 & 1.5 & 0.5 \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

5. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Demuestre que  $A$  es no singular y luego escriba  $A$  como producto de matrices elementales.

**RESPUESTA**

Veamos que  $A$  es igual a

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 5R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Calculemos el determinante de  $A$ :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = (1)(2)(-4) = -8.$$

Por lo tanto, como el determinante de  $A$  es distinto de cero eso implica que  $A$  es no singular.

Haciendo reducción hacia atrás:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow -R_3/4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 - 3R_3]{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2/2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo anterior, tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = I \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} I \Rightarrow$$

Ahora para calcular las inversas ocupemos lo visto en clase:

Sea  $A = I_n + uv^t$  una matriz elemental. Entonces  $A$  es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = I - \frac{uv^t}{1 + v^t u}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \blacksquare.$$

6. i) Encuentre dos matrices que sean invertibles pero que su suma no sea invertible. ii) Encuentre dos matrices singulares cuya suma sea invertible. Justifique todas sus aseveraciones.

### RESPUESTA

Sea  $A$  y  $B$  dos matrices de tamaño  $2 \times 2$ . Por convicción sea  $A = I$ . Entonces busquemos una matriz  $B$  tal que  $A + B$  no sea invertible, para ello consideremos el criterio de determinantes:

Una matriz es invertible si su determinante es cero.

Sea

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

tal que

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 1 + b_{22} \end{pmatrix}$$

7. Encuentre la descomposición LU de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

### RESPUESTA

Sea  $T_i$  una matriz inferior elemental y si no se requieren intercambios de renglones se pueden hacer  $n - 1$  multiplicaciones por la izquierda de  $A_{n \times n}$  por matrices triangulares inferiores elementales para llevar a  $A$  a una forma triangular superior, es decir:

$$T_{n-1} \cdots T_1 A = U$$

Luego

$$A = T_1^{-1} \cdots T_{n-1}^{-1} U = LU,$$

donde  $L = T_1^{-1} \cdots T_{n-1}^{-1}$ .

Entonces, usemos eliminación gaussiana para determinar la matriz  $U$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - R_1]{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & -1 & 3 & -4 \\ 0 & -3 & 7 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - 3R_2]{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & -8 & -24 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - 4R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix}$$

Ahora determinaremos  $L$ ,

$$E_{43}(-4)E_{42}(-3)E_{32}(-1)E_{41}(-1)E_{31}(-2)A = U$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

8. Encuentre la descomposición LU de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix},$$

y luego úsela para encontrar la solución del sistema  $Ax = b$ , donde

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

### RESPUESTA

El problema anterior se resolvió utilizando la metodología vista en clase. Ahora se hará uso de un método más sencillo(). Si  $A = LU$ , si sabe que  $A$  se puede factorizar como:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & c & 1 & 0 \\ d & e & f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & u & v & w \\ 0 & 0 & x & y \\ 0 & 0 & 0 & z \end{pmatrix} = LU$$

Observe que el primer renglón de  $U$  es el mismo que el primer renglón de  $A$  porque al reducir  $A$  a la forma triangular, no hace falta modificar los elementos del primer renglón.

Se pueden obtener todos los coeficientes faltantes con tan sólo multiplicar las matrices. La componente 2, 1 de  $A$  es 4. De este modo, el producto escalar del segundo renglón de  $L$  y la primera columna de  $U$  es igual a 4:

$$4 = 2a \quad \text{o} \quad a = 2$$

Después se tiene:

componente 2, 2:  $7 = 6 + u \rightarrow u = 1$ .

De aquí en adelante se pueden insertar los valores que se encuentran en  $L$  y  $U$ :

|   |  |
|---|--|
| componente 2, 3: $2 = -2 + v \rightarrow v = 4$ .         | componente 3, 4: $0 = -6 - 88 + y \rightarrow y = 94$ .        |
| componente 2, 4: $1 = 12 + w \rightarrow w = -11$ .       | componente 4, 1: $0 = 2d \rightarrow d = 0$ .                  |
| componente 3, 1: $-2 = 2b \rightarrow b = -1$ .           | componente 4, 2: $-4 = e \rightarrow e = -4$ .                 |
| componente 3, 2: $5 = -3 + c \rightarrow c = 8$ .         | componente 4, 3: $5 = -16 - 35f \rightarrow f = -3/5$ .        |
| componente 3, 3: $-2 = +1 + 32 + x \rightarrow x = -35$ . | componente 4, 4: $2 = 44 - 3(94)/5 + z \rightarrow z = 72/5$ . |

Por lo que:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -3/5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & -11 \\ 0 & 0 & -35 & 94 \\ 0 & 0 & 0 & 72/5 \end{pmatrix} = LU$$

Ahora, para resolver un sistema lineal  $Ax = b$  cuando  $A = LU$  se resuelven dos sistemas triangulares  $Ly = b$  y  $Ux = y$ . Primero se una sustitución hacia adelante en  $Ly = b$ , y luego se resuelve el sistema  $Ux = y$  usando sustitución hacia atrás (esta metodología se presento en clase). Entonces para este problema tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -3/5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Esto implica que

$$y_1 = 1$$

$$2(1) + y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = -2$$

$$-(1) + 8(-2) + y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = 17$$

$$0 - 4(-2) - 3(17)/5 + y_4 = 0 \Rightarrow y_4 = 17$$

Sea acaba de realizar la sustitución hacia adelante. Ahora, de  $Ux = y$  se obtiene:

La solución es:

9. Encuentre la descomposición LU de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 3 & -9 & 0 & -9 \\ -1 & 2 & 4 & 7 \\ -3 & -6 & 26 & 2 \end{pmatrix},$$

Usando esta misma descomposición como ayuda, encuentre  $A^{-1}$ .

## RESPUESTA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 3 & -9 & 0 & -9 \\ -1 & 2 & 4 & 7 \\ -3 & -6 & 26 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = LU$$

Recordando las propiedades de la inversa de una matriz:

$$A^{-1} = (LU)^{-1} = U^{-1}L^{-1}$$

10. Encuentre la descomposición LU de la matriz por bandas

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix},$$

(Para una interesante aplicación de matrices por bandas a problemas de flujo de calor en física y la importancia de obtener su descomposición LU, ver problemas 31 y 32 de Linear Algebra, D. Lay, 4th ed., p. 131 y las explicaciones que ahí se dan.)

## RESPUESTA

Considerando la metodología del inciso 9. Si  $A = LU$ , se sabe que  $A$  se puede factorizar como:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & c & 1 & 0 \\ d & e & f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & u & v & w \\ 0 & 0 & x & y \\ 0 & 0 & 0 & z \end{pmatrix} = LU$$

Observe que el primer renglón de  $U$  es el mismo que el primer renglón de  $A$  porque al reducir  $A$  a la forma triangular, no hace falta modificar los elementos del primer renglón.

Se pueden obtener todos los coeficientes faltantes con tan sólo multiplicar las matrices. La componente 2, 1 de  $A$  es  $a_{21}$ . De este modo, el producto escalar del segundo renglón de  $L$  y la primera columna de  $U$  es igual a  $a_{21}$ :

$$a_{21} = a_{11} \cdots a \quad \text{o} \quad a = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

Después se tiene:

$$\text{componente 2, 2: } a_{22} = a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}} + u \rightarrow u = a_{22} - a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

De aquí en adelante se pueden insertar los valores que se encuentran en  $L$  y  $U$ :

$$\text{componente 2, 3: } a_{23} = 0 + v \rightarrow v = a_{23}.$$

$$\text{componente 2, 4: } 0 = 0 + w \rightarrow w = 0.$$

$$\text{componente 3, 1: } 0 = a_{11}b \rightarrow b = 0.$$

$$\text{componente 3, 2: } a_{32} = (a_{22} - a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}})c \rightarrow c = \frac{a_{32}a_{11}}{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}}.$$

$$\text{componente 3, 3: } a_{33} = a_{23} \left( \frac{a_{32}a_{11}}{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}} \right) + x \rightarrow x = -35.$$

$$\text{componente 3, 4: } a_{34} = 0 + y \rightarrow y = a_{34}.$$

$$\text{componente 4, 1: } 0 = a_{11}d \rightarrow d = 0.$$

$$\text{componente 4, 2: } 0 = (a_{22} - a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}})e \rightarrow e = 0.$$

$$\text{componente 4, 3: } 5 = -16 - 35f \rightarrow f = -3/5.$$

$$\text{componente 4, 4: } 2 = 44 - 3(94)/5 + z \rightarrow z = 72/5.$$

Por lo que:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a_{32}a_{11}}{a_{22}a_{11}-a_{12}a_{21}} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} - a_{12} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}} & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & x & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & z \end{pmatrix} = LU$$