

4. Para el siguiente ejercicio es necesario el programa R.

- a. Escriba un programa en R que reproduzca las gráficas de las funciones de distribución acumulada y de masa de la distribución uniforme que aparecen en las notas del curso. Las gráficas deben verse similares a las figuras de la Figura 1.


## RESPUESTA

Cargamos los paquetes:

```
library(tidyverse)
library(gridExtra)

grafica_pdf_and_cdf_uniforme <- function(n){
  data_uniforme <- data_frame(x=seq(1:n)) %>%
    mutate("f_x"=1/n,
           "F_x"= cumsum(f_x))
  data_uniforme[n,]<-c(0,NaN,0)
  cdf <- ggplot(data=data_uniforme)+
    geom_segment(aes(x=x, xend=x+1, y=F_x, yend=F_x))+
    labs(y="F(x)",title="CDF Unifrome Discreta" )+
    ylim(0,1)
  pdf <- ggplot(data=data_uniforme)+
    geom_point(aes(x,f_x))+
    geom_segment(aes(x=x, xend=x, y=0, yend=f_x))+
    labs(x="x", y="f(x)",title = "PDF Unifrome Discreta")
  grid.arrange(pdf, cdf, ncol=2)
}

grafica_pdf_and_cdf_uniforme(10)
```



- b. Lea en la documentación de R, o en cualquier otra fuente de información confiable, la explicación de la función `sample(x, size, replace=FALSE, prob=NULL)`. (No es necesario entregar algo para este ejercicio).
- c. Usando la función `sample` simule una muestra de tamaño 10 000 de la distribución  $U(1, \dots, 10)$ . Fijando la semilla en 13 (`set.seed(13)`), muestre los resultados de la simulación en una tabla de frecuencia y calcule la media y la varianza. Sugerencia: Use la función `table`.

## RESPUESTA

```
set.seed(13) # fijamos la semilla.
muestra <- sample(10, 10000, replace = TRUE) # Muestra aleatoria.
table(muestra) # Tabla de Frecuencias
```

```
## muestra
##      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10
## 1015 1001  962 1013 1020  982  991  926 1069 1021
```

```
mean(muestra) # Media de la muestra simulada.
```

```
## [1] 5.5123
```

```
var(muestra) # Varianza de la muestra simulada.
```

```
## [1] 8.340283
```


- d. Grafique las frecuencias de la simulación anterior.

```
ggplot(data=data.frame(x=muestra), aes(x))+
  geom_bar(bins = 10, fill="blue")+
```

```
scale_x_discrete(limits = seq(1,10,1))+
labs(title="Grafica de frecuencias.", y="conteos")
```

```
## Warning: Ignoring unknown parameters: bins
```

Grafica de frecuencias.



5. Para el siguiente ejercicio también necesitamos R.

- a. Usando la función `sample`, simule 10 lanzamientos de una moneda equilibrada y cuente el número de águilas que obtiene. Repita este proceso  $10^6$  veces y muestre sus primeros 3 resultados. Grafique las frecuencias del número de águilas obtenidas en los  $10^6$  experimentos. También grafique las proporciones del número de águilas obtenidas.

## RESPUESTA

Consideremos, 1: obtener una aguilá, 0: obtener sol.

```
resultados_modena <- c(0,1)
sum(sample(resultados_modena, 10, replace = TRUE))
```

```
## [1] 6
```

Ahora repetimos el proceso  $10^6$  veces.

```
simulacion_moneda_equilibrada <- c() # Inicializamos un vector
for(i in 1:10**6) { # Creamos un ciclo para crear las repeticiones.
  simulacion_moneda_equilibrada[i] <- sum(sample(resultados_modena, 10, replace = TRUE))
}
# Mostramos los primeros 3 resultados.
```

```
simulacion_moneda_equilibrada[1:3]
```


```
## [1] 3 6 4
```

Graficamos las frecuencias del número de aguilas obtenidas en cada uno de los experimentos.

```
ggplot(data=data.frame(x=simulacion_moneda_equilibrada), aes(x))+  
  geom_bar(bins = 11, binwidth=.5, fill="blue")+  
  scale_x_discrete(limits=seq(0,10,1))+  
  labs(y="conteos", title="Grafica de frecuencias del experimento")
```


```
## Warning: `geom_bar()` no longer has a `binwidth` parameter. Please use  
## `geom_histogram()` instead.
```

Grafica de frecuencias del experimento



```
ggplot(data=data.frame(x=simulacion_moneda_equilibrada), aes(x))+  
  geom_histogram(bins = 11, binwidth=.5, fill="blue", aes(y=stat(count) / sum(count)))+  
  scale_x_discrete(limits=seq(0,10,1))+  
  labs(y="conteos", title="Grafica de frecuencias del experimento")
```

Grafica de frecuencias del experimento




- b. Usando la función `dbinom` grafique la función de masa de una distribución  $B(10, 0.5)$  sobre la gráfica de las proporciones que hizo en el inciso anterior.

## RESPUESTA

```
binomial<-data.frame(x=seq(0,10,1), y=dbinom(x=seq(0,10,1), size = 10,prob = 0.5))
ggplot(data=data.frame(x=simulacion_moneda_equilibrada), aes(x))+
  geom_histogram(bins = 11, binwidth=.5, fill="blue", aes(y=stat(count) / sum(count)))+
  scale_x_discrete(limits=seq(0,10,1))+
  labs(y="conteos", title="Grafica de frecuencias del experimento")+
  geom_line(data=binomial, aes(x,y))+
  geom_point(data=binomial, aes(x,y))
```

Grafica de frecuencias del experimento



c. Repita los dos incisos anteriores para una moneda desequilibrada que tiene probabilidad  $p = 0.3$  de obtener un águila cuando se lanza. ¿Qué observa?

## RESPUESTA

```
lanzamientos_moneda_desequilibrada <- c(rep(0,7),rep(1,3))
```

```
sum(sample(lanzamientos_moneda_desequilibrada, 10, replace = TRUE))
```

```
## [1] 2
```

```
simulacion_monedas_desequilibrada <- c()
```


```
for(i in 1:10**6) {
  simulacion_monedas_desequilibrada[i] <- sum(sample(lanzamientos_moneda_desequilibrada, 10, replace = TRUE))
}
```

```
simulacion_monedas_desequilibrada[1:3]
```


```
## [1] 2 3 4
```

```
frecuencias_moneda_desequilibrada <- table(simulacion_monedas_desequilibrada)
```


```
plot(frecuencias_moneda_desequilibrada)
```



```
plot(frecuencias_moneda_desequilibrada/10**6)
```



```
plot(frecuencias_moneda_desequilibrada/10**6)
par(new=TRUE)
plot(x=seq(0,10,1), y=dbinom(x=seq(0,10,1), size = 10,prob = 0.3),xlab = "", ylab = "",xlim = c(0
```



6. Una urna contiene 46 bolas grises y 49 bolas blancas. Usando la función `sample` en R, simule la extracción sin reemplazamiento de 20 de estas bolas y cuente el número de bolas grises que obtuvo. Repita este proceso  $10^6$  veces y grafique las frecuencias de bolas grises obtenidas en cada experimento. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 20 bolas de la urna 5 de ellas sean grises? También grafique la proporción de bolas grises obtenidas en los experimentos anteriores y sobre esta figura añada la correspondiente función de masa de la distribución Hipergeométrica asociada al experimento total.

## RESPUESTA


Sea 1: una bola gris, y 0: una bola blanca.

```
urna <- c(rep(1,46), rep(0,49))
sum(sample(urna, 20, replace=FALSE))

## [1] 9

frecuencias_grises <- c()
for(i in 1:10**6) {
  frecuencias_grises[i] <- sum(sample(urna, 20, replace=FALSE))
}
freq_grises <- table(frecuencias_grises)
plot(freq_grises)
```





Si  $X$  es el número de bolas grises que se obtienen en la extracción sin reemplazamiento de 20 bolas de la urna definida en el problema, entonces podemos decir que  $X \sim Hyper(n = 20, M = 46, N = 95)$ . Por lo tanto, la probabilidad de que se extraigan 5 bolas grises es:

$$f(x = 5) = \frac{\binom{46}{5} \binom{49}{15}}{\binom{95}{20}} = 0.01261935.$$

Graficamos la proporción de bolas grises:

```
proporcion_bolas <- freq_grises/10**6

plot(proporcion_bolas)
par(new=TRUE)
plot(x=seq(1,19,1), y=dhyper(x=seq(1,19,1), m = 46, n=49, k=20), xlab = "", ylab="")
```

