

Definición

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. Se dice que A es una matriz particionada o por bloques si se puede escribir como una matriz

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1q} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{p1} & A_{p2} & \dots & A_{pq} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

donde cada una de las entradas A_{ij} es a su vez una matriz de tamaño $m_i \times n_j$ y $\sum_{i=1}^p m_i = m$, $\sum_{j=1}^q n_j = n$.

Proposición

$$A^t = \begin{pmatrix} A_{11}^t & A_{21}^t & \cdots & A_{p1}^t \\ A_{12}^t & A_{22}^t & \cdots & A_{p2}^t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1q}^t & A_{2q}^t & \cdots & A_{pq}^t \end{pmatrix}_{n \times m}$$

Sumar y multiplicar matrices por bloques para que los bloques sean tratados como si fueran elementos requiere condiciones adicionales a las que ya se tienen.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 3 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & -5 \end{pmatrix}_{n \times m}$$

Sea A una matriz cuadrada de tamaño $m \times n$ y x un vector $n \times 1$.
Si A está dada por bloques columna por

$$A = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n),$$

es decir a_i es un vector columna $m \times 1$ y

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

entonces

$$\begin{aligned} Ax &= (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n \end{aligned}$$

Una combinación lineal de matrices es una suma del tipo

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_k A_k$$

donde las A_i son matrices y los α_i números reales.

Ax es una combinación lineal de las columnas de A

Análogamente sea A una matriz cuadrada de tamaño $m \times n$ y y un vector horizontal $1 \times m$. Si A está dada por bloques renglón por

$$A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix},$$

es decir u_i es un vector renglón $1 \times n$ y

$$y = (y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_m),$$

entonces

$$\begin{aligned} yA &= (y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_m) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} \\ &= y_1 u_1 + y_2 u_2 + \cdots + y_m u_m \end{aligned}$$

Luego, yA es una combinación lineal de los renglones de A .

En general, un producto matricial puede escribirse como

$$AB = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_p) = \begin{pmatrix} u_1 b_1 & u_1 b_2 & \cdots & u_1 b_p \\ u_2 b_1 & u_2 b_2 & \cdots & u_2 b_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

donde A tiene bloques de vectores renglón y B tiene bloques de vectores columna.

Si ahora A tiene bloques de vectores columna y B tiene bloques de vectores renglón, entonces el producto está dado por la suma de matrices dadas por el producto exterior

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum a_i v_i$$

Definición

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de tamaño n . La traza de A es

$$\text{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Proposición

Sean A, B matrices cuadradas de tamaño n , $\alpha \in \mathbb{R}$.

- i) $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^t)$
- ii) $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$
- iii) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$

Proposición

Sean $A_{m \times n}$, $B_{n \times m}$ matrices. Entonces $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$,

Proposición

Sean u, v vectores $m \times 1$. Entonces $\text{tr}(uv^t) = u^t v = v^t u$.

$$\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB) = \text{tr}(BCA)$$

Ejemplo

Sea A una matriz cuadrada. Encuentre una matriz cuadrada X tal que $AX - XA = I$

Definición

P es una matriz de permutación de tamaño n si se obtiene de permutar las columnas o renglones de la matriz identidad I_n .

Equivalentemente:

Definición

Una matriz de permutación de tamaño n es una matriz cuadrada tal que cada columna cada renglón contiene exactamente un 1 y 0 en los demás lados.

Si e_i es el vector canónico y

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)$$

por bloques renglón y columna respectivamente y P es una matriz de permutación, entonces

$$PA = \begin{pmatrix} e_{i1}^t \\ e_{i2}^t \\ \vdots \\ e_{im}^t \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} e_{i1}^t A \\ e_{i2}^t A \\ \vdots \\ e_{im}^t A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{i1} \\ u_{i2} \\ \vdots \\ u_{im} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AQ &= A(e_{j1} \quad e_{j2} \quad \cdots \quad e_{jn}) = (Ae_{j1} \quad Ae_{j2} \quad \cdots \quad Ae_{jn}) \\ &= (a_{j1} \quad a_{j2} \quad \cdots \quad a_{jn}) \end{aligned}$$

Definición

Una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ es triangular superior si $a_{ij} = 0$, $i > j$. A es triangular inferior si $a_{ij} = 0$, $j > i$. A es triangular si es triangular inferior o superior

Proposición

Sean A, B matrices cuadradas de tamaño n .

- i) Si A es triangular superior (inferior) entonces A^t es triangular inferior (superior).*
- ii) Si A y B son triangulares superiores (inferiores) entonces AB es triangular superior (inferior).*

Definición

Sea A una matriz cuadrada. Si existe un entero positivo k tal que $A^k = 0$, se dice que A es nilpotente.

Proposición

Sean $A_{n \times n}$ una matriz triangular con entradas diagonales cero. Entonces A es nilpotente. De hecho, $A^n = 0$.

Definición

Una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ es Hessenberg superior si $a_{ij} = 0$, $i > j + 1$. A es Hessenberg inferior si $a_{ij} = 0$, $j > i + 1$. A es Hessenberg si es Hessenberg inferior o superior.

Si H es Hessenberg superior (inferior) entonces A^t es Hessenberg inferior(superior).

Si H es Hessenberg y simétrica, se le llama tridiagonal.

Se pueden definir bidiagonal superior e inferior a partir de una tridiagonal.

Una matriz diagonal es Hessenberg.

El producto de matrices Hessenberg no necesariamente resulta del mismo tipo.

Proposición

Sean H una matriz Hessenberg superior (inferior) triangular superior (inferior). Entonces TH y HT son ambas Hessenberg superiores (inferiores).

Una matriz es sparse, si la mayoría de sus entradas son cero. Es densa si la mayoría de sus entradas es distinta de cero.

Definición

Una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ es una matriz banda si existen enteros $p_1, p_2 \geq 0$ tales que $a_{ij} = 0$ cuando $i > j + p_1$ o $j > i + p_2$. p_1 y p_2 se llaman el ancho de banda inferior y superior respectivamente; El ancho de banda de la matriz es $p_1 + p_2 + 1$

Sistema de ecuaciones lineales

Un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones y n variables es un sistema del tipo

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots = \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

Los a_{ij} son escalares fijos llamados coeficientes y las x_i son las variables. Si $m = n$ el sistema se llama cuadrado y rectangular de otra manera.

Una solución es una n -eada (s_1, \cdots, s_n) que hace que las ecuaciones sean ciertas al mismo tiempo.

Representación matricial de un sistema lineal

Todo sistema se puede representar por una ecuación matricial del tipo $Ax = b$.

La matriz de coeficientes del sistema A está dada por

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}_{m \times 1}$$

En representación matricial, una solución es un vector

$$s = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_m \end{pmatrix}$$

que satisface

$$As = b$$

Un sistema $Ax = b$ puede tener

- i) Solución única
- ii) Un número infinito de soluciones
- iii) No solución

Proposición

Si un sistema $Ax = b$ tiene más de una solución entonces tiene un número infinito de soluciones.

Definición

Un sistema $Ax = b$ es consistente si tiene al menos una solución e inconsistente si no.

Definición

Dada una matriz, una operación elemental por renglones es una de las siguientes:

- i) *Tipo I: intercambiar dos renglones de la matriz*
- ii) *Tipo II: multiplicar un renglón por un escalar distinto de cero.*
- iii) *Tipo III: reemplazar un renglón por la suma de ese renglón con el múltiplo escalar otro renglón*

Proposición

Si se aplica las mismas operaciones por renglón a A y b en el sistema $Ax = b$, la solución del sistema sigue siendo la misma.

La matriz de coeficientes aumentada del sistema está dada por

$$\left(\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)_{m \times n}$$

De esta forma aplicar operaciones por renglones a la matriz aumentada $(A|b)$ es equivalente a aplicarlas en ambos lados de la ecuación $Ax = b$.

Sea U la matriz dada por bloques renglón o columna

$$U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Una matriz U tiene forma escalonada por renglones si se cumple:

- ▶ Si el primer elemento no cero en un renglón u_i está en la posición j , entonces todas las entradas abajo de la posición i en las columnas v_1, \dots, v_j son cero.
- ▶ Si el renglón u_i es cero, entonces todos los renglones abajo de él son vectores de ceros.

Los pivotes son las primeras entradas no cero en cada renglón.

El método de Gauss o de eliminación Gaussiana consiste en llevar una matriz aumentada correspondiente a un sistema $Ax = b$ a una forma escalonada por renglones.

En una matriz cuadrada $A_{n \times n}$, correspondiente al sistema $Ax = b$, obtenemos un nuevo sistema $Ux = b'$ con matriz aumentada

$$\left(\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} & b'_1 \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} & b'_n \end{array} \right)_{n \times n}$$

Las soluciones del sistema cuadrado están dadas entonces por: 1.

$$x_n = b'_n / u_{nn}.$$

2. Recursivamente:

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right)$$

para $i = n, n-1, \dots, 2, 1$.

Si el sistema es rectangular $n > m$, el sistema reducido tendrá mas incógnitas que ecuaciones por lo que se deben seleccionar algunas variables que se llamaran básicas y las restantes serán libres.

Usualmente se escogen los pivotes como básicas y las restantes como libres. Una vez seleccionadas se hace sustitución hacia atrás y se encuentra una solución general.

Por medio de eliminación Gaussiana podemos saber si un sistema es inconsistente o no: Un sistema es inconsistente si y solo si al reducirlo se encuentra un renglón (en la matriz aumentada) del tipo $(0 \dots 0, \alpha)$

Teorema

Sea A una matriz y sean U_1 , U_2 dos formas escalonadas por renglones de A distintas (i.e. se emplearon dos sucesiones distintas de operaciones elementales). Entonces el número de pivotes de U_1 y U_2 es el mismo.

De esta manera, no importa que sucesión de operaciones elementales usemos, el número de pivotes permanece constante, y en consecuencia en las mismas posiciones. Por lo tanto el número de pivotes es un invariante de A .

El número de pivotes cuenta el número de variables básicas por lo que estás son siempre el mismo número y similarmente para las libres.

Sea U cualquier matriz en forma reducida por renglones obtenida de A , entonces:

$$\begin{aligned}\text{Número de pivotes de } A &= \text{Número de pivotes de } U \\ &= \text{Número de renglones no cero de } U \\ &= \text{Número de columnas básicas de } U\end{aligned}$$

Definición

El rango de A es el número de pivotes de A .

Una matriz E tiene forma escalonada reducida por renglones si se cumple:

- ▶ E Está en forma escalonada por renglones
- ▶ El primer elemento no cero en cada renglón es 1.
- ▶ Todas las entradas arriba de cada pivote son 0.

El método de Gauss-Jordan o de eliminación Gauss-Jordan consiste en llevar una matriz aumentada correspondiente a un sistema $Ax = b$ a una forma escalonada por renglones.

Las columnas básicas de $E_{m \times n}$ son r vectores canónicos en R^m .

Siempre podemos encontrar una matriz de permutación P tal que

$$EP = \begin{pmatrix} I_r & J \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Definición

Una matriz elemental de orden $n \times n$ es una matriz cuadrada del tipo $I_n + uv^t$ donde u, v son vectores $n \times 1$ tales que $v^t u \neq -1$.

Definición

i) Una matriz elemental de tipo I es una del tipo

$$E_{ij} = I - (e_j - e_i)(e_j - e_i)^t$$

ii) Una matriz elemental de tipo II es una del tipo

$$E_i(\alpha) = I + (\alpha - 1)e_i e_i^t$$

iii) Una matriz elemental de tipo III es una del tipo

$$E_{ij}(\beta) = I + \beta e_j e_i^t$$

con $i \neq j$

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$. Hacer una operación elemental por renglones en A es lo mismo que multiplicar A por la izquierda por la correspondiente matriz elemental.

Definición

Dada una matriz, una operación elemental por columnas es una de las siguientes:

- i) Tipo I: intercambiar dos columnas de la matriz*
- ii) Tipo II: multiplicar una columna por un escalar distinto de cero.*
- iii) Tipo III: reemplazar una columna por la suma de esa columna con el múltiplo escalar otra columna*

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$. Hacer una operación elemental por columnas en A es lo mismo que multiplicar A por la derecha por la correspondiente matriz elemental.

Proposición

Sea E una matriz elemental que multiplicada con A por la izquierda de A ejecuta una operación elemental por renglón. Entonces E^t es la matriz tal que AE^t ejecuta la operación correspondiente por columna.

Tipo I por columna: E_{ij}^t

Tipo II por columna: $E_i(\alpha)^t$

Tipo II por columna: $E_{ij}(\beta)^t$

Sistemas lineales homogéneos

Definición

Un sistema lineal $Ax = 0$ se llama un sistema lineal homogéneo

Siempre tiene la solución trivial $x = 0$ por lo que es consistente.

Dados v_1, v_2, \dots, v_n vectores, una combinación lineal es una expresión del tipo

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

donde los α_i son escalares.

La solución general de un sistema homogéneo es una combinación lineal de las soluciones particulares que se obtienen al hacer una variable libre igual a 1 y 0 en las demás, tomando las variables libres como coeficientes.

Proposición

Si A es $m \times n$ y $n > m$, entonces $Ax = 0$ tiene soluciones no triviales.

En general, si A es $m \times n$ la solución general del sistema homogéneo es

$$x = x_{f_1} h_1 + x_{f_2} h_2 + \dots + x_{f_{n-r}} h_{n-r}$$

Para el sistema $Ax = b$, la solución general es del tipo

$$x = x_p + x_h$$

donde x_h es la solución general del sistema homogéneo asociado y x_p es una solución particular que se obtiene haciendo todas las variables libres igual a cero.

Definición

Sea A una matriz cuadrada $n \times n$. Se dice que A es invertible o no singular si existe una matriz B tal que $AB = I_n$, $BA = I_n$. B es una inversa de A .

Si A no es invertible se le llama singular.

Proposición

Si A es invertible, la matriz inversa es única.

La inversa de A se denota por A^{-1} .

Si una matriz es invertible, entonces la solución del sistema $Ax = b$ esta dada por $x = A^{-1}b$.

El sistema se llama sistema no singular cuando A es no singular.

Proposición

Sen A, B matrices $n \times n$. Entonces $AB = I$ si y solo si $BA = I$.

Si A es una matriz $m \times n$, una inversa izquierda de A es una matriz C , $n \times m$ tal que $CA = I_n$. Una inversa derecha es una matriz B , $m \times n$ tal que $AB = I_m$.

Una matriz rectangular puede tener inversa por un lado, pero no del otro y no tienen por que coincidir.

Proposición

Sean A una matriz $n \times n$. Entonces

- i) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- ii) $(A^{-1})^{-1} = A$
- iii) $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$

Para encontrar A^{-1} , tenemos la ecuación $AX = I$ que puede verse como un conjunto de sistemas de ecuaciones $Ax_i = e_i$ donde x_i son las columnas de X .

Luego con el método de Gauss, si es posible resolver cada uno de estos sistemas con solución x_i , encontramos la inversa de A dada por $X = (x_1 \dots x_n)$. Usando Gauss Jordan

$$L(A|I) = (LA|LI) = (I|L)$$

implica que $L = A^{-1}$

Proposición

A es invertible si y solo si el sistema homogéneo asociado solo tiene la solución $x = 0$.

Proposición

Sea $A = I_n + uv^t$ una matriz elemental. Entonces A es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = I - \frac{uv^t}{1 + v^t u}$$

Más aún, si E es elemental del tipo I, II ó III, entonces E^{-1} es elemental del mismo tipo que E.

Proposición

Sea $A \neq 0$ una matriz $m \times n$. Entonces:

- i) Existe una matriz invertible G tal que $GA = U$, donde U está en forma escalonada por renglones.
- ii) Existe una matriz invertible H tal que $HA = E$, donde E está en forma escalonada reducida por renglones.

Proposición

A es no singular si y solo si el el producto de matrices elementales de tipo I, II, ó III.

Proposition

Si $A_{n \times n}$ es triangular inferior (superior) con todas sus entradas diagonales distintas de cero, entonces es invertible y su inversa es triangular inferior (superior). Más aún, cada elemento de la diagonal de la matriz inversa es el recíproco del elemento correspondiente de A .

Proposition

El producto de dos matrices de permutación es una matriz de permutación.

Proposition

Una matriz de permutación es invertible y su inversa es su transpuesta.

Definición

Sea A una matriz $n \times n$. Se dice que A tiene una descomposición LU si se puede factorizar como $A = LU$ donde

- i) $L = (l_{ij})$ es una matriz triangular inferior tal que $l_{ii} = 1$,
 $i = 1, \dots, n$
- ii) $U = (u_{ij})$ es una matriz triangular superior tal que $u_{ii} \neq 0$,
 $i = 1, \dots, n$

L es el factor inferior y U es el factor superior.

Una matriz triangular inferior elemental está definida por

$$T_k = I_n - \tau_k \mathbf{e}_k^t$$

donde

$$\tau_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \tau_{k+1,k} \\ \vdots \\ \tau_{n,k} \end{pmatrix}$$

$$T_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & -\tau_{k+1,k} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -\tau_{n,k} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Proposición

Una matriz triangular inferior elemental T_k es invertible, su inversa también es una matriz triangular inferior elemental y está dada por

$$T_k^{-1} = I + \tau_k e_k^t$$

El efecto de multiplicar una matriz triangular inferior elemental por otra matriz es eliminar las entradas abajo del pivote k .

$$T_k^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \tau_{k+1,k} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tau_{n,k} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(k-1)} = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & a_{1,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & a_{2,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{k,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & a_{k+1,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

$$a_{k,k}^{(k-1)} \neq 0$$

$$T_k A^{(k-1)} = (I - \tau_k \mathbf{e}_k^t) A^{(k-1)} = A^{(k-1)} - \tau_k \mathbf{e}_k^t A^{(k-1)}$$

$$= \begin{pmatrix} * & * & \cdots & a_{1,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & a_{2,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{k,k}^{(k-1)} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

donde

$$\tau_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{k+1,k}^{(k-1)} / a_{k,k}^{(k-1)} \\ \vdots \\ a_{n,k}^{(k-1)} / a_{k,k}^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

Observemos que T_k no afecta las primeras $k - 1$ columnas de $A^{(k-1)}$.

Si no se requieren intercambios de renglones se pueden hacer $n - 1$ multiplicaciones por la izquierda de $A_{n \times n}$ por matrices triangulares inferiores elementales para llevar a A a una forma triangular superior, es decir:

$$T_{n-1} T_n \dots T_2 T_1 A = U$$

Luego

$$A = T_1^{-1} \dots T_{n-1}^{-1} U$$

$$\begin{aligned} T_1^{-1} \dots T_{n-1}^{-1} &= (I + \tau_1 e_1^t) \dots (I + \tau_{n-1} e_{n-1}^t) \\ &= I + \tau_1 e_1^t + \dots + \tau_{n-1} e_{n-1}^t \end{aligned}$$

usando que $e_j^t \tau_k = 0$ cuando $j < k$. Además

$$\tau_k e_k^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & \dots & \tau_{k+1,k} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \tau_{n,k} & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

Por lo tanto

$$I + \tau_1 \mathbf{e}_1^t + \dots + \tau_{n-1} \mathbf{e}_{n-1}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$A = T_1^{-1} \dots T_{n-1}^{-1} U = (I + \tau_1 \mathbf{e}_1^t + \dots + \tau_{n-1} \mathbf{e}_{n-1}^t) U = LU$$

En resumen, hemos demostrado:

Proposición

Si A es una matriz y U es la matriz que se obtiene usando eliminación Gaussiana y no se necesitaron intercambios de renglones (i.e. no aparecieron pivotes cero) entonces A tiene una descomposición LU , dada por $A = LU$ donde L se obtiene con el algoritmo anterior.

Los elementos de la diagonal de U son los pivotes de A .

Para resolver el sistema lineal $Ax = b$ cuando $A = LU$ se resuelven dos sistemas triangulares $Ly = b$ y $Ux = y$.

Primero se usa sustitución hacia adelante en $Ly = b$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$y_1 = b_1$$

$$y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j$$

$$i = 2, 3, \dots, n.$$

Luego se resuelve el sistema $Ux = y$ usando sustitución hacia atrás:

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x_n = y_n / u_{nn}$$

$$x_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_i$$

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right)$$

$$i = n-1, n-2, \dots, 1.$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 7 & 2 & 0 \\ -6 & -10 & 0 & 1 \\ 4 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Una submatriz de una matriz A es una matriz que se obtiene al eliminar renglones y columnas de A .

Si A es de tamaño $m \times n$, $I_r \subset \{1, \dots, m\}$, $I_c \subset \{1, \dots, n\}$, se denota por $A_{I_r, \cdot}$ a la matriz que se forma al dejar solo los renglones indexados por I_r y A_{\cdot, I_c} a la matriz que se forma al dejar solo las columnas indexadas por I_c .

Si A es $n \times n$, una submatriz principal si se obtiene de A eliminando los mismos renglones y columnas, i.e. $I_c = I_r$. Una submatriz principal líder se obtiene cuando es principal y $I_c = I_r = \{1, 2, \dots, k\}$, $k < n$.

Proposición

Sea A una matriz no singular. A tiene una factorización LU si y solo si todas sus submatrices principales líderes son no singulares.

Proposición

Si A una matriz no singular y $A = LU$ es una factorización LU de A , entonces L y U son únicas.

No todas la matrices no singulares tienen una descomposición LU ,
por ejemplo

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{pmatrix}$$

Sin embargo

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, podemos multiplicar una matriz A por una matriz de permutación P de tal manera que $PA = LU$.

En general esto es cierto, siempre podemos encontrar una matriz de permutación P tal que PA tiene una descomposición LU .

De manera algorítmica, supongamos que A es $n \times n$ no singular y después de k pasos se requiere un intercambio de renglones, los cuales podemos suponer son $k + i$ y $k + j$. Si E es una matriz elemental del tipo I que cambia esos renglones, tenemos:

$$\begin{aligned} ET_k \cdots T_1 A &= ET_k E^2 T_{k-1} E^2 \cdots E^2 T_1 E^2 A \\ &= (ET_k E)(ET_{k-1} E) \cdots (ET_1 E) EA \end{aligned}$$

Lema

$\tilde{T}_\ell = ET_\ell E$ es triangular inferior elemental.

Continuando este proceso

$$\tilde{T}_{n-1} \cdots \tilde{T}_1 PA = U$$

$$PA = LU$$

Proposición

Si A es no singular, entonces existe una matriz de permutación P tal que PA tiene una descomposición LU

$$PA = LU$$

donde L es triangular inferior con unos en la diagonal y U es triangular superior.

Proposición

Sea A no singular de tamaño $n \times n$. Entonces $PA = LDU$ donde P es una matriz de permutación $n \times n$, L es $n \times n$ es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal, D es $n \times n$ diagonal con elementos diagonales no cero y U es $n \times n$ es una matriz triangular superior con unos en la diagonal.

Los elementos de D son distintos de cero pues son los pivotes de A .
 L y U son únicas.

Lema

Sea A una matriz simétrica de tamaño $n \times n$ tal que $A = LDU$ donde L es triangular inferior con unos en la diagonal, U es triangular superior con con unos en la diagonal, D es diagonal con elementos diagonales no cero. Entonces $U = L^t$ y $A = LDL^t$.

Proposición

Sea A una matriz simétrica de tamaño $n \times n$ que tiene una descomposición LU con pivotes estrictamente positivos. Entonces existe una matriz triangular inferior T tal que $A = TT^t$ y los elementos diagonales de T son positivos.

Definición

Sea A una matriz simétrica de tamaño $n \times n$. Se dice que A es positiva definida si todos sus pivotes son estrictamente positivos.

La descomposición $A = TT^t$ de una matriz positiva definida se llama la descomposición de Cholesky.

Ejemplos.

1. Inversa de matrices particionadas.
2. Descomposición LDU de matrices particionadas

Definición

Sea A un conjunto. Una operación en A es una función $f : A \times A \rightarrow A$.

Definición

Sea V un conjunto. Se dice que V es un espacio vectorial sobre K ($K = \mathbb{R}$ ó \mathbb{C}) si existe una operación $+$ en V tal que

- i) $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3$ para cualesquiera $v_1, v_2, v_3 \in V$
- ii) Existe un elemento 0 en V tal que $0 + v = v + 0 = v$ para todo $v \in V$
- iii) Dado $v \in V$ existe un $u \in V$ tal que $v + u = u + v = 0$
- iv) $v_1 + v_2 = v_2 + v_1, \forall v_1, v_2 \in V$.

Definición

(cont.) Existe además una función $\cdot : K \times V \rightarrow V$ tal que

- i) $\alpha \cdot (v_1 + v_2) = \alpha \cdot v_1 + \alpha \cdot v_2$ para cualesquiera $\alpha \in K$,
 $v_1, v_2 \in V$
- ii) $(\alpha_1 + \alpha_2) \cdot v = \alpha_1 \cdot v + \alpha_2 \cdot v$ para cualesquiera $\alpha_1, \alpha_2 \in K$,
 $v \in V$
- iii) $\alpha_1 \cdot (\alpha_2 \cdot v) = (\alpha_1 \alpha_2) \cdot v$, para cualesquiera $\alpha_1, \alpha_2 \in K$, $v \in V$
- iv) $1 \cdot v = v$, $\forall v \in V$.

Ejemplo

$$V = \mathbb{R}^n.$$

Ejemplo

El espacio trivial $V = \{0\}$.

Ejemplo

$$V = M_{m \times n}(\mathbb{R}).$$

Definición

Sea V un espacio vectorial sobre K . $W \subset V$ es un subespacio de V si W es un espacio vectorial con las operaciones inducidas por V .

Proposición

Sea V un espacio vectorial sobre K , $W \subset V$, $W \neq \emptyset$. W es un subespacio de V si

- i) Si $w_1, w_2 \in W$ entonces $w_1 + w_2 \in W$
- ii) Si $w \in W$, $\alpha \in K$ entonces $\alpha w \in W$

Ejemplo

El subespacio trivial $W = \{0\}$ de un espacio V .

Ejemplo

Lineas en \mathbb{R}^2

Ejemplo

Hiperplanos en \mathbb{R}^n

Proposición

Sea V un espacio vectorial. Si W_1, W_2 son subespacios de V entonces $W_1 \cap W_2$ es subespacio de V .

La unión de subespacios no es en general un subespacio.

Definición

Sea V un espacio vectorial, W_1, W_2 subespacios de V . La suma de W_1 y W_2 es

$$W_1 + W_2 = \{v \in V \mid v = w_1 + w_2, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

Definición

Sea V un espacio vectorial, W_1, W_2 subespacios de V . Entonces $W_1 + W_2$ es un subespacio de V . De hecho, es el espacio más pequeño de V que contiene a $W_1 \cup W_2$.

Definición

Sea V un espacio vectorial y v_1, \dots, v_n vectores en V . Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son escalares, el vector

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

es una combinación lineal de v_1, \dots, v_n .

Definición

Sea V un espacio vectorial y $S \subset V$. El espacio generado por S es el conjunto

$$\text{gen}(S) = \{v \in V \mid v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n, a_i \in S, \alpha_i \in K\}$$

Proposición

Sea V un espacio vectorial y $S \subset V$, $S \neq \emptyset$. $\text{gen}(S)$ es un subespacio de V . Más aún, es el subespacio más pequeño que contiene a S .

En general, dados vectores v_1, \dots, v_n , en \mathbb{R}^m , estos pueden acomodarse para formar las columnas de una matriz A de tamaño $m \times n$. Luego, un vector b estará en $\text{gen}\{v_1, \dots, v_n\}$ si y solo si $Ax = b$ es consistente.

Definición

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. El espacio columna de A es

$$\mathcal{C}(A) = \{y \in \mathbb{R}^m \mid y = Ax \text{ para algún } x \in \mathbb{R}^n\}$$

Dicho de otra manera $\mathcal{C}(A)$ es el espacio generado por las columnas de A de donde automáticamente obtenemos que $\mathcal{C}(A)$ es subespacio de \mathbb{R}^m .

Proposición

Sean A una matriz $m \times n$ y C una matriz $m \times p$. Entonces $\mathcal{C}(C) \subset \mathcal{C}(A)$ si y solo si $C = AB$ para alguna matriz B , $n \times p$.

Cuando B es no singular $n \times n$ se cumple la igualdad $\mathcal{C}(AB) = \mathcal{C}(A)$.

Definición

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. El espacio renglón de A es

$$\mathcal{R}(A) = \{y \in \mathbb{R}^m \mid y = A^t x \text{ para algún } x \in \mathbb{R}^n\}$$

$\mathcal{R}(A) = \mathcal{C}(A^t)$ por lo que es subespacio de \mathbb{R}^m .

Proposición

Sean A una matriz $m \times n$ y C una matriz $p \times n$. Entonces $\mathcal{R}(C) \subset \mathcal{R}(A)$ si y solo si $C = BA$ para alguna matriz B , $p \times m$.

Cuando B es no singular $m \times m$ se cumple la igualdad $\mathcal{R}(BA) = \mathcal{R}(A)$.

Definición

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. El espacio nulo de A es

$$\mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$$

$$\ker(A) = \mathcal{N}(A)$$

Proposición

Sean A una matriz $m \times n$. $\mathcal{N}(A)$ es subespacio de \mathbb{R}^n .

Proposición

Sean A una matriz $m \times n$ y B una matriz $n \times p$. Entonces $\mathcal{N}(B) \subset \mathcal{N}(AB)$. Si $m = n$ y A es no singular $n \times n$ entonces se cumple la igualdad.

Proposición

- i) Sean A, B matrices con el mismo número de renglones.
Entonces

$$\mathcal{C}((A \ B)) = \mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)$$

- ii) Sean A, C matrices con el mismo número de columnas.
Entonces

$$\mathcal{R}\left(\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}\right) = \mathcal{R}(A) + \mathcal{R}(C)$$

$$\mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}\right) = \mathcal{N}(A) \cap \mathcal{N}(C)$$

Proposición

Sean A una matriz $m \times n$ con columnas a_i y B una matriz $p \times n$ con columnas b_i .

i) Si $\mathcal{N}(A) \subset \mathcal{N}(B)$ y

$$a_k = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_{k-1} a_{k-1} + \alpha_{k+1} a_{k+1} + \cdots + \alpha_n a_n$$

entonces

$$b_k = \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_{k-1} b_{k-1} + \alpha_{k+1} b_{k+1} + \cdots + \alpha_n b_n$$

ii) Si $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(B)$, entonces

$$a_k = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_{k-1} a_{k-1} + \alpha_{k+1} a_{k+1} + \cdots + \alpha_n a_n$$

si y solo si

$$b_k = \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_{k-1} b_{k-1} + \alpha_{k+1} b_{k+1} + \cdots + \alpha_n b_n$$

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$. Entonces $\mathcal{R}(A) \cap \mathcal{N}(A) = 0$

u, v en \mathbb{R}^n son ortogonales si $u \cdot v = 0$. Dos subconjuntos S_1, S_2 de \mathbb{R}^n son ortogonales si dados un vector u en S_1 y un vector v en S_2 cualesquiera, estos son ortogonales.

Proposición

$\mathcal{R}(A)$ y $\mathcal{N}(A)$ son ortogonales

Definición

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. El espacio nulo izquierdo de A es

$$\mathcal{N}(A^t) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid A^t x = 0\}$$

Proposición

$\mathcal{N}(A^t A) = \mathcal{N}(A)$ y $\mathcal{N}(A A^t) = \mathcal{N}(A^t)$.

Definición

Sea V un espacio vectorial. Sea $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$. S es linealmente independiente si

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

implica que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Si el conjunto no es linealmente independiente se dice que es linealmente dependiente.

Proposición

Sea V un espacio vectorial. Si $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ y v_j , $1 \leq j \leq n$ se puede escribir como una combinación lineal de los otros elementos de S entonces $\text{gen}(S \setminus \{v_j\}) = \text{gen}(S)$.

Proposición

Sea $S = \{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathbb{R}^m$. S es linealmente independiente si y solo si la matriz formada con los a_i como columnas tiene $\ker A = \{0\}$

Corolario

Sea $S = \{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathbb{R}^n$. S es linealmente independiente si y solo si la matriz formada con los a_i como columnas es invertible.

Proposición

Sea V un espacio vectorial y sea $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$. Si S contiene un subconjunto linealmente dependiente, entonces S es linealmente dependiente.

Proposición

Sea V un espacio vectorial y sea $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$. Si S es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto de S también es linealmente independiente.

$\{0\}$ es siempre linealmente dependiente, por lo que un conjunto linealmente independiente no puede contener a 0.

Proposición

- i) Sean A_1 una matriz $m_1 \times r$ con r columnas linealmente independientes y A_2 una matriz $m_2 \times r$. Entonces

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

tiene r columnas linealmente independientes.

- ii) Sean A_1 una matriz $r \times n_1$ con r renglones linealmente independientes y A_2 una matriz $r \times n_2$. Entonces $(A_1 \ A_2)$ tiene r renglones linealmente independientes.

Proposición

Sea V un espacio vectorial y sea $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$.

1. Si S es linealmente independiente y $v \in V$, entonces $S \cup \{v\}$ es linealmente independiente si y solo si $v \notin \text{gen}(S)$.
2. Si $v_1 \neq 0$, S es linealmente dependiente si y solo si $v_j \in \text{gen}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$ para algún $2 \leq j \leq n$.

Proposición

Sea $S = \{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathbb{R}^m$. Si $n > m$ entonces S es linealmente dependiente.

Proposición

Sea A y B matrices con el mismo número de columnas.

- 1. Si $\mathcal{N}(A) \subset \mathcal{N}(B)$ entonces para cualquier subconjunto de columnas linealmente independientes de B , las columnas correspondientes de A son linealmente independientes. En particular A tiene al menos tantas columnas linealmente independientes como tiene B .*
- 2. Si $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(B)$ entonces cualquier subconjunto de columnas de B , es linealmente independiente si y solo si las columnas correspondientes de A son linealmente independientes. En particular A y B tienen el mismo número de columnas linealmente independientes.*

Corolario

Sea A una matriz $m \times n$. Un subconjunto de columnas de A es linealmente independiente si y solo si las columnas correspondientes en las mismas posiciones de la matriz escalonada por renglones de A son linealmente independientes.

Las columnas donde están los pivotes son linealmente independientes y son las columnas básicas.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$. El número de renglones linealmente independientes de A es igual al número de sus columnas linealmente independientes.

Definición

Sea A una matriz $m \times n$. El rango de A es el número (máximo) de renglones linealmente independientes de A .

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ con r columnas linealmente independientes. Entonces existe un conjunto de $n - r$ vectores linealmente independientes que son solución del sistema homogéneo dado por A y cualquier otra solución se puede expresar como una combinación lineal de esas $n - r$ soluciones linealmente independientes.

Definición

Sea V un espacio vectorial, $W \subset V$ un subespacio. Una base de W es un subconjunto de W linealmente independiente que genera W .

Proposición

Sea V un espacio vectorial y sea $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ un subconjunto linealmente independiente. Si $v \in \text{gen}(S)$ y $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$, entonces $\alpha_i = \beta_i$, $i = 1, \dots, n$, es decir la expresión lineal de v como combinación lineal de los vectores en S es única.

Definición

Sea V un espacio vectorial y sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ una base. Si $v \in V$, las coordenadas de v respecto a \mathcal{B} son los escalares α_i , $i = 1, \dots, n$, que aparecen en

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

Proposición

Sean V un espacio vectorial, W un subespacio de V , $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ un subconjunto de W linealmente independiente y $W = \text{gen}\{w_1, \dots, w_s\}$. Entonces $s \geq r$.

Proposición

Si $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ son dos bases del mismo espacio V , entonces $\#(\mathcal{B}_1) = \#(\mathcal{B}_2)$.

Definición

Sea V un espacio vectorial. La dimensión de V es el número de vectores en cualquier base de V .

Observemos que a una base no se le pueden quitar vectores que generen el espacio ni agregar vectores para mantener los vectores linealmente independientes.

Proposición

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces son equivalentes:

- i) \mathcal{B} es una base de V .*
- ii) Ningún conjunto contenido estrictamente en \mathcal{B} puede generar V .*
- iii) Cualquier conjunto que contenga a \mathcal{B} es linealmente dependiente.*

Proposición

Sea V un espacio vectorial, $\dim V = r$, $S \subset V$. Si $V = \text{gen}(S)$, entonces existe un $\mathcal{B} \subset S$ tal que \mathcal{B} es base de V .

Proposición

Sea V un espacio vectorial, $\dim V = r$, $S \subset V$. Si S es linealmente independiente, entonces existe $\mathcal{B} \supset S$ tal que \mathcal{B} es base de V .

Proposición

1. Sea A_1 una matriz $m \times r$, $r < m$, con columnas linealmente independientes. Entonces existe una matriz A_2 $m \times (m - r)$ de tal manera que $(A_1 \ A_2)$ es no singular
2. Sea A_1 una matriz $r \times n$, $r < n$, con renglones linealmente independientes. Entonces existe una matriz A_2 $(n - r) \times n$ de tal manera que

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

es no singular

Proposición

Sea V un espacio vectorial y $W \subset V$ un subespacio. Entonces $\dim W \leq \dim V$.

Proposición

Sea V un espacio vectorial y $W \subset V$ un subespacio. Si $\dim W = \dim V$, entonces $V = W$.

Si un espacio vectorial V es de dimensión finita n y $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathcal{B}_2 = \{u_1, \dots, u_n\}$ son dos bases distintas, entonces un vector $v \in V$ tendrá distintas coordenadas dependiendo de la base usada. Es decir

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \beta_i u_i$$

Es posible encontrar una relación entre ambas coordenadas.

Proposición

Si $(v_i)_{\mathcal{B}_2}$ es el vector (en \mathbb{R}^n) de coordenadas de v_i con respecto a la base \mathcal{B}_2 , $v_{\mathcal{B}_1}$ es el vector de coordenadas de v con respecto a la base \mathcal{B}_1 y $v_{\mathcal{B}_2}$ es el vector de coordenadas de v con respecto a la base \mathcal{B}_2 , entonces existe una matrix invertible A dada por $A = ((v_1)_{\mathcal{B}_2} \cdots (v_2)_{\mathcal{B}_2})$ (es decir, tiene los vectores de coordenadas como columnas) tal que

$$v_{\mathcal{B}_2} = Av_{\mathcal{B}_1}$$

A es la matriz de cambio de coordenadas de la base \mathcal{B}_1 a la base \mathcal{B}_2 .

$$A_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}$$

Proposición

Si A es la matriz de cambio de coordenadas de la base \mathcal{B}_1 a la base \mathcal{B}_2 entonces A^{-1} es la matriz de cambio de coordenadas de la base \mathcal{B}_2 a la base \mathcal{B}_1 .

$$A_{\mathcal{B}_2 \rightarrow \mathcal{B}_1} = (A_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2})^{-1}$$

Definición

El rango de una matriz A es la dimensión del espacio columna de A .

$$\rho(A)$$

Definición

La nulidad de una matriz A es la dimensión del espacio nulo (o kernel) de A .

$$\nu(A)$$

Ejemplo

$\rho(A) = 0$ si y solo si $A = 0$.

Ejemplo

T una matriz triangular

Ejemplo

I_n

Proposición

Si $\mathcal{N}(A) \subset \mathcal{N}(B)$ entonces $\rho(A) \geq \rho(B)$. Si $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(B)$ entonces $\rho(A) = \rho(B)$

Proposición

$\rho(A)$ = número de renglones linealmente independientes de A .

Corolario

Si A es cuadrada, $\rho(A) = \rho(A^t)$

Corolario

Si A es de tamaño $m \times n$, $\rho(A) \leq \min\{m, n\}$

Proposición

Sean A y B matrices tales que AB está bien definido. Entonces $\rho(AB) \leq \rho(A)$ y $\nu(AB) \geq \nu(B)$

Proposición

$\nu(A^t A) = \nu(A)$, $\nu(AA^t) = \nu(A^t)$

Teorema

Sea A un matriz de tamaño $m \times n$. Entonces

$$\rho(A) + \nu(A) = n$$

Dos matrices con el mismo número de columnas tienen el mismo rango si y solo si tiene la misma nulidad.

$$\rho(A) = \rho(A^t A) = \rho(A^t) = \rho(AA^t).$$

$$\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{R}(A).$$

Proposición

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces $\rho(AB) \leq \min\{\rho(A), \rho(B)\}$.

Corolario

Si A es una matriz y B es una submatriz de A entonces $\rho(B) \leq \rho(A)$.

Proposición

Sean A y B matrices tales que AB está bien definido. Entonces

- i) Si $\rho(AB) = \rho(A)$ entonces $\mathcal{C}(AB) = \mathcal{C}(A)$ y $A = ABC$ para alguna matriz C
- ii) Si $\rho(AB) = \rho(B)$ entonces $\mathcal{R}(AB) = \mathcal{R}(B)$ y $B = DAB$ para alguna matriz D .

Proposición

- i) Si A es $m \times n$ y B es $n \times n$ no singular entonces $\rho(AB) = \rho(A)$ y $\mathcal{C}(AB) = \mathcal{C}(A)$.
- ii) Si A es $m \times m$ y B es $m \times p$ no singular entonces $\rho(AB) = \rho(B)$ y $\mathcal{R}(AB) = \mathcal{R}(B)$.

Proposición

Sean A , B , C y D matrices con todos los productos que están abajo bien definidos. Entonces

- i) Si $CAB = DAB$ y $\rho(AB) = \rho(A)$ entonces $CA = DA$
- ii) Si $ABC = ABD$ y $\rho(AB) = \rho(B)$ entonces $BC = DB$

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ y B una matriz $n \times p$. Entonces $\rho(AB) = \rho(B) - \dim(\mathcal{N}(A) \cap \mathcal{C}(B))$.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ y B una matriz $n \times p$. Entonces $\rho(AB) \geq \rho(A) + \rho(B) - n$.

Proposición

Sea A de tamaño $n \times n$. A es invertible si y solo si $\rho(A) = n$.

Definición

Sea A una matriz $m \times n$ con $\rho(A) \geq 1$. una descomposición (ó factorización) por rango de A es un producto $A = CR$ con C de tamaño $m \times r$ y R de tamaño $r \times n$.

Proposición

Si $A \neq 0$, entonces A tiene una descomposición por rango.

Proposición

El rango de una matriz A , $m \times n$, es el mínimo entero para el cual podemos encontrar una matriz C de tamaño $m \times r$ y R de tamaño $r \times n$ tal que $A = CR$.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ con $\rho(A) = r$. Si $A = CR$ con C de tamaño $m \times r$ y R de tamaño $r \times n$ entonces $\rho(C) = \rho(R) = r$.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ con $\rho(A) = r$. y $A = CR$ una descomposición por rango. Entonces $\mathcal{C}(A) = \mathcal{C}(C)$, $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(R)$ y $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(R)$.

Corolario

Sea A una matriz $m \times n$ con $\rho(A) = r$. y $A = CR$ una descomposición por rango. Entonces las columnas de C constituyen una base para $\mathcal{C}(A)$ y los renglones de R constituyen una base para $\mathcal{R}(A)$.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ con $\rho(A) = r \geq 1$. Entonces existen matrices de permutación P y Q de tamaños $m \times m$ y $n \times n$, respectivamente, tales que

$$PAQ = \begin{pmatrix} B & BC \\ DB & DBC \end{pmatrix}$$

donde B es de tamaño $r \times r$ no singular, C es de tamaño $r \times (n - r)$ y D es de tamaño $(m - r) \times r$.

La descomposición por rango en la práctica.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ con $\rho(A) = r \geq 1$. Entonces existen matrices no singulares P y Q de tamaños $m \times m$ y $n \times n$, respectivamente, tales que

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

La anterior se llama la forma normal de la matriz.

Definición

Sea A una matriz $n \times n$. un vector $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$ es un vector propio de A si $Ax = \lambda x$ para algún escalar λ , que en tal caso es llamado un valor propio.

Ejemplos.

λ es un valor propio de A si y solo si la ecuación

$$(A - \lambda I)x = 0$$

tiene una solución no trivial.

Definición

El espacio propio de A correspondiente a λ es

$$E_\lambda := \mathcal{N}(A - \lambda I)$$

Proposición

Si A es triangular, sus valores propios son las entradas de su diagonal principal.

Proposición

0 es un valor propio de A si y solo si A es no invertible.

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$. Si el valor propio λ_i corresponde al vector propio v_i , $i = 1, \dots, r$ y $\lambda_i \neq \lambda_j$, $i \neq j$, entonces el conjunto $\{v_1, \dots, v_r\}$ es linealmente independiente.

Definición

Sea A una matriz $n \times n$. La ecuación característica de A es

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Proposición

λ es un valor propio de A si y solo si λ satisface la ecuación característica.

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$. $p(\lambda) := \det(A - \lambda I)$ es un polinomio de grado n , llamado el polinomio característico de A .

Definición

Sean A y B matrices $n \times n$. Se dice que A es similar a B si existe una matriz invertible P tal que $A = PBP^{-1}$.

Si A es similar a B entonces B es similar a A , por lo que simplemente decimos que A y B son similares.

De hecho. similaridad es una relación de equivalencia.

Proposición

Si A y B son similares entonces tienen el mismo polinomio característico y por tanto tienen los mismos valores propios

Definición

Una matriz es diagonalizable si es similar a una matriz diagonal D .

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$. Entonces A es diagonalizable si y solo si A tiene n vectores propios linealmente independientes. De hecho, $A = PDP^{-1}$ si y solo si las columnas de P son los n vectores propios de A linealmente independientes y las entradas de la matriz diagonal D son los valores propios correspondientes a los vectores propios.

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$. Si A tiene n valores propios distintos, entonces A es diagonalizable.

Definición

Sea A una matriz $n \times n$ y λ_0 un valor propio de A . La multiplicidad algebraica de λ_0 es el número m de veces que aparece como raíz del polinomio característico, $p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m q(\lambda)$. La multiplicidad geométrica de λ_0 es $\dim E_{\lambda_0} = \dim \mathcal{N}(A - \lambda_0 I)$.

Proposición

La multiplicidad geométrica de un valor propio es menor o igual que su multiplicidad algebraica.

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$. A es diagonalizable si y solo si la multiplicidad geométrica de cada valor propio es igual a su multiplicidad algebraica; es decir si la suma de las dimensiones de los espacios propios es igual a n .

Definición

Sea V un espacio vectorial, W, U subespacios de V . Se dice que V es suma directa de W y U si $V = W + U$ y $W \cap U = \{0\}$. en cuyo caso se escribe $V = W \oplus U$.

Proposición

$V = W \oplus U$ si y solo si todo $v \in V$ se escribe de manera única como $v = w + u$ con $w \in W$ y $u \in U$.

Definición

Sea V un espacio vectorial, $W_i, i = 1, \dots, r$ subespacios de V . Se dice que V es suma directa de los subespacios W_i si todo $v \in V$ se escribe de manera única como $v = w_1 + \dots + w_r$ con $w_i \in W_i$, lo cual se escribe como $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_r$.

Proposición

A es diagonalizable si y solo

$$\mathbb{C}^n = \mathcal{N}(A - \lambda_1 I) \oplus \cdots \oplus \mathcal{N}(A - \lambda_r I)$$

donde los λ_i son todos los distintos valores propios de A.

Teoremas Espectrales

Proposición

Sea A una matriz diagonalizable $n \times n$ de rango r . Entonces existe una matriz no singular V tal que

$$A = V \begin{pmatrix} \Lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^{-1}$$

donde Λ_1 es diagonal de tamaño $r \times r$ con elementos distintos de cero en la diagonal.

Proposición

Sea A una matriz diagonalizable $n \times n$ de rango r . Entonces existen escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tales que

$$A = \lambda_1 v_1 w_1^t + \lambda_2 v_2 w_2^t + \dots + \lambda_r v_r w_r^t$$

donde los v_i, w_j son vectores en \mathbb{C}^n tales que $w_i^t v_i = 1$, $w_i^t v_j = 0$, $i \neq j$, $i, j = 1, \dots, r$.

Proposición

Sea A una matriz diagonalizable $n \times n$ de rango r . Entonces existen una matriz S de tamaño $n \times r$, una matriz W de tamaño $r \times n$ y una matriz diagonal Λ_1 , $r \times r$ tales que

$$A = S \Lambda_1 W$$

donde $WS = I_r$.

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$ con valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distintos. Entonces A es diagonalizable si y solo si existen matrices G_1, \dots, G_r distintas de cero tales que:

- i) $A = \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2 + \dots + \lambda_r G_r$
- ii) $G_i G_j = 0$ si $i \neq j$
- iii) $G_1 + G_2 + \dots + G_r = I$
- iv) G_i es el proyector de $\mathcal{N}(A - \lambda_i I)$ a lo largo de $\mathcal{C}(A - \lambda_i I)$

En el teorema anterior

$$A = \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2 + \cdots + \lambda_r G_r$$

es llamada la descomposición espectral de A .

Corolario

Sea $A = \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2 + \cdots + \lambda_r G_r$ la descomposición espectral de la matriz diagonalizable A . Entonces A^m tiene descomposición espectral

$$A^m = \lambda_1^m G_1 + \lambda_2^m G_2 + \cdots + \lambda_r^m G_r$$

Si A es diagonalizable y $A = PDP^{-1}$, entonces

$$A^k = PD^kP^{-1}$$

Definición

Sea A una matriz $n \times n$ diagonalizable. La exponencial de A es

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

$$A^0 := I$$

La exponencial de una matriz siempre existe, i.e., la serie siempre converge.

Si

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

es una matriz diagonal entonces

$$\exp(D) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

Si A es diagonalizable, $A = PDP^{-1}$, entonces

$$\exp(A) = P \exp(D) P^{-1}$$

$$\exp(A) = e^{\lambda_1} G_1 + e^{\lambda_2} G_2 + \cdots + e^{\lambda_r} G_r$$

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$. Entonces A es similar a una matriz triangular superior cuyas entradas diagonales son los valores propios de A .

Dado un polinomio $f(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots + a_mt^m$, se puede definir el polinomio matricial

$$f(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_mA^m$$

para una matriz A de tamaño $n \times n$.

Proposición

Sea A una matriz $n \times n$ y sean λ_i , $i = 1, \dots, n$ los valores propios de A (contando multiplicidades). Si $f(t)$ es un polinomio, entonces $f(\lambda_i)$, $i = 1, \dots, n$ son los valores propios de $f(A)$.

Corolario

Sea A una matriz $n \times n$. Si $f(t)$ es un polinomio tal que $f(A) = 0$ y si λ es un valor propio de A , entonces λ es una raíz de $f(t)$, i.e. $f(\lambda) = 0$.

Definición

Una matriz cuadrada A es idempotente si $A^2 = A$.

Corolario

Sea A una matriz idempotente. Entonces sus valores propios son 1 ó 0.

Corolario

Sea A una matriz singular $n \times n$. Entonces 0 es un valor propio de A y la multiplicidad geométrica de 0 respecto a A es igual a la multiplicidad geométrica de 0 respecto a A^k para cualquier entero positivo k .

Definición

Sea X un espacio vectorial sobre K . Un producto interno sobre X es una función $\langle, \rangle : X \times X \rightarrow K$ que cumple que:

- i) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
- ii) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$
- iii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
- iv) $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$

para todo $x, y, z \in X$, $\alpha \in K$ y donde $\langle x, y \rangle := \langle, \rangle(x, y)$.

Definición

Sea X un espacio vectorial. X es un espacio con producto interno si tiene un producto interno definido sobre X .

Todo producto interno define una función

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

llamada la norma de x .

Un vector es unitario si $\|x\| = 1$

Proposition (desigualdad de Schwarz)

Sea X un espacio con producto interno. Entonces

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

para cualesquiera $x, y \in X$. La igualdad se cumple si y solo si x y y son linealmente dependientes o uno de ellos es cero.

Corolario (La desigualdad del triángulo)

Sea X un espacio con producto interno. Entonces

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

para cualesquiera $x, y \in X$. La igualdad se cumple si y solo si x y y son linealmente dependientes o uno de ellos es cero.

La distancia entre dos vectores está definida por

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}.$$

Definición

Sea X un espacio con producto interno. $x, y \in X$ son ortogonales si $\langle x, y \rangle = 0$. Dos conjuntos son ortogonales si todos los elementos de uno son ortogonales con todos los elementos del otro.

$$x \perp y, x \perp A, A \perp B.$$

Proposición

x y y son ortogonales si y solo si

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

En \mathbb{R}^n , un producto interno está definido por

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j$$

donde $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$. interpretando x, y como vectores

$$\langle x, y \rangle = x \cdot y = x^t y$$

Definición

Sea V un espacio con producto interno y $W \subset V$ un subespacio.
El complemento ortogonal de W es

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0 \quad \forall w \in W\}$$

Proposición

W^\perp es un subespacio de V .

Proposición

Sea V un espacio vectorial con producto interno, W un subespacio y $S \subset V$ tal que $\text{gen}(S) = W$. Entonces $x \in W^\perp$ si y solo si $x \perp S$.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$. Entonces $\mathcal{N}(A) = \mathcal{R}(A)^\perp$ y $\mathcal{N}(A^t) = \mathcal{C}(A)^\perp$.

Proposición

Sea V un espacio con producto interno y sea $S = \{u_1, \dots, u_p\}$ un conjunto ortogonal de vectores en V distintos de cero. Entonces S es linealmente independiente.

Proposición

Sea V un espacio con producto interno y $W = \text{gen}\{u_1, \dots, u_p\}$. donde los u_j forman un conjunto ortogonal de vectores en V distintos de cero. Entonces $y \in W$ es de la forma

$$y = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_p u_p$$

donde

$$\alpha_j = \frac{\langle y, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle}$$

Teorema

Sea V un espacio con producto interno y $W \subset V$ un subespacio. Entonces cualquier $y \in V$ se puede escribir de manera única como

$$y = w + z$$

donde $w \in W$ y $z \in W^\perp$. Es decir, $V = W \oplus W^\perp$. Mas aún, si $\{u_1, \dots, u_p\}$ es una base ortogonal de W , entonces

$$w = \frac{y \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \dots + \frac{y \cdot u_p}{u_p \cdot u_p} u_p$$

$$z = y - w.$$

En la descomposición $y = w + z$, al vector w se le llama la proyección ortogonal de y sobre W , $w = \text{proy}_W y$.

Proposición

- i) $\text{proy}_W(\text{proy}_W y) = \text{proy}_W y$
- ii) Si $y \in W$, $\text{proy}_W y = y$.

Proposición

Sea V un espacio con producto interno, $W \subset V$ un subespacio, $y \in V$ y $u = \text{proy}_W y$. Entonces u es el vector en W más cercano a y , en el sentido que

$$\|y - u\| < \|y - w\|$$

para todo $w \in W$, $w \neq u$.

u es la mejor aproximación a y por elementos de W .

Proposición

Sea U una matriz $m \times n$. U tiene columnas ortonormales si y solo si $U^t U = I$.

Proposición

Sea U una matriz $m \times n$ con columnas ortonormales, $x, y \in \mathbb{R}^n$. Entonces

- i) $\|Ux\| = \|x\|$
- ii) $(Ux) \cdot (Uy) = x \cdot y$
- iii) $(Ux) \cdot (Uy) = 0 \iff x \cdot y = 0$.

Definición

Una matriz U cuadrada es ortogonal si $U^{-1} = U^t$.

Proposición

Una matriz cuadrada es ortogonal si y solo si tiene columnas ortonormales.

El teorema es cierto también para los renglones de U .

Las columnas (renglones) de una matriz ortogonal forman una base ortonormal de \mathbb{R}^n si U es de tamaño $n \times n$

Proposición

Sea V un espacio con producto interno y $W \subset V$ un subespacio.

Si $\{u_1, \dots, u_p\}$ es una base ortonormal de W , entonces dado $y \in V$

$$\text{proy}_W y = (y \cdot u_1)u_1 + \cdots (y \cdot u_p)u_p$$

y

$$\text{proy}_W y = UU^t y$$

donde $U = (u_1 \cdots u_p)$.

Si el sistema $Ax = b$ no tiene solución, i.e. es inconsistente, podríamos tratar de encontrar x tal que Ax este tan cercano a b como sea posible, la mejor aproximación a la solución.

El problema general de mínimos cuadrados es encontrar x de tal manera que la distancia $\|b - Ax\|$ sea tan pequeña como sea posible.

Definición

Sea A una matriz $m \times n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Una solución de mínimos cuadrados del sistema $Ax = b$ es un $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\|b - A\hat{x}\| \leq \|b - Ax\|$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

El vector Ax está en $\mathcal{C}(A)$. El vector en $\mathcal{C}(A)$ más cercano a b está dado por la proyección ortogonal de b sobre $\mathcal{C}(A)$, \hat{b} .

Si $A\hat{x} = \hat{b}$, entonces \hat{x} satisface

$$A^t Ax = A^t b$$

Definición

El sistema $A^t Ax = A^t b$ se llama el sistema de ecuaciones normales de $Ax = b$.

Proposición

El conjunto de soluciones de mínimos cuadrados del sistema $Ax = b$ es el conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones normales $A^t Ax = A^t b$.

Proposición

Son equivalentes

1. *La solución de mínimos cuadrados de $Ax = b$ es única*
2. *Las columnas de A son linealmente independientes*
3. *$A^t A$ es invertible.*

En cualquier caso de los anteriores

$$\hat{x} = (A^t A)^{-1} A^t b$$

En general $\|b - A\hat{x}\|$ es llamado el error de mínimos cuadrados.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ con columnas linealmente independientes y $A = QR$ su factorización QR. Entonces dado $b \in \mathbb{R}^m$, la solución de mínimos cuadrados de $Ax = b$ está dada por

$$\hat{x} = R^{-1}Q^t b$$

Regresión Lineal

El Modelo General Lineal

Mínimos cuadrados para curvas

Regresión múltiple

Mínimos cuadrados con pesos

Valor predicho de y		Valor observado de y
$\beta_0 + \beta_1 x_1$	=	y_1
$\beta_0 + \beta_1 x_2$	=	y_2
\vdots	\vdots	\vdots
$\beta_0 + \beta_1 x_n$	=	y_n

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$X\beta = y$$

Encontrar la solución de mínimos cuadrados del sistema es encontrar la mejor línea que minimiza las distancias.

Modelo Lineal

$$y = X\beta + \epsilon$$

Se trata de minimizar $\epsilon = y - X\beta$ lo cual equivale a encontrar la solución de mínimos cuadrados de

$$X\beta = y$$

La solución de mínimos cuadrados es una solución de

$$X^t X \beta = X^t y$$

Proposición

Si A es simétrica real, todos sus valores propios son reales.

Proposición

Si A es simétrica real, λ_1, λ_2 son valores propios distintos y $x_1 \in E_{\lambda_1}, x_2 \in E_{\lambda_2}$, entonces x_1 y x_2 son ortogonales.

Si A es diagonalizable, $A = PDP^{-1}$ con P ortogonal, entonces $A = PDP^t$. En tal caso diremos que A es diagonalizable ortogonalmente.

Proposición

Si A es diagonalizable ortogonalmente, entonces A es simétrica

Proposición

Si A es simétrica entonces existe una matriz ortogonal P y una matriz diagonal D tal que $A = PDP^t$.

En el caso de una matriz simétrica, la descomposición espectral toma la forma

$$A = \lambda_1 u_1 u_1^t + \lambda_2 u_2 u_2^t + \cdots \lambda_n u_n u_n^t$$

donde los u_i son los vectores de P en la descomposición $A = PDP^t$ de A .

En una matriz simétrica la multiplicidad algebraica es la misma que la multiplicidad geométrica.

Definición

Una forma cuadrática es una función $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma

$$Q(x) = x^t B x$$

donde B es una matriz $n \times n$ y x es el vector correspondiente al valor de \mathbb{R}^n .

Proposición

Dada una forma cuadrática $Q(x) = x^t B x$, siempre se puede encontrar una matriz simétrica A tal que $Q(x) = x^t A x$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Definición

Una forma cuadrática es una función $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma

$$Q(x) = x^t A x$$

donde A es una matriz simétrica $n \times n$ y x es el vector correspondiente al valor de \mathbb{R}^n .

Proposición

Si A es simétrica, entonces $x^t A x = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$ si y solo si $A = 0$.

Proposición

Si $Q(x) = x^t A x$ es una forma cuadrática, con A simétrica, entonces existe una matriz ortogonal P tal que $A = P D P^t$, haciendo el cambio de variable $y = P^{-1} x$, $y^t D y$ toma los mismos valores que Q sin tener productos cruzados.

Definición

Una forma cuadrática Q es

- i) positiva definida si $Q(x) > 0, \forall x \neq 0$*
- ii) no negativa definida si $Q(x) \geq 0, \forall x \neq 0$*
- iii) negativa definida si $Q(x) < 0, \forall x \neq 0$*
- iv) no positiva definida si $Q(x) \leq 0, \forall x \neq 0$*
- v) indefinida si asume ambos valores, i.e. no es n.n.d ni n.p.d*

Definición

Una matriz simétrica A es positiva definida, no negativa definida, negativa definida, no positiva definida o indefinida si su correspondiente forma cuadrática lo es.

Proposición

Sea A una matriz simétrica, Q su correspondiente forma simétrica. Entonces A (o la forma Q) es:

- i) *positiva definida si y solo si todos sus valores propios son positivos*
- ii) *no negativa definida si y solo si todos sus valores propios son no negativos*
- iii) *negativa definida si y solo si todos sus valores propios son negativos*
- iv) *no positiva definida si y solo si todos sus valores propios son no positivos*
- v) *indefinida si y solo si sus valores propios son negativos y positivos*

Proposición

Sea A una matriz simétrica. Entonces $m = \min\{x^t Ax \mid \|x\| = 1\}$ y $M = \max\{x^t Ax \mid \|x\| = 1\}$ están dados por el menor y mayor propio de A respectivamente. Más aún, estos valores se alcanzan cuando x es el vector propio que corresponde a m y M respectivamente.

Proposición

Sea A una matriz simétrica, u_1 el vector propio correspondiente al valor propio máximo. Entonces el máximo de $x^t Ax$ sujeta a $x^t x = 1$, $x^t u_1 = 0$ es el segundo mayor valor propio de A , que se alcanza en el correspondiente vector propio.

Proposición

Sea A una matriz simétrica, $A = PDP^{-1}$ donde D es diagonal con sus entradas ordenadas de tal manera que $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$.

Entonces el máximo de $x^t Ax$ sujeta a $x^t x = 1$, $x^t u_1 = 0, \dots, x^t u_{k-1}$ es el valor propio λ_k de A , que se alcanza en el correspondiente vector propio.

Sea A una matriz $m \times n$. Observemos que:

1. $A^t A$ es simétrica
2. Los valores propios de $A^t A$ son no negativos.

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \lambda_n \geq 0$$

Definición

Sea A una matriz $m \times n$. Los valores singulares de A son $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, $i = 1, \dots, n$.

Observación: Los valores singulares son las longitudes de los vectores Av_i para $\{v_i\}$ los vectores propios correspondientes.

Proposición

Sean $\{v_i\}$ una base ortonormal de \mathbb{R}^n de los vectores propios correspondientes a los valores propios $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \lambda_n$ de $A^t A$. Si A tiene r valores singulares diferentes de cero, entonces $\{Av_1, \dots, Av_r\}$ es una base ortogonal de $\mathcal{C}(A)$ y $\rho(A) = r$.

Teorema (La descomposición en valores singulares)

Sea A una matriz $m \times n$ de rango r . Entonces existe una matriz Σ de tamaño $m \times n$ de la forma

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donde D es una matriz diagonal $r \times r$ que tiene como entradas los primeros r valores singulares de A , $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \sigma_r > 0$ (en ese orden), y existen una matriz ortogonal U , $m \times m$ y una matriz ortogonal V , $n \times n$ tal que

$$A = U\Sigma V^t$$

La descomposición en valores singulares de una matriz no es única.

Si $r = \rho(A)$ y $A = U\Sigma V^t$,

$$U = (U_r \quad U_{m-r})$$

donde $U_r = (u_1 \cdots u_r)$, $m \times r$, está formada por las primeras r columnas,

$$V = (V_r \quad V_{n-r})$$

donde $V_r = (v_1 \cdots v_r)$, $n \times r$, entonces

$$A = (U_r \quad U_{m-r}) \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_r^t \\ V_{n-r}^t \end{pmatrix} = U_r D V_r^t$$

Esta es la descomposición en valores singulares reducida de A .

Definición

Sea A una matriz $m \times n$. La pseudoinversa, o inversa de Moore-Penrose) de A está dada por

$$A^\dagger = V_r D^{-1} U_r^t$$

donde $A = U_r D V_r^t$ es una descomposición en valores singulares reducida de A .

Considerando de nuevo el sistema $Ax = b$, sea $\hat{x} = A^\dagger b$.

Entonces

$$A\hat{x} = U_r U_r^t b$$

de donde $U_r U_r^t b$ es la proyección ortogonal de b sobre $\mathcal{C}(A)$. Por lo tanto \hat{x} es una solución de mínimos cuadrados de $Ax = b$.

Proposición

$\hat{x} = A^\dagger b$ es la solución de mínimos cuadrados de $Ax = b$ de norma mínima entre todas las soluciones de mínimos cuadrados.

Ejemplo

Principal Component Analysis o PCA

La descomposición de valores singulares reducida de una matriz A da una descomposición por rango completo de A .

La inversa de Moore-Penrose es única

Definición

Sea A una matriz $m \times n$. Una inversa izquierda de A es una matriz B , $n \times m$ tal que $BA = I_n$. Una inversa derecha de A es una matriz C , $n \times m$ tal que $AC = I_m$.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$.

- i) A tiene una inversa derecha si y solo si todos sus renglones son linealmente independientes, i.e. $\rho(A) = m$
- ii) A tiene una inversa izquierda si y solo si todas sus columnas son linealmente independientes, i.e. $\rho(A) = n$.

Proposición

Si A tiene una inversa izquierda y una inversa derecha, entonces la matriz es cuadrada, las inversas izquierda y derecha son iguales y son únicas.

Definición

Sea A una matriz $m \times n$. Una matriz G , $n \times m$, es una inversa generalizada de A si Gb es una solución del sistema $Ax = b$ para cualquier $b \in \mathcal{C}(A)$.

G también se llama pseudo-inversa y se denota por A^g

Proposición

Toda matriz tiene una inversa generalizada.

Las inversas generalizadas no son únicas.

Proposición

A tiene inversa generalizada G si y solo si $AGA = A$.

Corolario

Si G es inversa generalizada de A, entonces G^t es inversa generalizada de A^t .

Proposición

Si A es no singular $n \times n$, entonces $G = A^{-1}$ es la única inversa generalizada.

Proposición

Toda matriz simétrica tiene una inversa generalizada simétrica.

Proposición

Sea A una matriz con rango completo por columnas (renglones). Entonces, G es una inversa generalizada de A si y solo si es una inversa izquierda (derecha).

Definición

Sea A una matriz $m \times n$. Una matriz G , $n \times m$, es una inversa de Moore-Penrose de A si satisface:

1. $AGA = A$
2. $GAG = A$
3. $(AG)^t = AG$
4. $(GA)^t = GA$

Proposición

La inversa de Moore-Penrose de una matriz es única.

La inversa de Moore-Penrose se denota por A^\dagger

Proposición

1. $(A^\dagger)^t = (A^t)^\dagger$
2. $(A^\dagger)^\dagger = A$

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$ tal que $A = CR$ es una factorización por rango de A . Entonces

1. $C^\dagger = (C^t C)^{-1} C^t$
2. $R^\dagger = R^t (R R C^t)^{-1}$
3. $A^\dagger = R^\dagger C^\dagger$.

Proposición

Sea A una matriz $m \times n$. Entonces

$$\|AA^\dagger b - b\| \leq \|Ax - b\|$$

para cualesquiera x y b .

Definición

Sea A una matriz $m \times n$ y B una matriz $p \times q$. El producto de Kronecker de A y B , $A \otimes B$ es una matriz por bloques de tamaño $mp \times nq$ cuyo ij -ésimo bloque es la matriz $a_{ij}B$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.

Ejemplos

$$A \otimes B \neq B \otimes A$$

$$0 \otimes A$$

$$I \otimes A$$

A una matriz por bloques

Proposición

- i) $\alpha \otimes A = A \otimes \alpha = \alpha A$
- ii) $(\alpha A) \otimes (\beta B) = \alpha\beta(A \otimes B)$
- iii) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$
- iv) $(A + B) \otimes C = (A \otimes C) + (B \otimes C)$
- v) $A \otimes (B + C) = (A \otimes B) + (A \otimes C)$
- vi) $(A \otimes B)^t = A^t \otimes B^t$.

Proposición

$$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B) = \text{tr}(B \otimes A).$$

Proposición

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD).$$

Proposición

- i) Si A y B son no singulares , entonces $A \otimes B$ es no singular y $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$
- ii) Si A^g es inversa generalizada de A y B^g es inversa generalizada de B entonces $A^g B^g$ es inversa generalizada de $A \otimes B$
- iii) $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$.

Proposición

Sean A y B matrices cuadradas con A similar a C y B similar a D . Entonces $A \otimes B$ es similar a $C \otimes D$.

Proposición

$$\rho(A \otimes B) = \rho(A)\rho(B) = \rho(B \otimes A).$$

Proposición

Si A y B son triangulares superiores (inferiores), entonces $A \otimes B$ es triangular superior (inferior).

Proposición

Si A y B son ortogonales, entonces $A \otimes B$ es ortogonal.

Proposición

Si A y B son matrices de permutación, entonces $A \otimes B$ es matriz de permutación.

Proposición

- i) Si A y B son matrices con descomposiciones LU ,
 $P_A A = L_A U_A$, $P_B B = L_B U_B$ entonces
 $(P_A \otimes P_B)(A \otimes B) = (L_A \otimes L_B)(U_A \otimes U_B)$ es una
descomposición LU de $A \otimes B$
- ii) Si A y B son matrices no singulares con descomposiciones de
Cholesky, $A = L_A L_A^t$, $B = L_B L_B^t$ entonces
 $(A \otimes B) = (L_A \otimes L_B)(L_A \otimes L_B)^t$ es una descomposición de
Cholesky de $A \otimes B$.
- iii) Si A y B son matrices con descomposiciones QR , $A = Q_A R_A$,
 $B = Q_B R_B$ entonces $(A \otimes B) = (Q_A \otimes Q_B)(R_A \otimes R_B)$ es una
descomposición QR de $A \otimes B$.

Proposición

Sean A y B matrices con descomposiciones de valores singulares

$A = U_A \Sigma_A V_A^t$, $B = U_B \Sigma_B V_B^t$. Entonces

$$(A \otimes B) = (U_A \otimes U_B)(\Sigma \otimes \Sigma)(V_A \otimes V_B)^t$$

Proposición

Los valores propios de $A \otimes B$ son productos de valores propios de A con valores propios de B ,

Proposición

Si A es $m \times m$ y B es $p \times p$,

$$\det(A \otimes B) = \det(A)^p \det(B)^m = \det(B \otimes A).$$

Definición

Sea A una matriz $m \times n$ con bloques columna a_i , $A = (a_1 \cdots a_n)$.
La vectorización de A es el vector $mn \times 1$,

$$\text{vec}(A) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Proposición

Sean A una matriz $m \times n$, B una matriz $n \times p$, C una matriz $p \times q$. Entonces

$$\text{vec}(ABC) = (C^t \otimes A) \text{vec}(B)$$

en general se pueden considerar sistemas del tipo $(A \otimes B)x = y$.

El producto de Hadamard de dos matrices $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ de tamaño $m \times n$ es la matriz $C = (c_{ij})$ de tamaño $m \times n$ donde $c_{ij} = a_{ij}b_{ij}$ y se denota por $A \odot B$.

Se puede desarrollar de manera análoga una teoría de las propiedades de este producto.

Dada $A = (a_{ij})$ de tamaño $n \times n$ se define

$$\text{diag}(A) = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

Diferenciación de matrices

- ▶ Con respecto a un parámetro
- ▶ Con respecto a un vector
- ▶ De funciones matriciales
- ▶ Casos generales

