

CLASE 7 (PRÁCTICA 2) - ANÁLISIS 1 - CONTINUIDAD. DERIVADA DE CURVAS.


Ejercicio: Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 - (y + a)^2 & \text{si } x + 2y \leq 0 \\ \frac{xy \sin(x)}{e^y x^2 + y^2} + xy - 9 & \text{si } x + 2y > 0 \end{cases}$$

Hallar, si es posible, todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ de manera que f resulte continua en $(0, 0)$.

Solución:

Primero observamos que el dominio de f que es \mathbb{R}^2 está dividido en dos regiones, como muestra el siguiente gráfico:



Para que f resulte continua en $(0, 0)$ debe existir el límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ y además su valor debe coincidir con $f(0, 0)$.

Por un lado, sabemos que para cualquier punto (x, y) que cumple $x + 2y > 0$ tenemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy \sin(x)}{e^y x^2 + y^2} + xy - 9 \right) = -9$$

Recordar que la clase pasada vimos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy \sin(x)}{e^y x^2 + y^2} = 0$.

Por otro lado, para cualquier punto (x, y) que cumple $x + 2y \leq 0$ se tiene que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 - (y + a)^2 = -a^2.$$

Además, $f(0, 0) = -a^2$. Para que f sea continua en $(0, 0)$ debe cumplirse que $-a^2 = -9$ y por lo tanto $a = 3$ ó $a = -3$.

Observación: La existencia y coincidencia del límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ en ambas regiones delimitadas por la recta $x + 2y = 0$ garantiza la existencia de $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ y su valor coincide con lo que vale el límite en ambas regiones. Veamos esto por definición.

Supongamos que $a = 3$ (uno de los valores posibles de “ a ” donde el límite existe), entonces como

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy \sin(x)}{e^y x^2 + y^2} + xy - 9 \right) = -9 \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 - (y + 3)^2 = -9$$

en las regiones correspondientes, tenemos que para todo $\varepsilon > 0$ existen δ_1 y δ_2 tales que:

$$\text{Si } (x, y) \text{ cumple } x + 2y > 0 \text{ y } \|(x, y)\| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{xy \operatorname{sen}(x)}{e^y x^2 + y^2} + xy \right| < \varepsilon$$

y

$$\text{Si } (x, y) \text{ cumple } x + 2y \leq 0 \text{ y } \|(x, y)\| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |x^2 - (y + 3)^2 + 9| < \varepsilon.$$

Entonces si elegimos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ tenemos que

$$\|(x, y)\| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x, y) + 9| < \varepsilon,$$

es decir, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = -9$.

Ejercicio: Analizar la continuidad en \mathbb{R}^2 de la función

$$f(x, y) = \left(\sqrt{|xy|}, \frac{x}{\sqrt{x^2 + (y + 1)^2}} \right).$$

¿Es posible extender f de forma continua a todo \mathbb{R}^2 ?

Solución: Sean $f_1(x, y) = \sqrt{|xy|}$ y $f_2(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + (y + 1)^2}}$ las funciones coordenadas de f . Observamos que $\operatorname{Dom}(f) = \operatorname{Dom}(f_1) \cap \operatorname{Dom}(f_2) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, -1)\}$.

Para estudiar la continuidad de f , estudiamos la continuidad de sus funciones coordenadas. Observamos que f_1 es una función continua ya que es una composición de funciones. Por otra parte, f_2 es continua pues es un cociente de funciones continuas y el denominador no se anula en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, -1)\}$. Concluimos que f es continua en su dominio.

Ahora, estudiemos el comportamiento de f alrededor del punto $(0, -1)$. Para ello, solo es necesario analizar el límite de $f_2(x, y)$ cuando (x, y) tiende a $(0, -1)$, ya que f_1 está bien definida en dicho punto y vale $f_1(0, -1) = 0$.

Para analizar la existencia del límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,-1)} f(x, y)$ podemos hacer un cambio a coordenadas polares eligiendo

$$x = r \cos \theta \quad \text{y} \quad y + 1 = r \operatorname{sen} \theta$$

donde $r = \sqrt{x^2 + (y + 1)^2}$ y $\theta \in \mathbb{R}$. Notemos que si $(x, y) \rightarrow (0, -1)$ entonces $r \rightarrow 0^+$. Luego el límite queda de la forma:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,-1)} \frac{x}{\sqrt{x^2 + (y + 1)^2}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r \cos \theta}{r} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \cos \theta$$

como este límite depende de θ concluimos que no existe.

Como $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,-1)} f_2(x, y)$ no existe, f_2 tiene una singularidad esencial en $(0, -1)$. Por lo tanto, no es posible extender f al $(0, -1)$ de manera que resulte continua en ese punto.

Vector tangente y recta tangente a una curva:

Sea \mathcal{C} una curva parametrizada por $\alpha : (a, b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $a < b$ y $t_0 \in I$. La derivada de α en t_0 se obtiene derivando cada coordenada de α y evaluando en $t = t_0$ (siempre que existan todas las derivadas en t_0).

Observaciones:

- $\alpha(t_0)$ es la posición de una partícula que sigue la trayectoria descrita por \mathcal{C} ,
- $\alpha'(t_0)$ es la velocidad de dicha partícula en el instante t_0 ,
- La recta tangente a la curva \mathcal{C} en el punto $\alpha(t_0)$ tiene ecuación

$$L_{t_0} : \lambda \alpha'(t_0) + \alpha(t_0).$$

Ejercicio: Para las siguientes funciones, hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $\mathcal{C} = \text{Im}(\alpha)$ en el punto $\alpha(t_0)$.

a) $\alpha(t) = (e^{t-1}, e^{1-t})$, $t \in [0, 2]$, $t_0 = 1$.


b) $\alpha(t) = (2 \cos(t), \sin(t), t)$, $t \in [0, \pi]$, $t_0 = \pi/4$. (Ejercicio)

Solución: a) Para dar la ecuación de la recta tangente a \mathcal{C} en $\alpha(1)$ necesitamos calcular $\alpha(1)$ y $\alpha'(1)$. En efecto, $\alpha(1) = (e^{1-1}, e^{1-1}) = (1, 1)$ y $\alpha'(t) = (e^{t-1}, -e^{1-t})$ con lo cual $\alpha'(1) = (1, -1)$.

Luego, la recta tangente a \mathcal{C} en $\alpha(1)$ es

$$L : \lambda(1, -1) + (1, 1).$$

Con ayuda de GeoGebra podemos graficar la curva junto con la recta tangente en el punto indicado.



Ejercicio: Sea \mathcal{C} la curva dada por la intersección de las superficies

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y = 20 \quad \text{y} \quad y + z = 5.$$

Hallar una parametrización de \mathcal{C} y encontrar todos los puntos de \mathcal{C} en donde las rectas tangentes a \mathcal{C} son perpendiculares al plano $x = 1$.

Solución: Primero completamos cuadrados en la primera ecuación:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 4 - 4 + y^2 + 2y + 1 - 1 &= 20 \\ (x - 2)^2 + (y + 1)^2 &= 25 \end{aligned}$$

esta es la ecuación de un cilindro en que se puede parametrizar como

$$\alpha(t) = (5 \cos(t) + 2, 5 \sin(t) - 1, z), \quad t \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R}.$$

Ahora, si despejamos la variable z de la ecuación del plano $y + z = 5$, nos queda que

$$z = -y + 5 = -5 \sin(t) + 1 + 5 = -5 \sin(t) + 6.$$

Por lo tanto, la parametrización de la curva \mathcal{C} es

$$r(t) = (5 \cos(t) + 2, 5 \sin(t) - 1, -5 \sin(t) + 6).$$

Luego, el vector tangente a \mathcal{C} en un punto $\alpha(t)$ viene dado por

$$r'(t) = (-5 \sin(t), 5 \cos(t), -5 \cos(t)).$$

Para que este vector sea perpendicular al plano $x = 1$ debe ser paralelo a la normal al plano que está dada por $\vec{n} = (1, 0, 0)$, es decir, requerimos que la segunda y tercera coordenada de $r'(t)$ sean cero. Por lo tanto, buscamos $t \in [0, 2\pi]$ tales que $\cos(t) = 0$, estos valores son $t = \pi/2$ y $t = 3\pi/2$.

Por último, los puntos donde la recta tangente a la curva \mathcal{C} es paralela al plano $x = 1$ son $r(\pi/2) = (2, 4, 1)$ y $r(3\pi/2) = (2, -6, 11)$.