

Chapitre 2 : Ensembles de nombres

1 Ensembles usuels

Définition : Entiers

- Un nombre entier naturel est un nombre entier positif ou nul. On note l'ensemble des nombres entiers naturels \mathbb{N} .
- Un nombre entier relatif est un nombre entier positif, négatif ou nul. On note l'ensemble des nombres entiers relatifs \mathbb{Z} .

Remarque

Tout nombre entier naturel est un nombre entier relatif : on note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Définition : Nombres décimaux et rationnels

- Un nombre décimal est un nombre pouvant s'écrire $\frac{a}{10^n}$, où a est un nombre entier relatif et n est un entier naturel. On note l'ensemble des nombres décimaux \mathbb{D} .
- Un nombre rationnel est un nombre pouvant s'écrire $\frac{a}{b}$, où a est un nombre entier relatif et b est un entier naturel non nul. On note l'ensemble des nombres rationnels \mathbb{Q} .

Remarque


- Tout entier relatif est un nombre décimal.
- Tout nombre décimal est un nombre rationnel.

On note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

Définition : Nombre réel

On a deux manières de définir les nombres réels :


- Si on considère une droite graduée, l'ensemble des abscisses des points de cette droite forme l'ensemble des nombres réels.
- Alternativement, un nombre réel est un nombre qui peut s'écrire comme un entier suivi d'un nombre fini ou infini de chiffres après la virgule.



On note l'ensemble des nombres réels \mathbb{R} .

Remarque

Tout nombre rationnel est un nombre réel.
On note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.



Exemple

- Exemple d'entiers naturels : 0, 1, 2, 50, 357 892, ...
- Exemple d'entiers relatifs : -1, -76, -2689, ...
- Exemple de nombres décimaux : 0,8, -89,127, ...
- Exemple de nombres rationnels : $\frac{6}{11}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{60}{859}$, ...
- Exemple de nombres réels : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e , ...

2 Intervalles

Définition : Intervalle de \mathbb{R}

Soient a et b deux nombres réels tels que $a \leq b$.

- L'**intervalle** $[a;b]$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $x \geq a$ et $x \leq b$.
On dit que a et b sont les **bornes** de cet intervalle.
- L'**intervalle** $] - \infty; b]$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $x \leq b$.
- L'**intervalle** $[a; +\infty[$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $x \geq a$.

Pour exclure une des bornes d'un intervalle, il faut utiliser un crochet tourné vers l'extérieur. Ainsi $[a;b[$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $x \geq a$ et $x < b$.

3 Théorie des ensembles

En mathématique, on considère souvent des **ensembles** : c'est-à-dire des groupes d'objets. On dit qu'ils contiennent des **éléments**.

Exemple

- 1,2 est un ensemble, qui contient 1 et 2.

- \mathbb{N} est un ensemble, qui contient tous les nombres entiers.