

DÉFINITION La **division décimale** d'un nombre (le **dividende**) par un autre nombre non nul (le **diviseur**) est l'opération qui consiste à calculer le **quotient décimal** tel que :

$$\text{dividende} \div \text{diviseur} = \text{quotient} \quad \text{ou} \quad \text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient}$$

Exemples

• Division décimale de 17 par 2 :
 $17 \div 2 = 8,5$ ou $17 = 2 \times 8,5$

• Division décimale de 589 par 100 :
 $589 \div 100 = 5,89$ ou $589 = 100 \times 5,89$

PROPRIÉTÉ

La **division décimale** est l'opération qui permet de déterminer le **nombre manquant dans une multiplication à trou**. On effectue la division décimale du produit par le facteur connu pour déterminer le facteur inconnu.

Exemple

Le nombre manquant dans l'égalité $6 \times ? = 21$ peut être déterminé par le calcul : $21 \div 6$.

$$21 \div 6 = 3,5 \text{ donc } 6 \times 3,5 = 21$$

49 Toute multiplication de deux facteurs non nuls équivaut à deux divisions. Recopier et compléter.

a. $351 = 9 \times 39$ $351 \div \dots = \dots$
 $351 \div \dots = \dots$

b. $\dots = \dots \times \dots$ $\dots \div \dots = \dots$
 $270 \div 6 = 45$

64 Dans chaque égalité, déterminer le nombre inconnu. Écrire le calcul effectué pour trouver ce nombre.

a. $\spadesuit \times 4 = 7$

b. $12 \div \heartsuit = 5$

c. $8,4 = \diamondsuit \times 6$

d. $1,5 = \clubsuit \div 9$



85

LE DÉFI

Es-tu capable de déterminer la 100^e décimale du quotient de la division de 45 par 13 ?