

**DÉFINITION** La **division euclidienne** d'un nombre entier (le **dividende**) par un autre nombre entier non nul (le **diviseur**) est l'opération qui consiste à calculer le **quotient entier** et le **reste entier** tels que :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste} \quad \text{avec} \quad \text{reste} < \text{diviseur}$$

**Exemples**

- Division euclidienne de 17 par 2 :  
 $17 = 2 \times 8 + 1$  avec  $1 < 2$

- Division euclidienne de 589 par 100 :  
 $589 = 100 \times 5 + 89$  avec  $89 < 100$

16 Recopier et compléter par les quotients entiers, et les restes qui conviennent.

- a. Division de 7 par 2 :  $7 = 2 \times \dots + \dots$
- b. Division de 23 par 5 :  $23 = 5 \times \dots + \dots$
- c. Division de 79 par 8 :  $79 = 8 \times \dots + \dots$
- d. Division de 36 par 4 :  $36 = 4 \times \dots + \dots$
- e. Division de 45 par 6 :  $45 = 6 \times \dots + \dots$



Inutile de poser  
les opérations, utilise  
les tables de multiplications.

8 Inventer un problème en lien avec chaque égalité.

- a.  $295 \text{ élèves} = 16 \times 18 \text{ élèves} + 7 \text{ élèves}$
- b.  $354 \text{ billes} = 15 \text{ billes} \times 23 + 9 \text{ billes}$

★ 35 Hervé partage équitablement toutes les pépites de chocolat dont il dispose sur 34 cookies. Après avoir mis 9 pépites sur chaque cookie, il lui en reste 4. Combien de pépites avait-il au départ ?

