

PROPRIÉTÉ

Si on **divise** un nombre **par 10 ; par 100 ; par 1 000**, alors chaque chiffre de ce nombre prend une valeur 10 fois ; 100 fois ; 1 000 fois plus petite.

Remarque Dans les cas où le reste n'est pas égal à 0, la valeur du quotient décimal n'est pas exacte. On peut alors donner des **arrondis** de ce quotient.

Exemple

Division décimale de 16 par 7 :

$$\begin{array}{r} 16 \\ - 14 \\ \hline 20 \\ - 14 \\ \hline 60 \\ - 56 \\ \hline 40 \\ - 35 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$16 \div 7 \approx 2$$

2 est l'**arrondi à l'unité** du quotient ;

$$\text{ou } 16 \div 7 \approx 2,3$$

2,3 est l'**arrondi au dixième** du quotient ;

$$\text{ou } 16 \div 7 \approx 2,29$$

2,29 est l'**arrondi au centième** du quotient.

Le reste est différent de 0.

62 Déterminer l'arrondi des quotients au centième.

- a. $89 \div 7$ b. $3,14 \div 3$
c. $247 \div 6$ d. $6,7 \div 9$



Pour obtenir l'arrondi au centième, il faut calculer la division jusqu'au millième.

★ 67 Reproduire le tableau, puis le compléter en utilisant une calculatrice.

	Arrondi		
	à l'unité	au dixième	au centième
$75 \div 13$			
$13 \div 75$			
$6,5 \div 11$			

★ 76 Ellis hésite entre deux paquets de croquettes pour son chien.



1. Quel est le prix au kg des croquettes Happy Dog ?
2. Quel est le prix au kg des croquettes Waoufy ?
3. Quel est l'article le plus intéressant financièrement ?