


宇宙論（DDR）：一次ソース依存（距離指標で結論がどれだけ変わるか）



代表（BAO含む：最も強い制約）
SNIa+BAO (2021): $\varepsilon_0=0.013\pm0.029$ (1σ)
静的最小 $\varepsilon_0=-1$ は $|z|\approx34.93$
必要補正 ($z=1$ の目安) : $\Delta\mu\approx1.52$ mag, $\tau\approx1.4$
非棄却へ必要: $\sigma\times11.64$ (3σ 目安)

代表（BAOなし：最も緩い制約）
Clusters+SNIa (2012, non-iso): $\varepsilon_0=-0.713\pm0.263$ (1σ)
静的最小 $\varepsilon_0=-1$ は $|z|\approx1.09$
必要補正 ($z=1$ の目安) : $\Delta\mu\approx0.43$ mag, $\tau\approx0.4$

補足（BAOなしでも強く棄却する例）
SNIa+H(z) (2010): $|z|\approx25.6$
→ 『BAOを使うから棄却』に限らず、距離指標（SNe/H(z)/クラスター等）の前提が支配する点を示す。

読み方（）
同じ静的最小（ $\varepsilon_0=-1$ ）でも、一次ソース（距離指標）の採り方で棄却度が大きく動く。
次は『どの仮定（校正/共分散/進化補正/幾何モデル）が $|z|$ を支配するか』を個別に詰める。