

# Logique

Arnaud Durand et Pierre Gervais

November 25, 2016

## Contents

<b>I</b>	<b>Calcul propositionnel</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Syntaxe</b>	<b>2</b>
1.1	Raisonnements . . . . .	3
1.2	Définition alternative de $\mathcal{F}_{\mathcal{P}}$ . . . . .	3
1.2.1	Sous-formule, hauteur, arbre de décomposition . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Sémantique</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Exemples de formalisation</b>	<b>5</b>
3.1	Contraintes de compatibilité/exclusion . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Équivalence logique usuelles</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Formules normales</b>	<b>7</b>
5.1	Tables de vérité et formes normales . . . . .	8
5.2	Systèmes complets de connecteurs . . . . .	9
5.3	Mise sous forme normale . . . . .	9
<b>6</b>	<b>Formes normales complètes et bornes inférieures de FND</b>	<b>9</b>
6.1	Formules propositionnelles positives . . . . .	11
<b>II</b>	<b>La méthode de résolution</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Notion d'équisatisfaisabilité</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Méthode de résolution</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Application à certains types de formules</b>	<b>18</b>
<b>III</b>	<b>Procédure de décision pour la satisfaisabilité : DPLL</b>	<b>18</b>

## IV Compléments

21

### 10 Calcul propositionnel

21

10.1 Théorème de lecture unique . . . . . 21

## Part I

# Calcul propositionnel

## 1 Syntaxe

Le *calcul propositionnel* est un langage *inductivement* et *librement engendré* par un ensemble de règles.

C'est à dire qu'une formule ne peut pas être obtenu de deux façons différentes.

**Définition 1.** Soit  $\mathcal{P}$  un ensemble de constantes propositionnelles, on définit  $\mathcal{F}_{\mathcal{P}}$  le calcul propositionnel sur  $\mathcal{P}$  obtenu par les règles suivantes :

- si  $p \in \mathcal{P}$ , alors  $p \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$
- $\perp \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$
- si  $F \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$ , alors  $(\neg F) \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$
- si  $F, G \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$  alors  $(F \vee G), (F \wedge G), (F \rightarrow G) \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$

*Notation 1.* S'il n'y a pas d'ambiguïté, on notera  $\mathcal{F}_{\mathcal{P}} = \mathcal{F}$

**Définition 2.** Une définition alternative de  $\mathcal{F}$  est  $\mathcal{F} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n$  où

- $\mathcal{F}_0 = \mathcal{P}$
- $\mathcal{F}_{n+1} = \mathcal{F}_n \cup \{(\neg F) \mid F \in \mathcal{F}_n\} \cup \{(F \star G) \mid F, G \in \mathcal{F}_n, \star \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}\}$ , avec  $n \geq 0$

On définit la *hauteur* d'une formule  $F$  par le plus petit  $n$  tel que  $F \in \mathcal{F}_n$ .

*Remarque 1.* Ce langage est fortement parenthésé et toute formule peut être représentée par un arbre de décomposition.

**Propriété 1.** *Propriété de lecture unique*

*Pour tout  $F \in \mathcal{F}$ , un seul de ces cas est vrai :*

1.  $F \in \mathcal{P}$
2. Il existe un unique  $G \in \mathcal{F}$  tel que  $F = (\neg G)$
3. Il existe d'uniques  $G, H \in \mathcal{F}$  et  $\star \in \{\vee, \wedge, \rightarrow\}$  tels que  $F = G \star H$

*C'est-à-dire que toute formule ne peut se décomposer que d'une seule façon.*




Figure 1: Arbre de décomposition

## 1.1 Raisonnements

On démontrera généralement les propriétés s'appliquant à  $\mathcal{F}$  par induction : pour démontrer une proposition  $A$  s'appliquant à  $\mathcal{F}$ , on la démontre sur  $\mathcal{P}$  et pour tout  $(F \star G)$  et  $(\neg F)$  où on suppose que  $F, G \in \mathcal{F}$  vérifient  $A$  et  $\star \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ .

## 1.2 Définition alternative de $\mathcal{F}_{\mathcal{P}}$

Soit  $\Sigma = \mathcal{P} \cup \{(\,, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \perp\}$ ,  $\Sigma^*$  est l'ensemble des mots sur  $\Sigma$ .

*Exemple 1.*

- $F = (\wedge \neg x_1)((\in \Sigma^*$
- $F = (\neg x_1) \in \Sigma^*$

**Définition 3.**  $\mathcal{F}$  est le plus petit sous-ensemble de  $\Sigma^*$  contenant  $\mathcal{P} \cup \{\perp\}$  et **clos** par les opérations

1.  $(F, G) \mapsto (F \vee G)$
2.  $(F, G) \mapsto (F \wedge G)$

3.  $(F, G) \mapsto (F \rightarrow G)$

*Remarque 2.* On peut montrer que les deux définitions correspondent.  $\mathcal{F}$  satisfait la propriété de lecture unique (voir TD).

### 1.2.1 Sous-formule, hauteur, arbre de décomposition

**Définition 4.** Soit  $F \in \mathcal{F}$ , on définit  $\mathcal{S}(F)$  l'ensemble des *sous-formules de  $F$*  telles que

- si  $F \in \mathcal{P}$ ,  $\mathcal{S}(F) = \{F\}$
- si  $F = (\neg G)$  alors  $\mathcal{S}(F) = \{F\} \cup \mathcal{S}(G)$
- si  $F = (G \star H)$  où  $\star \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ , alors  $\mathcal{S}(F) = \{F\} \cup \mathcal{S}(G) \cup \mathcal{S}(H)$

TODO : vérifier dernier point

**Définition 5.** Soit  $F \in \mathcal{F}$  on définit la *hauteur*  $h(F)$  de  $F$  par

- $h(F) = 0$ , si  $F \in \mathcal{P}$
- si  $F = (\neg G)$ , alors  $h(F) = 1 + h(G)$
- si  $F = (G \star H)$ , alors  $h(F) = 1 + \max\{h(G), h(H)\}$

**Définition 6.** Soit  $F \in \mathcal{F}$ , l'*arbre de décomposition de  $F$*   $arb(F)$  est un graphe étiqueté défini par

1. si  $F \in \mathcal{P}$ ,  $arb(F)$  est réduit à un sommet étiqueté par  $F$ .
2. si  $F = (\neg G)$ , alors  $arb(F) = \neg - arb(G)$
3. si  $F = (G \star H)$ , alors  $arb(F) = G - \star - H$

*Notation 2.* Soit  $F$  une formule,  $var(F)$  est l'ensemble des variables de  $F$ ,  $occ(F)$  est le multi-ensemble des variables de  $F$  et  $arb(F)$  est le graphe

- dont les sommets sont  $V$
- et muni d'une fonction d'étiquetage  $\lambda : V \longrightarrow \{\neg, \perp, \vee, \wedge, \rightarrow\} \cup var(F)$ .

*Remarque 3.* Toutes les définitions sont univoques par la propriété de lecture unique.

*Remarque 4.* On définit la hauteur d'une formule par la hauteur de son arbre de décomposition, c'est-à-dire la distance maximum entre les feuilles et la racine.

*Notation 3.*

- $\top$  comme abréviation pour  $(\perp \rightarrow \perp)$
- $(p \longleftrightarrow q)$  pour  $(p \leftarrow q) \wedge (p \rightarrow q)$
- $\bigwedge_{i=1}^n A_i = (((A_1 \wedge A_2) \wedge A_3) \dots \wedge A_n)$

## 2 Sémantique

On s'intéresse à des propositions dont la valeur de vérité est soit vrai soit faux. On a besoin d'une **interprétation** (en terme de vrai ou faux) de ces constantes propositionnelles.

**Définition 7.** Une *valuation* est une fonction  $v : \mathcal{P} \longrightarrow \{0,1\}$ . Étant donné une valuation  $v$ , on définit l'*interprétation*  $\bar{v} : \mathcal{F} \longrightarrow \{0,1\}$  comme ceci

- si  $F = p \in \mathcal{P}$  alors  $\bar{v} = v(p)$
- si  $F = (\neg G) \in \mathcal{P}$  alors  $\bar{v}(F) = 1$  si et seulement si  $\bar{v}(G) = 0$
- $\bar{v}(\perp) = 0$
- $\bar{v}(F \wedge G) = 1$  si et seulement si  $\bar{v}(F) = \bar{v}(G) = 1$

On peut décrire l'interprétation d'une formule par sa *table de vérité* :

$F$	$G$	$\neg G$	$F \wedge G$	$F \rightarrow G$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1

On définit formellement la *table de vérité* par une fonction  $v : \{0,1\}^{\mathcal{P}} \longrightarrow \{0,1\}$

**Définition 8.**

- $F \in \mathcal{F}$  est dit *satisfaisable* s'il existe une valuation  $v$  de  $\mathcal{P}$  tel que  $\bar{v}(F) = 1$
- $F$  est dit *valide* si pour toute valuation  $v$  de  $\mathcal{P}$ ,  $\bar{v}(F) = 1$ , on dit aussi que  $F$  est une *tautologie*.
- $F$  et  $G$  sont dites *équivalentes*, notées  $F \equiv G$ , si pour toute valuation  $v$ ,  $\bar{v}(F) = \bar{v}(G)$
- On note  $v \models F \iff \bar{v}(F) = 1$ , c'est à dire si et seulement si  $v$  satisfait  $F$ .

*Exercice 1.* Vérifier que  $F \equiv G$  si et seulement si  $F \leftrightarrow G$  est valide.

**Proposition 1.** Pour tout  $F \in \mathcal{F}$ ,  $F$  est satisfaisable si et seulement si  $(\neg F)$  n'est pas valide.

## 3 Exemples de formalisation

### 3.1 Contraintes de compatibilité/exclusion

**Problème :** On possède  $n$  produits chimiques à ranger dans  $k \leq n$  conteneurs. Certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble dans un conteneur.

La contrainte est donnée sous la forme d'un ensemble  $\mathcal{L} \subseteq [n]$  tel que  $I = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \mathcal{L}$  si et seulement si les produits  $i_1, \dots, i_k$  ne peuvent pas être stockés ensemble.

**Enjeu :** Écrire une formule propositionnelle  $F$  telle que  $F$  est satisfaisable si le problème a une solution.

Les variables propositionnelles  $\mathcal{P} = p(i, j)$ ,  $i \leq n$ ,  $j \leq k$  sont interprétées par "le produit chimique  $i$  est dans le camion  $j$ ".

On exprime deux propositions :

- Chaque produit se trouve dans un unique conteneur :  $F = \underbrace{\left( \bigwedge_{i \leq n} \left( \bigvee_{j \leq k} p(i, j) \right) \right)}_{\text{Chaque produit } i \text{ est stocké dans au moins un camion } j} \wedge \underbrace{\left( \bigwedge_{i \leq n} \left( \bigwedge_{\substack{j, j' \leq k \\ j \neq j'}} (\neg(p(i, j) \wedge p(i, j'))) \right) \right)}_{\text{Pour chaque produit } i \text{ et chaque paire de camions } j \neq j' \text{ il est faux que } i \text{ est à la fois dans } j \text{ et } j'}$
- On respecte les incompatibilités :  $G = \underbrace{\bigwedge_{I \subseteq \mathcal{L}} \left( \bigwedge_{j \leq k} \neg \left( \bigwedge_{i \in I} p(i, j) \right) \right)}_{\substack{\text{Pour chaque ensemble } I \text{ de produits} \\ \text{ne pouvant pas être stockés ensemble} \\ \text{et pour chaque camion } j, \\ \text{aucun produit de } I \text{ n'est présent dans le camion}}}$

## 4 Équivalence logique usuelles

**Proposition 2.** *Substitution*

Soient  $H_1, \dots, H_n \in \mathcal{F}$ .

- Si  $F$  est une tautologie, la formule  $F' = F[H_1/p_1, \dots, H_n/p_n]$  est une tautologie, où  $F'$  est la formule dans laquelle on remplace chaque  $p_i$  par  $H_i$ .
- Si  $F \equiv G$  alors  $F[H_1/p_1, \dots, H_n/p_n] \equiv G[H_1/p_1, \dots, H_n/p_n]$

*Exemple 2.* Soient  $F = (p_1 \rightarrow p_1)$  et  $H = ((q_1 \wedge \neg q_3) \vee q_3)$

Si  $F$  est une tautologie, alors  $((q_1 \wedge \neg q_3) \vee q_3) \rightarrow ((q_1 \wedge \neg q_3) \vee q_3)$  est une tautologie.

*Remarque 5.* La réciproque est fausse.

**Lemme 1.** Soit  $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_n\}$ ,  $F \in \mathcal{F}$  et  $H_1, \dots, H_n \in \mathcal{F}$ .

Soit  $v$  une valuation de  $\mathcal{P}$  avec  $\forall i, v(H_i) = \delta_i$ .

Alors la valuation  $v'$  définie par  $v'(p_i) = \delta_i$  vérifie  $\bar{v}(F[H_1/p_1, \dots, H_n/p_n]) = \bar{v}'(F)$

*Preuve 1.* Démontrons le lemme par induction structurale sur  $F$ .

On notera  $F[H_1/p_1, \dots, H_n/p_n] := F[\bar{H}/\bar{p}]$

- Si  $F = \perp$ , alors  $v(\perp) = v'(\perp) = 0$ .
- Si  $F = p_1 \in \mathcal{P}$ , alors  $F' = F[H_1/p_1] = H_1$  et  $v'(p_1) = \delta_1 = v(H_1)$ .
- Si  $F = \neg G$ , par hypothèse d'induction  $v(G[\bar{H}/\bar{p}]) = v'(G)$ .  
 $v(F[\bar{H}/\bar{p}]) = 1$   
 $v(G[\bar{H}/\bar{p}]) = 1 - v'(G) = v'(F)$

- Si  $F = G_1 \wedge G_2$ , par hypothèse d'induction

$$\begin{cases} v(G_1[\overline{H}/\overline{p}]) = v'(G_1) \\ v(G_2[\overline{H}/\overline{p}]) = v'(G_2) \end{cases}$$

$$\text{or } v(F[\overline{H}/\overline{p}]) = v(G_1[\overline{H}/\overline{p}]) \cdot v(G_2[\overline{H}/\overline{p}]) = v'(G_1) \cdot v'(G_2) = v'(F)$$

- etc.

□

*Preuve 2.* Preuve de la proposition Comme  $F \equiv G$  si et seulement si  $(F \longleftrightarrow G)$  est une tautologie.

On prouve seulement la première partie de la proposition.

Supposons  $F$  une tautologie, soit  $v$  une valuation de  $\mathcal{P}$ , par le lemme précédent il existe  $v'$  telle que  $v(F[\overline{H}/\overline{p}]) = v'(F)$  comme  $F$  est une tautologie,  $v'(F) = 1$  et  $v(F[\overline{H}/\overline{p}])$  est une tautologie.

□

Par la suite, pour toutes formules propositionnelles  $A$ ,  $B$  et  $C$ , les équivalences suivantes se montreront en substituant des variables aux formules.

### Propriété 2.

- *Négation* :  $\neg\neg A \equiv A$
- *Lois de Morgan* :  $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ ,  $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ ,  $\neg(A \longrightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$
- *Associativité* :  $(A \wedge (B \wedge C)) \equiv ((A \wedge B) \wedge C)$  et  $(A \vee (B \vee C)) \equiv ((A \vee B) \vee C)$
- *Expression des connecteurs* :  $\perp \equiv (A \wedge \neg A)$  et  $\top \equiv (A \vee \neg A)$
- *Distributivité* :  $(A \vee (B \wedge C)) \equiv ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$
- *Idempotence* :  $A \vee A \equiv A$  et  $A \wedge A \equiv A$
- *Absorption* :  $(A \wedge \perp) \equiv \perp$  et  $(A \vee \top) \equiv \top$
- *Neutre* :  $(A \wedge \top) \equiv A$  et  $(A \vee \perp) \equiv A$

## 5 Formules normales

Ici  $\mathcal{P} = \{x_1, \dots, x_n\}$

### Définition 9.

- Un *littéral* est une variable ou une négation de variable.
- Une *clause* (ou *disjonction élémentaire*) est une formule  $C$  de la forme  $C = \bigvee_{i \in A} x_i \vee \bigvee_{i \in B} \neg x_i$  où  $A, B \subseteq \{1, \dots, n\}$ .
- La longueur d'une clause  $C$  notée  $|C|$  est son nombre de variables :  $|C| = |A| + |B|$ .
- Si  $|C| = 1$ ,  $C$  est une *clause unitaire*.

**Définition 10.**

- $F$  est sous *forme normale disjonctive* (FND ou DNF) si  $F$  est une disjonction de conjonctions élémentaires, c'est à dire si  $F$  est de la forme

$$F = \bigvee_{i=1}^m \left( \bigwedge_{j \in A_i} x_j \wedge \bigwedge_{j \in B_i} \neg x_j \right)$$

- $F$  est sous *forme normale conjonctive* (FNC ou CNF) si  $F$  est une conjonction de disjonctions élémentaires, c'est à dire si  $F$  est de la forme

$$F = \bigwedge_{i=1}^m \left( \bigvee_{j \in A_i} x_j \wedge \bigvee_{j \in B_i} \neg x_j \right)$$

- Si la longueur de chaque clause est bornée par  $l > 0$ , on dit que  $F$  est  $l$ -FNC (de même pour  $l$ -FND).

**Définition 11.** Soit  $F$  sous forme FNC, c'est à dire si  $F = \bigwedge_{i \in I} C_i$  où  $(C_i)_{i \in I}$  sont des clauses, la longueur  $|F|$  de  $F$  est :

$$|F| = \sum_{i \in I} |C_i|$$

*Exemple 3.*

- $F = (p \wedge q \neg r) \vee (\neg p \wedge r) \vee \neg r$  est une 3-FND.
- $F = p \vee \neg q$  est une 2-FNC à une clause et une 1-FND à deux clauses unitaires.

*Remarque 6.* Le nombre de clauses différentes possibles est borné :  $|I| \leq 2^{|\mathcal{P}|}$

## 5.1 Tables de vérité et formes normales

Soit  $v$  une valuation de  $\mathcal{P}$ , on note :

$$C_v^1 = \left( \bigwedge_{i \in A_1} x_i \right) \wedge \left( \bigwedge_{i \in B_1} \neg x_i \right)$$

$$\text{où } \forall x_i \in \mathcal{P}, \begin{cases} v(x_i) = 1 \iff i \in A \\ v(x_i) = 0 \iff i \in B \end{cases} .$$

On a  $A_1 \sqcup B_1 = \mathcal{P}$ .

**Lemme 2.** Soit  $F$  une formule,  $F$  est équivalente à la FND suivante :

$$\bigvee_{\substack{v : \mathcal{P} \longrightarrow \{0,1\} \\ \bar{v}(F)=1}} C_v^1$$

On note à présent :

$$C_v^0 = \left( \bigvee_{i \in B} x_i \right) \vee \left( \bigvee_{i \in A} \neg x_i \right)$$



**Lemme 3.** Soit  $F$  une formule,  $F$  est équivalente à la FNC suivante :

$$\bigwedge_{\substack{v : \mathcal{P} \longrightarrow \{0,1\} \\ \bar{v}(F)=0}} C_v^0$$

## 5.2 Systèmes complets de connecteurs

**Définition 12.** Un système de connecteurs est fonctionnellement complet si toute table de vérité est représentable par une formule utilisant ces seuls connecteurs.

**Corollaire 1.**  $\{\wedge, \vee, \neg\}$  est fonctionnellement complet, de même pour  $\{\wedge, \neg\}$ ,  $\{\vee, \neg\}$ ,  $\{\rightarrow, \neg\}$  et  $\{\perp, \rightarrow\}$ .

## 5.3 Mise sous forme normale

On cherche comment construire une forme normale équivalente à une formule  $F$  donnée, il faut :

- construire la table de vérité de  $F$
- en déduire une FND ou une FNC

Cette méthode est très coûteuse car elle oblige à en passer par l'examen de toutes les valuations. Une autre méthode consiste à jouer avec les équivalences pour trouver une FND ou FNC.

# 6 Formes normales complètes et bornes inférieures de FND

**Définition 13.** Soient  $F$  une formule sur  $\mathcal{P}$  et  $C$  une conjonction élémentaire.

On dit que  $C$  est *impliquant* de  $F$  (ou que  $F$  absorbe  $C$ ) si  $(C \rightarrow F)$  est valide.

*Remarque 7.*  $(C \rightarrow F)$  est valide si et seulement si :

$$\forall v : \mathcal{P} \longrightarrow \{0,1\}, (\bar{v}(C) = 1 \implies \bar{v}(F) = 1)$$

Le terme d'absorption est justifié par le fait que  $(C \rightarrow F)$  soit valide si et seulement si  $C \vee F \equiv F$ .

**Définition 14.** Soit  $C_1$  une conjonction élémentaire,  $C_1$  est un *impliquant premier* de  $F$  si :

- $C_1$  est un impliquant de  $F$
- aucun impliquant  $C_2$  de  $F$  n'absorbe  $C_1$ , c'est-à-dire : pour toute conjonction élémentaire  $C_2$ , si  $(C_2 \rightarrow F)$  est valide alors  $(C_1 \rightarrow C_2)$  n'est pas valide (c'est à dire  $C_1 \vee C_2 \not\equiv C_2$ ).

En résumé,  $C_1$  est un impliquant de  $C_2$  si et seulement si  $(C_1 \rightarrow C_2)$  est valide, si et seulement si  $(C_1 \vee C_2 \equiv C_2)$ , et si et seulement si  $C_2$  absorbe  $C_1$ .

*Exemple 4.*  $C_2 = (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3)$  est un impliquant de  $C_1 = (x_1 \wedge \neg x_2)$  car pour toute valuation  $v$ , si  $\bar{v}(C_2) = 1$ , alors  $\begin{cases} v(x_1) = 1 \\ v(x_2) = v(x_3) = 0 \end{cases}$  et donc  $\bar{v}(C_2) = 1$ .  
 $C_2$  est "plus général" que  $C_1$ .

**Lemme 4.** Soient  $C_1 = \bigwedge_{i \in A_1} x_i \wedge \bigwedge_{i \in B_1} \neg x_i$  et  $C_2 = \bigwedge_{i \in A_2} x_i \wedge \bigwedge_{i \in B_2} \neg x_i$   
 $C_1$  est un impliquant de  $C_2$  ( $C_2$  absorbe  $C_1$ ) si et seulement si  $A_2 \subseteq A_1$  et  $B_2 \subseteq B_1$ .

Exercice 2. Le démontrer.

Exemple 5.  $C_1 = x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_4$  et  $C_2 = x_1 \wedge \neg x_3$   
 $C_2$  absorbe  $C_1$ .

**Lemme 5.** Soient  $C = \bigwedge_{i \in A} l_i$  où  $(l_i)_i$  sont des littéraux et  $F$  est une formule.  
 $C$  est un impliquant premier de  $F$  si et seulement si :

- $C$  est un impliquant de  $F$
- Pour tout  $j \in A$ , on a que  $C_j = \bigwedge_{\substack{i \in A \\ i \neq j}} l_i$  n'est pas un impliquant de  $F$ .

Exercice 3. Le démontrer.

Remarque 8. Soit  $F = \bigvee_{i \in I} D_i$ , chaque  $D_i$  est un impliquant de  $F$ .

**Proposition 3.** Toute formule propositionnelle peut être mise sous forme normale disjonctive dont toutes les clauses élémentaires sont les impliquants premiers de  $F$ . Une telle FND est dite complète.

Preuve 3. Soit  $n$  le nombre de variables, à équivalence logique près il n'existe qu'un nombre fini de conjonctions élémentaire (au plus  $3^n$ ) donc d'impliquants premiers de  $F$ .

Par exemple :  $\mathcal{P} = \{x_1, x_2, x_3\}$ , chaque variable peut apparaître ou pas dans la clause.

Si elle apparaît, cela peut être positivement ou négativement.

Soient  $(D_i)_{i \leq m}$  des impliquants premiers de  $F$ .

- $F$  absorbe chacun de ses impliquants
- $F$  est équivalente à une FND :  $\bigvee_{i \in A} C_i$

donc par associativité de la disjonction :

$$F \equiv \bigvee_{i \in A} C_i \vee \bigvee_{i=1}^m D_i$$

Pour tout  $j$ , par absorption,  $\bigvee_{i \in A} C_i \vee D_j \equiv F$ .

Chaque  $C_i$  est un impliquant :

- Soit  $C_i$  est premier
- Soit  $C_i$  est absorbé par un impliquant premier  $D_j$  (c'est à dire  $C_i \vee D_j \equiv D_j$ ).

Par associativité et absorptions successives, on a :

$$F = \bigvee_{i=1}^m D_i$$

*Notation 4.* Par abus de langage, on appelle les modèles de  $F$  l'ensemble des valuations  $S_F$  satisfaisant  $F$ .

Si  $C$  est un impliquant de  $F$ ,  $S_C \subseteq S_F$  et si  $C$  est un impliquant premier de  $F$ ,  $S_C$  est maximal au sens de l'inclusion.

**Définition 15.** Soient  $F \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$ ,  $F = \bigvee_{i \in I} C_i$  et  $C_i$  des conjonctions élémentaires.

- $F$  est *première* si chaque  $C_i$  est un impliquant premier.
- $F$  est *redondante* s'il existe  $j \in I$  tel que  $F \equiv \bigvee_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} C_i$
- $F$  est *non-redondante* si pour tout  $j \in I$ ,  $F \not\equiv \bigvee_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} C_i$ .

La redondance est une généralisation de la notion d'absorption : si  $C_j$  vérifie  $F \equiv \bigvee_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} C_i$ , alors  $C_j$  est absorbée

par  $\bigvee_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} C_i$

*Exemple 6.*  $C_1 = x \wedge y$ ,  $C_2 = x \wedge \neg y$ ,  $C_3 = x$  et  $F = \bigvee_{i=1}^3 C_i$ , on a  $F \equiv \bigvee_{i=1}^2 C_i \equiv C_3$  car  $C_1$  et  $C_2$  sont des impliquants de  $C_3$ .

**Lemme 6.** Si  $F$  est complète, alors  $F$  est première, mais l'inverse n'est pas vrai si la forme complète est redondante.

Ces notions sont utiles pour caractériser des FND (de longueurs) minimales de certaines formules.

## 6.1 Formules propositionnelles positives

**Définition 16.** Soit  $\mathcal{P}$  un ensemble de variables propositionnelles, on définit l'ordre  $\leq$  sur les valuations par

$$\forall v_1, v_2 : \mathcal{P} \longrightarrow \{0, 1\}, v_1 \leq v_2 \iff \forall x \in \mathcal{P}, v_1(x) \leq v_2(x)$$

**Définition 17.** Une formule  $F$  est *positive* si pour toute valuation  $v_1, v_2$  telles que  $v_1 \leq v_2$  on a  $\overline{v_1}(F) \leq \overline{v_2}(F)$ .

**Proposition 4.** Soit  $F$  une formule, elle est positive si et seulement si tous les impliquants premiers de  $F$  sont positifs, c'est-à-dire si elle ne contient aucun littéral négatif.

*Remarque 9.* Si une formule est positive alors elle peut être écrite sans utiliser de négation.

*Preuve 4.*

**$F$  positive  $\implies F$  tous les littéraux de  $F$  sont positifs**

Soit  $F$  une formule positive, et  $C$  un impliquant premier de  $F$  contenant un littéral négatif.

$$C = \bigwedge_{i \in A} x_i \wedge \bigwedge_{i \in B} \neg x_i, B \neq \emptyset$$

$C' = \bigwedge_{i \in A} x_i$  absorbe  $C$ , or  $C$  est un impliquant premier, donc  $C$  ne peut pas être absorbé par un autre impliquant de  $F$ .

Alors  $C'$  n'est pas un impliquant de  $F$ , d'où l'existence d'une valuation  $v$  satisfaisant  $C'$  mais pas  $F$ .

Si  $\bar{v}(C') = 1$  alors  $\forall i \in 1, v(x_i) = 1$  et  $\forall i \in B, v(x_i) \in \{0, 1\}$ .

$C$  est un impliquant de  $F$  donc pour toute valuation  $v'$ , si  $\bar{v}'(C) = 1$  alors  $\bar{v}'(F) = 1$ , par exemple :

$$\begin{cases} v'(x_i) = 1, \forall i \in A \\ v'(x_i) = 0, \forall i \in B \end{cases}$$

On a donc :

$$\begin{cases} \bar{v}(F) = 0, \forall i \in A \\ \bar{v}'(F) = 1, \forall i \in B \\ v' \leq v \end{cases}$$

On sait que  $F$  est positive alors  $1 = v'(F) \leq v(F) = 0$ , contradiction.  $\checkmark$

***F tous les littéraux de F sont positifs  $\implies$  F positive***

On considère une forme (par exemple complète) de  $F$  :

$$F \equiv \bigvee_{i \in I} C_i$$

où  $(c_i)_i$  sont des impliquants premiers de  $F$ .

Par hypothèse chaque  $C_i$  est positif, on doit montrer que  $F$  est positive, c'est-à-dire que

$$\forall v, v' : (v \leq v' \implies \bar{v}(F) \leq \bar{v}'(F))$$

Soit  $v$  une valuation, on pose  $A_v = \{i | v(x_i) = 0\}$ .

Par définition, pour tout  $j$  on a

$$\bar{v}(C_j) = 0 \iff C_j \text{ ne contient que des variables de } A_v$$

Soit  $v'$  une autre valuation telle que  $v \leq v'$ , on a  $A_{v'} \subseteq A_v$ , donc  $\{C_j | \bar{v}(C_j) = 1\} \subseteq \{C_j | \bar{v}'(C_j) = 1\}$ , d'où :

$$\bar{v}(F) \leq \bar{v}'(F)$$

$\checkmark$

**Proposition 5.** *Soit  $F$  une formule positive, alors la FND complète de  $F$  est positive et non-redondante. Elle est l'unique FND première de  $F$ .*

*Remarque 10.* Il n'existe pas de forme équivalente plus courte : aucun impliquant premier n'est redondant.

*Preuve 5.* Soit  $F$  une formule positive de variables  $x_1, \dots, x_n$ .

Par les propositions précédentes, la FND complète  $\bigvee_{i \in I} C_i$  de  $F$  n'a que des impliquants premiers positifs.

Supposons par l'absurde qu'il existe  $j \in I$  telle que  $C_j$  soit superflue (que  $F$  soit redondante), c'est à dire que  $F \equiv \bigvee_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} C_i$ .

On pose  $C_j = \bigwedge_{a \in A} x_a$ , considérons la valuation  $v$  telle que  $v(x_a) = 1 \iff a \in A$ . On a  $\bar{v}(C_j) = 1$  donc  $\bar{v}(F) = 1$ .

Or  $F \equiv \bigvee_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} C_i$ , donc il existe  $i \neq j$  tel que  $\bar{v}(C_i) = 1$ .

Posons à présent  $C_i = \bigwedge_{b \in B} x_b$ , on sait que  $C_i$  et  $C_j$  sont des impliquants premiers de  $F$

Donc  $C_i$  (resp.  $C_j$ ) n'absorbe pas  $C_j$  (resp.  $C_i$ ), d'après une proposition précédente  $A \not\subseteq B$  et  $B \not\subseteq A$ , il existe alors  $b \in B$  tel que  $b \notin A$ , donc  $v(b) = 0$  et  $\bar{v}(C_i) = 0$ , ce qui est contradictoire.

## Part II

# La méthode de résolution

## 7 Notion d'équisatisfaisabilité

**Problème 1 :** Déterminer si une formule en FNC est satisfaisable

**Problème 2 :** Mettre une formule sous forme FNC en préservant l'équivalence.

Première stratégie pour le premier problème : Construire une table de vérité :  $2^n$  lignes où  $n$  est le nombre de variables.

Deuxième stratégie : Construire la FND de la formule :  $F = \bigvee_{i \in I} D_i$  avec  $D_i = p_i^1 \wedge p_i^2 \dots \wedge p_i^k$ .

$F$  est satisfaisable si et seulement s'il existe un  $i \in I$  tel que  $D_i$  soit satisfaisable, ce qui est facile à tester :  $D_i$  est satisfaisable si on n'a pour aucune variable  $p \wedge \dots \neg p$ .

On cherche seulement à savoir si une formule  $G$  est satisfaisable, on n'a pas besoin de construire une formule équivalente, on peut se contenter de construire une formule *équisatisfaisable*.


**Définition 18.**  $F \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$  et  $G \in \mathcal{F}_{\mathcal{Q}}$  sont équisatisfaisables si elles sont toutes les deux satisfaisables ou non-satisfaisables.

*Exemple 7.*  $F = x \vee y$ , avec  $\mathcal{P} = \{x, y\}$  et  $F = ((x \vee y) \leftrightarrow p) \wedge p$ , avec  $\mathcal{Q} = \{x, y, p\}$

**Proposition 6.** Soit  $F \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$ , il existe  $\mathcal{Q}$ ,  $G \in \mathcal{F}_{\mathcal{Q}}$  avec  $G = \bigwedge_{i \in I} C_i$  en FNC tels que  $F$  et  $G$  soient équisatisfaisables et

- $|\mathcal{Q}| \leq |SF(F)|$
- $|I| \leq |SF(F)| + 1$
- $\forall i \in I, |C_i| \leq 3$

Preuve 6. On le montre sur un exemple.



$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, p_3\}, \mathcal{Q} = \mathcal{P} \cup \{q_1, \dots, q_7\}$

On pose  $G \in \mathcal{F}_{\mathcal{Q}}$  avec :  $G =$

$$\begin{aligned} & (q_1 \leftrightarrow (p_1 \wedge p_2)) \\ & \wedge (q_2 \leftrightarrow q_1) \\ & \wedge (q_3 \leftrightarrow (q_2 \wedge p_3)) \\ & \wedge (q_5 \leftrightarrow \neg p_3) \\ & \wedge (q_6 \leftrightarrow (p_1 \wedge q_5)) \\ & \wedge (q_7 \leftrightarrow (q_6 \wedge q_3)) \\ & \wedge q_7 \end{aligned}$$

On transforme chaque pseudo-clause  $(q_i \leftrightarrow (q_j \vee q_k))$  en une conjonction de 3-clauses équivalentes :

$$\begin{aligned} & (q_i \leftrightarrow (q_j \vee q_k)) \\ & (q_i \rightarrow (q_j \vee q_k)) \wedge ((q_j \vee q_k) \rightarrow q_i) \\ & (\neg q_j \vee q_i) \wedge (\neg q_k \vee q_i) \wedge (\neg q_i \vee q_j \vee q_k) \end{aligned}$$

## 8 Méthode de résolution

On va montrer qu'une formule n'est pas satisfaisable, on va utiliser une méthode de réfutation.

en considérant  $p, \neg p \notin C_1 \vee C_2$ , on n'utilisera qu'une seule règle de déduction :

On notera la règle de déduction "de  $(C_1 \vee p)$  et  $(C_2 \vee \neg p)$  on déduit  $(C_1 \vee C_2)$ " par

$$\frac{(C_1 \vee p) \quad (C_2 \vee \neg p)}{C_1 \vee C_2}$$

Cette règle préserve la satisfaisabilité :

Soit  $v$  satisfaisant  $(C_1 \vee p)$  et  $(C_2 \vee \neg p)$ , alors  $\bar{v}(C_1) = 1$  ou  $\bar{v}(p) = 1$

- Si  $v$  satisfait  $C_1$  alors  $v$  satisfait  $C_1 \vee C_2$
- Si  $v$  satisfait  $p$  alors  $\bar{v}(\neg p) = 0$  et nécessairement  $\bar{C}_2 = 1$ , d'où  $\bar{v}(C_1 \vee C_2) = 1$ .

*Remarque 11.*  $(C_1 \vee p) \wedge (C_2 \vee \neg p)$  est satisfaisable si et seulement si  $(C_1 \vee p) \wedge (C_2 \vee \neg p) \wedge (C_1 \vee C_2)$

**Définition 19.**  $C_1 \vee C_2$  est appelé le *résolvant* de  $C_1 \vee p$  et  $C_2 \vee \neg p$ .

Idée : D'une formule  $\varphi = \bigwedge_{i=1}^n C_i$  et une variable  $p \in \mathcal{P}$ , on construit  $\varphi' = \varphi \wedge (C'_i \vee C'_j)$  avec  $C'_i = C_i \vee p$  et  $C'_j = C_j \vee \neg p$ , jusqu'à ce qu'on ne puisse plus appliquer la méthode ou jusqu'à ce qu'on ait produit la clause vide  $\square$  sachant que pour toute variable  $p$ , on a :

$$\frac{p \quad \neg p}{\square}$$

NB : pour toute valuation  $v$ ,  $v(\square) = 0$ .

**Définition 20.** Une preuve de réfutation par résolution de  $\varphi = \bigwedge_{i=1}^n C_i$  (avec  $\varphi$  en FNC) est une suite  $r_1, \dots, r_m$  telle que pour tout  $i \leq m$

- $r_i \in \{C_1, \dots, C_n\}$
  - $r_i$  se déduit par résolution de  $r_j$  et  $r_k$  avec  $j, k < i$
- et  $r_m = \square$

*Exemple 8.*  $\varphi = (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

1.  $r_1 : p \vee q$
2.  $r_2 : p \vee \neg q$
3.  $r_3 : \neg p \vee q$
4.  $r_4 : \neg p \vee \neg q$
5.  $r_5 : q$
6.  $r_6 : \neg q$  résolution de  $r_2$  et  $r_4$
7.  $r_7 : \square$  résolution de  $r_5$  et  $r_6$

**Définition 21.** Un système de réfutation est

- *cohérent* si toute formule réfutable n'est pas satisfaisable.
- *complet* si toute formule non satisfaisable est réfutable

**Théorème 1.** La méthode de résolution est cohérente et complète, c'est à dire pour tout formule  $\varphi$  :  
 $\varphi$  est réfutable par résolution si et seulement si elle n'est pas satisfaisable

Preuve 7.

**réfutable  $\implies$  non satisfaisable**

Il existe une preuve par réfutation  $r_1, \dots, r_m = \square$ .

On suppose par l'absurde que  $\varphi$  est satisfaisable, alors il existe une valuation  $v : \text{var}(\varphi) \longrightarrow \{0, 1\}$  satisfaisant

$\varphi$

Pour tout  $i \leq m$  :

- soit  $r_i \in \varphi$ , dans ce cas  $\bar{v}(r_i) = 1$
- soit  $r_i$  est obtenu par résolution depuis  $r_j$  et  $r_k$  avec  $j, k \leq i$ , dans ce cas  $\bar{v}(r_j) = \bar{v}(r_k) = 1$  alors  $\bar{v}(r_i) = 1$ , or  $\bar{v}(r_m) = 0$ , contradiction

✓

**non satisfaisable  $\implies$  réfutable**

On le montre par induction sur le nombre  $k$  de variables de  $\varphi$

$$\varphi = \bigwedge_{i=1}^m C_i$$

**$k = 0$**

$\varphi = \phi$  ou  $\varphi = \square$  ✓

**$k \geq 0$**

On suppose l'équivalence vraie jusqu'à un certain  $k \geq 0$

Soit  $p \in \text{var}(\varphi)$ , on regroupe les clauses contenant  $p$ , celles contenant  $\neg p$  et les autres.

$$S = \bigwedge_{i : (p \vee \neg p) \notin C_i} C_i$$

$$Res_p = \bigwedge_{\substack{C \vee p \in S \\ D \vee \neg p \in S}} (C \vee D)$$

$$\varphi_p = Res_p \wedge \overbrace{\bigwedge_{\substack{C \in S \\ p \notin C \\ \neg p \notin C}} C}^{\psi_p}$$

On utilisera le lemme suivant : si  $\varphi$  n'est pas satisfaisable alors  $\varphi_p$  n'est pas satisfaisable.

$|\text{var}(\varphi_p)| \leq |\text{var}(\varphi)| - 1 = k$  on applique l'hypothèse d'induction :  $\varphi_p$  est réfutable, or les clauses  $\varphi_p$  sont :

- soit des clauses de  $\psi_p$
- soit des clauses obtenues par résolution à partir de clauses de  $\varphi$

Donc aucune  $\varphi_p$  n'est réfutable, on peut obtenir une preuve de réfutation de  $\varphi$  à partir de celles de  $\varphi$  autrement dit : ( $\varphi_p$  est réfutable  $\implies$  un sous-ensemble  $\varphi'$  de  $\varphi$  est réfutable donc  $\varphi$  est réfutable).

✓

✓



Montrons le lemme :

*Preuve 8.* On suppose  $\varphi$  non-satisfaisable et  $\varphi_p$  satisfaisable.

Soit  $v$  satisfaisant  $\varphi_p$ , par construction de  $\varphi_p$   $p \notin \text{var}(\varphi_p)$ .

On peut étendre  $v$  en  $v_0, v_1$  telles que :

- $\forall p \neq q, v(q) = v_0(p) = v_1(q)$
- $v_0(p) = 0, v_1(p) = 1$

$\varphi$  n'est pas satisfaisable :  $\overline{v_0}(\varphi) = 0$  et  $\overline{v_1}(\varphi) = 0$

Il existe  $C \in \varphi$  telle que  $\overline{v_0}(C) = 0$  et  $D \in \varphi$  telle que  $\overline{v_1}(D) = 0$

Si  $C \in \psi_p$  alors  $C \in \varphi_p$  et donc  $\overline{v_0}(C) = 1 = \overline{v}(C)$  donc  $C \notin \psi_p, C \in \varphi_p$

De même  $D \notin \psi_p$  ( $D \in \varphi$ ), donc  $C, D \in \{E \mid E \in \varphi, p \in E \text{ ou } \neg p \in E\}$

- on suppose  $\neg p \in C$ , c'est à dire  $C = C' \vee \neg p$ , dans ce cas  $\overline{v_0}(C) = \overline{v_0}(C')$  ou  $\overline{v_0}(C) = \overline{v_0}(\neg p) = 1$ , contradiction, donc  $p \in C$

- De même  $\neg p \in D$

Donc  $C = C' \vee p, p, \neg p \notin C'$

$D = D' \vee \neg p, p, \neg p \notin D'$

Donc  $C' \vee D' \in \text{Res}_p$  et  $C' \vee D' \in \varphi_p$

$\overline{v}(C' \vee D') = 1$

or  $\overline{v_0}(C) = 0$

- $C = C' \vee p, p, \neg p \notin C'$
- $\overline{v_0}(C) = \overline{v}(C') = 0$

de même  $D = D' \vee \neg p$  et  $p, \neg p \in D'$  donc  $\overline{v_1}(D) = \overline{v}(D') = 0$ , contradiction.

La preuve donne un algorithme

$S \leftarrow \varphi$

**while**  $\text{var}(S) \neq \emptyset$  et  $\square \notin S$  **do**

choisir  $p \in \text{var}(S)$   
 $S \leftarrow S \setminus \{C \in S \mid p \in C \text{ et } \neg p \in C\}$   
 $\text{Res} \leftarrow \{C \cup P \mid C \cup \{p\} \in S \text{ et } D \cup \{\neg p\} \in S\}$   
 $S \leftarrow \text{Res} \cup \{C \in S \mid p \notin C \text{ et } \neg p \in C\}$

**end**

**if**  $\square \in S$  **then**

**return** 0

**else**

**return** 1

**end**

**Algorithm 1:** DP-Résolution (Davis-Putnam, années 60)

On en déduit un test de validité de  $\varphi$  en regardant si  $\neg\varphi$  est non-satisfaisable.

**Définition 22.** La *longueur* d'une preuve par résolution est le nombre d'étapes de résolution utilisées dans la preuve

L'algorithme DP peut être très inefficace sur des formules "très simple", par exemple le principe des tiroirs.

On note  $PHP_n$  (*pigeon hole principle*) le fait qu'il n'existe pas de fonction injective de  $[n+1]$  à  $[n]$

On note  $\neg PHP_n = \varphi \wedge \psi$  avec  $\varphi = \bigwedge_{i=1}^{n+1} p_{i,1} \vee \dots \vee p_{i,n}$  et  $\psi = \bigwedge_{j=1}^n \bigwedge_{1 \leq i < i' < n+1} \neg(p_{i,j} \wedge p_{i',j})$

**Théorème 2.** (*Haken*) Il existe un entier  $n_0$  tel que toute preuve par résolution de  $\neg PHP_n$  est de longueur au moins  $2^{n/32}$  avec  $n \geq n_0$ .

## 9 Application à certains types de formules

**Définition 23.** Soit  $C$  une clause telle que  $var(C) \subseteq \mathcal{P}$ ,  $C$  est une *clause de Horn* si  $C$  contient au plus un littéral positif.

C'est à dire qu'une clause de Horn est de la forme  $\neg p_1 \vee \neg p_2 \dots \neg p_k \vee q$ , ou encore sous la forme  $(p_1 \wedge p_2 \dots \wedge p_k) \rightarrow q$

**Définition 24.**  $\varphi$  en FNC est de Horn si toute ses clauses sont de Horn

Règle de résolution unitaire :

$$\frac{\frac{\neg p_1 \vee \dots \vee \neg p_k \vee q \quad q}{\neg p_1 \vee \dots \vee \neg p_k}}{\frac{\neg p_1 \vee \dots \vee \neg p_k \vee q \quad p_i}{\neg p_1 \vee \dots \vee \neg p_{i-1} \vee \neg p_{i+1} \dots \vee p_k \vee q}} \quad \frac{C \vee q \quad \neg q}{C}$$

Sur l'exemple du début on ne peut pas appliquer la règle de résolution unitaire  $(p \vee q, \neg p \vee q, \dots)$

*Remarque 12.* La méthode de résolution unitaire n'est pas complète pour le calcul propositionnel, c'est-à-dire qu'il existe des énoncés non-satisfaisables qui ne sont pas réfutables

**Théorème 3.** La méthode de DP-résolution unitaire est cohérente et complète pour les formules de Horn

On peut décider de la satisfaisabilité de  $\varphi$  en un nombre d'étapes linéaire en la taille de  $\varphi$ .

*Notation 5.* Pour tout formule  $\varphi$  on note

$$unit(\varphi) = \{C \in \varphi \mid |C| = 1\}$$

*Remarque 13.* Si  $\varphi$  est de Horn et  $unit(\varphi) = \emptyset$  alors  $\varphi$  est satisfaisable.

La valuation  $\forall q \in var(\varphi), v(q) = 0$  est telle que  $\bar{v}(\varphi) = 1$

## Part III

# Procédure de décision pour la satisfaisabilité : DPLL

DPLL = Davis, Putnam, Logeman et Loveland, 1962

1. On choisit  $p \in var(\varphi)$
2.  $\varphi$  est satisfaisable si et seulement si  $\varphi[p/1]$  ou  $\varphi[p/0]$  est satisfaisante

```

 $S \leftarrow \varphi$ 
for  $q \in \text{var}(\varphi)$  do
  |  $v(q) \leftarrow 0$ 
end
while  $\text{unit}(S) \neq \emptyset$  et  $\Box \notin S$  do
  | choisir  $\{l\} \in \text{unit}(\varphi)$ 
  |  $v(l) \leftarrow 1$ 
  |  $S \leftarrow S \setminus \{C \in S \mid l \in C \wedge \neg l \in C\}$ 
  |  $\text{Res}_p \leftarrow \{C \mid C \cup \{\neg p\} \in S\}$ 
  |  $S \leftarrow \{C \mid C \cup \{\neg p\} \in S\}$ 
end
if  $\Box \in S$  then
  | return 0
else
  | return  $v$ 
end

```

**Algorithm 2:** DP-Resolution-Horn( $\varphi$ )

### Propagation unitaire :

**Proposition 7.** Soit  $\varphi \in \mathcal{F}_{\mathcal{P}}$  en FNC,  $C \in \text{unit}(\varphi)$ , c'est-à-dire  $C = l$  où  $l = x_i$  ou  $l = \neg x_i$ . Alors  $\varphi$  est satisfaisable si et seulement si  $\varphi[x/\top]$  est satisfaisable.

Les clauses unitaires forcent l'assignation des variables concernées.

### Littéraux purs :

**Définition 25.**  $x \in \mathcal{P}$  est de polarité positive (respectivement négative) si  $\forall C \in \varphi, x \in \text{var}(C) \implies x \in C$  (respectivement  $x \in \text{var}(C) \implies \neg x \in C$ )

En notant pour toute formule  $F$  et toute variable  $y$  : " $y$  apparaît dans  $F$ " par  $y \in F$ .

On note  $\text{Pol}^+(\varphi)$  l'ensemble des variables de polarité positive de  $\varphi$  et  $\text{Pol}^-(\varphi)$  celles de polarité négative.

**Proposition 8.** Si  $x \in \text{Pol}^+(\varphi)$  alors  $\varphi$  est satisfaisable si et seulement si  $\varphi[x/\top]$  est satisfaisable. Si  $x \in \text{Pol}^-(\varphi)$  alors  $\varphi$  est satisfaisable si et seulement si  $\varphi[x/\perp]$  est satisfaisable.

*Preuve 9.*

**On suppose  $\varphi$  satisfaisable**

Soit  $\varphi = \bigwedge_{i \in I} C_i \wedge \bigwedge_{j \in J} C_j$  et  $x \in \text{Pol}^+(\varphi)$  où  $x \in C_i, \forall i \in I$  et  $x, \neg x \notin C_j, \forall j \in J$ .

Il existe une valuation  $v$  satisfaisant  $\varphi$ , soit  $v' = v|_{\mathcal{P} \setminus \{x\}}$ .

$\bar{v}(\varphi) = 1$  alors  $\bar{v}(\bigwedge_{j \in J} C_j) = 1$ , or  $x, \neg x \notin C_j, \forall j \in J$  donc  $\bar{v}'(\bigwedge_{j \in J} C_j) = 1$   
or

$$\varphi[x/\top] = \underbrace{\bigwedge_{i \in I} C_i[x/\top]}_{\top} \wedge \underbrace{\bigwedge_{j \in J} C_j[x/\top]}_{\text{satisfait par } v'}$$

✓

**Si  $\varphi$  est satisfaisable**

Soit  $v : \mathcal{P} \setminus \{x\} \rightarrow \{0,1\}$  satisfaisant  $\varphi[x/\top]$ , dans ce cas  $v' : \mathcal{P} \rightarrow \{0,1\}$  définie par  $v'(x) = 1$  et  $v'(y) = v(y)$ ,  $\forall y \neq x$   
 $\varphi$  est satisfaisable. ✓

```

if  $\varphi = \top$  then
  | return 1
else if  $\varphi = \perp$  then
  | return 0
else if  $\text{unit}(\varphi) \neq \emptyset$  then
  | Choisir  $l \in \text{unit}(\varphi)$ 
  | return DPLL( $\varphi[l/\top]$ )
else if  $\text{Pol}^+(\varphi) \cup \text{Pol}^-(\varphi) \neq \emptyset$  then
  | Choisir  $x \in \text{Pol}^+(\varphi)$ 
  | Choisir  $y \in \text{Pol}^-(\varphi)$ 
  | return DPLL( $\varphi[x/\top][y/\perp]$ )
else
  | Choisir  $x \in \text{var}(\varphi)$ 
  | return DPLL( $\varphi[x/\top]$ ) ou DPLL( $\varphi[x/\perp]$ )
end

```

**Algorithm 3:** DPLL( $\varphi$ )

*Remarque 14.* DPLL est très performant en pratique.

Il dépend fortement de l'heuristique du choix de  $x$  dans la dernière étape.

**Heuristiques pour le choix de  $x$**

**Schoning/Toran :** The satisfiability theorem

$l$  un littéral,  $k \in \mathbb{N}$  et  $\varphi$  une formule.

$$f_k(l) = \text{Card}\{C : C \in \varphi, |C| = k, l \in C\}$$

$$f(l) = \sum_{k \in \mathbb{N}} f_k(l)$$

$f(l)$  est le nombre d'occurrences de  $l$  dans  $\varphi$ .

DLIS : choisir  $f(l)$  maximal et poser  $l = \top$ .

On choisit  $x$  tel que  $f(x) + f(\neg x)$  maximal et  $x = \top$  si  $f(x) > f(\neg x)$ ,  $x = \perp$  sinon.

Un SAT solver est dépendant du choix de  $x$ . Il dépend de la stratégie de backtrack.

CDCL : conflict drivers clause legacy :

- construire un graphe de conflits entre choix d'attributions de variables
- apprendre les raisons qui ont amené à une contradiction (identifier un ensemble de choix contradictoires, par exemple  $x_1 = 0, y_1 = 1, z_2 = 1$ )
- ajouter une clause qui empêche cette situation de se reproduire (par exemple  $\neg x_1 \vee y_1 \vee \neg z_2$ )

## Part IV

# Compléments

## 10 Calcul propositionnel

### 10.1 Théorème de lecture unique

**Définition 26.** Soient  $w_0, w_1 = a_1 \dots a_n \in \mathcal{M}$ , on dit que  $w_0$  est un segment initial de  $w_1$ , noté  $w_0 \subseteq w_1$  si  $w_0 = a_1 \dots a_i$  avec  $1 \leq i \leq n$ , et  $w_0$  est un segment propre, noté  $w_0 \subsetneq w_1$  si  $i < n$ .

**Lemme 7.** Soit  $F \in \mathcal{F}$  et  $G \subsetneq F$ , alors  $M \notin \mathcal{F}$   
Autrement dit, aucune formule n'est le préfixe d'une autre.

**Proposition 9.** On note  $o[F]$  le nombre de parenthèses ouvrantes d'une formule  $F$  et  $f[F]$  pour ses parenthèses fermées.

1.  $\forall F \in \mathcal{F}, o[F] = f[F]$
2.  $\forall F \in \mathcal{F}, \forall M \in \Sigma^*, M \subsetneq F \implies \begin{cases} o[M] > f[M], \text{ et donc } M \notin \mathcal{F} & (a) \\ \mathbf{x-ou} \ M = \neg \dots \neg \notin \mathcal{F} & (b) \\ \mathbf{x-ou} \ M = \varepsilon \notin \mathcal{F} & (c) \end{cases}$

*Preuve 10.* Soient  $F \in \mathcal{F}$  et  $M \subsetneq F$ , montrons le second point.

- Si  $F = \neg G = \neg g_1 \dots g_n$ 
  - cas (c) :  $M = \varepsilon$
  - cas (b) :  $M = \neg$
  - $M = \neg g_1 \dots g_i \subsetneq G, i < n$   
alors soit  $o[M] = o[g_1 \dots g_i] > f[g_1 \dots g_i] = f[M]$ , ce qui rentre dans le cas (a)  
soit  $g_1 \dots g_i = \underbrace{\neg \dots \neg}_{i \text{ fois}}$ , alors  $M = \underbrace{\neg \dots \neg}_{i+1 \text{ fois}}$  : on est encore dans le cas (b).
- Si  $F = (G \circ H) = (g_1 \dots g_m \circ h_1 \dots h_n)$  et  $M \subsetneq F$ , soit  $M = \varepsilon$  (cas (c)), soit  $M \neq \varepsilon$  avec
  - $M = ($  alors  $o[M] = 1 > f[M] = 0$
  - $M = (g_1 \dots g_i, 1 \leq i \leq m$ , donc  $o[M] = o[g_1 \dots g_i] + 1 > f[M] = f[g_1 \dots g_i]$
  - $M = (G \circ$  donc  $o[M] = 1 + o[G] > f[M] = f[G]$
  - $M = (G \circ h_1 \dots h_i, 1 \leq i \leq n$ , alors  $o[M] = 1 + o[G] + o[h_1 \dots h_i]$   
 $o[M] = 1 + f[G] + o[h_1 \dots h_i] > f[G] + f[h_1 \dots h_i] = f[(G \circ h_1 \dots h_i)] = f[M]$
- Si  $F \in \mathcal{P}, M = \varepsilon$ , c'est le cas (c).

□

*Preuve 11.* Soit  $F \in \mathcal{F}$

- Si  $F \in \mathcal{P}$  pour tout  $q \in \mathcal{P} \setminus \{F\}$ ,  $q \neq F$ .  
 $\forall G \in \mathcal{F}$ ,  $F \neq \neg G$  car  $|\neg G| \geq 2 > 1 = |F|$   
 $\forall G, H \in \mathcal{F}$ ,  $\forall \star \in \{\wedge, \vee, \longrightarrow\}$ ,  $(G \star H) \neq F$  car  $|F| = 1 < 5 \leq |(G \star H)|$
- Si  $F = \neg G$  avec  $G \in \mathcal{F}$ , pour tout  $q \in \mathcal{F}$  on a  $q \neq F$ .  
 $\forall H \neq G$  on a  $\neg H \neq F$   
 $\neg G \neq (H \star K)$  pour toute formules  $H$  et  $G$  et tout opérateur  $\star$ .
- Si  $F = (G_1 \star G_2)$ , supposons  $F = (H_1 \circ H_2)$  que l'on réécrit

$$a_1 \dots a_k \star b_1 \dots b_l = c_1 \dots c_m \circ d_1 \dots d_n$$

Montrons  $G_1 = H_1$ , ce qui impliquera  $\star = \circ$  et  $G_2 = H_2$ .

On est face à l'un des deux cas :

$$(*) \quad \underbrace{a_1 a_2 a_3 \dots a_k}_{G_1 \in \mathcal{F}} \subseteq \underbrace{c_1 c_2 c_3 \dots c_m}_{H_1 \in \mathcal{F}}$$

$$(**) \quad c_1 c_2 c_3 \dots c_m \subseteq a_1 a_2 a_3 \dots a_n$$

les deux cas sont symétriques, on suppose  $(*)$  et par l'absurde que  $G_1 \neq H_1$ , c'est à dire  $G_1 \subsetneq H_1$ , ce qui implique d'après le lemme  $G_1 \notin \mathcal{F}$ .

On a également  $\forall F \in \mathcal{F}$ ,  $\neg G \neq (G_1 \star G_2)$  et  $\forall p \in \mathcal{P}$ ,  $p \neq (G_1 \star G_2)$ .

□

**Exercice 3** Soit  $C = \bigwedge_{i \in I} l_i$  et  $F$  telle que  $C$  soit un impliquant de  $F$ .

*S'il existe  $j$  tel que  $C_j$  implique  $F$ , alors  $C$  n'est pas premier*

Supposons qu'il existe  $j$  tel que  $C_j$  soit un impliquant de  $F$ .

$C = C_j \wedge l_j$  alors si une valuation  $v$  est telle que  $\bar{v}(C) = 1$ , c'est que  $\bar{v}(C_j) = \bar{v}(l_j) = 1$

Cela signifie que  $C$  est un impliquant de  $C_j$ ,  $C$  n'est donc pas un impliquant premier de  $F$ . ✓

*Si pour tout  $j$   $C_j$  n'implique pas  $F$ , alors  $C$  est premier*

✓