

6. (5 分) 某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰, 50% 的同学爱好滑雪, 70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪。在该地的中学生中随机调查一位同学, 若该同学爱好滑雪, 则该同学也爱好滑冰的概率为 ()。
- A. 0.8 B. 0.6 C. 0.5 D. 0.4
7. (5 分) 设甲: $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$, 乙: $\sin \alpha + \cos \beta = 0$, 则 ()。
- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
8. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{5}$, C 的一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ ()。
- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
9. (5 分) 现有 5 名志愿者报名参加公益活动, 在某一星期的星期六、星期日两天, 每天从这 5 人中安排 2 人参加公益活动, 则恰有 1 人在这两天都参加的不同安排方式共有 ()。
- A. 120 种 B. 60 种 C. 30 种 D. 20 种
10. (5 分) 函数 $y = f(x)$ 的图象由函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
11. (5 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 4 的正方形, $PC = PD = 3$, $\angle PCA = 45^\circ$, 则 $\triangle PBC$ 的面积为 ()。
- A. $2\sqrt{2}$ B. $3\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$
12. (5 分) 设 O 为坐标原点, F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, $\cos \angle F_1 P F_2 = \frac{3}{5}$, 则 $|OP| =$ ()。
- A. $\frac{13}{5}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$ C. $\frac{14}{5}$ D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

二、填空题。本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 为偶函数, 则 $a =$ _____。
14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3 \\ -2x + 3y \leq 3 \\ x + y \geq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。


15. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, C_1D_1 的中点。以 EF 为直径的球的球面与该正方体的棱共有_____个公共点。
16. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2$, $BC = \sqrt{6}$, $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD =$ _____。

三、解答题。本大题共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17—21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 1$, $2S_n = na_n$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
- (2) 求数列 $\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 。

18. (12 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $A_1C \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $AA_1 = 2$, A_1 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。



- (1) 证明: $A_1C = AC$ 。
- (2) 已知 AA_1 与 BB_1 的距离为 2, 求 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值。

19. (12 分) 一项试验旨在研究臭氧效应, 试验方案如下: 选 40 只小白鼠, 随机地将其中 20 只分配到试验组, 另外 20 只分配到对照组。试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境, 对照组的小白鼠饲养在正常环境, 一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量 (单位: g)。

(1) 设 X 表示指定的两只小白鼠中分配到对照组的只数, 求 X 的分布列和数学期望。

(2) 试验结果如下。 对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1
32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2
19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

(i) 求 40 只小白鼠体重的增加量的中位数 m , 再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数, 完成如下列联表。

	$< m$	$\geq m$
对照组		
试验组		

(ii) 根据上一问中的列联表, 能否有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异? 附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

20. (12 分) 已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{15}$ 。

(1) 求 p 。

(2) 设 F 为 C 的焦点, M, N 为 C 上两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$, 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^3 x}$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 。

(1) 当 $a = 8$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性。

(2) 若 $f(x) < \sin 2x$ 恒成立, 求 a 的取值范围。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。

已知点 $P(2, 1)$, 直线 $l: \begin{cases} x = 2 + t \cos \alpha \\ y = 1 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), α 为 l 的倾斜角。 l 与 x 轴正半轴、 y 轴正半轴分别交于点 A, B , 且 $|PA| \cdot |PB| = 4$ 。

(1) 求 α 。

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 l 的极坐标方程。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。

设 $a > 0$, 函数 $f(x) = 2|x - a| - a$ 。

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集。

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a 。