


2018 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷


一、填空题：本题共 12 小题，共 54 分。第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分。

1. (4 分) 不等式 $|x| > 1$ 的解集为_____。
2. (4 分) 计算： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2} =$ _____。
3. (4 分) 设集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid -1 < x < 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____。
4. (4 分) 若复数 $z = 1 + i$ (i 是虚数单位), 则 $z + \frac{2}{z} =$ _____。
5. (4 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 若 $a_2 + a_8 = 10$, 则 $a_3 + a_5 + a_7 =$ _____。
6. (4 分) 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 的距离之和等于 4, 则动点 P 的轨迹方程为_____。
7. (5 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $AA_1 = 5$, O 是 A_1C_1 的中点, 则三棱锥 $A - A_1OB_1$ 的体积为_____。




8. (5 分) 某校组队参加辩论赛, 从 6 名学生中选出 4 人分别担任一、二、三、四辩, 若其中学生甲必须参赛且不担任四辩, 则不同的安排方法种数为_____。(结果用数值表示)
9. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 若 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等, 则 $a =$ _____。

10. (5 分) 设 $m \in \mathbb{R}$, 若 z 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m^2 - 1 = 0$ 的一个虚根, 则 $|z|$ 的取值范围是_____。
11. (5 分) 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = x + 2(1-x)\sin(ax)$, $x \in (0, 1)$, 若函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图象有且仅有两个不同的公共点, 则 a 的取值范围是_____。
12. (5 分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米, 圆 O 的半径为 1 米, 圆心是正方形的中心, 点 P, Q 分别在线段 AD, CB 上。若线段 PQ 与圆 O 有公共点, 则称点 Q 在点 P 的“盲区”中。已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动, 同时, 点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动, 则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中, 点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为_____秒 (精确到 0.1)。



二、 选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。每小题只有一项符合题目要求。

13. (5 分) 下列函数中, 为偶函数的是()。
- A. $y = x^{-2}$ B. $y = x^{\frac{1}{3}}$ C. $y = x^{-\frac{1}{2}}$ D. $y = x^3$
14. (5 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中, 与直线 BC_1 异面的直线的条数为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
15. (5 分) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, “ $\{a_n\}$ 是递增数列”是 “ $\{S_n\}$ 是递增数列” 的()。
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

16. (5 分) 已知 A, B 为平面上的两个定点, 且 $|\overline{AB}| = 2$, 该平面上的动线段 PQ 的端点 P, Q 满足 $|\overline{AP}| \leq 5$, $\overline{AP} \cdot \overline{AB} = 6$, $\overline{AQ} = -2\overline{AP}$, 则动线段 PQ 所形成图形的面积为()。

A. 36

B. 60

C. 72

D. 108

三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 已知 $f(x) = \cos x$ 。

(1) (6 分) 若 $f(\alpha) = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 求 $f\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值。

(2) (8 分) 求函数 $y = f(2x) - 2f(x)$ 的最小值。

18. (14 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 。

(1) (6 分) 若点 $(2, 1)$ 在 Γ 上, 求 Γ 的焦点坐标。

(2) (8 分) 若 $a = 1$, 直线 $y = kx + 1$ 与 Γ 相交于 A, B 两点, 且线段 AB 中点的横坐标为 1, 求实数 k 的值。

19. (14 分) 利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面, 所得截线是抛物线”的几何原理, 某快餐店用两个射灯(射出的光锥为圆锥)在广告牌上投影出其标识, 如图 1 所示。图 2 是投影射出的抛物线的平面图, 图 3 是一个射灯投影的直观图。在图 2 与图 3 中, 点 O, A, B 在抛物线上, OC 是抛物线的对称轴, $OC \perp AB$ 于 C , $AB = 3$ 米, $OC = 4.5$ 米。




图 1 (示意)




图 2




图 3

(1) (7 分) 求抛物线的焦点到准线的距离。

(2) (7 分) 在图 3 中, 已知 OC 平行于圆锥的母线 SD , AB, DE 是圆锥底面的直径, 求圆锥的母线与轴的夹角的大小 (精确到 0.01°)。

20. (16 分) 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{1 + a \cdot 2^x}$ 。

(1) (4 分) 若 $a = 1$, 求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 。

(2) (6 分) 求函数 $y = f(x) \cdot f(-x)$ 的最大值 (用 a 表示)。

(3) (6 分) 设 $g(x) = f(x) - f(x-1)$, 若对任意 $x \in (-\infty, 0]$, $g(x) \geq g(0)$ 恒成立, 求 a 的取值范围。

21. (18 分) 若 $\{c_n\}$ 是递增数列, 数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} \leq$

0, 则称 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的“分隔数列”。

(1) 设 $c_n = 2n$, $a_n = n + 1$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列。

(2) 设 $c_n = n - 4$, S_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, $d_n = c_{3n-2}$, 判断数列 $\{S_n\}$ 是否是数列 $\{d_n\}$ 的分隔数列, 并说明理由。

(3) 设 $c_n = aq^{n-1}$, T_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, 若数列 $\{T_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列, 求实数 a, q 的取值范围。