

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷理科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。


1. (5 分) 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| = (\quad)$ 。

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 > 0\}$, 则 $\complement_{\mathbb{R}} A = (\quad)$ 。

- A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$ B. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x \mid x < -1\} \cup \{x \mid x > 2\}$ D. $\{x \mid x \leq -1\} \cup \{x \mid x \geq 2\}$

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：



建设前经济收入构成比例

建设后经济收入构成比例

则下面结论中不正确的是()。

- A. 新农村建设后，种植收入减少
B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍
D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半
4. (5 分) 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $3S_3 = S_2 + S_4$, $a_1 = 2$, 则 $a_5 = (\quad)$ 。
A. -12 B. -10 C. 10 D. 12
5. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为()。
A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} = (\quad)$ 。


A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

7. (5 分) 某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为()。



A. $2\sqrt{17}$

B. $2\sqrt{5}$

C. 3

D. 2

8. (5 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线与 C 交于 M 、 N 两点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (\quad)$ 。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

9. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x & x \leq 0 \\ \ln x & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) + x + a$ 。若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则 a 的取值范围是()。


A. $[-1, 0)$

B. $[0, +\infty)$

C. $[-1, +\infty)$

D. $[1, +\infty)$

10. (5 分) 如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形。此图由三个半圆构成，三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC 、直角边 AB 、 AC 。 $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I，黑色部分记为 II，其余部分记为 III。在整个图形中随机取一点，此点取自 I、II、III 的概率分别记为 p_1 、 p_2 、 p_3 ，则()。



- A. $p_1 = p_2$
 B. $p_1 = p_3$
 C. $p_2 = p_3$
 D. $p_1 = p_2 + p_3$

11. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M 、 N 。若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| = (\quad)$ 。

- A. $\frac{3}{2}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. 4

12. (5 分) 已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为()。

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

二、 填空题：共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

14. (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_n = 2a_n + 1$, 则 $S_6 =$ _____。

15. (5 分) 从 2 位女生、4 位男生中选 3 人参加科技比赛, 且至少有 1 位女生入选, 则不同的选法共有 _____ 种。(用数字填写答案)


16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是_____。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分。

17. (12 分) 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle A = 45^\circ$, $AB = 2$, $BD = 5$ 。

- (1) 求 $\cos \angle ADB$ 。
(2) 若 $DC = 2\sqrt{2}$, 求 BC 。

18. (12 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, E, F 分别为 AD, BC 的中点, 以 DF 为折痕, 把 $\triangle DFC$ 折起, 使点 C 到达点 P 的位置, 且 $PF \perp BF$ 。



- (1) 证明: 平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ 。
 - (2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值。
19. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$ 。
- (1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 AM 的方程。
 - (2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$ 。
20. (12 分) 某工厂的某种产品成箱包装, 每箱 200 件, 每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验, 如检验出不合格品, 则更换为合格品。检验时, 先从这箱产品中任取 20 件作检验, 再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验。设每件产品为不合格品的概率都为 p ($0 < p < 1$), 且各件产品是否为不合格品相互独立。
- (1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$, 求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 。
 - (2) 现对一箱产品检验了 20 件, 结果恰有 2 件不合格品, 以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值。已知每件产品的检验费用为 2 元, 若有不合格品进入用户手中, 则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用。
 - (i) 若不对该箱余下的产品作检验, 这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X , 求 EX 。
 - (ii) 以检验费用与赔偿费用之和的期望值为决策依据, 是否该对这箱余下的所有产品作检验?
21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$ 。
- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。
 - (2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$ 。

四、选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。
- (1) 求 C_2 的直角坐标方程。
 - (2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程。
23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$ 。
- (1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集。
 - (2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围。