
Asimov q_0
Asimov q_0^*
$s/\sqrt{b+\sigma_b^2}$
MC median
$s = 2$
$\tau = 0.5$
$\tau = 2$
med[Z | s]
b


Asimov q_0
Asimov q_0^*
$s/\sqrt{b+\sigma_b^2}$
MC median
$s = 2$
$\sigma_b/b = 1$
$\sigma_b/b = 0.25$
med[Z | s]
b

Asimov q_0
Asimov q_0^*
$s/\sqrt{b+\sigma_b^2}$
MC median
$s = 5$
$\tau = 0.5$
$\tau = 2$
med[Z | s]
b

Asimov q_0
Asimov q_0^*
$s/\sqrt{b+\sigma_b^2}$
MC median
$s = 5$
$\sigma_b/b = 1$
$\sigma_b/b = 0.25$
med[Z | s]
b


Asimov q_0
Asimov q_0^*
$s/\sqrt{b+\sigma_b^2}$
MC median
$s = 10$
$\tau = 0.5$
$\tau = 2$
med[Z | s]
b


Asimov q_0
Asimov q_0^*
$s/\sqrt{b+\sigma_b^2}$
MC median
$s = 10$
$\sigma_b/b = 1$
$\sigma_b/b = 0.25$
med[Z | s]
b