LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

Con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas

DIEGO MONTELEONE

LUIS PAGANO







TEMAS DE NATURALEZA & CONSERVACIÓN / MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 12

2022

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

Con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas

DIEGO MONTELEONE

LUIS PAGANO

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

Con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas

DIEGO MONTELEONE

LUIS PAGANO

TEMAS DE NATURALEZA & CONSERVACIÓN N° 12

AVES ARGENTINAS / ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA DEL PLATA, BUENOS AIRES, 2022

AVES ARGENTINAS

BirdLife INTERNATIONAL

GRUPO F.A.L.C.O.

Citación sugerida / Recommended citation:
Monteleone D. y L. Pagano (2022) Listado de las Aves Argentinas. Con comentarios sobre especies nuevas raras e hipotéticas. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de Aves Argentinas N° 12. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata
Matheu 1246/8
(C1249AAB) Buenos Aires – Argentina
Teléfono y fax: +54-11 49437216 al 19
Correo electrónico: info@avesargentinas.org.ar
En la red: www.avesargentinas.org.ar

Temas de Naturaleza & Conservación
Monografías de Aves Argentinas / AOP

Diseño gráfico: Mariano Masariche

Copyright Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, 2022
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723.

Monteleone, Diego Luis
Listado de las aves argentinas : con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas / Diego Luis Monteleone ; Luis Gerardo Pagano. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Aves Argentinas AOP, 2022.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-4192-21-9

1. Conservación de la Naturaleza. 2. Ornitología. I. Pagano, Luis Gerardo II. Título
CDD 598

Fotografías de tapa:
Imagen central: Monjita Castaña (*Neoxolmis rubetra*), Foto: Ignacio Hernández
Abajo de izquierda a derecha: Fueguero Boreal (*Piranga olivacea*), Foto: Matías Torreguitar; Picaflor Nuca Blanca (*Florisuga mellivora*), Foto: Diego Oscar; Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), Foto: Sebastián Lescano; Mielero Patas Rojas (*Cyanerpes cyaneus*), Foto: Sandra Antueno; Playero Gigante (*Numenius arquata*), Foto: Martín Juárez

Fotografías de contratapa:
Imagen central: Albatros Ceja Negra (*Thalassarche melanophris*), Foto: Santiago Imberti
Abajo de izquierda a derecha: Falaropo Pico Fino (*Phalaropus lobatus*), Foto: Manuel Battistella; Gaucho Andino (*Agriornis albicauda*), Foto: Andrés Terán; Pingüino Crestudo (*Eudyptes sclateri*), Foto: Guillermo Rivera; Burlisto Cabeza Gris (*Attila phoenicurus*), Foto: Martjan Lammertink; Pardela de Cabo Verde (*Calonectris edwardsii*), Foto: Jorge La Grotteria

Fotografías de apertura de secciones:
Página 20: Bandurria Andina (*Theristicus branickii*), Foto: Gisella Müller. **Página 92:** Gaucho Andino (*Agriornis albicauda*), Foto: Andrés Terán. **Página 184:** Albatros "tipo cauta" (*Thalassarche cauta/steadi*), Foto: Diego Oscar. **Página 194:** Loica Serrana (*Leistes [loyca] obscurus*), Foto: Juan José Bonanno. **Página 200:** Pitotoy Patas Verdes (*Tringa nebularia*), Foto: Pepijn Kamminga. **Página 234:** Picaflor Esmeralda (*Chrysuronia versicolor*), Foto: Roberto Güller. **Página 242:** Pepitero Colorado (*Pseudosaltator rufiventris*), Foto: Silvia Vitale.

Ilustraciones: Luis Pagano
Página 19: Cachudito Pico Negro (*Anairetes parulus*). **Página 193:** Ñacundá (*Chordeiles nacunda*). **Página 233:** Batará Pecho Negro (*Biatas nigropectus*). **Página 241:** Cuervillo de Cañada (*Plegadis chihi*).

SUMARIO

9 PRÓLOGO

11 AGRADECIMIENTOS

13 INTRODUCCIÓN

21 ESPECIES NUEVAS

93 ESPECIES RARAS Y VAGANTES

185 TAXA NO ASIGNADOS A NIVEL DE ESPECIE

195 POSIBLES CAMBIOS TAXONÓMICOS

201 ESPECIES HIPOTÉTICAS

235 ESPECIES ELIMINADAS Y NO ACEPTADAS

243 APÉNDICE 1. LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

DIEGO MONTELEONE

El interés de Diego por la naturaleza se inició a los 10 años de edad, mientras exploraba los campos cercanos a su casa en la localidad bonaerense de Los Cardales. Un par de años más tarde ingresó a Aves Argentinas/AOP, un lugar ideal para compartir salidas y realizar observaciones en forma sistemática. En el año 1999 comenzó su carrera como guía profesional de observación de aves, totalizando más de 300 viajes por todas las regiones de Argentina. A medida que fue ganando experiencia, su vocación lo llevó a recorrer cada rincón del país en busca de las especies más raras y localizadas. Del mismo modo, organizó expediciones a otros países del continente como Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. Sus estudios universitarios le valieron el título de Licenciado en Ciencias Biológicas, desarrollando su tesis sobre taxonomía y biogeografía de los churrines (*Scytalopus sp.*) del noroeste argentino.

Colaboró activamente en trabajos bien conocidos como "*Aves de Argentina y Uruguay*" (2003) y "*Aves de Sudamérica*" (2006). Ha participado en diversos congresos y talleres, entre ellos AICAs de Argentina, Libro Rojo de las Aves Argentinas y ecoturismo. Diego tiene especial interés en el estudio e identificación de las aves mediante sus vocalizaciones, además de ser un apasionado por la ornitología sudamericana y sus aves endémicas. Posee numerosas horas de grabaciones propias, algunas de ellas publicadas en CD's comerciales. Anualmente dicta cursos y charlas sobre sitios relevantes para el avistaje de aves, identificación de especies crípticas y biogeografía argentina. En la actualidad se encuentra enfocado en la promoción de la observación de aves en el ámbito local, siendo miembro fundador del Comité Argentino de Registros Ornitológicos (CARO), revisor de la plataforma eBird y coautor del esperado libro "*Donde ver aves en Argentina*".

LUIS PAGANO

La ribera platense fue el escenario donde Luis se contactó con la naturaleza desde muy joven. A los 15 años de edad ingresó al taller de Taxidermia del Museo de La Plata, y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Desde ese lugar privilegiado pudo relacionarse con muchos profesionales y aprender sobre diversas ramas de la biología, especialmente la zoología. Pero sus intereses iban más allá de un simple gabinete. Junto a otros amigos y colegas comenzó a recorrer la pampa húmeda, quizás su región favorita de Argentina. Sus conocimientos y habilidades rápidamente fueron reconocidos en el ámbito científico, permitiéndole participar de extensas campañas a los sitios más diversos y remotos. De esta manera, Luis pudo estudiar en detalle las aves de las Yungas, el Chaco Húmedo, las mesetas de Santa Cruz, el Beni boliviano y la Antártida.

Luis era un naturalista completo y a la vez un artista virtuoso y sensible. Sus dibujos fueron publicados en numerosos artículos y portadas de revistas científicas. El mundo de la observación de aves también le apasionaba, y su talento para identificar y describir especies lo convirtieron en un observador sagaz, meticuloso y siempre atento a predecir la posible aparición de alguna especie nueva, rara o vagante. Era un enamorado de la bibliografía histórica, citando trabajos y autores desconocidos para la mayoría de las personas. Entre sus proyectos más recientes se destacan el de Aves Amenazadas del bosque atlántico en Misiones y el Proyecto Atajacaminos (Caprimulgidae) en la Reserva Natural Rincón Santa María, Corrientes. Los artículos de Luis aparecieron en diversas revistas especializadas. Su particular modo de escritura es un maravilloso documento que quedará para siempre, como legado, en la historia de nuestra ornitología.

PRÓLOGO

Bajo el título de Catálogo o Lista, la diversidad de aves de nuestro país fue abordada y presentada no en pocas ocasiones, pero dichas presentaciones fueron discontinuadas en el tiempo, incluso por largos períodos en la historia de la ornitología argentina. Además, los distintos y sucesivos trabajos, no siempre siguieron criterios o formatos del antecedente bibliográfico predecesor, por lo que las publicaciones no resultaban en su mayoría complementarias y/o integradoras entre sí. Cabe recordar que el primer trabajo al respecto fue el de Eduardo L. Holmberg, que fue publicado en 1898 curiosamente como una sección adicionada al "Segundo Censo Poblacional de la República Argentina", y que fuera impreso en el Taller Tipográfico de la Penitencia Nacional. Allí, en un compendio a modo de primer inventario biológico del país, Holmberg enumera 561 especies de aves para nuestro territorio, incluyendo las primeras referencias a varias de ellas, luego ya extintas a nivel nacional.

Es entonces que el "Listado de las Aves Argentinas" de Monteleone y Pagano, abre un nuevo capítulo en la bibliografía referencial, no solo por la tan necesaria y esperada actualización, sino también porque la iniciativa nace una vez más, como aquel trabajo predecesor e innovador de Mazar Barnett y Pearman, en dos jóvenes y notables promesas del recambio generacional.

El vuelo prematuro de Luis, deja un vacío difícil de llenar, pero sus aportes se plasmaron en este trabajo, provenientes no solo de sus dotes de naturalista, dibujante y ornitólogo de campo, sino además del profundo conocimiento que tenía sobre las colecciones ornitológicas nacionales y extranjeras, así como de la bibliografía local y regional. Entonces, se amalgamaron con el entusiasmo inquieto de Diego, otro de nuestros más destacados ornitólogos de campo, biólogo todo terreno, guía profesional, viajero empedernido, y como tenaz bibliófilo que es, un revisor fanático y defensor — a ultranza, por cierto — de la invalorable Biblioteca de la "Ornitológica", como a él mismo le gusta llamarla.

Al nutrirse entonces de aquella publicación bilingüe ya mencionada y que les precede: la "Lista Comentada de las Aves Argentinas", cuya autoría corresponde al recordado "Juancito" y al "Gringo", editada hace poco más de 20 años y que se constituyó en el hito que achicó la brecha casi eterna desde la última lista publicada, o sea la segunda y "Nueva Lista" de Olrog aparecida en 1979, no solo siguieron los criterios de inclusión/exclusión de dicho trabajo, sino que reforzaron y ajustaron muchas de las referencias en aquellas especies más controvertidas y en las nuevas e irrefutables incorporaciones ya definitivas.

El nivel de detalle para cada especie tratada, el análisis de los antecedentes bibliográficos y museológicos, no siempre correctos o bien interpretados con anterioridad, la prolijidad en las documentaciones que validan la incorporación — o no — para tal o cual estatus o categoría, más un maratónico trabajo de revisión de los sitios disponibles en Internet (con sus virtudes y defectos que supieron depurar sabiamente) y conocidos bajo el concepto actual de ciencia ciudadana; hacen de este trabajo, digno de la admiración y elogio de los grandes ornitólogos fundacionales que se especializaron en realizar tediosos, poco legibles a veces, pero tan necesarios compilados sistemáticos, aquellos de la talla de un Dabbene, piedra basal de la ornitología moderna y de la Asociación Ornitológica del Plata; de los Bertoni o los Zotta (padres e hijos, en ambos casos y respectivamente), de los enciclopedistas Steullet y Deutier; y sin dudas, del maestro Olrog, con su versatilidad productiva en Listas y Guías.

De este modo, Diego y Luis, estudiaron, documentaron e incorporaron con su trabajo metódico que les llevó casi un lustro realizar, 83 especies de aves a la avifauna nacional, concluyendo con un número actualizado y vigente de 1074 especies.

El trabajo agrega además continuidad, como un nuevo volumen, a la Serie "Temas de Naturaleza y Conservación - Monografías de Aves Argentinas", iniciada en la década de los 90 por Santiago Krapovickas y Andrés Bosso. Y, por ende, se constituye además en la lista referencial de las aves argentinas, en una herramienta necesaria para la toma de decisiones y un instrumento de conocimiento y desarrollo no solo para la fecunda y descollante ornitología argentina, sino también para la creciente pléyade de observadores, fotógrafos y naturalistas dedicados a la observación y conservación de aves silvestres de nuestro país y sus ambientes naturales.

Damos por descontado que la dupla autoral, separada temporal y terrenalmente, pero no así vocacional y emocionalmente, nos proveerá de la necesaria y oportuna actualización, cuando llegue el momento indicado. Estaremos esperando entonces, mientras disfrutamos del renovado y moderno "Listado de las aves argentinas. Con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas".

Alejandro G. Di Giacomo
Reserva El Bagual, Formosa
Noviembre 2022

AGRADECIMIENTOS

El equipo de Aves Argentinas/AOP apoyó nuestra propuesta de trabajo desde el comienzo. Entre las principales personas involucradas debemos mencionar a Juan Raggio, Ignacio Roesler, Alejandro Di Giacomo, Andrés Bosso, Hernán Casañas, Francisco Gonzáles Táboas y Juan José Bonanno. Ignacio Hernández y Santiago Imberti cedieron gentilmente las imágenes principales de la tapa y contratapa respectivamente. Agradecemos en especial a Alejandro Bodrati por sus numerosas revisiones, datos inéditos y ayuda en la clasificación de migraciones. El siguiente grupo de colaboradores generó valiosos comentarios y aportes al manuscrito: Santiago Imberti, Giselle Mangini, Ignacio Roesler, Julián Quillén Vidoz, Flavio Moschione, Mark Pearman, Juan Ignacio Areta, Facundo Di Sallo, Julián Baigorria, Christian Savigny, Daniel Almirón, Javier Ubiría, Julián Hernández, Cynthia Ursino, Diego Gallegos y Emilio Jordan.

Personal de diversas instituciones, museos y bibliotecas fueron fundamentales en la búsqueda de antiguos especímenes, bibliografía e información. Por tal motivo nos complace agradecer a Daniel Acosta (CNH), Raúl Aguirre Barrios (MAB), Sebastián Aveldaño (COFML), Graciela Ayala (CHMO), Laura Barone (MACN), John Bates (FMNH), Shannon Beliew (USGS-PWRS), José Benjamin Bender (COI-IADIZA), Diego Betancourt (CNH), Walter Billordo (APN), Bentley Bird (AMNH), Patrick Boussès (MNHN), Michael Brooke (UMZC), Sebastián Cabanne (MACN), Mario Cabrera (MZUC), Valeria Cabrera (MNP), María Laura Calderón (MAS), Peter Capainolo (AMNH), Patricia Capllonch (CENAA), Steven Cardiff (LSUMZ), Marcelo Cavicchia (APN), Carla Cicero (MVZ), René Corado (WFVZ), Yolanda Davies (MACN), Andrew Doll (DMNS), Mary Ferraro (UMMZ), Cecilia Foerster (MJF), Sylke Frahnert (ZMB), Jérôme Fuchs (MNHN), Natalia García (MACN), Kimball Garrett (LACM), Luca Ghiraldi (MZUT), Guillermo Gil (APN), Anibal González (CNH), Shannon Hackett (FMNH), Graciela Ibargoyen (MAS), Pepijn Kamminga (Naturalis Biodiversity Center), Ragnar Kinzelbach (ZSRO), Leonardo Leiva (MFA), Darío Lijtmaer (MACN), Ben Marks (FMNH), Jay McGowan (MLNS), Erica Mejlon (ZMUU), Julio Milat (MOMB), Christopher Milensky (NMNH), Colin Miskelly (NMNZ), Diego Montalti (MLP), Daniel Monteiro Figueira (MNRJ), Allan O'Connell (USGS-PWRS), Marisel Pereyra (Academia Nacional de Ciencias), Eduardo Pérez Navarro (MP), Jimena Ponce (Herbario CORD), Nate Rice (ANSP), Manuel Ruedi (MHNG), Martín Saleme (FML), Luciano Segura (MLP), Maureen Smith (NML), Hans teer Steege (Naturalis Biodiversity Center), Paul Sweet (AMNH), Ricardo Torres (MZUC), Jeremiah Trimble (MCZ), Thomas Trombone (AMNH), Markus Unsöld (ZSM), Hein Van Grouw (NHMUK), Laurent Vallotton (MHNG), Claire Voisin (MNHN), Jean-François Voisin (MNHN), John James Wilson (NML), Michelle Winnard (FC) y Kristof Zyskowski (YPM).

Muchas personas aportaron en forma desinteresada bibliografía, fotos, observaciones y comentarios. Por su ayuda y buena predisposición, somos gratos con Hernán Alvarado, Jorge Anfuso, Sandra Antueno, Christian Artuso, María Astete, Adrián Azpíroz, Jorge Baldo, Ulises Balza, Manuel Battistella, Claudio Bertonatti, Daniel Blanco, Pedro Blendinger, Christoph Bock, Oscar Braslavsky, Esteban Bremer, Federico Bruno, Gustavo Bruno, Freddy Burgos, Carlos Cabrera, Santiago Carrillo, Miguel Castelino, Adrián Castillo, Leandro Castillo, Marcos Cenizo, Matías Chávez, Leandro N. Chávez, Paula Ciraolo, Ricardo Clark, Andrew Clarke, Eugenio Coconier, Uriel Colina, Natalie Collm, Francisco Cornell, Marco Crozariol, Carlos Cuñado,

Esteban Daniels, Martín de la Peña, Cecilia de Larminat, Javier de Leonardis, Vítor de Queiroz Piacentini, Nina Dehnhard, Rubén Dellacasa, Laurent Demongin, Enrique Derlindati, Adrián Di Giacomo, Santos Di Mauro, Juan Díaz Colodrero, Alec Earnshaw, Adrian Eisen Rupp, Andrés Elías, Silvia Elsegood, Silvia Enggist, Francisco Erize, Néstor Fariña, Rodrigo Fariña, Gustavo Fava, Héctor Fernández, Javier Fernández, Ricardo Fernández, Carlos Ferrari, Diego Ferrer, Carlos Ferreyra, Carlos Figuerero, Fausto Firstate, Leticia Forte, Adrián Galimberti, Facundo Gandoy, Steve Gantlett, Marcos García Rams, Marcelo Gavensky, René Gingins, Alejandro Giraudo, Hugo Giraudo, Patricia González, Fabricio Gorleri, Pablo Grilli, Roberto Güller, Steffen Hahn, Adrián Heredia, Nuria Herrera, Martin Heubeck, Hugo Hulsberg, Álvaro Jaramillo, Washington Jones, Martín Juárez, Matías Juhant, Juan Klavins, Cristian Klimaitis, Juan Klimaitis, Niels Krabbe, Ernesto Krauczuk, Jorge La Grotteria, Martjan Lammertink, Arnaud Le Nevé, William Legge, Sebastián Lescano, Andrew Livermore, Bernabé López-Lanús, James Lowen, Damián Lozano, Marcelo Mambrin, Mauricio Manzione, Amado Martínez, Natalia Martínez-Curci, Pablo Meoniz, Matías Michelutti, Eduardo Militello, Annick Morgenthaler, Gabriel Moresco, Mike Morrison, Mario Mosqueira, Gisela Müller, Luciano Naka, Jonas Nilsson, Tom Noah, Valeria Ojeda, José Luis Orgeira, Ulises Ornstein, Diego Oscar, Daniel Pandini, Aníbal Parera, Pablo Petracci, Richard Phillips, Cristina Pita, Hernán Povedano, Germán Prancetti, Gustavo Puente, Germán Pugnali, Patricio Ramírez Llorens, Ramiro Ramírez, Ginger Rebstock, Luis Ricciuto, Fernando Riera, Guillermo Rivera, Luis Rivera, Oscar Rodríguez, Hernán Rodríguez Goñi, Alejandro Ronchetti, Juan Manuel Rubio, Carlos Saibene, Sergio Salvador, Nadia Sánchez, Javier Sanguinetti, Fabrice Schmitt, Karl-Ludwig Schuchmann, Sergio Seipke, José Segovia, Héctor Slongo, Heber Sosa, Walter Stein, David Stejskal, Brent Stephenson, Walter Svagelj, Lorenzo Sympson, Leandro Tamini, Verónica Tejerina, Luis Tejo, Andrés Terán, Robert Tizard, Martín Toledo, Matías Torreguitar, Jorge Omar Torres, Jorge Veiga, Carolina Venninni, David Vergara, Félix Vidoz, Olga Villalba, Federico Villegas, Silvia Vitale, Emilio White, Bret Whitney, Marcelo Wioneczak y Leonardo Wolf.

INTRODUCCIÓN

A comienzos de este siglo, Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) publican una lista de aves actualizada con 998 especies para el territorio de la República Argentina. Estos autores incluyeron completos y rigurosos análisis que continúan siendo una importante referencia para investigadores, conservacionistas y observadores de aves. Con la popularización de la fotografía digital y la proliferación de información accesible a través de internet, un creciente número de personas comenzó a registrar nuevas especies para el país y confirmar muchas otras que carecían de la evidencia necesaria. Por consiguiente, resulta oportuno resumir los hallazgos acontecidos durante los últimos 20 años y de esta manera reorganizar la lista oficial de la avifauna argentina.

En este trabajo se catalogan como especies *nuevas* aquellas que fueron descubiertas o confirmadas luego de la aparición de la lista de Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Muchas de estas novedades son producto de reorganizaciones taxonómicas, debido a un mayor conocimiento de las técnicas moleculares y los límites de especie. Pusimos especial énfasis en compilar los registros de las especies *raras* de nuestro país, aquellas que poseen menos de 10 (diez) registros documentados en total o en los últimos 50 años (*i.e.* a partir de 1972). Incluimos además las especies observadas en territorio nacional pero que todavía no cuentan con evidencias físicas comprobables, es decir las especies *hipotéticas*. De forma accesoria adicionamos y eliminamos registros ya existentes, que favorecidos por una minuciosa revisión de especímenes de museo y bibliografía son sumados al conocimiento actual de cada especie tratada.

En el curso de nuestra revisión encontramos que algunas especies debían ser eliminadas, y en cada caso se argumentan las razones de esta decisión. También excluimos de nuestros comentarios aquellas especies cuya presencia es producto de una introducción antrópica, y que por el momento no cuentan con poblaciones naturalizadas. Una extensa revisión de bibliografía y consulta a los principales museos del mundo no es suficiente para cumplir nuestra meta. Es por ello que consultamos a numerosos ornitólogos, aficionados y repositorios digitales de grabaciones y/o fotografías en internet. Fueron incorporados todos los registros hasta julio de 2022. Somos conscientes de la imposibilidad de acceder a la totalidad de la información, pero creemos que nuestra labor puede ser la base de futuros trabajos que definan el real estatus de éstas y otras especies. En caso de hallar especies nuevas o raras, recomendamos que las mismas sean comunicadas en revistas especializadas o en la plataforma eBird.

Es esperable que la lista de aves de un país cambie constantemente a medida que avanza el conocimiento en temas como identificación, patrones de migración y taxonomía. Los avances tecnológicos y la capacidad de viajar a lugares remotos ayudaron en gran medida tanto a popularizar la observación de aves como a facilitar la obtención de evidencia de muchas especies consideradas raras en el pasado. Por lo tanto, los cambios de categorías pueden ser reales o simplemente reflejar un aumento de detecciones en áreas previamente desconocidas. Los cambios que ocurren a nivel global afectan a las especies de distinta manera, por ende especies que en el pasado fueron comunes hoy podrían haberse vuelto raras y viceversa. Especies actualmente consideradas extintas tanto a nivel local como global fueron incluidas ya que están contenidas dentro de nuestro criterio de rareza.

El área geográfica abarcada es la misma que en Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) para una mejor comparación entre ambos trabajos. Esto incluye la Argentina continental, el mar argentino, las islas subantárticas (Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur) y el sector antártico argentino (Mapa 1). Tanto en el ordenamiento taxonómico como para la nomenclatura científica e inglesa, seguimos los lineamientos del SACC (Remsen *et al.* [2021] *Classification of the bird species of South America*. American Ornithologists' Union). Los nombres vernáculos en castellano fueron tomados de Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides), incluyendo el cambio del epíteto "común" propuesto por Gallegos *et al.* ([2020] *Nuevos nombres para algunas aves de Argentina*. Aves Argentinas). En caso de encontrar algún nombre alternativo en la bibliografía, el mismo es mencionado entre paréntesis.

Presentamos un formato que simplifique la información disponible, sea de rápida comprensión y a la vez genere una lectura fluida. Para todas las especies se incluye su distribución, y a continuación se enumeran los registros nacionales a los cuales tuvimos acceso. En algunos casos se brinda información sobre taxonomía y comentarios acerca del estatus asignado. Toda la bibliografía consultada se encuentra inserta en el cuerpo principal del texto. Gran parte del esfuerzo se concentró en conseguir la evidencia concreta proveniente del país, tanto mediante especímenes de museo así como en la búsqueda de grabaciones o fotografías de limitado acceso. Al mismo tiempo se logró compilar una considerable colección de bibliografía en formato electrónico, que esperamos se encuentre disponible para todos los interesados en ornitología y/o la naturaleza en general.

NOMBRE COMÚN | *Nombre científico*
DISTRIBUCIÓN: Área geográfica donde la especie está presente y movimientos migratorios generales. En algunos casos se mencionan registros extralimitales o poblaciones relictuales.
REGISTROS: Se enumeran todos los registros a los que tuvimos acceso para la mayoría de las especies. Los números en negrita representan observaciones documentadas. Para las especies con numerosos registros, incluimos únicamente los correspondientes hasta alcanzar las primeras 10 (diez) evidencias. No se incluyen registros para las novedades derivadas de cambios taxonómicos, a menos que se considere rara.
TAXONOMÍA: Se comenta el estatus taxonómico de cada especie que lo amerite.
COMENTARIOS: Notas sobre alguno de los registros mencionados. También se detallan registros erróneos, observaciones en países limítrofes y publicaciones recientes de especies con numerosas observaciones documentadas.
ESPECÍMENES: Acrónimo del museo y número de los ejemplares examinados.

Utilizamos las siguientes categorías para agrupar a las especies tratadas en este trabajo, de acuerdo a la bibliografía disponible, evidencias rastreadas y experiencia personal. Las letras entre paréntesis corresponden a los códigos utilizados en el texto principal y el Apéndice 1.

ESPECIES NUEVAS (N): Especies descubiertas o confirmadas luego de la publicación de la última lista comentada (Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*), o que por diversos motivos no fueron incluidas por estos autores. Algunas de ellas son producto de cambios taxonómicos recientes (CT).

ESPECIES RARAS (R) Y VAGANTES (V): Especies confirmadas que poseen menos de 10 (diez) registros documentados en total o en los últimos 50 años (*i.e.* a partir de 1972). Aquellas cuya presencia se asume que es meramente accidental o errática (sin una población estable), se las considera *vagantes (= errantes)*.

TAXA NO ASIGNADOS A NIVEL DE ESPECIE: Utilizado en los taxa que no pueden ser determinados a nivel de especie, por lo tanto se requieren mayores estudios para esclarecer su presencia en el país.

POSIBLES CAMBIOS TAXONÓMICOS: Subespecies propuestas como especies válidas, pero que aún no han sido ampliamente reconocidas por la comunidad científica.

ESPECIES HIPOTÉTICAS: Especies mencionadas para la fauna argentina que no cuentan con la evidencia física necesaria (*i.e.* fotografía, grabación, filmación o espécimen de museo) que avale dicha observación.

ESPECIES ELIMINADAS Y NO ACEPTADAS: Especies incluidas por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*), pero que actualmente se considera que deben ser eliminadas de la lista de aves de Argentina. Otras especies han sido recientemente propuestas para su incorporación a la avifauna nacional, pero no fueron aceptadas por la comunidad ornitológica o se discuten en el presente trabajo.

ESPECIES ENDÉMICAS, MIGRATORIAS E INTRODUCIDAS

Los criterios de endemismo provienen de Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides). Para la clasificación de migraciones se utilizó mayormente a Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) con ciertas modificaciones. No fueron considerados los movimientos irregulares de algunos grupos (*p. e.* familia Anatidae), como así tampoco los complejos patrones migratorios de las aves pelágicas. Las letras entre paréntesis corresponden a los códigos utilizados en el texto principal y el Apéndice 1.

ESPECIE ENDÉMICA (E): Especie que habita exclusivamente en el territorio de la República Argentina.

ENDÉMICA DE CRÍA (Ec): Especie que se reproduce únicamente dentro del territorio argentino, pero que posteriormente puede ser registrada en países limítrofes.

MIGRANTE NEÁRTICA (Mn): Especie que se reproduce en el hemisferio norte y luego migra hacia las regiones australes para pasar la etapa post-reproductiva.

MIGRANTE AUSTRAL (Ma): Especie que nidifica en territorio argentino durante la primavera austral, y posteriormente realiza una migración fuera del país hacia regiones más septentrionales.

MIGRANTE PARCIAL (Mp): Especie que nidifica en Argentina y durante el invierno se desplaza mayormente dentro del territorio nacional.

VISITANTE INVERNAL (Vi): Especie que en invierno alcanza el noreste de Argentina desde las serranías del sudeste de Brasil.

ESPECIE INTRODUCIDA (I): Especie que no habita naturalmente en el territorio argentino, pero que se ha establecido formando poblaciones estables y nidificantes.

ABREVIATURAS

CINZ: Código Internacional de Nomenclatura Zoológica
E: este
km: kilómetros
MN: Monumento Natural
msnm: metros sobre el nivel del mar
N: norte
NE: noreste
NO: noroeste
O: oeste
PN: Parque Nacional
PP: Parque Provincial
RB: Reserva de Biósfera
RE: Reserva Ecológica
RM: Reserva Municipal
RN: Reserva Nacional
RNE: Reserva Natural Estricta
RP: Reserva Provincial
S: sur
s/n: sin número
SACC: South American Classification Committee
SE: sudeste
SO: sudoeste
W: oeste (en coordenadas geográficas)

ACRÓNIMOS DE MUSEOS, COLECCIONES E INSTITUCIONES

AA/AOP: Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246, Buenos Aires, Argentina.
AMNH: American Museum of Natural History. Central Park West & 79th Street, New York, USA.
ANSP: The Academy of Natural Sciences of Drexel University. 1900 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, USA.
APN: Administración de Parques Nacionales. Carlos Pellegrini 657, Buenos Aires, Argentina.
CENAA: Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Argentina.
CHMO: Museo de Ciencias Naturales de Oberá. Ucrania 1050, Parque de las Naciones, Oberá, Misiones, Argentina.
CIES: Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales. Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.
CIPNI: Centro de Interpretación del Parque Nacional Iguazú. Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.
CNH: Museo de Ciencias Naturales e Historia, Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya. Centro Multicultural La Costanera. Avenida Costanera Jorge Kemerer, Posadas, Misiones.
COFML: Colección Ornitológica, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 200, San Miguel de Tucumán, Argentina.
COFML-SHIPTON: Colección Ornitológica Stewart Shipton, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 200, San Miguel de Tucumán, Argentina.

COI-IADIZA: Colección Ornitológica, Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, Conicet. Avenida Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín, Mendoza, Argentina.
CORD: Herbario de la Universidad Nacional de Córdoba, Conicet. Avenida Vélez Sarsfield 249, Córdoba, Argentina.
DMNS: Denver Museum of Nature and Science. 2001 Colorado Boulevard, Denver, USA.
FC: Falklands Conservation. Jubilee Villas, Ross Road, Port Stanley, Falkland Islands.
FMNH: Field Museum of Natural History. 1400 S Lake Shore Dr., Chicago, USA.
FML: Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 200, San Miguel de Tucumán, Argentina.
IAA: Instituto Antártico Argentino. Avenida 25 de Mayo 1147, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.
LACM: Los Angeles County Museum of Natural History. 900 Exposition Boulevard, Los Angeles, USA.
LSUMZ: Museum of Natural Science, Louisiana State University. 119 Foster Hall, Baton Rouge, USA.
MAB: Museo Amado Bonpland. Avenida Costanera General San Martín 100, Corrientes, Argentina.
MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Ángel Gallardo 490, Buenos Aires, Argentina.
MAS: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano. Carlos Gardel 62, Paraná, Argentina.
MCZ: Museum of Comparative Zoology, Harvard University. 26 Oxford Street, Cambridge, USA.
MFA: Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Primera Junta 2859, Santa Fe, Argentina.
MHNG: Museum d'Histoire Naturelle de Genève. Route de Malagnou 1, Genève, Suisse.
MJF: Museo de la Selva Juan Foerster. Calle 44 n° 739, Miramar, Buenos Aires, Argentina.
MNHN: Muséum National d'Histoire Naturelle. 57 rue Cuvier, Paris, France.
MNP: Museo Natural Mesopotámico Ince Apóstol. Avenida Madariaga s/n, Parque Mitre, Mercedes, Corrientes, Argentina.
MNRJ: Museu Nacional do Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil.
MLNS: Macaulay Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology. 159 Sapsucker Woods road, Ithaca, USA.
MLP: Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.
MOMB: Museo Ornitológico Municipal de Berisso. Montevideo 821, Berisso, Buenos Aires, Argentina.
MRAC: Museo Regional Aníbal Cambas. Roque González 3300, Posadas, Argentina.
MP: Museo de la Patagonia. Centro Cívico s/n, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
MVZ: Museum of Vertebrate Zoology, University of California. Valley Life Sciences Building, 3101 UC Berkeley road, Berkeley, USA.
MZUC: Museo de Zoología, Academia Nacional de Ciencias, Universidad Nacional de Córdoba. Avenida Vélez Sarsfield 249, Córdoba, Argentina.
MZUT: Museo Regionale di Scienze Naturali, Sezione di Zoologia. Via Giolitti 36, Torino, Italia.
NHMUK (= BMNH): The Natural History Museum. Akeman Street, Tring, UK.
NML: World Museum. William Brown Street, Liverpool, UK.
NMNH (= USNM): National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Constitution Avenue & 10th Street, Washington, USA.
NMNZ: Museum of New Zealand, Te Papa Tongarewa. 55 Cable Street, Wellington, New Zealand.
RMNH: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (= Naturalis Biodiversity Center). Darwinweg 2, Leiden, The Netherlands.
UMMZ: University of Michigan Museum of Zoology. 3600 Varsity Drive, Ann Arbor, Michigan, USA.
UMZC: Museum of Zoology, University of Cambridge. Downing Street, Cambridge, UK.
USGS-PWRS: United States Geological Survey (= Patuxent Wildlife Research Center). 12100 Beech Forest Road, Laurel, USA.
WFVZ: Western Foundation of Vertebrate Zoology. 439 Calle San Pablo, Camarillo, USA.
YPM: Yale Peabody Museum of Natural History. 170 Whitney Avenue, New Heaven, USA.
ZMB: Museum für Naturkunde. Invalidenstrasse 43, Berlin, Deutschland.
ZMUU: Museum of Evolution, Uppsala University. Norbyvägen 16, Uppsala, Sweden.
ZSM: Zoologische Staatssammlung. Münchhausenstrasse 21, München, Deutschland.
ZSRO: Zoologischen Sammlung der Universität Rostock. Universitätsplatz 2, Rostock, Deutschland.

Mapa 1. Argentina continental, Antártida argentina e islas subantárticas

ESPECIES NUEVAS

Un total de 83 especies fueron incorporadas al elenco de la avifauna local durante el periodo 2001-2022 (15 de ellas provenientes de cambios taxonómicos). Muchas habían sido catalogadas como *hipotéticas* por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), y recientemente confirmadas mediante documentación. Esta actualización da como resultado un listado de 1074 especies de aves para la República Argentina (Apéndice 1).

PATO CUCHARA BOREAL | *Spatula clypeata* | N V

Distribución: Se reproduce en las regiones Paleártica y Neártica. Luego de la etapa reproductiva realiza una migración hacia el N de Sudamérica, N de África y centro de Asia (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un macho fotografiado por Fabio Olmos en la laguna de Tonchi, departamento Río Chico, Santa Cruz el 10 de enero de 2012. El mismo permaneció en el sitio al menos hasta el 18 de marzo de ese año, fecha en la que fue fotografiado por Ignacio Roesler y Wesley Overman (Roesler *et al.* [2013] *Nuestras Aves* 58: 32-34; ebird.org/checklist/S52865215).
2. Un macho en plumaje de eclipse fotografiado por Luis Pagano, Juan Klavins y Carlos Ferreyra en la laguna C-233 de la meseta La Siberia (49°04'S 71°45'W), departamento Lago Argentino, Santa Cruz entre el 4 y el 20 de marzo de 2015 (L. Pagano *obs. pers*.).
3. Un macho adulto fotografiado por Zulima Schupbach en Trelew, departamento Rawson, Chubut entre el 17 y el 20 de noviembre de 2018 (Schupbach [2019] *EcoRegistros Revista* 9: 11-13).
Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Anas* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

PATO CUCHARA AUSTRALIANO | *Spatula rhynchotis* | N V

Distribución: La subespecie nominal en Australia y Tasmania, mientras que la subespecie *variegata* se encuentra restringida a Nueva Zelanda (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un macho en plumaje nupcial colectado en "*Rep. Arg. = Entre Ríos*", sin fecha ni datos de colector (Crozariol & Nacinovic [2017] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137: 312-314). El espécimen se encuentra depositado en el MNRJ.
Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Anas* (Pizzey & Knight [2007] *The Field Guide to the Birds of Australia*. Harper Collins).
Comentarios: Este ejemplar representa la primera y única mención de la especie para Argentina y Sudamérica, además del primer hallazgo fuera de Australasia. Si bien los autores argumentan convincentemente, no debería descartarse la posibilidad de que pertenezca a un ave de cautiverio. Más aun teniendo en cuenta que el general Justo José de Urquiza era un abocado coleccionista de aves exóticas y pasó sus últimos años en Entre Ríos, coincidiendo con la fecha que se asume fue obtenido este ejemplar.
Especímenes (1): **MNRJ**-19034

PAVA DE MONTE YUNGUEÑA | *Penelope bridgesi* | N (CT)

Distribución: Andes desde el centro de Bolivia hasta el NO de Argentina (del Hoyo [1994] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 2. Lynx Edicions).
Taxonomía: Descripta por George Gray ([1860] *Proceedings of the Zoological Society of London* 28: 269-272) con material tipo proveniente de Bolivia, y considerada tradicionalmente una subespecie de la PAVA DE MONTE RIBEREÑA *Penelope obscura*. Evangelista-Vargas & Silveira ([2018] *Zoologia* 35: e12993) demuestran en base al análisis de coloración, morfología y distribución alopátrica, que estas poblaciones deben considerarse especies distintas. Dicha propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop875.htm).

Comentarios: La población argentina se conoce desde hace tiempo, tal como lo evidencian las antiguas menciones para Tucumán, Catamarca y Jujuy (Burmeister [1860] *Journal für Ornithologie* 46: 241-268; White [1882] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882: 591-629; Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221; Baer [1904] *Ornis* 12: 209-234; Bruch [1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259). La confusa y variada nomenclatura fue posteriormente aclarada por Miguel Lillo ([1909] *Apuntes de Historia Natural* 1: 21-26).

MACÁ ANDINO | *Podiceps juninensis* | N (CT)

Distribución: Andes desde Colombia hasta el N de Chile y NO de Argentina, entre los 3000-5000 msnm (Llimona & del Hoyo [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Taxonomía: Descripta por Hans von Berlepsch y Jean Stolzmann ([1894] *Ibis* 36: 109-112) con especímenes provenientes del lago Junín, Perú y tradicionalmente considerada una subespecie del MACÁ PLATEADO *Podiceps occipitalis*. Seguimos el actual tratamiento de BirdLife International que sugiere que la subespecie *juninensis* sea reconocida como especie válida (datazone.birdlife.org).
Comentarios: La primera cita para Argentina corresponde a una serie de ejemplares colectados por Demetrio Rodríguez en Salta y Jujuy (Zotta [1935] *Hornero* 6: 104-106).

TORCAZA ALA BLANCA | *Zenaida meloda* | N

Distribución: Sobre la costa del Pacífico, desde el S de Ecuador hasta el N de Chile (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).
Registros: **1**-2. Un ejemplar grabado y fotografiado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en Villa Unión, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 1 de marzo de 2007 (Bodrati & Cockle [2008] *Hornero* 23: 35-36). Estos autores mencionan haber escuchado varios individuos los días previos, tanto en esta localidad como en la vecina Banda Florida.
3. Dos individuos observados por Dante Ramos en Villa Unión, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 20 de agosto de 2007 (Vitale *et al.* [2010] *Nuestras Aves* 55: 6-8).
4-5. Al menos diez ejemplares grabados y fotografiados por Ignacio Roesler y Emilio Jordan en Villa Unión, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 29 y 30 de diciembre de 2007 (Vitale *et al.* [2010] *op. cit.*).
6-7. Varios individuos observados por Ignacio Roesler y Emilio Jordan en Alto Jagüé, departamento General Sarmiento, La Rioja el 30 y 31 de diciembre de 2007 (Vitale *et al.* [2010] *op. cit.*).
8-9. Varios individuos registrados por Silvia Vitale, Kristina Cockle, Alejandro Bodrati y Carlos Ferrari en Villa Unión y Banda Florida, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 7 de febrero de 2009 (Vitale *et al.* [2010] *op. cit.*).
10. Dos ejemplares observados y grabados por Silvia Vitale, Kristina Cockle, Alejandro Bodrati y Carlos Ferrari en Villa San José de Vinchina, departamento Vinchina, La Rioja el 8 de febrero de 2009 (Vitale *et al.* [2010] *op. cit.*; xeno-canto.org/54703).
11. Al menos dos ejemplares adultos, un juvenil y un nido activo fotografiados por Silvia Vitale, Kristina Cockle, Alejandro Bodrati y Carlos Ferrari en Banda Florida, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 10 de febrero de 2009 (Vitale *et al.* [2010] *op. cit.*).
12-15. Registrada por Gustavo Fava, Juan Acosta y Graciela Blanco en Villa Corral, departamento Ca-

lingasta, San Juan en septiembre de 2009, septiembre y diciembre de 2010 y septiembre de 2011 (Fava *et al.* [2013] *Nuestras Aves* 58: 12-16).
16. Un ejemplar fotografiado por Carlos Cabrera en Rincón de los Sauces, departamento Pehuenches, Neuquén el 20 de julio de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=16409). Posteriormente fue registrada con cierta regularidad en dicha localidad (Miller *et al.* [2018] *EcoRegistros Revista* 8: 17-20).
17. Un grupo de once ejemplares observados y fotografiados por Gustavo Fava, Juan Acosta y Graciela Blanco cerca del canal Guillermo Céspedes, departamento Pocito, San Juan el 3 de septiembre de 2011 (Fava *et al.* [2013] *op. cit.*).
18. Al parecer varios ejemplares observados por Raúl Fuentes en Buta Ranquil, departamento Pehuenches, Neuquén el 4 de febrero de 2015 (R. Fuentes *en* Veiga & Bianchini [2017] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 227: 1-8).
19. Un ejemplar fotografiado por Raúl Fuentes en el barrio Área de Frontera en Chos Malal, departamento homónimo, Neuquén el 15 de septiembre de 2015 (R. Fuentes *en* Veiga & Bianchini [2017] *op. cit.*).
20. Varios ejemplares observados y fotografiados por Edgardo Fernández y Raúl Raineri en Villa Regina, departamento General Roca, Río Negro entre los años 2015 y 2017 (E. Fernández y R. Raineri *en* Bianchini [2018] *Historia Natural. Tercera Serie* 8: 35-40).
21. Un ejemplar fotografiado por Raúl Fuentes en Chos Malal, departamento homónimo, Neuquén el 28 de abril de 2016 (R. Fuentes *en* Veiga & Bianchini [2017] *op. cit.*).
22. Varios ejemplares adultos y juveniles observados y fotografiados por Alicia Miller, Julián Tocce, Ricardo Vázquez e Ignacio Hernández en General Roca, departamento homónimo, Río Negro entre junio y noviembre de 2017 (Bianchini [2018] *op. cit.*; Miller *et al.* [2018] *op. cit.*).
23. Un subadulto fotografiado por Adrián Pizani en Villa La Angostura, departamento Los Lagos, Neuquén el 1 de noviembre de 2017 (A. Pizani *en* Bianchini [2018] *op. cit.*).
24. Un subadulto fotografiado por Mauro Bianchini en Villa Regina, departamento General Roca, Río Negro el 20 de enero de 2018 (Bianchini [2018] *op. cit.*).
25. Registrada por Amneris Carcar en Allen, departamento General Roca, Río Negro sin fecha. Observada por Lucas Braun en dicha localidad el 17 de febrero de 2018 y fotografiada el 29 de abril del mismo año (A. Carcar y L. Braun *en* Miller *et al.* [2018] *op. cit.*).
Comentarios: Omitimos las reiteradas observaciones publicadas en internet con relación a Villa Unión, La Rioja. Al parecer esta especie sufrió una reciente y notable expansión por el territorio nacional, con numerosos registros en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (ebird.org; ecoregistros.org).

AÑAPERO CARIBEÑO (Querequeté) | *Chordeiles gundlachii* | N V

Distribución: Cría en el extremo sur del estado de Florida, Estados Unidos e islas de la región Caribe. Su área de invernada es desconocida (Cleere [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Hasta tres ejemplares observados y grabados por Silvina Verón en San José de Feliciano, departamento Feliciano, Entre Ríos entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 (Verón [2021] *Hornero* 36: 127-129; xeno-canto.org/625890).
Comentarios: La especie regresó al mismo sitio a partir de diciembre de 2021, pudiendo ser nuevamente documentada por varios observadores (ebird.org; ecoregistros.org; Figura 1). Una hembra que crió en la isla de Guadalupe, Antillas Menores pasó la temporada no reproductiva en el estado de Amazonas, Brasil (Perlut & Levesque [2020] *Journal of Caribbean Ornithology* 33: 49-53).

Figura 1. Añapero Caribeño *Chordeiles gundlachii*, San José de Feliciano, Entre Ríos, 4 de enero de 2022 (Jorge La Grotteria)

ATAJACAMINOS CEJA BLANCA | *Hydropsalis maculicaudus* | N R

Distribución: En parches desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Bolivia, centro de Brasil y NE de Paraguay (Cleere [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en cercanías del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 15 y 20 de octubre de 2006 (Bodrati & Areta [2010] *Hornero* 25: 67-73).
2. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en cercanías del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 6 y 7 de octubre de 2008 (Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
3. Un macho observado y grabado por Alejandro Bodrati en cercanías del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 12, 14 y 15 de octubre de 2010 (A. Bodrati *in litt.*).
Taxonomía: Anteriormente en el género *Caprimulgus* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).
Comentarios: Todos los registros se efectuaron en la misma localidad, unos 2 km al sudeste del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones (A. Bodrati *in litt.*).

VENCEJO NUCA BLANCA | *Streptoprocne biscutata* | N R

Distribución: La subespecie nominal mayormente en el E de Brasil, desde Minas Gerais hasta Rio Grande do Sul. Registrada también en Paraguay y Argentina (Chantler [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Varios ejemplares sobrevolando el río Pepirí Guazú en Piñal Seco, departamento San Pe-

dro, Misiones el 10 de diciembre de 1984 (Nores & Yzurieta [1985] *Historia Natural* 5: 55-56).
2. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1986 (M. Rumboll *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
3-4. Individuos solitarios registrados por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en los años 1987 y 1988 (M. Rumboll *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
5. Un individuo observado por Jerry Warne en el PN Iguazú, Misiones el 20 de diciembre de 1992 (J. Warne *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
6. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en Colonizadora Misionera, Establecimiento Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 1 de noviembre de 2003 (A. Bodrati *en* Pearman [2012] *Nuestras Aves* 57: 32-34).
7. Un individuo observado por Juan I. Areta en el PN Iguazú, Misiones el 25 de noviembre de 2005 (J.I. Areta *en* Pearman [2012] *op. cit.*).
8-9. Un total de tres individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 17 y 20 de octubre de 2008 (A. Bodrati *en* Pearman *et al.* [2010] *Ornitología Neotropical* 21: 351-359; A. Bodrati *en* Pearman [2012] *op. cit.*).
10. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PP Caá Yarí, Misiones el 19 de octubre de 2009 (A. Bodrati *en* Pearman [2012] *op. cit.*).
11. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 5 de noviembre de 2009 (A. Bodrati *en* Pearman [2012] *op. cit.*).
12. Un grupo de 22 ejemplares fotografiado por Mark Pearman en el PP Salto Encantado, Misiones el 31 de noviembre de 2010 (Pearman [2012] *op. cit.*).
13. Un grupo filmado por Juan Teloni en el PP Salto Encantado, Misiones el 9 de noviembre de 2011 (ecoregistros.org/site/video.php?id=540).
14. Un ejemplar fotografiado por Lucas Retamosa en la RNE San Antonio, Misiones el 15 de septiembre de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=287268).
15. Un ejemplar fotografiado por Leandro Castillo y Fernando Cabral en el PN Iguazú, Misiones el 3 de junio de 2021 (ebird.org/checklist/S90140157).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*).

VENCEJO PALMERO (Vencejo de las Palmeras) | *Tachornis squamata* | N V

Distribución: Amplia distribución en el N de Sudamérica. La subespecie nominal desde las Guayanas y Trinidad hasta el centro y E de Brasil (Chantler [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un individuo observado por Julián Baigorria y un grupo de observadores en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 16 de octubre de 2015 (Baigorria [2020] *Hornero* 35: 137-139).
Comentarios: El ave permaneció en el sitio durante varios días y pudo ser fotografiada por otros observadores (Baigorria [2020] *op. cit.*; Figura 2).

Figura 2. Vencejo Palmero *Tachornis squamata*, Puerto Iguazú, Misiones, 19 de octubre de 2015 (Marcelo Gavensky)

PICAFLOR NUCA BLANCA | *Florisuga mellivora* | N V

Distribución: La subespecie nominal desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Bolivia y Brasil (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Matías Ferroni, Alec Earnshaw y Nancy Regio en la hostería Los Pecanes, partido de San Fernando, Buenos Aires el 15, 17 y 21 de febrero de 2016 (Ferroni *et al.* [2017] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 216: 1-7).
Comentarios: El mismo permaneció aproximadamente un mes en el lugar y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org; Figura 3).

Figura 3. Picaflor Nuca Blanca *Florisuga mellivora*, Los Pecanes, Buenos Aires, 6 de marzo de 2016 (Diego Oscar)

PICAFLOR TOPACIO | *Chrysolampis mosquitus* | N R

Distribución: Desde Panamá y N de Sudamérica hasta el centro de Brasil y N de Bolivia (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un ejemplar supuestamente colectado por Carlos Berg en la provincia de Misiones, sin más detalles (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad.
2. Un individuo observado por Germán Pugnali y Mark Pearman en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de abril de 2001. El mismo fue fotografiado por Norberto Bolzón y Roberto Güller en dicha localidad el 28 de abril, y visto por última vez el 1 de mayo de ese año (Pugnali & Pearman [2001] *Hornero* 16: 93-95).

3. Registrada en reiteradas ocasiones en la intendencia del PN Iguazú ubicada en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones durante el otoño de 2001 (Chebez *et al.* [2004] *Hornero* 19: 1-5).
4. Un individuo observado por Rodrigo Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 18 de abril de 2002 (Chebez *et al.* [2004] *op. cit.*).
5. Un macho juvenil (posiblemente el mismo de la observación anterior) filmado en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 26 y el 29 de abril de 2002 (Chebez *et al.* [2004] *op. cit.*). La filmación no se encuentra disponible.
6. Una hembra observada por Ramiro Ramírez en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de marzo de 2014 (ebird.org/checklist/S31734836).
7. Un macho adulto observado por Emiliano García Loyola en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38631553).
8. Un joven fotografiado por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 11 de abril y el 17 de mayo de 2020 (Castillo & Florentín [2020] *Nuestras Aves* 65: 76).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La especie al parecer frecuenta regularmente el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, Misiones (Ignacio Roesler *in litt.*).

PICAFLOR GARGANTA ESCAMADA | *Heliomaster squamosus* | N R

Distribución: Endémica del E de Brasil, desde Pernambuco hasta São Paulo (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo observado por Flavio Moschione en la RP Guaycolec, Formosa el 9 de enero de 1991 (F. Moschione *en* Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).
2. Un ejemplar filmado y fotografiado por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 29 de octubre y el 28 de noviembre de 2009 (Castillo & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 40: 1-8).
3. Dos individuos observados por Warren Stevens en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de septiembre de 2016 (ebird.org/checklist/S31757055).
4. Un macho fotografiado por Gustavo Puente en Gualeguaychú, departamento homónimo, Entre Ríos entre el 26 de marzo y el 30 mayo de 2020 (Puente *et al.* [2020] *Nuestras Aves* 65: 84). El ejemplar reapareció en el sitio en septiembre y diciembre del mismo año (ecoregistros.org; Figura 4).



Figura 4. Picaflor Garganta Escamada *Heliomaster squamosus*, Gualeguaychú, Entre Ríos, 6 de diciembre de 2020 (Gustavo Puente).

Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La inclusión por parte de Olrog ([1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324) provino de una confusión de Martín de la Peña que posteriormente corrigió mencionando que en realidad se trataba de hembras de PICAFLOR DE BARBIJO *Heliomaster furcifer* con mancha oscura en la garganta (de la Peña [2004] *Nuestras Aves* 47: 31; ver además *Heliomaster longirostris*).

PICAFLOR TIJERETA | *Eupetomena macroura* | N

Distribución: Ampliamente distribuida en el centro-este de Sudamérica. La subespecie nominal desde las Guayanas a través del N, centro y SE de Brasil hasta São Paulo. La subespecie *cyanoviridis* en la Serra do Mar del estado de São Paulo (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho observado por Hernán Povedano en el PN Iguazú, Misiones el 22 de julio de 1993 (H. Povedano *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA).

2. Registrada por David Stejskal y Candice Lowther en el PN Iguazú, Misiones el 12 de octubre de 2002 (ebird.org/checklist/S52693654).

3. Un ejemplar fotografiado por Rodrigo Castillo y Silvia Vitale en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre enero y julio de 2005 (Chebez *et al.* [2006] *Hornero* 21: 49-51). El mismo fue registrado en esa localidad hasta octubre de ese año (ebird.org).

4. Un individuo observado por Ernesto Krauczuk en Piñalito Norte, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 18 de julio de 2005 (E. Krauczuk *en* Straube *et al.* [2006] *Atualidades Ornitológicas* 132: 1-9; del Castillo *et al.* [2012] *Atualidades Ornitológicas* 170: 12-15).

5. Observada en reiteradas ocasiones en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre enero y octubre de 2006 (Castillo *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 68-69).

6. Un individuo observado por Scott Mills en el PN Iguazú, Misiones el 17 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S20277396).

7. Un individuo observado en reiteradas ocasiones en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre 1 y el 5 de enero de 2007 (Castillo *et al.* [2009] *op. cit.*).

8. Un individuo observado por Santiago Imberti, Hernán Casañas y un grupo de observadores en el PP Urugua-í, Misiones el 5 de agosto de 2008 (ebird.org/checklist/S27277469).

9. Registrada en forma regular en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre agosto de 2008 y febrero de 2021 (Castillo *et al.* [2009] *op. cit.*; del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*; ebird.org; ecoregistros.org).

10. Un individuo observado por Marcelo Allende en Posadas, departamento Capital, Misiones el 1 de mayo de 2010 (ebird.org/checklist/S23617648).

11. Un ejemplar fotografiado por Silvia Kruchowski en Garupá, departamento Capital, Misiones durante el primer semestre de 2011 (del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*).

12. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 8 de noviembre de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=10528).

13. Un individuo observado por Rodrigo Martínez Gamba en Puerto Rico, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 24 de abril de 2012 (del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*).

14. Dos ejemplares fotografiados por Marcelo Allende en Posadas, departamento Capital, Misiones entre el 5 y el 8 de junio de 2012 (del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*).

15. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Allende en Posadas, departamento Capital, Misiones el 7 de octubre de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=191025).

16. Un ejemplar fotografiado por Lucas Retamoza en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 6 de abril de 2013 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=29420).
17. Dos ejemplares fotografiados por Joel y Guillermo Martínez en Puerto Esperanza, departamento Iguazú, Misiones el 20 y 21 de junio de 2014 (ebird.org/checklist/S52594433).
18. Un ejemplar fotografiado por Horacio Dali en Campo Ramón, departamento Oberá, Misiones el 26 de diciembre de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=87502).
19. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en Oberá, departamento homónimo, Misiones el 7 de abril de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=212716).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Una pareja y un juvenil fotografiados en San Pedro, departamento homónimo, Misiones durante septiembre y octubre de 2015 (Bodrati *et al.* [2016] *Nuestras Aves* 61: 24). Recientemente registrada por primera vez en la provincia de Corrientes (Bernasconi *et al.* [2019] *EcoRegistros Revista* 9: 1-3).

PICAFLOR PECHO AZUL | *Chionomesa lactea* | N R

Distribución: La subespecie nominal en el centro y S de Brasil, desde Bahia hasta São Paulo (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Roberto Güller en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 30 de abril de 2001 (Chebez *et al.* [2004] *Hornero* 19: 1-5; Anónimo [2005] *Nuestras Aves* 49: 11).
2. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 3 de julio de 2004 (Militello & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 32: 1-5).
3. Un ejemplar filmado por Norberto Oste en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de agosto de 2004 (Güller & Oste [2011] *Nuestras Aves* 56: 12-13).
4. Registrada por Sebastián Dardanelli en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de abril de 2011 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=249566).
5-6. Dos ejemplares fotografiados por Roberto Güller en Comandante Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 21 y 23 de julio y el 25 de agosto de 2012 (Güller & Rodríguez [2013] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 130: 1-5). Los mismos permanecieron en el sitio durante la primavera de ese año, pudiendo ser registrados por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org).
7. Hasta dos individuos observados diariamente por Emilio White en Puerto Libertad, departamento Iguazú, Misiones entre julio y septiembre de 2012 (E. White *en* Güller & Rodríguez [2013] *op. cit.*).
8. Un ejemplar fotografiado por Gustavo Castaing en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 23 de febrero de 2017 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=199077).
9. Un ejemplar fotografiado en forma regular en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones durante julio de 2017 (ebird.org; ecoregistros.org).
10. Un ejemplar fotografiado por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de julio de 2019. El mismo permaneció aproximadamente dos semanas en el sitio (Rodríguez *et al.* [2020] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 306: 1-4).
11. Un ejemplar fotografiado por Natalia Vreys y Fernando Cabral en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 20 de marzo de 2021 (ebird.org/checklist/S83876488).
Taxonomía: Anteriormente incluida en el género *Amazilia* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

PICAFLOR LAZULITA | *Chlorestes cyanus* | N R

Distribución: Ampliamente distribuida en la región amazónica. La subespecie *griseiventris* restringida a la costa de São Paulo y el NE de Argentina (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho colectado en Necochea, partido homónimo, Buenos Aires en enero de 1926 (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 420). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad.

2. Un macho observado por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal a la vera del río Bermejo, departamento Orán, Salta el 15 de julio de 1988 (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata).

3-4. Al menos dos individuos observados por Flavio Moschione en el río Cayotal entre Trigohuaico y Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 28 y 29 de julio de 1992 (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).

5. Un individuo observado por Flavio Moschione sobre el río Cayotal cerca de Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 16 de septiembre de 2007 (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).

Figura 5. Picaflor Lazulita *Chlorestes cyanus*, PP de la Araucaria, Misiones, 13 de enero de 2008 (Alejandro Bodrati)

6. Un ejemplar fotografiado por Alejandro Bodrati en el PP de la Araucaria, Misiones el 12 y 13 de enero de 2008 (A. Bodrati *en* de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 6: 1-348; A. Bodrati *in litt.*; Figura 5).

7. Un ejemplar hallado muerto por Carlos Cuñado y Silvia Strelkov en el abra de Lizoite, departamento Santa Victoria, Salta el 27 de octubre de 2010 (Cuñado *et al.* [2012] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 95: 1-5).

8. Dos machos observados por Flavio Moschione en la confluencia de los ríos Lipeo y Bermejo, PN Baritú, Salta el 6 de septiembre de 2013 (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).

Taxonomía: Anteriormente incluida en el género *Hylocharis* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes.* Harper Collins).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas.* Lynx Edicions). Las observaciones referidas a la provincia de Salta son la fuente para su inclusión en la avifauna de dicha provincia (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta.* Ministerio de Cultura y Turismo). Una observación de Andrea Pigazzi en el PN Iguazú, Misiones en la década de 1980 requiere confirmación (Hernán Casañas *en* Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).

BURRITO OCELADO | *Micropygia schomburgkii* | N R

Distribución: La subespecie *chapmani* ocupa en forma fragmentada una extensa región del SE de Perú, N de Bolivia, centro y SE de Brasil y E de Paraguay (Taylor & Sharpe [2020] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: 1. Un individuo escuchado por Alejandro Bodrati y Martjan Lammertink en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 13 de febrero de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *Ornithology Research* 28: 185-190).
2. Un total de 18 ejemplares escuchados y algunos grabados por Alejandro Bodrati y Martjan Lammertink en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones entre el 25 y el 29 de febrero de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *op. cit.*).
3. Cuatro individuos escuchados y grabados por Alejandro Bodrati, Néstor Fariña y Olga Villalba en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 5 de marzo de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *op. cit.*).
4. Cinco individuos escuchados por Alejandro Bodrati y Facundo Di Sallo en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 16 de marzo de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *op. cit.*).
5. Seis individuos escuchados y grabados por Alejandro Bodrati, Martjan Lammertink y Facundo Di Sallo en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 18 y 19 de agosto de 2020 (A. Bodrati y F. Di Sallo *in litt.*).
Comentarios: A partir de su descubrimiento en el país se sucedieron numerosos registros en la misma localidad (ebird.org), sugiriendo que por el momento la especie se encuentra establecida con éxito en la reserva Campo San Juan, Misiones.

CHORLITO MONGOL | *Charadrius mongolus* | N V

Distribución: Durante la época reproductiva ocupa en forma fragmentada la región oriental de Asia, desde los Himalayas hasta Siberia. Luego migra hacia las costas del océano Índico, SE de Asia y Australia (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Un adulto en plumaje nupcial fotografiado por Arnaud Le Nevé en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 30 de marzo de 2011 (Le Nevé & Manzione [2011] *Hornero* 26: 177-180; Figura 6).
Taxonomía: El ejemplar de Punta Rasa, Buenos Aires fue asignado a la subespecie *stegmanni*, que nidifica en el norte de Siberia y pasa el invierno desde China hasta Australia (Le Nevé & Manzione [2011] *op. cit.*).
Comentarios: Este registro constituye el primero para Argentina y Sudamérica. Una especie no identificada de *Charadrius* hallada en Rio



Figura 6. Chorlito Mongol *Charadrius mongolus*, Punta Rasa, Buenos Aires, 30 de marzo de 2011 (Arnaud Le Nevé)

Grande do Sul, Brasil probablemente pertenezca a esta especie (Franz *et al.* [2018] *Iheringia. Série Zoologia* 108: e2018005). Un ejemplar fotografiado por Renato Munarriz en la RN de Paracas, Perú el 23 de abril de 2021 (ebird.org/checklist/S86564477).

PLAYERO GIGANTE | *Numenius arquata* | N V

Distribución: Su área de cría comprende una amplia región del N de Europa y Asia. Durante la época no reproductiva se dispersa hacia las costas del Mediterráneo, África, el océano Índico y el SE asiático (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por David Vander Pluym y John Sterling en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 27 y 28 de enero de 2010 (Vander Pluym & Sterling [2019] *Cotinga* 41: 41-43). El individuo permaneció varios días en el sitio y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org).
2. Un ejemplar fotografiado por Martín Juárez en Mar Chiquita, departamento homónimo, Buenos Aires el 11 de marzo de 2019 (ebird.org/checklist/S53920321; Figura 7).
Comentarios: La observación efectuada en Punta Rasa, Buenos Aires constituye el primer registro para Sudamérica.

Figura 7. Playero Gigante *Numenius arquata*, Mar Chiquita, Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 (Martín Juárez)

COMBATIENTE | *Calidris pugnax* | N V

Distribución: Se reproduce en una amplia región al N de Asia y Europa. Posteriormente migra hacia el S ocupando principalmente el medio oriente, África e India (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Christoph Bock y Tom Noah en Ceibas, departamento Islas del Ibicuy, Entre Ríos el 9 de noviembre de 2007 (ebird.org/checklist/S76539059; Figura 8).

Figura 8. Combatiente *Calidris pugnax*, Ceibas, Entre Ríos, 9 de noviembre de 2007 (Christoph Bock)

Taxonomía: Tradicionalmente en el género monotípico *Philomachus*, aunque estudios moleculares recientes lo incorporan dentro de *Calidris* (Gibson & Baker [2012] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 64: 66-72; Banks [2012] *Zootaxa* 3513: 86-88).

Comentarios: Para una revisión de los registros en Sudamérica ver Remsen *et al.* ([2021] *Classification of the bird species of South America*. American Ornithologists' Union).

PLAYERO ZARAPITÍN | *Calidris ferruginea* | N V

Distribución: Nidifica en un área relativamente pequeña al N de Rusia. En la época no reproductiva ocupa gran parte de África, Asia y Australia (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: **1**. Un ejemplar colectado por William Burnett y Robert Fitzroy en el "*Este de la Patagonia*", sin fecha (Sharpe [1896] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 24. London). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 9).

2. Un ejemplar fotografiado por Martín Toledo y Agustín Quaglia en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 17 de octubre de 2013 (Toledo *et al.* [2018] *Revista Brasileira de Ornitologia* 26: 214-216; Figura 10).

Figura 9. Playero Zarapitín *Calidris ferruginea*, NHMUK-1837.2.21.254, este de la Patagonia (The Natural History Museum)

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), quienes no pudieron hallar el

Figura 10. Playero Zarapitín *Calidris ferruginea*, Mar Chiquita, Córdoba, 17 de octubre de 2013 (Martín Toledo)

espécimen en el BMNH (= NHMUK). Claës Olrog ([1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324) menciona que el ejemplar obtenido fue capturado en la costa de la provincia de Chubut.
Especímenes (1): **NHMUK**-1837.2.21.254

PLAYERITO MENOR | *Calidris minutilla* | N

Distribución: Nidifica en una amplia región de Norteamérica, y posteriormente migra hacia el sur llegando hasta Chile y Brasil (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Un individuo observado por Alan Hemmings en Signy Island, Orcadas del Sur el 8 de diciembre de 1981. Supuestamente el mismo fue relocalizado el 26 de enero de 1982 y registrado a diario hasta el 2 de febrero del mismo año (Hemmings [1985] *British Antarctic Survey Bulletin* 69: 81-82).
2. Un ejemplar fotografiado por Juan Maceda, Federico Bruno y Daniela Acevedo en la laguna El Uncal, departamento Chalileo, La Pampa el 11 de febrero de 2007 (Maceda *et al.* [2008] *Hornero* 23: 95-98).
3. Registrada por Flavio Moschione en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy en febrero de 2008 (F. Moschione *en* Camperi *et al.* [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140).
4. Registrada en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre febrero de 2009 y septiembre de 2010 (Rodríguez *et al.* [2011] *Flamingo* 18: 45-47).
5. Unos 16 individuos observados por Flavio Moschione en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy en febrero de 2011 (F. Moschione *en* Bianchini [2019] *Historia Natural. Tercera Serie* 9: 37-52).
6. Un grupo de 6 u 8 individuos observado por Flavio Moschione en los bañados del Quirquincho, departamento Rivadavia, Salta sin fecha (F. Moschione *com. pers.*).
7. Un ejemplar fotografiado por Mauro Bianchini y Cynthia Arenas en la laguna de Antofagasta de la Sierra, departamento homónimo, Catamarca el 7 de marzo de 2014 (Bianchini [2019] *op. cit.*).
8. Un ejemplar fotografiado por David Vergara y Martín Toledo en la laguna Mar Chiquita, departamento

San Justo, Córdoba el 11 de noviembre de 2015 (Salvador *et al.* [2016] *Listado de Aves de la Provincia de Córdoba, Argentina*; ebird.org/checklist/S26765304).
9. Un ejemplar fotografiado por Natalia Martínez-Curci en la estancia Medaland, partido de Villa Gesell, Buenos Aires el 15 de diciembre de 2017 (Martínez-Curci *et al.* [2018] *Wader Study* 125: 1-3).
10. Un ejemplar filmado por Luis Pagano, Flavio Moschione, José Segovia, Ana Sureda y Azucena Rodríguez en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 2 de febrero de 2019 (youtube.com/watch?v=F-8L0lm3jyjw; ebird.org/checklist/S53495145).
11. Un ejemplar fotografiado por Marcos Enrique en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 31 de diciembre de 2019 (Enrique *et al.* [2020] *Nuestras Aves* 65: 20-22).
12. Un individuo observado por Flavio Moschione y otros observadores en el salar de Llullaillaco, departamento Los Andes, Salta el 11 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S63420335).
13. Un ejemplar fotografiado por Horacio Luna y Martín Manassero en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 19 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S63556287).
14. Un ejemplar fotografiado por Pablo Capovilla, Mauricio Schmithalter y Marcos Soria en la laguna Añapiré, departamento La Capital, Santa Fe el 29 de febrero de 2020 (Enrique *et al.* [2020] *op. cit.*). El mismo permaneció algunos días en el área y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org; Figura 11).
15. Un ejemplar fotografiado por Juan Muñoz de Toro y Maximiliani Gilli en Colastiné, departamento La Capital, Santa Fe el 20 de septiembre de 2020 (ebird.org/checklist/S73907046).
16. Un individuo observado por Flavio Moschione, Ana Sureda, Carina Rodríguez y Walter Arias en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 14 de octubre de 2021 (ebird.org/checklist/S96542130).
17. Un ejemplar fotografiado por Horacio Luna, Camilo García y otros observadores en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 8 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98642261).
18. Un individuo observado por Flavio Moschione, Ana Sureda, María Eugenia Juez y Nicolás Rodrí-

Figura 11. Playerito Menor *Calidris minutilla*, laguna Añapiré, Santa Fe, 1 de marzo de 2020 (Andrés Terán)

guez Montuelle en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 6 de febrero de 2022 (ebird.org/checklist/S104192494).
19. Un ejemplar fotografiado por Carlos Merlo y Carlos Cabrera en los Piletones de Paramillos, departamento Lavalle, Mendoza el 13 de abril de 2022 (ebird.org/checklist/S107012441).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Es un visitante regular en el MN Laguna de los Pozuelos y cuencas vecinas (ríos Miraflores y Doncellas), departamento Cochinoca, Jujuy (Flavio Moschione *com. pers.*). Un individuo observado en la Bahía de Asunción, Paraguay el 5 de enero 1989 (Hayes *et al.* [1990] *Condor* 92: 947-960) es un registro que podría considerarse limítrofe y fue incluido por Contreras *et al.* ([2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara). Las fotografías presentadas para la provincia de Corrientes (Colina & Kohan [2020] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 308: 1-4), en realidad corresponden al PLAYERITO PECTORAL *Calidris melanotos*.

BECASINA GIGANTE | *Gallinago undulata* | N R

Distribución: Fragmentada distribución en Sudamérica. La subespecie *gigantea* en el SE de Brasil y E de Paraguay (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: **1-2**. Dos ejemplares obtenidos por L. Hardy du Dréssent en "*Buenos Ayres*" en abril de 1886 (Sharpe [1896] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 24. London; Hellmayr & Conover [1948] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series*. Volume XIII. Part I). Los especímenes se encuentran depositados en el NHMUK (Figura 12).
3. Un ejemplar colectado por Charles Perrins en "*Argentina*" en febrero de 1896, e ingresado a la colección del NHMUK como obtenido en San José de los Arroyos (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.

Figura 12. Becasina Gigante *Gallinago undulata*, NHMUK-1896.1.1.5, Buenos Aires, abril de 1886 (The Natural History Museum)

4-5. Mencionada para las provincias de Chaco y Buenos Aires por Santiago Venturi, quien aparentemente no colectó ningún ejemplar (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Lynch Arribálzaga [1920] *Hornero* 2: 85-98; Hellmayr & Conover [1948] *op. cit.*).
6. Incluida por José Pereyra para el noreste de la provincia de Buenos Aires mediante comentarios de terceros (Pereyra [1938] *Memorias del Jardín Zoológico de La Plata* 9: 6-305).
7. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40).

8. Un individuo escuchado por Hernán Casañas y Adrián Di Giacomo unos 20 km al este de Gobernador Virasoro, departamento Santo Tomé, Corrientes en octubre de 2003 (H. Casañas y A. Di Giacomo *en* López-Lanús & Moller Jensen [2012] *Hornero* 27: 189-193).
9-10. Al menos dos parejas grabadas por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes entre el 24 y el 27 de junio de 2009 (López-Lanús & Moller Jensen [2012] *op. cit.*; López-Lanús [2010] *Sonidos de aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini).
11. Un ejemplar grabado por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 18 de febrero de 2011 (López-Lanús & Moller Jensen [2012] *op. cit.*).
12. Tres individuos registrados por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 19 de julio de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *en* Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).
13. Hasta tres ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 4 de diciembre de 2013 (López-Lanús *et al.* [2013] *op. cit.*).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Richard Wace ([1921] *Hornero* 2: 194-204) la menciona para las islas Malvinas con el nombre de *Gallinago gigantea*, y comenta que algunos ejemplares fueron colectados y depositados en la colección de aves de Puerto Stanley. Con respecto a la cita de Roberto Dabbene, llamativamente la especie no es incluida por Ernst Hartert y Santiago Venturi ([1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267), quienes mencionan dichas localidades para la BECASINA DE BAÑADO *Gallinago paraguaiae*.
Claës Olrog ([1958] *Acta Zoológica Lilloana* 16: 83-90) supone que los reportes locales son confusiones con el PLAYERO ESQUIMAL *Numenius borealis*, ya que a este último los cazadores lo denominaban "becasina grande" o "becasina doble". Había sido mencionada como fotografiada en Río Grande, departamento homónimo, Tierra del Fuego el 24 de octubre de 1974 (Abramson [1977] *Auk* 94: 357). Las imágenes depositadas en el United States Geological Survey corresponden a la BECASINA PATAGÓNICA *Gallinago magellanica* (Figura 13).
Especímenes (3): **NHMUK**-1896.1.1.4, **NHMUK**-1896.1.1.5, **NHMUK**-1896.7.3.2

BECASINA PATAGÓNICA | *Gallinago magellanica* | N (CT)

Distribución: Desde el centro de Chile y Argentina hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Taxonomía: Descripta por Phillip Parker King ([1828] *Zoological Journal* 4: 91-105) con material proveniente del estrecho de Magallanes, Chile. Considerada por mucho tiempo una subespecie de la BECASINA DE BAÑADO *Gallinago paraguaiae*. Miller *et al.* ([2020] *Ibis* 162: 968-990) demuestran que la subespecie *magellanica* merece ser elevada a rango específico debido a diferencias en las vocalizaciones y los despliegues aéreos. Esta propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop843.htm).

Figura 13. Becasina Patagónica *Gallinago magellanica*, Río Grande, Tierra del Fuego, 24 de octubre de 1974 (United States Geological Survey)

Comentarios: Esta forma se conoce desde hace mucho tiempo en territorio argentino, especialmente en la región austral y las islas Malvinas (Doering [1881] *Informe Oficial de la Comisión Científica Agregada*

al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro. Buenos Aires; Sclater & Hudson [1889] *Argentine Ornithology*. Vol. 2. RH Porton; Oustalet [1891] *Mission scientifique du Cap Horn. 1882-1883*. Tome VI. Première Partie; Scott & Sharpe [1904] *Reports of The Princeton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899*. Volume II; Brooks [1917] *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 61 [7]: 135-160; Wace [1921] *Hornero* 2: 194-204; Reynolds [1934] *Hornero* 5: 339-353).

FALAROPO PICO FINO | *Phalaropus lobatus* | N V

Distribución: Nidificante circumpolar en el extremo norte de las regiones Neártica y Paleártica. Luego de la etapa reproductiva se dispersa por los océanos Pacífico e Índico (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1-2. Roberto Dabbene ([1920] *Hornero* 2: 99-128) menciona dos especímenes depositados en el MACN, uno procedente de Chaco con fecha de marzo de 1899 y otro de Patagonia sin fecha. Ambos especímenes parecen estar perdidos en la actualidad.
3. Mencionada por Ángel Zotta y Secundino da Fonseca ([1936] *Hornero* 6: 343-364) para la provincia de Buenos Aires. Al parecer estos autores intercambiaron las localidades de esta especie con las del FALAROPO PICO GRUESO *Phalaropus fulicarius*.
4. Incluida para la avifauna de la provincia de La Pampa, sin detalles (Orrego Aravena [1969] *Vertebrados de La Pampa*. Biblioteca Pampeana. Serie Folletos Nº13).
5. Mencionada sin detalles para la provincia de Corrientes (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28).
6. Un ejemplar fotografiado por Aníbal Casas y Mariano Gelain en el río Ñirihuau, Río Negro el 1 de

Figura 14. Falaropo Pico Fino *Phalaropus lobatus*, Plottier, Neuquén, 21 de abril de 2019 (Manuel Battistella)

febrero de 1986 (Casas & Gelain [1986] *Nuestras Aves* 11: 6-7). La imagen obtenida no es suficiente para identificarla con certeza (Christie *et al.* [2004] *Aves del Noroeste Patagónico. Atlas y Guía*. LOLA).
7. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN).
8. Un individuo observado por Leonardo Pastorino, Samuel Narosky y otros observadores en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires en junio de 1988 (Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).
9. Un individuo observado por Martín de la Peña a unos 4 km de Las Leñas, departamento Malargüe, Mendoza el 13 de octubre de 2004 (Sosa *et al.* [2006] *Xolmis* 1: 7-8).
10. Un individuo observado por Mariano Gelain y Daniel Pandini en el lago Nahuel Huapi, departamento Bariloche, Río Negro el 14 de octubre de 2004 (Sosa *et al.* [2006] *op. cit.*).
11. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).
12. Un ejemplar fotografiado por Cecilia de Larminat en la laguna La Solitaria, departamento Zapala, Neuquén el 4 de mayo de 2018 (Anónimo [2020] *Aves Argentinas* 59: 9; ebird.org/checklist/S45490519). El ave permaneció al menos tres días en dicha localidad (C. de Larminat *in litt.*).
13. Un ejemplar fotografiado por Manuel Battistella cerca de Plottier, departamento Confluencia, Neuquén el 21 de abril de 2019 (ebird.org/checklist/S55515853; Figura 14).
14. Un ejemplar fotografiado por Cecilia de Larminat en la estancia La Porteña ubicada al este de Las Lajas, departamento Picunches, Neuquén el 31 de mayo de 2020 (ebird.org/checklist/S69962386). El ave volvió a ser registrada en el sitio el 7 y 11 de junio de 2020 (C. de Larminat *in litt.*; ebird.org).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Existían fotografías sin publicar provenientes del PP Aconcagua, Mendoza en enero de 1995 (Sosa [1995] *Boletín de la Fundación Cullunche* 23: 6) y la RP Villavicencio, Mendoza en diciembre de 2001 (Sosa *et al.* [2006] *op. cit.*). Las imágenes de ambos ejemplares aportadas por Heber Sosa (*in litt.*) resultan ser adultos de *Phalaropus fulicarius* en plumaje de invierno (Figuras 15-16). La observación realizada por Pablo Petracci en el PP Laguna Tromen, Neuquén (P. Petracci *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*) fue retractada por el mismo autor concluyendo que se trataba de *Phalaropus fulicarius* (P. Petracci *in litt.*). Mariano Gelain ([2013] *Xolmis* 24: 1-3) menciona la observación de cuatro individuos en el departamento Angaco, San Juan el 1 de febrero de 2012. Las fotos del artículo muestran claramente un pequeño grupo de PITOTOY CHICO *Tringa flavipes*.

Figura 15. Falaropo Pico Grueso *Phalaropus fulicarius*, PP Aconcagua, Mendoza, enero de 1995 (Luis Arias)

Figura 16. Falaropo Pico Grueso *Phalaropus fulicarius,* RP Villavicencio, Mendoza, diciembre de 2001 (Celso Bucolini)

GAVIOTA DE SABINE | *Xema sabini* | N V

Distribución: Especie de distribución holártica. En América cría en Alaska, costa e islas del archipiélago canadiense y Groenlandia. Luego de la etapa reproductiva la población americana migra a través del Pacífico hasta las costas de Perú y Chile, así como también hasta la corriente de Benguela en el S de África (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Zanoletti y otros observadores en Villa Gesell, partido homónimo, Buenos Aires el 1 de abril de 2021 (Loredo *et al.* [2021] *Nuestras Aves* 66: 65-67). El mismo fue relocalizado por Sebastián Lescano en Mar Azul, partido de Villa Gesell, Buenos Aires el 26, 29 y 30 de abril de 2021 (S. Lescano *in litt.*; Figura 17).

Figura 17. Gaviota de Sabine *Xema sabini*, Mar Azul, Buenos Aires, 26 de abril de 2021 (Sebastián Lescano)

Comentarios: El ejemplar permaneció varios días en Mar Azul, Buenos Aires y pudo ser documentado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org). El registro efectuado al sur de Tierra del Fuego (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides) pertenece al territorio chileno. Un ejemplar fotografiado por Carlos de Souza Carvalho en Praia do Cassino, Rio Grande do Sul, Brasil el 16 de noviembre de 2009 (Parrini & Carvalho [2009] *Atualidades Ornitológicas* 151: 53).

GAVIOTA GARUMA | *Leucophaeus modestus* | N V

Distribución: Cría en el desierto de Atacama al N de Chile. Fuera de la etapa reproductiva se distribuye a lo largo de la costa del Pacífico, desde Colombia hasta el centro de Chile (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un individuo observado durante tres semanas en Puerto Stanley, islas Malvinas durante agosto de 1953 (Cawkell & Hamilton [1961] *Ibis* 103A: 1-27).

2. Un individuo permaneció al menos tres semanas en Puerto Stanley, islas Malvinas en junio de 1991 (Henry [1995] *Cotinga* 4: 68).

Figura 18. Gaviota Garuma *Leucophaeus modestus*, Tolar Grande, Salta, 7 de marzo de 2015 (Santiago Carrillo)

3. Un juvenil fotografiado por Santiago Carrillo en Tolar Grande, departamento Los Andes, Salta el 7 de marzo de 2015 (Carrillo [2015] *EcoRegistros Revista* 5: 10-11; Figura 18).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

GAVIOTA REIDORA | *Leucophaeus atricilla* | N V

Distribución: Ampliamente distribuida en regiones cálidas de las Américas. Existen registros erráticos en Europa, O de África, Japón y Australia (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Un individuo observado por Luis Pagano en el puerto de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires 31 de diciembre de 2008 (Pagano & Bodrati *en prep*.). El ejemplar fue comparado directamente con otras cuatro especies de gaviotas, mostrando proporciones distintas que aseguran su identificación (L. Pagano *obs. pers*.).
2. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Nazareno Yunes Del Carlo, Alejandro Sandoval y Jorge Torres en el dique La Ciénaga, departamento El Carmen, Jujuy el 2 de abril de 2022 (ebird.org/checklist/S106065358; Figura 19). El ave permaneció en el sitio al menos hasta el 15 de abril, fecha en la que fue fotografiada por Gustavo Arévalos (ecoregistros.org).
Comentarios: Algunos de los registros más cercanos a nuestro país provienen de Cidreira, Rio Grande do Sul, Brasil (Franz *et al*. [2018] *Iheringia. Série Zoologia* 108: 1-38); bahía de Asunción, departamento Central, Paraguay (Clay *et al.* [2017] *Revista Brasileira de Ornitologia* 25: 128-136); Piriápolis, departamen-

Figura 19. Gaviota Reidora *Leucophaeus atricilla*, dique La Ciénaga, Jujuy, 2 de abril de 2022 (Jorge Omar Torres)

to Maldonado, Uruguay (ebird.org/checklist/S84717513) y laguna Guapilo, departamento Santa Cruz, Bolivia (Brady *et al.* [2019] *Cotinga* 41: 98-100).

GAVIOTÍN CORONA BLANCA | *Anous minutus* | N V

Distribución: Regiones tropicales de los océanos Atlántico y Pacífico. La subespecie *atlanticus* en islas del océano Atlántico hasta el golfo de Guinea (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: **1**. Un ejemplar colectado en las islas Malvinas (sin datos de fecha ni colector) fue adquirido por Thomas Wilson al comprar la colección del duque de Rivoli aproximadamente en el año 1846 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El espécimen se encuentra depositado en el ANSP (Figura 20).

Figura 20. Gaviotín Corona Blanca *Anous minutus*, ANSP-5024, islas Malvinas (The Academy of Natural Sciences of Drexel University)

2. Un ejemplar colectado por E. Biester y F. Hildebrandt supuestamente en las islas Malvinas en Octubre de 1966 (Woods [2017] *op. cit.*). El mismo había sido publicado como proveniente de "Atlantik vor Brasilien, St. Pauls-Felsen, Oktober 1966" (Kinzelbach [2016] *Die Vögel. Aves. Verzeichnis des Bestands 2016. Zoologische Sammlung der Universität Rostock*. Basiliskenpresse). El espécimen (ZSRO-1291) actualmente posee la leyenda "*SO - Pazifik*", lo que sugiere una proveniencia diferente.

Comentarios: Considerada errónea para las islas Malvinas por Woods ([2017] *op. cit.*). Si bien la exacta proveniencia del espécimen depositado en el ANSP podría resultar dudosa, optamos por incluir la especie respetando los datos originales. Existen reportes modernos para la costa del estado de São Paulo, Brasil (Barbieri *et al.* [2010] *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 242-244).

Especímenes (1): **ANSP**-5024

GAVIOTÍN SOMBRÍO | *Onychoprion fuscatus* | N V

Distribución: Especie politípica ampliamente distribuida en los mares tropicales del mundo. La subespecie nominal en el golfo de México y el océano Atlántico (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: **1**. Un ejemplar adulto colectado por Jean Quoy y Joseph Gaimard en las islas Malvinas en el año 1820 (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El espécimen se encuentra depositado en el MNHN (Figura 21).

Taxonomía: Conocida anteriormente como *Sterna fuscata* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Robin Woods

([2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC) la incluye como vagante para las islas Malvinas. Es probable que las menciones referidas a estas islas provengan del espécimen depositado en el MNHN (American Ornithologists' Union [1910] *Check-List of North American Birds. Third Edition*. New York; Dabbene [1918] *Hornero* 1: 129-139; Ridgway [1919] *Bulletin of the United States National Museum*. Volume 50. Part 8). Además Robert Ridgway ([1919] *op. cit.*) menciona una hembra colectada en "Tortugas, Argentina", cuyo espécimen aparentemente se encuentra perdido (Christopher Milensky *in litt.*).
Especímenes (1): **MNHN-ZO-MO-**14650

Figura 21. Gaviotín Sombrío *Onychoprion fuscatus*, MNHN-ZO-MO-14650, islas Malvinas, año 1820 (Patrick Boussès, Muséum National d'Histoire Naturelle)

GAVIOTÍN ALA BLANCA | *Chlidonias leucopterus* | N V

Distribución: Amplia distribución en la región Paleártica, desde el centro de Europa hasta el NE de China. Luego de la reproducción migra al S ocupando gran parte de África, SE de Asia y Australia (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Edelweiss Enggist, Héctor Fernández, David Juszczuk, Héctor Schreiber y Mercedes Vivero en Cancha Larga, departamento Bermejo, Chaco durante abril de 2018 (ebird.org/checklist/S45047124; Figura 22)
2. Un ejemplar en plumaje nupcial fotografiado por Hugo Giraudo en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 6 de octubre de 2018 (ebird.org/checklist/S49085884).
3. Un ejemplar en plumaje nupcial fotografiado por Martín Meurzet en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 28 de septiembre de 2019 (ebird.org/checklist/S60248418; Figura 23).
4. Un ejemplar fotografiado y filmado por Emiliano García Loyola en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 17 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95268008).
Taxonomía: Además de las múltiples guías de campo, para una discusión sobre identificación del género ver Alström ([1989] *British Birds* 82: 296-319).

Comentarios: Recientemente incorporada para Sudamérica en base a un registro fotográfico en Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, Brasil (Aldabe *et al.* [2010] *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 261-262). Algunas observaciones sin evidencia podrían corresponder al GAVIOTÍN NEGRO *Chlidonias niger*. El GAVIOTÍN CARA BLANCA *Chlidonias hybridus* ha sido fotografiado recientemente en Paraguay (Clay [2016] *Neotropical Birding* 19: 56-58; Clay *et al.* [2017] *Revista Brasileira de Ornitologia* 25: 128-136), por lo tanto no debe ser descartado a la hora de identificar estas confusas especies.

Figura 22. Gaviotín Ala Blanca *Chlidonias leucopterus*, Cancha Larga, Chaco, 2 de abril de 2018 (Héctor Fernández)

Figura 23. Gaviotín Ala Blanca *Chlidonias leucopterus*, Mar Chiquita, Córdoba, 28 de septiembre de 2019 (Martín Meurzet)

PINGÜINO DE TRISTÁN | *Eudyptes moseleyi* | N V

Distribución: Reproduce en las islas Tristan da Cunha y Gough en el océano Atlántico sur, y en la islas Amsterdam y Saint Paul del océano Índico (Cuthbert [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: **1**. Un adulto fotografiado por Mike Morrison en MacBride Head, islas Malvinas el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 1995 (Woods & Woods [1997] *Atlas of breeding birds of the Falkland Islands*. Anthony Nelson; Matias *et al.* [2009] *Marine Ornithology* 37: 287-289).

2. Un adulto observado por Mike Morrison en MacBride Head, islas Malvinas el 30 de noviembre de 1996 (Woods & Woods [1997] *op. cit.*; Matias *et al.* [2009] *op. cit.*).

3. Un ejemplar observado y fotografiado por Rafael Matias y Paulo Catry en New Island, islas Malvinas el 21, 27 y 29 de noviembre de 2004 (Matias *et al.* [2009] *op. cit.*).

4. Un adulto observado por Mark Pearman y otros observadores en Kidney Island, islas Malvinas el 12 de diciembre de 2004 (Matias *et al.* [2009] *op. cit.*).

5. Registrada por Peter Alexander al noroeste de la isla Livingston, Península Antártica el 25 de febrero de 2008 (ebird.org/checklist/S57673974).

6. Un ejemplar registrado en Diamond Cove, islas Malvinas en todas las temporadas reproductivas desde el año 2009 al 2014. En esa última temporada se apareó con un PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, aunque el pichón fue hallado muerto en diciembre de ese año (Crofts & Robson [2015] *Seabird* 28: 37-42; ebird.org/checklist/S45577527).

7. Un individuo observado por Klemens Pütz en Beauchêne Island, islas Malvinas el 27 de noviembre de 2011 (Morrison & Henry [2012] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 16: 6-9; Crofts & Robson [2015] *op. cit.*).

8. Un ejemplar fotografiado en Murrel Farm Camp, islas Malvinas en octubre de 2013 y enero de 2014

(Morrison [2014] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2013*. Falklands Conservation; Crofts & Robson [2015] *op. cit.*).
9. Un individuo observado en Murrel Farm Camp, islas Malvinas en noviembre y diciembre de 2014 (Morrison [2015] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2014*. Falklands Conservation; Crofts & Robson [2015] *op. cit.*).
10. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry en Eagle Point, islas Malvinas el 31 de diciembre de 2014 (Morrison [2015] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S49371785).
11. Un ejemplar fotografiado por Fernando Riera en el faro Segunda Barranca de la bahía San Blas, partido de Patagones, Buenos Aires el 12 de octubre de 2017 (F. Riera *in litt.*; Figura 24). La identificación fue confirmada por Colin Miskelly (*in litt.*).
12. Un ejemplar fotografiado por Mark Conboy y Grant Humphries en Volunteer Point, islas Malvinas el 19 de enero de 2018 (ebird.org/checklist/S42535118).
13. Un ejemplar fotografiado por Marco Valentini en Kidney's Cove, islas Malvinas el 20 de enero de 2018 (ebird.org/checklist/S62888435).
14. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry en Murrel Farm Camp, islas Malvinas el 8 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61273479).



Figura 24. Pingüino de Tristán *Eudyptes moseleyi*, bahía San Blas, Buenos Aires, 12 de octubre de 2017 (Fernando Riera)

15. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry en Murrel Farm Camp, islas Malvinas el 25 de octubre de 2020 (ebird.org/checklist/S75393415). Casi con seguridad el mismo ejemplar fue observado en el sitio en enero y marzo de 2021 (ebird.org).
16. Un ejemplar observado por David Carter en Kidney's Cove, islas Malvinas el 31 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S78435733). Muy probablemente el mismo ejemplar retornó al sitio en noviembre y diciembre de 2021, siendo registrado por Ryan Hawksworth y Ryan Irvine (ebird.org).
17. Un ejemplar fotografiado por Mike Greenfelder y Linnet Tse en New Island, islas Malvinas el 7 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98601477).
Taxonomía: Considerada por mucho tiempo una subespecie del PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, pero la evidencia molecular sustenta su separación como especie plena (Jouventin *et al.* [2006] *Molecular Ecology* 15: 3413-3423).
Comentarios: Si bien la especie aparece con cierta regularidad en las islas Malvinas e intenta reproducirse allí, hasta el momento no se conoce la existencia de una pareja pura que haya nidificado con éxito en territorio argentino. Es muy probable que algunos de los reportes en estas islas correspondan al mismo ejemplar.

ALBATROS REAL DEL NORTE | *Diomedea sanfordi* | N (CT)

Distribución: Nidifica principalmente en las islas Sisters, Fourty-Fours y Chatham al O de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Taxonomía: Descripta por Robert Murphy ([1917] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 37: 861-864) en base a un espécimen colectado unas 40 millas al oeste de Corral, Chile. Adoptamos el tratamiento sugerido por Robertson & Nunn ([1998] *en* Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons) quienes separan a este taxón del ALBATROS REAL DEL SUR *Diomedea epomophora*.
Comentarios: La dificultad para identificar esta especie genera gran cantidad de reportes erróneos, no obstante existen numerosas observaciones documentadas en el mar argentino (Santiago Imberti *in litt.*).

ALBATROS DE LAS ANTÍPODAS | *Diomedea antipodensis* | N (CT) R

Distribución: Se reproduce exclusivamente en las islas Antípodas y Campbell al S de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un adulto observado por Santiago Imberti entre la isla de los Estados y las islas Malvinas el 3 de diciembre de 2004 (ebird.org/checklist/S27200236).
2. Un adulto fotografiado por Rick Heil unas 60 millas al norte de la isla Smith, Península Antártica el 23 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40574389).
3. Un individuo (aparentemente el mismo de la observación anterior) observado por Rick Heil y Blair

Figura 25. Albatros de las Antípodas *Diomedea antipodensis*, Bird Island, Georgias del Sur, 24 de marzo de 2010 (British Antarctic Survey)

Nikula unas 33 millas al norte de la isla Livingston, Península Antártica el 24 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40575132).
4. Una hembra adulta fotografiada por Christian Savigny en el pasaje de Drake el 9 de diciembre de 2006 (Savigny [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 168: 1-5).
5. Un joven anillado en Nueva Zelanda fue fotografiado en Bird Island, Georgias del Sur el 24 de marzo de 2010 (Burton & Croxall [2012] *A Field Guide to the Wildlife of South Georgia*. Princeton University Press; Clarke *et al.* [2012] *British Birds* 105: 118-144; Figura 25).
6. Un macho adulto fotografiado por Christian Savigny en la desembocadura del canal de Beagle, Tierra del Fuego el 24 de marzo de 2012 (Savigny [2014] *op. cit.*).
7. Un macho adulto fotografiado por Santiago Imberti unos 350 km al sudoeste de las islas Georgias del Sur (56°37,82'S 40°43,70'W) el 5 de febrero de 2015 (S. Imberti *com. pers.*; ebird.org/checklist/S21888161).
8. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny en el pasaje de Drake el 13 de febrero de 2017 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=225882).
9. Un individuo observado por Christian Savigny en el pasaje de Drake (57°12,5'S 65°12'W) el 15 de enero de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=675996).
Taxonomía: Descripta como una subespecie del ALBATROS ERRANTE *Diomedea exulans* (Robertson & Warham [1992] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 112: 74-81) y posteriormente elevada a rango específico (Robertson & Nunn [1998] *en* Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons) junto con la forma *gibsoni* que se reproduce en las islas Auckland, Nueva Zelanda. Más tarde Burg & Croxall ([2004] *Molecular Ecology* 13: 2345-2355) concluyen que *antipodensis* y *gibsoni* no difieren lo suficiente como para considerarlas especies distintas.

ALBATROS DE TRISTÁN | *Diomedea dabbenena* | N (CT) R

Distribución: Su área de nidificación se restringe a la islas Gough e Inaccessible, en el grupo de las islas Tristan da Cunha (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: **1**. Dos adultos obtenidos a bordo del crucero *Patria* de la armada argentina, a unas 100 millas de la costa de Buenos Aires (38°30'S 56°W) el 6 de marzo de 1914. Los especímenes se utilizaron para describir el taxón *Diomedea chionoptera alexanderi* (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 311-348; Navas & Camperi [1999] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Nueva Serie* 1: 109-113). Uno de ellos se encuentra depositado en el MACN (Figura 26).
2-8. Siete observaciones realizadas por Christian Savigny y otros observadores entre el continente y las islas Malvinas en noviembre de 2002 (Savigny *et al.* [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires). Ninguna de ellas fue debidamente documentada.

Figura 26. Albatros de Tristán *Diomedea dabbenena*, MACN-Or-8478a, 100 millas de la costa de Buenos Aires, 6 de marzo de 1914 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

9. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny en aguas frente a Mar del Plata, Buenos Aires el 7 de abril de 2007 (Savigny [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 168: 1-5).
10. Un ejemplar filmado por Josep del Hoyo en el mar de Scotia entre las islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur el 19 de abril de 2012 (ebird.org/checklist/S64820104).
11. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).
Taxonomía: Gregory Mathews ([1929] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 50: 10-11) designó el nombre actual para el taxón descripto por Roberto Dabbene ([1926] *op. cit.*). Seguimos el actual consenso que separa este taxón del ALBATROS ERRANTE *Diomedea exulans* en base a diferencias moleculares y morfométricas (Robertson & Nunn [1998] *en* Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons; Cuthbert *et al.* [2003] *Waterbirds* 26: 338-344; Burg & Croxall [2004] *Molecular Ecology* 13: 2345-2355).
Comentarios: La dificultad para identificarlo a campo quizás sea la verdadera causa de la escasez de registros, por lo tanto es probable que sea una especie regular y subobservada en aguas argentinas (Santiago Imberti *in litt.*).
Especímenes (1): **MACN-Or**-8478a

ALBATROS DE BULLER | *Thalassarche bulleri* | N R

Distribución: Toda su población se reproduce en las islas Solander y Snares al S de Nueva Zelanda. Luego se dispersa por el océano Pacífico llegando a las costas de Chile y Perú (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Tres individuos observados por William Curtis al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 28 de marzo de 1987 (Curtis [1988] *Sea Swallow* 37: 3-8; Curtis [1988] *Sea Swallow* 37: 62-63).
2. Un individuo observado al norte de Orkney Island, Orcadas del Sur (59°39'S 45°49'W) el 5 de marzo de 2012 (Orgeira *et al.* [2013] *Polar Research* 32: 18972).

Figura 27. Albatros de Buller *Thalassarche bulleri*, bahía Aguirre, Tierra del Fuego, 15 de diciembre de 2012 (Leandro N. Chávez)

3. Un adulto fotografiado por Leandro N. Chávez en Bahía Aguirre, Tierra del Fuego el 15 de diciembre de 2012 (Tamini & Chávez [2014] *Polar Biology* 37: 1209-1212; Figura 27).
Taxonomía: Esta especie posee una subespecie no descripta formalmente, antiguamente tratada como *Thalassarche platei*. Esta forma innominada se reproduce en las islas Sisters y Forty-Fours del archipiélago de las islas Chatham y en las islas Three Kings en el norte de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*). El ejemplar fotografiado en aguas argentinas (Tamini & Chávez [2014] *op. cit.*) pertenece a la forma nominal.
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Dos ejemplares fotografiados por Michael O'Brien cerca del cabo de Hornos, Chile el 26 de enero de 2016 (ebird.org/checklist/S27161775).

ALBATROS DE SALVIN | *Thalassarche salvini* | N (CT) R

Distribución: La mayor parte de la población nidifica en las islas Bounty al S de Nueva Zelanda, aunque parejas aisladas crían en otras islas cercanas y en el océano Índico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Figura 28. Albatros de Salvin *Thalassarche salvini*, MACN-Or-1579a, costa de la provincia de Buenos Aires, año 1927 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

Registros: **1**. Un ejemplar colectado por el vapor *Undine* en la "*costa de la provincia de Buenos Aires*" en el año 1927 (Savigny & Carbajal [2015] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 180: 1-9). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 28).
2. Un ejemplar fotografiado en Bird Island, Georgias del Sur el 28 de febrero de 1982 (Prince & Croxall [1983] *British Antarctic Survey Bulletin* 59: 15-27). Aparentemente el mismo individuo fue nuevamente observado en el sitio el 16 de diciembre de 1983 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104).
3. Un adulto identificado entre un total de 25 observaciones de albatros *tipo cauta*, durante un estudio realizado cerca de las islas Malvinas entre febrero de 1998 y enero de 2001 (White *et al.* [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).
4. Dos adultos observados en cercanías de las islas Malvinas (White *et al.* [1999] *Seabird and marine mammal dispersion in the waters around the Falkland Islands 1998-1999*. Joint Nature Conservation Committee). No queda claro si este registro tiene relación con la referencia anterior (White *et al.* [2002] *op. cit.*).
5. Un ejemplar fotografiado 29 km al este de Puerto Deseado, Santa Cruz (47°39'S 64°53'W) el 10 de marzo de 2006 (Seco Pon *et al.* [2007] *Notornis* 54: 49-51).
6. Un adulto fotografiado por Nigel Voaden en aguas antárticas del pasaje de Drake el 27 de noviembre de 2006 (ebird.org/checklist/S19991194).
7. Un ejemplar subadulto fotografiado por Rubén Dellacasa entre Tierra del Fuego y las islas Malvinas (53°17'14''S 64°7'1''W) el 6 de diciembre de 2019 (Dellacasa *et al. en prep.*).
Taxonomía: Seguimos los lineamientos de Robertson & Nunn ([1998] *en* Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons), quienes consideran a las cuatro subespecies del ALBATROS DE TASMANIA *Thalassarche cauta* como especies distintas: *T. cauta*, *T. steadi*, *T. salvini* y *T. eremita*. Al igual que las otras especies del grupo, la identificación específica de los ejemplares inmaduros resulta en ocasiones imposible (Howell [2006] *Birding* 38: 56-59; Howell [2009] *Neotropical Birding* 4: 19-25).
Comentarios: Un adulto fotografiado por Christophe Gouraud en el pasaje de Drake, Chile el 6 de diciembre de 2014 (ebird.org/checklist/S65102721).
Especímenes (1): **MACN-Or-**1579a

PAÍÑO DE COLLAR | *Hydrobates hornbyi* | N V

Distribución: Restringida a la corriente de Humboldt en las costas del océano Pacífico, desde el N de Ecuador hasta el centro de Chile (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).
Registros: 1. Un ejemplar capturado y fotografiado por María Astete y René Gingins en San Martín de los Andes, departamento Lácar, Neuquén el 25 de abril de 2020 (Astete & Gingins [2020] *Nuestras Aves* 65: 92-93; Figura 29).
Taxonomía: A veces incluida dentro del género *Oceanodroma* (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).
Comentarios: Los primeros nidos de esta especie fueron recientemente descubiertos en el desierto de Atacama, Chile (Barros *et al.* [2018] *Ardea* 106: 203-207).

Figura 29. Paíño de Collar *Hydrobates hornbyi*, San Martín de los Andes, Neuquén, 25 de abril de 2020 (María Astete y René Gingins)

PETREL ALAS GRANDES | *Pterodroma macroptera* | N

Distribución: Se reproduce en diversas islas de los océanos Atlántico e Índico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).
Registros: 1-3. Tres individuos observados en la zona de los 60°S 30°W el 26 de diciembre de 1959 (Novatti [1960] *Contribución del Instituto Antártico Argentino* 53: 1-19).
4. Registrada a los 40°S 57°W el 23 de abril de 1960 (Tickell & Woods [1972] *British Antarctic Survey Bulletin* 31: 63-68).
5-7. Tres individuos observados frente a la costa de Buenos Aires (39°S 57°W) en febrero de 1962 (Thurston [1982] *British Antarctic Survey Bulletin* 55: 77-103).
8-9. Dos individuos observados a los 39°21'S 56°20'W el 4 de enero de 1970 (Brown *et al.* [1975] *Ibis* 117: 339-356).
10. Registrada por B. Pearson cerca de las islas Georgias del Sur (53°44'S 36°18'W) el 10 de abril de 1977 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104).
11. Registrada por M. Whitehouse cerca de las islas Georgias del Sur (53°10'S 43°50'W) el 22 de febrero de 1980 (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*).
12-20. Tres individuos observados por William Curtis a unas 200 millas de las islas Malvinas (49°S 55°W) el 19 de agosto 1982, y otros seis el 24 de agosto en la misma zona (Bourne & Curtis [1985] *Sea Swallow* 34: 18-28).
21. Registrada por M. Whitehouse cerca de las islas Georgias del Sur (51°21'S 37°11'W) el 22 de marzo de 1985 (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*).
22. Un individuo observado por Mike Winter y William Bourne entre 110 y 150 millas al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 5 de febrero de 1990 (Gregory [1994] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114: 12-20).

23. Un individuo observado por William Curtis frente a la costa de Buenos Aires (39,2°S 57,3°W) el 24 de febrero de 1992 (Curtis [1994] *Sea Swallow* 43: 19-28).
24-48. Registrada 25 veces entre los 64°09'S 30°10'W y 65°12'S 25°41'W el 26 de enero de 1994 (José L. Orgeira IAA *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
49-50. Registrada en dos ocasiones entre los 67°59'S 26°24'W y 67°52'S 26°57'W el 13 de febrero de 1994 (José L. Orgeira IAA *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Posteriormente Montalti *et al.* ([1999] *Polish Polar Research* 20: 347-354) mencionan un total de 64 individuos observados en el mar de Weddell oriental entre los 64°S y 69°S durante febrero de 1994, siendo la posición más austral a los 69°05'S 21°24'W el 13 de febrero de 1994.
51. Registrada a los 66°08'S 33°09'W el 14 de febrero de 1994 (José L. Orgeira IAA *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*; Montalti *et al.* [1999] *op. cit.*).
52. Un individuo observado por Anders Anderson al norte de las islas Georgias del Sur el 15 de diciembre de 1995 (A. Anderson *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
53. Un individuo observado entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (53°05'S 52°28'W) en febrero de 1999 (White *et al.* [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).
54. Un individuo observado a los 47°52'S 60°41'W en marzo de 1999 (White *et al.* [2002] *op. cit.*).
55. Un individuo observado por Andrew Black unas 25 millas al este de Puerto Stanley, islas Malvinas el 14 de marzo de 2003 (Black *et al.* [2004] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2003*. Falklands Conservation).
56. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).
57. Un individuo observado por Colin Miskelly en Port Williams, islas Malvinas el 26 de diciembre de 2007 (ebird.org/checklist/S31267690).
58. Registrado por Mike Greenfelder entre las islas Malvinas y Georgias del Sur el 13 de marzo de 2008 (ebird.org/checklist/S36999377).
59. Un individuo observado por Michael Hoit frente al golfo San Jorge, Chubut el 4 de noviembre de 2009 (ebird.org/checklist/S66008437).
60. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6:1-37).
61-62. Dos individuos observados en el mar de Scotia (60°26'S 49°55'W) el 15 de marzo de 2012 (Orgeira *et al.* [2013] *Polar Research* 32: 18972).
63. Un individuo observado al norte de las islas Shetland del Sur (60°21'S 62°07'W) el 21 de marzo de 2012 (Orgeira *et al.* [2013] *op. cit.*).
64-65. Al parecer dos ejemplares distintos filmados por Josep del Hoyo en el mar de Scotia al noroeste de las islas Georgias del Sur el 19 de abril de 2012 (ebird.org/checklist/S64820101).
66. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny frente a la costa de Buenos Aires el 2 de febrero de 2016 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=195314).
67-70. Un total de cuatro individuos registrados en tres sitios diferentes alrededor de los 58°S 50°W el 29 de marzo de 2017 (José L. Orgeira IAA *in litt.*).
71. Un ejemplar fotografiado por Santiago Imberti entre las islas Malvinas y Georgias del Sur el 13 de marzo de 2018 (ebird.org/checklist/S43625290).
72. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny frente a la costa de Buenos Aires (40°03'25''S 50°50'55''W) el 13 de marzo de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=256561).
73. Un ejemplar fotografiado por Santiago Imberti al noroeste de las islas Georgias del Sur el 14 de marzo de 2018 (ebird.org/checklist/S43650155).
74. Un ejemplar fotografiado por Ken Chamberlain y un grupo de observadores frente a la costa de Chubut el 24 de febrero de 2019 (ebird.org/checklist/S53258627).

Taxonomía: Junto al PETREL DE CARA GRIS *Pterodroma gouldii* fueron tratadas como la misma especie, pero sus diferencias son mayores que aquellas entre otras especies de *Pterodroma* (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*), quienes especulan que los registros más australes podrían ser confusiones con el PETREL APIZARRADO *Aphrodroma brevirostris* (William Bourne *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Es una especie habitual en la plataforma continental argentina y en aguas entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (Santiago Imberti *in litt.*).

PETREL DE ANTEOJOS | *Procellaria conspicillata* | N

Distribución: Restringida al océano Atlántico sur, nidifica únicamente en la isla Inaccessible del archipiélago Tristan da Cunha (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Andrew Black 350 km al sudeste de Sea Lion Island, islas Malvinas (54°23'S 55°45'W) en diciembre de 1996 (A. Black *en* White [2002] *The distibution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).
2-4. Tres individuos observados por Christian Savigny 147 millas al sudeste de Punta Medanosa, Santa Cruz (48°47'S 62°21'W) el 9 de febrero de 2000 (Savigny [2002] *Cotinga* 18: 81-84; Quiñones & Imberti [2018] *Cotinga* 40: 74-78).
5. Un individuo registrado por Andrew Black 110 km al norte de Macbride Head, islas Malvinas (50°20'S 57°41'W) el 13 de marzo de 2000 (A. Black *en* White [2002] *op. cit.*; Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).
6-7. Un individuo observado por Santiago Imberti 278 millas al este de Cabo Blanco, Santa Cruz (46°14'S 59°11'W); y otro 283 millas al sudeste de Camarones, Chubut (45°28'S 58°54'W) el 13 de marzo de 2000 (Imberti [2002] *Marine Ornithology* 30: 32-33; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
8-9. Dos individuos observados por Santiago Imberti 220 millas al sudeste de la bahía San Blas, Buenos Aires (41°44'S 57°36'W) el 14 de marzo de 2000 (Imberti [2002] *op. cit.*; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
10. Un individuo observado por Tim Reid al norte de Jason Island, islas Malvinas el 14 de febrero de 2004 (Black *et al.* [2005] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 5: 12-14).
11. Un individuo observado en una localidad no especificada de las islas Malvinas el 29 de marzo de 2006 (Morrison & Henry [2007] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 8: 11-14).
12. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).
13. Un individuo observado por Juan Mazar Barnett a menos de 370 km frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 24 de enero de 2008 (Ginsburg & DeWitt [2013] *Nuestras Aves* 58: 55-56; J. Mazar Barnett *in litt.*).
14-21. Ocho individuos observados (al menos uno fotografiado) en un rango entre 97 y 101 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires entre febrero y marzo de 2008 (Chávez *et al.* [2014] *Hornero* 23: 73-79; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
22-24. Tres ejemplares marcados con transmisores satelitales en la isla Inaccessible visitaron en el año 2009 las aguas frente a la costa de Buenos Aires, ingresando uno de ellos en la bahía Samborombón y el río de la Plata (Reid *et al.* [2014] *Antarctic Science* 26: 23-32).
25. Un ejemplar fotografiado por Ricardo Doumeq Milieu en aguas frente a la provincia de Buenos Aires el 17 de enero de 2010 (ebird.org/checklist/S37650232).

26. Un ejemplar fotografiado 100 millas al sudeste de la bahía Samborombón, Buenos Aires (36°26'S 54°09'W) el 10 de abril de 2010 (Chávez *et al.* [2014] *op. cit.*; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
27. Un ejemplar fotografiado por Leandro N. Chávez 158 millas al sudeste de Punta Ninfas, Chubut (44°20'S, 61°15'W) el 30 de enero de 2012 (Anónimo [2012] *Naturaleza & Conservación* 34: 38; Chávez *et al.* [2014] *op. cit.*).
28. Un ejemplar fotografiado por Bárbara DeWitt 125 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 3 de febrero de 2013 (Ginsburg & DeWitt [2013] *op. cit.*). Esto fue publicado como la primera evidencia de la especie en aguas argentinas continentales.
29-33. Cinco observaciones realizadas por Leandro N. Chávez y otros observadores en el mar argentino entre el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2013 (Chávez *et al.* [2014] *op. cit.*).
34. Un individuo observado por Santiago Imberti frente a la costa de Buenos Aires el 25 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S27839208).
35. Un ejemplar fotografiado por William Stein 89 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires (38°55'S 56°00'W) el 13 de febrero de 2014 (Seco Pon & Stein [2015] *Revista Brasileira de Ornitologia* 23: 29-30).
36. Un individuo observado por Fabrice Schmitt y Fernando Díaz frente a Bahía Blanca, Buenos Aires el 26 de febrero de 2014 (ebird.org/checklist/S17374111).
37. Un individuo observado por Leandro N. Chávez y otros observadores 193 millas al sudeste de la bahía San Blas, Buenos Aires (42°06'S 58°15'W) el 28 de mayo de 2014 (Chávez [2014] *op. cit.*; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
38-39. Dos individuos observados por Christophe Gouraud en aguas del mar argentino el 13 de marzo de 2015 (ebird.org/checklist/S22782129).
40-41. Dos ejemplares fotografiados por Diego Monteleone y un grupo de observadores en las afueras de Mar del Plata, Buenos Aires el 15 de marzo de 2015 (ebird.org/checklist/S22600014). Las coordenadas del registro son 38°17'S 57°32'W (L. Pagano *obs. pers*).
42. Un grupo de nueve ejemplares fotografiados por Javier Quiñones 134 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 18 de enero de 2016 (Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
Taxonomía: Considerada hasta hace poco una subespecie del PETREL BARBA BLANCA *Procellaria aequinoctialis* (Ryan [1998] *Bird Conservation Internacional* 8: 223-235).

PARDELA DE CABO VERDE | *Calonectris edwardsii* | N R

Distribución: Se reproduce únicamente en el archipiélago de Cabo Verde, ubicado en el océano Atlántico norte (Onley & Scofield [2007] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Tres individuos observados por William Curtis 181 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires (38°36'S 53°30'W) el 18 de febrero de 1994 (Curtis [1994] *Sea Swallow* 43:19-28).
2. Un ejemplar fotografiado por Sean Sime y Joseph DiCostanzo en algún lugar del mar argentino el 2 de marzo de 2001 (ebird.org/checklist/S55680550).
3. Un ejemplar fotografiado por Diego Monteleone, Ulises Ornstein, Luis Pagano y un grupo de observadores unas 12 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 23 de febrero de 2014 (ebird.org/checklist/S30651047).
4. Un ejemplar fotografiado por Mark Pearman unas 21 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 8 de marzo de 2014 (M. Pearman *com. pers.*).
5. Dos ejemplares observados y fotografiados por Luis Pagano y un grupo de observadores entre 10 y 25 millas al este de Mar del Plata, Buenos Aires el 27 de noviembre de 2016 (L. Pagano *obs. pers.*; ebird.org/checklist/S32807580).

6. Hasta 18 ejemplares observados y fotografiados por Luis Pagano y un grupo de observadores entre 10 y 25 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 17 de febrero de 2017 (L. Pagano *obs. pers*.; ecoregistros.org/site/imagen.php?id=191102; Figura 30).
7. Más de 20 ejemplares observados y fotografiados por Luis Pagano y un grupo de observadores unas 10 millas al este de Mar del Plata, Buenos Aires el 18 de febrero de 2017 (L. Pagano *obs. pers*.; ebird.org/checklist/S44550015).
8-11. Un total de 67 individuos registrados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores en cuatro sitios frente a la costa de Buenos Aires el 26 de febrero de 2017 (ebird.org). Las fotografías no se encuentran disponibles.
12. Un total de 26 individuos observados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores frente a la costa de Buenos Aires el 3 de febrero de 2018 (ebird.org).
13. Un máximo de 202 individuos observados y fotografiados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores frente a la costa de Buenos Aires el 3 de marzo de 2018 (ebird.org).
14. Dos individuos observados por Mick Greene frente a la costa patagónica norte el 20 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S64619428).
15. Al menos dos individuos observados por Luke Seitz y Steve Howell frente a la costa de Buenos Aires el 23 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S63993001).
16-18. Un total de tres individuos observados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores frente a la costa de Buenos Aires entre el 17 y el 22 de febrero de 2020 (ebird.org).
19. Un individuo observado por Marcelo Gavensky, Laura Dodyk, Andrés de Miguel y Javier Pe-

Figura 30. Pardela de Cabo Verde *Calonectris edwardsii*, Mar del Plata, Buenos Aires, 17 de febrero de 2017 (Jorge La Grotteria)

reyra frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 5 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98582323).
20. Un ejemplar hallado muerto por Flavio Moschione en las playas de Mar Chiquita, partido homónimo, Buenos Aires el 28 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S99617878). Desconocemos si el ejemplar fue conservado, y al parecer no existen fotografías del mismo.
Taxonomía: Considerada por mucho tiempo una subespecie de la PARDELA GRANDE *Calonectris diomedea* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).
Comentarios: William Curtis ([1994] *op. cit*.) curiosamente menciona que los ejemplares observados poseían el pico negro. Recientemente citada para aguas uruguayas (Abreu *et al*. [2010] *Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay* 19: 29-35). Aparentemente no es una especie rara en el mar argentino, la escasez de registros se debe a que ha pasado desapercibida para la mayoría de los observadores (Santiago Imberti *in litt*.).

PARDELA PATAS CLARAS | *Ardenna carneipes* | N V

Distribución: Se reproduce en Australia y Nueva Zelanda, y posteriormente se dispersa por los océanos Pacífico e Índico (Onley & Scofield [2007] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry 110 km al noroeste de las islas Malvinas el 16 de octubre de 2014 (Morrison [2015] *Rare and vagrants birds in the Falkland Islands*. Falklands Conservation; ebird.org/checklist/S50430053).
Taxonomía: Anteriormente en el género *Puffinus* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

PIQUERO VARIADO (Piquero Peruano) | *Sula variegata* | N V

Distribución: Endémica de la corriente de Humboldt en el océano Pacífico. Las colonias se distribuyen desde el N de Perú hasta el centro de Chile (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al*. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado en las "*Islas Malvinas*" el 7 de enero de 1837 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El espécimen se encuentra depositado en el NML (Figura 31).
2. Un individuo observado por Johan Mogensen en la provincia de Tierra del Fuego, sin fecha (Zotta [1935] *Hornero* 6: 151-196).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
Especímenes (1): **NML**-D2907a

Figura 31. Piquero Variado *Sula variegata*, NML-D2907a, islas Malvinas, 7 de enero de 1837 (World Museum)

PELÍCANO PERUANO | *Pelecanus thagus* | N V

Distribución: Se reproduce en la costa del océano Pacífico, desde el centro de Perú hasta el centro de Chile (Elliott [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Roberto Dabbene ([1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513) menciona un supuesto comentario o hallazgo de Santiago Venturi en Barracas al Sud (actualmente Avellaneda), Buenos Aires sin fecha.
2. Mencionada como accidental para Tierra del Fuego, sin más detalles (Clark [1986] *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos*. LOLA).
3. Un individuo observado por María Luisa de Solari en el PN Lago Puelo, Chubut el 21 de noviembre de 1993 (Félix Vidoz *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
4. Registrada por Domingo Gallusio en el lago Fagnano, Tierra del Fuego sin fecha (D. Gallusio *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Posteriormente la localidad fue rectificada como canal de Beagle, Tierra del Fuego (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).
5. Un juvenil fotografiado por Andrés Elías en el embalse Potrerillos, departamento Luján de Cuyo, Mendoza en junio de 2008 (Elías [2008] *Nuestras Aves* 53: 48).
6. Un juvenil fotografiado por Paula Ciraolo unos 40 km al sur de Gaiman, departamento Rawson, Chubut el 17 de mayo de 2015 (ebird.org/checklist/S23516961; Figura 32).
7. Un juvenil capturado y fotografiado en el Puesto Fernández de la localidad de Ingeniero Luis Huergo, departamento General Roca, Río Negro el 30 de mayo de 2021 (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Río Negro).
Taxonomía: Anteriormente tratada como una subespecie del PELÍCANO PARDO *Pelecanus occidentalis*, aunque existen diferencias de tamaño, plumaje y distribución que avalan el tratamiento como especies distintas (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop271.htm).

Figura 32. Pelícano Peruano *Pelecanus thagus*, 40 km al sur de Gaiman, Chubut, 17 de mayo de 2015 (Paula Ciraolo)

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Con respecto a la mención de Roberto Dabbene, llamativamente la especie no es incluida por Ernst Hartert y Santiago Venturi ([1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Recientemente fotografiada en la costa de São Paulo, Brasil (Patrial *et al.* [2011] *Revista Brasileira de Ornitologia* 19: 539-540).

GARZA BRUJA CORONADA (Garza Encapuchada) | *Nyctanassa violacea* | N V

Distribución: Por el Atlántico desde Estados Unidos y las Antillas hasta el S de Brasil. En las costas del océano Pacífico desde California hasta el N de Perú (Martínez-Vilalta & Motis [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar adulto fotografiado por Fabricio Gorleri en Tilcara, departamento homónimo, Jujuy el 22 de octubre de 2018 (Gorleri [2020] *Hornero* 34: 50-52).
Comentarios: Esta especie se ha expandido a través de las costas del Pacífico hacia Perú y Chile (Ugarte *et al.* [2010] *Revista Peruana de Biología* 17: 249-251; Barros [2018] *La Chiricoca* 23: 25-44), así como también en el sur de Brasil (Gianuca [2007] *Revista Brasileira de Ornitologia* 15: 464-467).

GARCITA REAL | *Pilherodius pileatus* | N R

Distribución: Cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Desde el E de Panamá a través de las Guayanas hasta el E de Brasil, E de Ecuador, Bolivia, Paraguay y N de Argentina (Martínez-Vilalta & Motis [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo observado por Flavio Moschione y Ricardo Banchs en el riacho Monte Lindo Chico, departamento Patiño, Formosa el 5 de diciembre de 1993 (Moschione & Banchs [1995] *Nótulas Faunísticas* 83: 1-2).
2. Un individuo observado por Miguel Castelino y Karina Schiaffino en el PN Iguazú, Misiones el 3 de abril de 1995 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA).
3. Un individuo observado en el PN Río Pilcomayo, Formosa el 5 de febrero de 1999 (Daniel Fernández *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
4. Un individuo observado por Carla Pijoan en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 2005 (Pijoan [2009] *Nuestras Aves* 54: 40-41).
5. Un ejemplar fotografiado por Pablo Capovilla y Facundo Di Sallo 2,5 km al sur del PP Pampa del Indio, Chaco el 10 de noviembre de 2017 (Di Sallo & Capovilla [2018] *Nuestras Aves* 63: 22-23).
6. Dos ejemplares observados (uno fotografiado) por Marcelo Cavicchia en el PN Iguazú, Misiones el 2 de septiembre de 2019 (ebird.org/checklist/S59481845).
7. Un individuo observado por Patricio Ramírez Llorens en el PN Iguazú, Misiones el 16 de julio de 2020 (ebird.org/checklist/S71572076).
8. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 20 de febrero de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=434211). Quizás el mismo fue relocalizado por María del Castillo y otros observadores el 15 de julio de 2021 (ebird.org/checklist/S91784034).
9. Un ejemplar observado y fotografiado por Marcelo Gavensky, Adrián Heredia y un grupo de observadores en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 y 16 de mayo de 2021 (ebird.org/checklist/S89934185). Quizás el mismo fue observado por Adrián Heredia,

Silvina Collado y Julián Collado el 26 y 27 de noviembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98163579).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*).

BANDURRIA ANDINA | *Theristicus branickii* | N V

Distribución: Andes desde Ecuador hasta el NO de Bolivia y extremo N de Chile (Matheu & del Hoyo [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un grupo de al menos seis ejemplares fotografiado por Gisela Müller y Oscar Braslavksy en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta entre el 16 y el 23 de octubre de 2020 (Müller *et al.* [2021] *Hornero* 36: 79-82; Figura 33).
Taxonomía: Descripta por Hans von Berlepsch y Jean Stolzmann ([1894] *Ibis* 36: 385-405) con material proveniente de Perú. Considerada por largo tiempo una subespecie de la BANDURRIA AUSTRAL *Theristicus melanopis*. Existe numerosa evidencia que sustenta la separación de las formas *melanopis* y *branickii* como especies válidas (Jaramillo [2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press; Collar & Bird [2011] *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 459-463), propuesta que fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop822.htm).

Figura 33. Bandurria Andina *Theristicus branickii*, Los Toldos, Salta, 22 de octubre de 2020 (Gisela Müller)

JOTE CABEZA AMARILLA GRANDE | *Cathartes melambrotus* | N V

Distribución: Especie típica de la Amazonía, distribuida en las Guayanas, S de Venezuela y Colombia, E de Ecuador y Perú, N y E de Bolivia y centro de Brasil (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).
Registros: 1. Un individuo observado por Roberto Straneck y Christian Henschke en el PN Calilegua, Jujuy en mayo de 1981 (Olrog [1985] *en* Newton & Chancellor [editores] *Conservation Studies on Raptors.* ICBP Technical Publication N°5).
2. Un individuo observado en las juntas del río Lipeo, Salta el 29 de julio de 1992 (Flavio Moschione *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
3. Una pareja observada en Tartagal, departamento General José de San Martín, Salta el 21 de octubre de 2000 (Mark Pearman *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Muy probablemente la misma observación fue luego publicada con fecha "19 de octubre de 2000" (Coconier *et al.* [2007] *en* Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°6. Aves Argentinas).
4-5. Un total de cuatro individuos observados en el PN Calilegua, Jujuy en agosto de 2003 y julio de 2004 (Roesler & Juhant [2004] *I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de Rapaces.* La Plata).
6. Dos ejemplares fotografiados por Alejandro Laspiur y Gustavo Fava en Rodeo, departamento Iglesia, San Juan el 3 de marzo de 2011 (Fava & Acosta [2015] *Nuestras Aves* 60: 51-52).
7. Un inmaduro observado por Luis Pagano en la finca Río Seco, unos 10 km al norte de San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta el 30 de junio de 2011 (L. Pagano *obs. pers*.).
8. Un adulto observado por Luis Pagano unos 2 km al oeste de General Mosconi, departamento General José de San Martín, Salta el 3 de diciembre de 2011 (L. Pagano *obs. pers*.).
9. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 17 de abril de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=605997).
10. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 14 de noviembre de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=684415).
11. Un adulto observado por Luis Pagano en la ruta provincial n°83 sobre el puente del río Jordán, departamento Valle Grande, Jujuy el 3 de enero de 2018 (L. Pagano *obs. pers*.).
Taxonomía: Alexander Wetmore ([1964] *Smithsonian Miscellaneous Collections*. Volume 146. Number 6: 1-18) describe esta especie basándose en características del plumaje y medidas de las timoneras centrales.
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Claës Olrog ([1985] *op. cit.*) menciona que los "jotes de cabeza amarilla" del PN Iguazú, Misiones aparentan ser más grandes que los observados en Corrientes y podrían corresponder a esta especie. Es plausible que los ejemplares identificados como *melambrotus* en las yungas argentinas correspondan a una forma no descripta de *Cathartes*.

PEUQUITO | *Accipiter chilensis* | N (CT)

Distribución: Localizada en el centro de Chile y O de Argentina hasta Tierra del Fuego (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).
Taxonomía: Descripta por Rudolph Philippi y Ludwig Landbeck ([1864] *Archiv für Naturgeschichte* 30 [1]: 41-54) con material tipo proveniente de Chile. Tradicionalmente considerada una población austral del ESPARVERO VARIADO *Accipiter bicolor*. Seguimos a Jean-Marc Thiollay ([1994] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the birds of the world*. Vol. 2. Lynx Edicions) en reconocer a este taxón como especie válida. *Accipiter chilensis* posee distribución alopátrica y difiere en tamaño, plumaje y vocali-

zaciones (Jaramillo [2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Comentarios: Las primeras menciones para Argentina provienen de Ushuaia e isla de los Estados, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego (Salvadori [1900] *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 20: 609-634; Dabbene [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 341-405) y el lago General Paz (= Vintter), Chubut (Lynch Arribálzaga [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 151-168). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

AGUILUCHO BLANCO | *Pseudastur polionotus* | N R

Distribución: Restringida a la franja costera del E de Sudamérica, desde Alagoas hasta Rio Grande do Sul en Brasil, E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).
Registros: 1. Observada en la costa argentina del Alto Paraná a los 26° de latitud sur, Misiones (Bertoni [1904] *Anales Científicos Paraguayos* 3: 1-10). Este dato quizás sea la fuente para la posterior mención de Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
2. Un individuo observado por Samuel Narosky en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 5 de febrero de 1975 (S. Narosky *en* Beltrán [1985] *Nuestras Aves* 6: 16-17). Posteriormente Chebez ([1994] *Los que se van*. Albatros) menciona la localidad como PN Iguazú, Misiones.
3. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1985 (M. Rumboll *en* Saibene *et al*. [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
4. Un individuo observado por Hernán Casañas en el PN Iguazú, Misiones en julio de 1985 (H. Casañas *en* Chebez [1994] *op. cit*.).
5. Dos individuos observados por Fernando Foletto en el PP Horacio Foerster, Misiones el 14 de agosto de 2009 (Baigorria & Foletto [2013] *Nuestras Aves* 58: 88-91).
6. Un ejemplar fotografiado por Fernando Foletto en el PP Horacio Foerster, Misiones el 2 de diciembre de 2009 (Baigorria & Foletto [2013] *op. cit*.).
7. Un individuo observado por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 19 de febrero de 2012 (Baigorria & Foletto [2013] *op. cit*.).
Taxonomía: Anteriormente conocida como *Leucopternis polionota* (Rodríguez Mata *et al*. [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Tanto Bertoni ([1904] *op. cit*.) como Dabbene ([1914] *Physis* 1: 293-366) comentan que el "aguilucho de cabeza blanca" referido por Holmberg ([1887] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 19: 1-388) para el arroyo Quiá, Chaco podría corresponder a esta especie.
Había sido incluida para la avifauna del PN Mburucuyá, Corrientes en base a una observación de Judith Hutton en mayo de 1989 (Gómez & Babarskas [1992] *en* Gómez *et al*. [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN). Posteriormente Chatellenaz *et al*. ([2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160) la excluyen del listado asumiendo que se trató de un error.

AGUILUCHO ALAS ANCHAS | *Buteo platypterus* | N

Distribución: Nidifica en el E de Norteamérica y las Antillas, migrando luego hacia Centroamérica y O de Sudamérica a través de los Andes (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).
Registros: 1. Un individuo observado por Andrew Whittaker y Steve Hilty en el PN Calilegua, Jujuy el 1 de noviembre de 2000 (A. Whittaker y S. Hilty *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions; Mazar Barnett & Kirwan [2002] *Cotinga* 17: 79-87).
2. Un individuo observado por Ignacio Roesler y Luciano Naka en el PN Calilegua, Jujuy el 5 de noviembre de 2002 (Roesler & Mazar Barnett [2004] *Hornero* 19: 37-40).
3-4. Dos individuos observados por Juan Mazar Barnett y Hernán Casañas en el PN Calilegua, Jujuy el 6 de noviembre de 2002 (Roesler & Mazar Barnett [2004] *op. cit.*).
5-6. Un juvenil y un adulto observados por Juan Mazar Barnett, Johanna Winkelman y Eduard Osieck en dos sitios diferentes del PN Calilegua, Jujuy el 24 de noviembre de 2003 (Roesler & Mazar Barnett [2004] *op. cit.*). El adulto fue fotografiado por Johanna Winkelman (Ignacio Roesler *in litt.*).
7. Un adulto observado en la zona de selva montana del PN Calilegua, Jujuy en diciembre de 2003 (Roesler & Casañas [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires).
8. Un adulto fotografiado por José Segovia en Ocloyas, departamento Doctor Manuel Belgrano, Jujuy en octubre de 2004 (J. Segovia *com. pers.*).
9. Un adulto observado en la zona de selva montana del PN Calilegua, Jujuy en noviembre de 2004 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).
10. Un adulto observado por Ignacio Roesler en la zona de selva montana del PN Calilegua, Jujuy en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).
11. Un juvenil observado por Ignacio Roesler en la zona de selva de transición del PN Calilegua, Jujuy en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).
12. Un adulto observado por Ignacio Roesler en la RN El Nogalar, Salta en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).
13. Un adulto observado por Ignacio Roesler en el PN Baritú, Salta en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).
14-15. Un adulto y un juvenil fotografiados por Pablo Grilli unos 9 km al oeste de Salvador Mazza, departamento General José de San Martín, Salta el 13 de diciembre de 2009 (Pagano *et al.* [2017] *Nuestras Aves* 62: 34-35).
16. Un individuo observado por Germán Pugnali volando sobre el río Jordán, departamento Valle Grande, Jujuy el 21 de noviembre de 2010 (ebird.org/checklist/S26693335).
17. Un adulto fotografiado con cámara trampa en la estancia Guaycolec, departamento Formosa, Formosa el 9 de diciembre de 2010 (Klavins *et al.* [2012] *Cotinga* 34: 57-59).
18. Un adulto observado por José Segovia y Luis Pagano en la reserva privada Eco-Portal de Piedra, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 11 de diciembre de 2011 (L. Pagano *obs. pers.*).
19-21. Tres adultos observados y uno fotografiado por Donald Bryant sobre la ruta provincial n°83 cerca de San Francisco, departamento Valle Grande, Jujuy el 16 de enero de 2013 (Sergio Seipke *in litt.*).
22-23. Registrada en el PN Calilegua, Jujuy el 1 y 4 de febrero de 2013 (Kilpp *et al.* [2018] *Ornitología Neotropical* 29: 337-342).
24. Un individuo observado por Facundo Gandoy en Vaqueros, departamento La Caldera, Salta el 4 de noviembre de 2013 (ebird.org/checklist/S15563960).
25. Registrada por Freddy Burgos en el abra Los Cedros-Honda, departamento Valle Grande, Jujuy el 29 de diciembre de 2013 (ebird.org/checklist/S16147314).
26. Un adulto fotografiado con cámara trampa en el PN Iguazú, Misiones el 27 de enero de 2014 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*).

27. Un juvenil fotografiado por Giselle Mangini y Facundo Gandoy en la finca Miraflores, departamento Anta, Salta el 8 de diciembre de 2014 (ebird.org/checklist/S20835818).
28. Una pareja observada por Julián Quillén Vidoz y un grupo de observadores en el PN Calilegua, Jujuy el 8 de diciembre de 2014 (ebird.org/checklist/S23382068).
29. Un adulto fotografiado por Carlos Cuñado en la reserva privada Eco-Portal de Piedra, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 9 de noviembre de 2015 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*; ecoregistros.org/site/imagen.php?id=125527).
30. Una pareja observada (adulto fotografiado) por William Legge en el PN Calilegua, Jujuy el 9 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26848181).
31. Un juvenil fotografiado por Luis Fernández en el dique Los Molinos, departamento Doctor Manuel Belgrano, Jujuy el 12 de enero de 2016 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S26856660).
32. Un juvenil fotografiado por Mariel Sánchez en el PN Calilegua, Jujuy el 12 de noviembre de 2016 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S32575035).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Mencionada sin detalles para la reserva privada San Pablo, departamento Lules, Tucumán entre julio de 2016 y noviembre de 2017 (Ortiz *et al.* [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 246: 1-8). Un ejemplar fotografiado por Iván Eroles en la reserva privada El Destino, partido de Magdalena, Buenos Aires el 4 de diciembre de 2019; y otro fotografiado por Enrique Chiurla en Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita, Buenos Aires el 8 de diciembre del mismo año (Eroles Monllor & Chiurla [2020] *Nuestras Aves* 65: 17-19). Un ejemplar fotografiado por Esteban Martínez Pastur en Villa Nogués, departamento Lules, Tucumán el 23 de febrero de 2020 (Navarrete *et al.* [2020] *EcoRegistros Revista* 10: 4-7). Con numerosos registros durante los últimos 20 años, actualmente se la considera una especie de presencia estacional y frecuente en las selvas de montaña del noroeste argentino.

CATITA ANDINA | *Bolborhynchus orbygnesius* | N R

Distribución: Andes orientales desde el N Perú hasta el centro de Bolivia (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*).
Registros: 1. Un grupo de 45 individuos observado por Flavio Moschione entre Valle Colorado y Santa Ana, departamento Valle Grande, Jujuy el 6 de abril de 2007 (F. Moschione *en* Krabbe *et al.* [2009] *Hornero* 24: 95-98).
2. Un grupo grabado y fotografiado por Niels Krabbe, Ana Sureda y Roberto Canelo en la finca El Candado, departamento Chicoana, Salta el 27 y 28 marzo de 2009 (Krabbe *et al.* [2009] *op. cit.*; xeno-canto.org/32253; xeno-canto.org/32257).
3. Un grupo grabado por Niels Krabbe en la finca El Candado, departamento Chicoana, Salta el 22 de enero de 2015 (xeno-canto.org/212732).
4. Tres ejemplares observados y grabados por Freddy Burgos arriba de Valle Colorado, departamento Valle Grande, Jujuy el 22 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S45950440).
5. Dos individuos observados por José Segovia arriba de Valle Colorado, departamento Valle Grande, Jujuy el 16 de julio de 2016 (ebird.org/checklist/S46917015).
6. Un grupo de cinco individuos observados por Flavio Moschione arriba de Valle Colorado, departamento Valle Grande, Jujuy el 13 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95058182).

CHOROY | *Enicognathus leptorhynchus* | N V

Distribución: Centro de Chile desde Aconcagua hasta Chiloé y ocasionalmente el N de Aisén, hasta los 2000 msnm (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Registrada con cierta regularidad por Omar Zapata en Villa Pehuenia, departamento Aluminé, Neuquén durante el mes de marzo sin especificar el año (O. Zapata *en* Veiga *et al*. [2005] *Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución.* Editorial RyC).
2. Dos individuos observados por Horacio Matarasso y Henry Webster en la estancia San Huberto, departamento Huiliches, Neuquén el 25 de febrero de 2006 (Matarasso & Webster [2006] *Nuestras Aves* 52: 35-36).
3. Un individuo observado por Juan M. Rubio en Esquel, departamento Futaleufú, Chubut el 27 de mayo de 2008 (J.M. Rubio *in litt.*).
4. Un ejemplar filmado y fotografiado por Luis Ricciuto en el museo El Charrúa, RM Quilque Lil, departamento Aluminé, Neuquén el 7 y 9 de mayo de 2020 (ebird.org/checklist/S68630573; Figura 34).
5. Un ejemplar (probablemente el mismo de la observación anterior) fotografiado por Luis Ricciuto en Aluminé, departamento homónimo, Neuquén el 18 de noviembre de 2021 (L. Ricciuto *in litt.*).
Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Existen reportes referidos al paso Icalma, departamento Aluminé, Neuquén que preferimos excluir por falta de detalles (H. Gerbund *en* López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).

Figura 34. Choroy *Enicognathus leptorhynchus*, reserva Quilque Lil, Neuquén, 9 de mayo de 2020 (Luis Ricciuto)

CHURRÍN DE ZIMMER | *Scytalopus zimmeri* | N

Distribución: Andes del S de Bolivia y NO de Argentina, entre los 1700-3200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Claës Olrog en el "*camino a Valle Grande, San Francisco*", departamento Valle Grande, Jujuy el 4 de agosto de 1956 (Olrog [1958] *Acta Zoológica Lilloana* 15: 5-18). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.
2-3. Dos ejemplares colectados por Claës Olrog, José María Gómez, Octavio Budin y Leoncio Lemo en El Duraznillo, departamento Valle Grande, Jujuy el 25 y 27 de octubre 1970 (Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264). Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.
4-5. Dos ejemplares colectados por Claës Olrog, José María Gómez, Octavio Budin y Leoncio Lemo en El Duraznillo, departamento Valle Grande, Jujuy el 4 de noviembre de 1970 (Olrog [1972] *op. cit.*). Uno de los especímenes se encuentra depositado en el MACN y el restante en la COFML.
6. Numerosos ejemplares grabados por Mark Pearman en el río Tranca, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de diciembre de 1996. Posteriormente este observador la registró en varias visitas a la misma zona (M. Pearman *in litt.*).
7. Varios ejemplares grabados por Mark Pearman entre El Duraznillo y Alto Calilegua, departamento Valle Grande, Jujuy el 4 de septiembre de 1998 (M. Pearman *in litt.*).
8. Registrada por Germán Pugnali en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 29 de octubre de 2003 (ebird.org/checklist/S26745026).
9-10. Varios individuos registrados por Juan Mazar Barnett cerca de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 2 y 3 de diciembre de 2003 (J. Mazar Barnett, inédito).
11. Registrada por Diego Monteleone, Germán Pugnali, Mark Pearman y Frank Lambert cerca de Rodeo Pampa, departamento Santa Victoria, Salta el 7 de septiembre de 2004 (ebird.org/checklist/S26500580).
12. Registrada por Daniel Almirón en cercanías de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta entre el 22 y el 25 de octubre de 2004 (ebird.org/checklist/S27379459).
13-33. Mencionada sin detalles para diez localidades de la provincia de Jujuy y otras once de la provincia de Salta (Di Giacomo [2005] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).
34. Un individuo observado por Nigel Voaden en el PN Los Cardones, Salta el 5 de marzo de 2006 (ebird.org/checklist/S20477493).
35. Un individuo observado por John y Lindsay Fitch en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 19 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S7954097).
36. Registrada en numerosas ocasiones en el cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] *Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro*. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy).
37-38. Grabada por Daniel Almirón, Diego Caiafa y otros observadores cerca de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 5 y 6 de noviembre de 2007 (ebird.org/checklist/S24888731; xeno-canto.org/116369).
Taxonomía: Niels Krabbe y Thomas Schulenberg ([1997] *Ornithological Monographs* 48: 47-88) proponen una clasificación moderna del género *Scytalopus* basada en diferencias ecológicas y vocales.
Comentarios: Claës Olrog había observado diferencias de plumaje entre las aves de la sierra de Aconquija, Tucumán (pertenecientes al CHURRÍN CEJA BLANCA *Scytalopus superciliaris*) y las provenientes de Calilegua, Jujuy sospechando que estas últimas podrían corresponder a la subespecie *Scytalopus superciliaris zimmeri* (Olrog [1958] *op. cit.*; Olrog [1963] *Opera Lilloana* 9: 1-377). Más tarde, este autor refuta su propia hipótesis aclarando que las diferencias observadas son individuales (Olrog [1972] *op. cit.*). Esta especie pasó desapercibida por largo tiempo en territorio argentino ya que habita en sectores localizados e inaccesibles, pero principalmente debido al desconocimiento de sus vocalizaciones y la

importancia de éstas como caracteres taxonómicos (Areta & Monteleone [2022] *Journal of Ornithology*: doi.org/10.1007/s10336-022-02012-0).
Especímenes (5): **MACN-Or**-52161, **COFML**-10050, **COFML**-13213, **COFML**-13214, **COFML**-13215

BANDURRITA BOLIVIANA | *Tarphonomus harterti* | N R

Distribución: Andes del O de Bolivia entre los 1400-2950 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Una pareja observada y grabada por Juan Mazar Barnett en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 3 de diciembre de 2003 (J. Mazar Barnett, inédito).
2. Un ejemplar grabado por Diego Monteleone, Germán Pugnali, Mark Pearman y Frank Lambert en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 8 de septiembre de 2004 (Monteleone [2008] *en* López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).
3. Un ejemplar fotografiado por Germán Pugnali, Mark Pearman y James Lowen en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 4 de agosto de 2009 (G. Pugnali y J. Lowen *in litt*.).
4. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta en junio de 2010 (A. Bodrati *com. pers*.).
5. Tres ejemplares fotografiados por Jorge La Grotteria, Santiago Torres y Walter Gómez en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 9 de septiembre de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=358398; Figura 35).
6. Tres ejemplares fotografiados y grabados por Diego Monteleone, Ulises Ornstein, Fabricio Gorleri y un grupo de observadores en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 15 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61623949).
7. Dos individuos observados por Freddy Burgos en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 23 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61770837).

Figura 35. Bandurrita Boliviana *Tarphonomus harterti*, Santa Victoria Oeste, Salta, 9 de septiembre de 2019 (Jorge La Grotteria)

8. Un ejemplar fotografiado por Ulises Ornstein, Daniel Almirón y Hugo Hulsberg en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 9 de noviembre de 2021 (ebird.org/checklist/S97547768).
Comentarios: Todos los registros provienen de un sector localizado sobre la ruta que conduce a Cañaní, unos 3 km al este de Santa Victoria Oeste, Salta.

BANDURRITA DE BOSQUE | *Upucerthia saturatior* | N (CT)

Distribución: Endémica de los bosques patagónicos del centro-sur de Chile y O de Argentina (Areta & Pearman [2009] *Condor* 111: 135-149).
Taxonomía: Descripta por William Scott ([1900] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 10: 62-64) con material proveniente de Chile, y considerada por casi todos los autores como una subespecie de la BANDURRITA ESTEPARIA *Upucerthia dumetaria*. Juan Esteban ([1951] *Acta Zoológica Lilloana* 12: 377-441) fue uno de los pocos en tratar a la forma *saturatior* como especie diferente. Nuevos estudios demostraron que las diferencias morfológicas, vocales y ecológicas son suficientes para reconocer a *saturatior* como especie válida (Areta & Pearman [2009] *op. cit.*; museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop393.htm).
Comentarios: Mencionada por primera vez para la avifauna argentina en base a una serie de ejemplares colectados cerca del lago Nahuel Huapi, Neuquén y en la provincia de Chubut (Zotta [1938] *Hornero* 7: 46-64). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

REMOLINERA ACANELADA | *Cinclodes albiventris* | N (CT)

Distribución: Andes de Perú, Bolivia, N de Chile y NO de Argentina hasta los 5000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Descripta por Rudolph Philippi y Ludwig Landbeck ([1861] *Anales de la Universidad de Chile* 18: 731-734) con material proveniente de Arica, Chile y considerada por mucho tiempo una subespecie de la REMOLINERA PARDA *Cinclodes fuscus*. Nuevos estudios demostraron que *albiventris* debería ser tratada como especie válida, propuesta que fue aceptada por el SACC (Sanín *et al.* [2009] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 53: 547-555; museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop415.htm).
Comentarios: Existen numerosos reportes históricos en la literatura (White [1882] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882: 591-629; Baer [1904] *Ornis* 12: 209-234; Bruch [1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259; Chapman [1919] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 41: 323-333; Dabbene [1920] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 30: 113-195).

BAILARÍN YUNGUEÑO | *Chiroxiphia boliviana* | N

Distribución: Andes desde el S de Perú hasta el O de Bolivia, entre los 650-2150 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Registrada por Flavio Moschione en la finca Candado Grande ubicada en la serranía de las Pavas, departamento Orán, Salta el 9 de septiembre de 2013 (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; Areta *et al. en prep.*).

2-3. Varios ejemplares grabados por Juan I. Areta, Mark Pearman, Facundo Gandoy y Giselle Mangini en dos territorios de la finca Candado Grande ubicada en la serranía de las Pavas, departamento Orán, Salta entre el 1 y el 3 de octubre de 2014 (Areta *et al. en prep.*).
4. Un juvenil capturado y al menos cuatro ejemplares grabados por Luis Rivera y Natalia Politi en la finca Pintascayo, departamento Iruya, Salta entre el 10 y el 13 de octubre de 2014 (Rivera & Politi [2015] *Hornero* 30: 21-23).
5. Escuchada por Juan I. Areta en el PN Calilegua, Jujuy el 21 de agosto de 2015 (Areta *et al. en prep.*).
6. Un individuo observado por Nicolás Bejarano en el PN Calilegua, Jujuy el 6 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S51699794).
7. Registrada por Flavio Moschione en el PN Calilegua, Jujuy en enero de 2016 (Hernán Povedano *en* López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).
8. Cuatro individuos grabados por Facundo Gandoy, Giselle Mangini, Facundo Di Sallo y Federico Brissón Egli en el dique Itiyuro, departamento General José de San Martín, Salta el 17 de abril de 2016 (ebird.org/checklist/S29057033).
9. Un ejemplar fotografiado por Dolores Fernández en el PN Calilegua, Jujuy el 24 de abril de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=563265).
10. Un juvenil fotografiado por Adrián Braidotti en el PN Calilegua, Jujuy el 11 de julio de 2016 (Braidotti [2016] *EcoRegistros Revista* 6: 27-29).
11. Un individuo observado por Daniel Almirón y Hugo Hulsberg en el PN Calilegua, Jujuy el 1 y 3 de agosto de 2016 (ebird.org/checklist/S31037685).
12. Uno o dos individuos escuchados por Diego Monteleone y Hugo Hulsberg en el PN Calilegua, Jujuy el 13 de septiembre de 2016 (ebird.org/checklist/S31648854).
13. Al menos cuatro ejemplares grabados por Juan I. Areta en el PN Calilegua, Jujuy el 16 de septiembre de 2016 (Areta *et al. en prep.*).
14. Dos individuos grabados por Jorge La Grotteria y Hernán Alvarado en el PN Calilegua, Jujuy el 27 de septiembre de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=485110).
15. Un ejemplar grabado por Martín Toledo y Alejandro Schaaf en el PN Calilegua, Jujuy el 8 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S31986970).
16. Un total de seis individuos registrados por Julián Quillén Vidoz en el PN Calilegua, Jujuy el 13 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32167843).
17. Dos individuos observados por Nicolás Bejarano en la reserva Loma Chata, departamento Valle Grande, Jujuy el 1 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S51523652).
18. Un ejemplar fotografiado por Matías Chávez en el PN Calilegua, Jujuy el 27 de febrero de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=549575).
Comentarios: Documentada en el PN Baritú, Salta en octubre de 2018 y enero de 2019 (Müller *et al.* [2019] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 269: 1-4).

TUERÉ ENMASCARADO | *Tityra semifasciata* | N

Distribución: Desde México y Centroamérica hasta el NO de Sudamérica y la Amazonía, con una población disyunta en el E de Paraguay. Mayormente por debajo de los 1500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un macho fotografiado por Ignacio Roesler y otros observadores en el PN Iguazú, Misiones el 17 de enero de 2008 (Bodrati *et al.* [2008] *Hornero* 23: 45-49).
2-3. Una hembra y una pareja observadas por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 4 y 6 de mayo de 2010 (Pagano & Bodrati [2011] *Nuestras Aves* 56: 33-34).

4. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 16 de agosto de 2010 (Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).
5. Una hembra adulta fotografiada por Rosana Ursino y Pablo Mosto cerca de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 29 de agosto de 2010 (Mosto [2011] *EcoRegistros Revista* 3: 1-3; Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).
6. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 1 de diciembre de 2010 (Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).
7. Una hembra fotografiada por Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 30 de agosto de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=15731).
8. Un macho fotografiado por Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 22 de agosto de 2013 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=25702).
9. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de octubre de 2013 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=606015).
10. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Laura Dodyk en el PP Puerto Península, Misiones el 8 de enero de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=36300).
11. Una pareja fotografiada por Jorge La Grotteria, Alec Earnshaw y Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 2 y 3 de mayo de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=50616).
12. Una pareja fotografiada por Patricio Silfeni en el PN Iguazú, Misiones el 31 de julio de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=58041).
13. Una hembra fotografiada por Marian Wigdorovitz en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 18 de marzo de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=92321).
14. Una hembra fotografiada por Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 7 de abril de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=98890).
15. Dos ejemplares fotografiados por Andrés Terán en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 27 de junio de 2015 (ebird.org/checklist/S53179395).
Comentarios: Un individuo observado por Alejandro Bodrati unos 4 km al este del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 14 de octubre de 2017 (Bodrati [2018] *Nuestras Aves* 63: 56). Un nido depredado por ARASARÍ FAJADO *Pteroglossus castanotis* en el PN Iguazú, Misiones (Moresco [2019] *Nuestras Aves* 64: 14-16). Especie de reciente y rápida expansión por el territorio argentino (Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).

PICOAGUDO | *Oxyruncus cristatus* | N R

Distribución: Fragmentada distribución en Sudamérica. La población más austral ocupa la región SE de Brasil, E de Paraguay y extremo NE de Argentina hasta los 1600 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Pablo Canevari en el PN Iguazú, Misiones el 16 de mayo de 1982 (Canevari [1992] *Nuestras Aves* 27: 35).
2. Un individuo observado por Peter Kaestner en el PN Iguazú, Misiones en el año 1986 (P. Kaestner *en* Ridgely & Tudor [1994] *The Birds of South America. The Suboscine Passerines*. University of Texas Press).
3-6. Registrada por Davis Finch en el PN Iguazú, Misiones el 19 de julio de 1987, 19 de julio de 1988, 20 de noviembre de 1988 y 19 de julio de 1989 (Finch [1991] *Nuestras Aves* 24: 24-25).
7. Un individuo observado por Germán Pugnali en el PN Iguazú, Misiones el 20 de julio de 1992 (ebird.org/checklist/S26748674).

8. Un individuo observado por Germán Pugnali en el PN Iguazú, Misiones en julio de 1994 (G. Pugnali *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
9. Un ejemplar grabado en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones el 27 y 28 de septiembre de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
10. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en el PN Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 2007. Al día siguiente fue relocalizado por Ignacio Roesler, Mark Pearman y Emilio Jordan en el mismo sitio (I. Roesler *in litt.*).
11. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iguazú, Misiones el 28 de agosto de 2008 (ramonmollerjensen.com).
12. Un ejemplar fotografiado por Fernando Bernasconi en el PP Urugua-í, Misiones el 8 de mayo de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=17122).
13. Un individuo escuchado por Luis Pagano y Diego Oscar sobre la ruta provincial n°14 unos 6 km al sur del cruce con la ruta provincial n°17, departamento San Pedro, Misiones el 7 de abril de 2012 (L. Pagano *obs. pers.*; ebird.org/checklist/S31610122).

Figura 36. Picoagudo *Oxyruncus cristatus*, PN Iguazú, Misiones, 2 de julio de 2016 (Alec Earnshaw)

14. Un individuo escuchado por Rosana Ursino en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de abril de 2012 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=32675).
15. Dos individuos vocalizando cerca de la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 2 y 3 de septiembre de 2013 (DNREA [2013] *Apepú 2013. Campaña de Invierno, Parque Nacional Iguazú*. APN).
16. Dos individuos escuchados por Fabricio Gorleri en el PP Urugua-í, Misiones el 12 de abril de 2015 (ebird.org/checklist/S17917593).
17. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Hugo Hulsberg y otros observadores en el PN Iguazú, Misiones el 10 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S47191345).
18. Un ejemplar fotografiado y filmado por Alec Earnshaw y Julián Baigorria en el PN Iguazú, Misiones el 2 de julio de 2016 (ebird.org/checklist/S36634944; Figura 36).
19. Un individuo observado por Walter Gómez en el PN Iguazú, Misiones el 21 de julio de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=458086).
20. Un individuo escuchado por Julián Quillén Vidoz en Saltos del Tabay, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 24 de diciembre de 2016 (ebird.org/checklist/S33180893).
21. Un ejemplar fotografiado por Héctor Schreiber, David Juszczuk y Héctor Fernández en el PN Iguazú, Misiones el 28 de septiembre de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=354326).
22. Un individuo registrado por Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 8 de febrero de 2021 (ebird.org/checklist/S80668531).
23. Un ejemplar fotografiado por Jorge La Grotteria y María Sosa en el PN Iguazú, Misiones el 1 de abril de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=439157).

24. Un individuo observado por Facundo Di Sallo y Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 16 de abril de 2021 (ebird.org/checklist/S85670247). Éstos y otros observadores lo registran en forma regular en la zona entre abril y noviembre de ese año (ebird.org; ecoregistros.org).
25. Un ejemplar fotografiado por Dante Insúa, Carlos Schmidtutz, Sergio Castedo y Livio Blanco sobre la ruta nacional n°101, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de enero de 2022 (ebird.org/checklist/S103299601).
26. Un individuo observado por Agostina Juncosa y Valentín Zárate en el PP Puerto Península, Misiones el 23 de enero de 2022 (ebird.org/checklist/S101309102).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Casi todos los registros del PN Iguazú, Misiones provienen del mismo sector sobre la ruta nacional n°101. Es probable que allí exista una pequeña población local y las fotografías publicadas correspondan a unos pocos individuos.

MOSQUETA OREJA NEGRA | *Phylloscartes paulista* | N R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta el E de Paraguay y el extremo NE de Argentina. Mayormente por debajo de los 600 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Mencionada con dudas para Iguazú, Misiones (Zotta [1939] *Hornero* 7: 299-326).
2. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40).
3. Un individuo anillado en el norte de Misiones en septiembre de 1978 (Arturo Tarak *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324). Posteriormente dicha localidad fue referida como PN Iguazú, Misiones (Juan C. Chebez *en* Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Cambridge).
4. Observada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1982 (F. Moschione *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
5. Un ejemplar colectado por Miguel Castelino y otros investigadores en la seccional Hidrómetro del PN Iguazú, Misiones el 29 de agosto de 1984. Esta quizás sea la fuente del comentario publicado años más tarde (Gustavo Iglesias *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA). El espécimen permaneció depositado en el CIES y posteriormente ingresado a la colección del MACN el 25 de septiembre de 2012 (M. Castelino *com. pers.*; Figura 37).
6. Observada por Samuel Narosky en el PN Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 1986 (S. Narosky *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
7. Observada por Bret Whitney y Robert Barth en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1986 (B. Whitney y R. Barth *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).
8. Observada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1988 (F. Moschione *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
9. Observada por Bernabé López-Lanús en el PN Iguazú, Misiones entre el 7 y el 25 de enero de 1990 (B. López-Lanús *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
10. Registrada por Ernesto Krauczuk en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones en el año 1990 (E. Krauczuk *en* Wege & Long [1995] *Key Areas for threatened birds in the Neotropics*. BirdLife Conservation Series N°5).
11. Tres individuos observados en Puerto San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 20 de febrero 1992 (Giraudo *et al.* [1993] *Nótulas Faunísticas* 49: 1-13).
12. Observada por Leonardo Pastorino en el PN Iguazú, Misiones en julio de 1992 (L. Pastorino *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

13. Uno o dos individuos observados por Phil Benstead en el PN Iguazú, Misiones el 27 de agosto de 1993 (Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser* Mergus octosetaceus *in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust).
14. Dos individuos observados por Juan Mazar Barnett en el PP de la Sierra Martínez Crovetto, Misiones el 11 de junio de 1994 (J. Mazar Barnett *en* Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). Luego la localidad fue referida como Colonia Taranco, departamento Apóstoles, Misiones (Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
15. Tres individuos observados en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 3 de diciembre de 1994 (Ernesto Krauczuk *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
16-17. Registrada en dos ocasiones en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones durante el año 1996 (Ernesto Krauczuk *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit*).
18. Un individuo observado en el PP Cruce Caballero, Misiones en marzo de 1997 (Bodrati & Cockle [2006] *Ornitología Neotropical* 17: 243-258).
19. Registrada por Diego Serra en la RNE San Antonio, Misiones en el año 1998 (D. Serra *en* Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA).
20. Un individuo observado por Greg Roberts en el PN Iguazú, Misiones el 17 de enero de 1999 (G. Roberts *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
21-22. Un individuo y una pareja observados en el PP Cruce Caballero, Misiones el 22 y 23 de octubre de 2003 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
23. Un individuo observado por Carlos Ferrari en el PP Cruce Caballero, Misiones el 24 de octubre de 2003 (ebird.org/checklist/S16018264).
24. Dos individuos observados por Christian Savigny en el PN Iguazú, Misiones el 16 de mayo de 2004 (Savigny [2013] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 124: 1-4).
25. Un individuo observado en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 6 de febrero de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*). En esta localidad se la encontró regularmente entre los años 2004 y 2007 (Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64).
26-27. Registrada en la RNE San Antonio, Misiones el 4 y 9 de junio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
28. Un individuo observado en el PP Cruce Caballero, Misiones el 22, 24 y 27 de junio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
29. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 5 de abril de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).

Figura 37. Mosqueta Oreja Negra *Phylloscartes paulista*, MACN-Or-72928, PN Iguazú, Misiones, 29 de agosto de 1984 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

30. Un ejemplar grabado en el PP Cruce Caballero, Misiones el 4 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
31. Un ejemplar grabado por Kristina Cockle en el PP Urugua-í, Misiones el 30 de mayo de 2005 (Cockle [2008] *en* López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).
32. Un individuo observado vocalizando en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 2 de junio de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
33. Una pareja observada en el PP Moconá, Misiones el 17 de octubre de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
34. Un individuo observado por Carlos Ferrari en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 8 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S15620397).
35. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati en el arroyo Paraíso del PP Caá Yarí, Misiones el 16 de octubre de 2007 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*; A. Bodrati *in litt.*).
36. Dos ejemplares observados (uno de ellos grabado) por Alejandro Bodrati en el arroyo Paraíso del PP Caá Yarí, Misiones el 19 de octubre de 2009 (A. Bodrati *in litt.*).
37. Dos individuos observados por Marcelo Allende en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 9 de junio de 2012 (ebird.org/checklist/S23722329).
38. Un individuo observado por Sebastián Dardanelli en el PN Iguazú, Misiones el 18 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24308730).
39. Un individuo observado por Frank Dijkstra y Guy Cox en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 2 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S24778539).
40. Un individuo observado por David Bell y Adam Timpf en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 7 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S27529759).
41. Un ejemplar fotografiado por Facundo Di Sallo en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 6 de agosto de 2020 (F. Di Sallo *in litt.*). Lamentablemente la calidad de la fotografía no permite una identificación segura.
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). La observación referida a la RB Yaboty, Misiones en septiembre de 1994 (Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*; Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*) fue refutada por Sebastián Cabanne (*in litt.*). Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (1): **MACN-Or-**72928

MOSQUETA PICO PALA | *Todirostrum cinereum* | N

Distribución: Desde México y Centroamérica hasta gran parte de Sudamérica, mayormente periamazónica por debajo de los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Andrés Bosso en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de febrero y el 21 de marzo de 2001 (Bosso [2001] *Hornero* 16: 49-50).
2. Un individuo observado por Germán Pugnali en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de marzo de 2003 (ebird.org/checklist/S26708113).
3. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP de la Araucaria, Misiones el 3 de marzo de 2004 (Bodrati [2005] *Nuestras Aves* 50: 30-33).
4. Registrada por Terry Rosenmeier en el PP Cañadón de Profundidad, Misiones el 20 de marzo de 2006 (ebird.org/checklist/S25662180).

5. Un ejemplar fotografiado por Gabriela Núñez Montellano en la reserva privada Yacutinga, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de marzo de 2007. El mismo fue registrado regularmente durante ese año, hallándose una pareja con nido el 25 de noviembre (Núñez Montellano *et al*. [2009] *Cotinga* 31: 151-152).
6. Un individuo observado en Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones en abril de 2007 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).
7. Un individuo observado por Facundo Gandoy en el PN Iguazú, Misiones el 15 de agosto de 2007 (ebird.org/checklist/S28229566).
8. Parejas nidificantes en el barrio de guardarques del PN Iguazú, Misiones entre los años 2008 y 2010 (Javier Cerutti *en* Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*; Pagano & Bodrati [2017] *Nuestras Aves* 62: 11-13).
9. Un individuo observado por Carlos Ferrari y Silvia Vitale en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 21 de febrero de 2008 (ebird.org/checklist/S15741906).
10. Un ejemplar observado y grabado por Juan I. Areta y Alejandro Bodrati en la península Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de agosto de 2008 (Bodrati *et al*. [2012] *op. cit*.).
11. Un individuo observado por Santiago Imberti y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 7 de agosto de 2008 (ebird.org/checklist/S27277881).
12. Un individuo observado por Daniel Almirón, Norberto Oste y Diego Monteleone en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 5 de septiembre de 2008 (ebird.org/checklist/S26501348).
13. Un individuo observado por Carlos Ferrari y Silvia Vitale en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 10 de octubre de 2008 (ebird.org/checklist/S15740532).
14. Una pareja nidificante observada por Ramón Moller Jensen en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 15 de octubre de 2008 (Pagano & Bodrati [2017] *op. cit*.).
15. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iguazú, Misiones el 28 de octubre de 2008 (Pagano & Bodrati [2017] *op. cit*.).
16. Un ejemplar fotografiado por Rosana Ursino en el PN Iguazú, Misiones el 8 de abril de 2010 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=1212).
17. Registrada por Pablo Meoniz en el PN Iguazú, Misiones el 18 de abril de 2010 (ebird.org/checklist/S54930511).
18. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 4 y 5 de mayo de 2010 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit*.).
19. Dos individuos observados por Joshua Stone en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de julio de 2010 (ebird.org/checklist/S6623163).
20. Registrada por Gabriel San Juan en el lago Urugua-í, departamento Iguazú, Misiones el 29 de julio de 2010 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=11539).
21. Un individuo observado por Glenda Janca y otros observadores en el PN Iguazú, Misiones el 6 de agosto de 2010 (ebird.org/checklist/S6781323).
22. Un individuo observado por Matt Dufort en el PN Iguazú, Misiones el 20 de agosto de 2010 (ebird.org/checklist/S7213714).
23. Grabada y fotografiada por José Luis Merlo en el departamento Iguazú, Misiones entre el 21 y el 23 de septiembre de 2010 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=4075). La ubicación de estos registros no es precisa, existen fotos de la misma serie con diferentes fechas y localidades.
24. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 3 de diciembre de 2010 (Bodrati *et al*. [2012] *op. cit*.).
25. Un individuo observado en Santa Rosa, departamento San Pedro, Misiones en febrero de 2011 (Bodrati *et al*. [2012] *op. cit*.).
26. Un individuo observado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones en marzo de 2011 (Bodrati *et al*. [2012] *op. cit*.).

27. Un ejemplar fotografiado por Diego Oscar y Rosana Ursino en el PP Puerto Península, Misiones el 23 de marzo de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=5219).
28. Un ejemplar fotografiado por Hugo Hulsberg en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 28 de noviembre de 2011 (ebird.org/checklist/S47197190).
29. Hallada por Ramón Moller Jensen nidificando en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones desde noviembre de 2011 en adelante (R. Moller Jensen *en* Pagano & Bodrati [2017] *op. cit.*).
30. Un ejemplar fotografiado por Lotfi Si Saber en el PN Iguazú, Misiones el 5 de enero de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=283275).
Comentarios: Esta especie ha colonizado en forma acelerada, aparentemente de norte a sur, el territorio de la provincia de Misiones y sus densidades han aumentado en las localidades donde fue inicialmente registrada (Pagano & Bodrati [2017] *op. cit.*). Un nido hallado por Marcelo Wioneczak en Posadas, departamento Capital, Misiones (Wioneczak [2018] *Nuestras Aves* 63: 14-15). Recientemente documentada en la provincia de Corrientes (Colina & Cibils [2019] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 283: 1-3; De Lucca & Demarco [2020] *Nuestras Aves* 65: 90).

FIOFÍO PARANAENSE | *Elaenia sordida* | N (CT)

Distribución: Amplia región del SE de Brasil incluyendo E de Paraguay y NE de Argentina, hasta los 2000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Descripta por John Zimmer ([1941] *American Museum Novitates* 1108: 1-23) con material proveniente de Franca, São Paulo, Brasil. Considerada tradicionalmente una subespecie del FIOFIO OSCURO *Elaenia obscura*. Trabajos moleculares recientes avalan el tratamiento de la subespecie *sordida* como especie válida (Rheindt *et al.* [2008] *BMC Evolutionary Biology* 8: 1193; Tang *et al.* [2018] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 127: 522-533), propuesta que fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop806.htm).
Comentarios: Una de las primeras menciones para nuestro país la realiza William Partridge ([1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153), quien describe cuatro machos colectados en el arroyo Urugua-í, Misiones en los años 1949 y 1951. En el mismo trabajo se comenta la existencia de otros cuatro especímenes provenientes de Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones. Para una revisión de las vocalizaciones ver Minns ([2017] xeno-canto.org/article/218).

DORADITO LIMÓN | *Pseudocolopteryx citreola* | N (CT)

Distribución: Centro de Chile y O de Argentina, entre los 300-1300 msnm (Ábalos & Areta [2009] *Ornitología Neotropical* 20: 215-230).
Taxonomía: Descripta por Ludwig Landbeck ([1864] *Archiv für Naturgeschichte* 30 [1]: 55-62) con material proveniente del valle del río Mapocho, Santiago, Chile. Nuevas investigaciones demuestran que la población occidental del DORADITO PAMPEANO *Pseudocolopteryx flaviventris* difiere en medidas y vocalizaciones de las del centro y este del país, pero al mismo tiempo son indistinguibles del taxón *citreola* (Ábalos & Areta [2009] *op. cit.*). El reconocimiento de esta forma como especie válida fue aceptado por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop420.htm).
Comentarios: La descripción original fue publicada en español por una revista científica chilena (Lan-

dbeck [1864] *Anales de la Universidad de Chile* 24: 336-348). La primera mención para Argentina la realiza Alexander Wetmore ([1926] *Bulletin of the United States National Museum* 133: 1-448), quien colectó especímenes en las provincias de Mendoza, Río Negro y Chubut. Para mayor información sobre identificación, comportamiento vocal, movimientos migratorios y filogenia ver López-Lanús *et al.* ([2010] *Boletín Chileno de Ornitología* 16: 51-58), Leiva & Bierig ([2014] *Natura Neotropicalis* 45: 87-95) y Jordan *et al.* ([2021] *Zoologica Scripta* 50: 173-192).

BENTEVEO DE BARBIJO | *Myiodynastes chrysocephalus* | N

Distribución: Andes desde el N de Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, mayormente entre los 1000-2200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en Mesón de Condado, departamento Santa Victoria, Salta el 26 de enero de 1991 (López-Lanús [1992] *Hornero* 13: 258).
2-4. Registrada por Ignacio Roesler y Luciano Naka en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy en octubre de 2002. Además, Ignacio Roesler la observó en dicha localidad en enero de 2004 y en otras ocasiones posteriores (I. Roesler *in litt.*). Las grabaciones no fueron halladas en la MLNS.
4. Un adulto y tres juveniles observados por Flavio Moschione y José Segovia en la RP Las Lancitas, Jujuy el 29 de enero de 2004 (Segovia *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 23-25).
5. Un adulto y un juvenil observados y fotografiados por José Segovia, Patricio Ramírez Llorens y Mónica Camposano cerca del río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 21 de marzo de 2007 (Segovia *et al.* [2009] *op. cit.*).
6. Una pareja grabada por Fabricio Gorleri en el PN Calilegua, Jujuy el 6 de abril de 2007 (Segovia *et al.* [2009] *op. cit.*).
7. Un individuo observado por Fabricio Gorleri, Freddy Burgos y Rolando Guevara en el PN Calilegua, Jujuy el 8 de abril de 2007 (ebird.org/checklist/S10702182).
8. Un ejemplar grabado por Flavio Moschione en el río Cayotal a 500 m de su unión con el río Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de enero de 2009 (xeno-canto.org/292930).
9. Un individuo observado y escuchado por Germán Pugnali en el PN Calilegua, Jujuy el 21 de noviembre de 2010 (ebird.org/checklist/S26693335).
10. Un ejemplar grabado por Freddy Burgos en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 29 de diciembre de 2011 (ebird.org/checklist/S41730562).
11. Una pareja con nido fotografiada por Diego Monteleone y Cristina Pita en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 6 de enero de 2013 (ebird.org/checklist/S26501264).
12. Un ejemplar fotografiado por Hugo Hulsberg y Daniel Almirón en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 26 de diciembre de 2013 (ebird.org/checklist/S48243898).
13. Tres ejemplares fotografiados por William Legge arriba del PN Calilegua, departamento Valle Grande, Jujuy el 8 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26847946).
14. Dos individuos observados por José Segovia en la RP Las Lancitas, Jujuy el 12 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S48922880).
15. Un ejemplar grabado y fotografiado por Jorge La Grotteria y Hernán Alvarado en el PN Calilegua, Jujuy el 29 de septiembre de 2016 (La Grotteria *et al.* [2017] *EcoRegistros Revista* 7: 55-58).
16. Dos individuos observados y escuchados por Julián Quillén Vidoz en el PN Calilegua, Jujuy el 14 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32168113).
17. Un ejemplar fotografiado por Matías Chávez en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 25 de octubre de 2016 (La Grotteria *et al.* [2017] *op. cit.*).

18. Un individuo observado por Nicolás Bejarano en el PN Calilegua, Jujuy el 30 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S51521306).
19. Un ejemplar grabado por Francisco Cornell en San Francisco, departamento Valle Grande, Jujuy el 14 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S32668517).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Actualmente es una especie regularmente registrada en algunos sitios de las yungas argentinas, donde se la puede considerar un visitante estival nidificante.

BENTEVEO ALA ROJIZA | *Myiozetetes cayanensis* | N V

Distribución: Amplia distribución en el N de Sudamérica, mayormente por debajo de los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Dos ejemplares escuchados y fotografiados por Oscar Rodríguez en el PN Iguazú, Misiones el 16 de junio de 2022 (ebird.org/checklist/S113074097). Al día siguiente uno de ellos fue grabado por Fernando Cabral en el mismo sitio (ebird.org).
Taxonomía: Para una discusión sobre identificación ver Restall ([2009] *Neotropical Birding* 5: 24-31).
Comentarios: Recientemente confirmada para Paraguay mediante registros documentados en los departamentos Canindeyú y Concepción (Smith *et al.* [2014] *Alauda* 82: 71-72).

VIUDITA ENMASCARADA | *Fluvicola nengeta* | N

Distribución: La subespecie nominal en el E de Brasil hasta São Paulo, por debajo de los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar filmado por Ernesto Krauczuk, Daniel Kurday y Esteban Arzamendia en el PP Esmeralda, Misiones el 20 de marzo de 2002 (Krauczuk *et al.* [2003] *Lundiana* 4: 161).
2. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 19 de octubre de 2005 (Klavins & Bodrati [2007] *Hornero* 22: 43-45).
3. Un individuo observado por Dionisio Paniagua en el PN Iguazú, Misiones el 29 de julio de 2008 (ebird.org/checklist/S37194466).
4. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en el PN Iguazú, Misiones el 18 de febrero de 2010 (Militello *et al.* [2010] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 44: 1-4).
5. Registrada por Alan Wilkinson en el PN Iguazú, Misiones el 4 de diciembre de 2010 (ebird.org/checklist/S60219606).
6. Registrada por Al Kirkley en el PN Iguazú, Misiones el 2 de enero de 2012 (ebird.org/checklist/S22375574).
7. Un ejemplar fotografiado en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones durante febrero y marzo de 2012 (La Grotteria *et al.* [2012] *EcoRegistros Revista* 2. Artículo 4: 1-6). Numerosas observaciones en la misma localidad hasta noviembre de 2018, e incluso se la halló nidificando en septiembre de 2015.
8. Un individuo observado por Marcos Lartigau en la reserva privada San José, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de febrero de 2014 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=182785).
9. Registrada por Julián Quillén Vidoz en el PN Iguazú, Misiones el 7 de junio de 2015 (ebird.org/checklist/S23834046).

10. Un individuo observado por Martín Toledo y Javier Poblete en el PN Iguazú, Misiones el 15 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24369715).
11. Un ejemplar fotografiado por Joel Martínez y Pedro Gauna en el complejo La Aventura, departamento Capital, Misiones el 1 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S29927505).
12. Un ejemplar fotografiado por Andrea Paniagua en la reserva Arroyo Itá, departamento Capital, Misiones el 4 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26257596).
13. Dos individuos observados por Warren Bielenberg en el PN Iguazú, Misiones el 20 de julio de 2017 (ebird.org/checklist/S38419678).
14. Un ejemplar fotografiado por Martjan Lammertink y Néstor Fariña en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 16 de octubre de 2017 (Fariña & Lammertink [2018] *Nuestras Aves* 63: 48-50).
15. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el balneario municipal de Aristóbulo del Valle, departamento Caingúas, Misiones el 31 de noviembre de 2017 (A. Bodrati *en* Fariña & Lammertink [2018] *op. cit.*).
16. Un individuo observado por Andrés Espíndola en el PN Iguazú, Misiones el 24 de enero de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=682767).
17. Un ejemplar fotografiado por Sabina De Lucca en la reserva Arroyo Itá, departamento Capital, Misiones el 18 de octubre de 2018 (ebird.org/checklist/S49279739).
18. Un individuo observado por Cherry Williams y Fernando Cabral en el PN Iguazú, Misiones el 5 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S64154640).
19. Un ejemplar observado y fotografiado por Vanesa Montaño en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 27 y 28 de julio de 2020 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=405991).
20. Un ejemplar fotografiado por Florencia Morinigo en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 2 de agosto de 2020 (ebird.org/checklist/S75101235).
21. Un ejemplar fotografiado por Haydee Cabassi y Claudia Castells en la reserva Arroyo Itá, departamento Capital, Misiones el 9 y 10 de septiembre de 2020 (ebird.org/checklist/S73392048). Probablemente el mismo fue relocalizado en el sitio el 16 de octubre de 2020 (ebird.org).
Comentarios: Especie de reciente aparición y franca expansión a través de las provincias de Misiones y extremo norte de Corrientes, donde se la continúa registrando con cierta regularidad.

MONJITA RABADILLA BLANCA | *Xolmis velatus* | N R

Distribución: Especie típica del *cerrado*, ocupando el centro y E de Brasil, N de Bolivia y N de Paraguay hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Wioneczak, Luis Pradier, Luis Krause y Nicolás Pavese cerca de Rincón Ombú Chico, departamento Ituzaingó, Corrientes el 18 de octubre de 2015 (Wioneczak *et al.* [2018] *Nuestras Aves* 63: 8-10).
2. Un ejemplar fotografiado por Flávio Laube y un grupo de observadores cerca del paraje Uguay, departamento Mercedes, Corrientes el 16 de diciembre de 2018 (wikiaves.com.br/3221790; Adrian Eisen Rupp *in litt.*).
3. Un ejemplar filmado por Ernesto Krauczuk cerca de Puerto Esperanza, departamento Iguazú, Misiones el 18 de diciembre de 2018 (ecoregistros.org/site/video.php?id=3834).
4. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iberá, departamento Mercedes, Corrientes el 20 de febrero de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=317564).
5. Un ejemplar fotografiado por Daniel Almirón, Hugo Hulsberg, Javier Ubiría, Norberto Oste y Ce-

priano Oporto en Bahía Carayá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 31 de marzo de 2019 (ebird.org/checklist/S54501124). El mismo permaneció en el sitio al menos hasta julio de ese año, pudiendo ser registrado en numerosas ocasiones (ebird.org; ecoregistros.org).
6. Un ejemplar fotografiado por Carlos Carmona en Paso de los Oscares, departamento Salavina, Santiago del Estero el 9 de abril de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=326750).
7. Un ejemplar fotografiado por Antonio Gómez y María Pelozo sobre la ruta provincial n°40 entre Rincón del Socorro y Colonia Carlos Pellegrini, departamento Mercedes, Corrientes el 18 de agosto de 2019 (Gómez & Pelozo [2019] *Nuestras Aves* 64: 26).
8. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Gavensky, Julián Baigorria y un grupo de observadores en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 23 y 24 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79955132).
9. Un ejemplar fotografiado por Ricardo Battistino, Laura González y Gustavo Marino en la reserva natural Laguna El Palmar, departamento Vera, Santa Fe el 28 de agosto de 2021 (ebird.org/checklist/S94012509). El ave permaneció en el sitio al menos hasta octubre de ese año (ebird.org).

BURLISTO OLIVÁCEO | *Contopus cooperi* | N V

Distribución: Nidificante en una amplia región de Alaska, Canadá y el O de Estados Unidos. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el sur ocupando el NO y centro de Sudamérica (Altman & Sallabanks [2020] *en* Poole [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Diego Ferrer en el PP Aconcagua, Mendoza el 11 de noviembre de 2014 (Ferrer [2015] *Hornero* 30: 25-27; Figura 38).

Figura 38. Burlisto Oliváceo *Contopus cooperi,* PP Aconcagua, Mendoza, 11 de noviembre de 2014 (Diego Ferrer)

GOLONDRINA PURPÚREA | *Progne subis* | N V

Distribución: Se reproduce en una extensa región del E de Estados Unidos, centro y SE de Canadá. Luego de la etapa reproductiva ocupa la mitad N de Sudamérica hasta el S de Brail y N de Argentina (Brown & Tarof [2020] *en* Poole [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: 1. Un macho de primer año observado en vuelo en Horseshoe Bay, islas Malvinas el 19 de octubre de 1972. El mismo fue hallado muerto por Vernon Steen y posteriormente medido e identificado por David Carstairs (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC; Mike Morrison *in litt.*). El espécimen aparentemente se encuentra perdido.
2. Cuatro machos y una hembra observados en la laguna de Pocho, departamento Pocho, Córdoba el 3 de noviembre de 1977 (Nores *et al.* [1983] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 56: 1-114)
3. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN).
4. Mencionada como abundante en el centro y oeste de la provincia de Formosa en diciembre de 1982, sin más detalles (Ridgely & Tudor [1989] *The birds of South America*. Vol. 1. The oscine passerines. University of Texas Press; Robert Ridgely *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
5. Registrada en varias ocasiones por Pablo Michelutti en Miramar y la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba desde el año 1987 (P. Michelutti *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
6. Una bandada de 5000 individuos observada en Jujuy en el mes de diciembre, sin más detalles (Fjeldså & Krabbe [1990] *Birds of the High Andes.* University of Copenhagen).
7. Un individuo observado por Mark Van Beirs en el PN Iguazú, Misiones el 1 de diciembre de 1991 (M. Van Beirs *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
8. Un macho y varias hembras observados por Carlos Saibene en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1991 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA).
9. Una pareja observada por Flavio Moschione en Pipinas, partido de Punta Indio, Buenos Aires el 3 de noviembre de 1993 (F. Moschione *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*)
10. Una pareja observada por Ricardo Clark y Tom Gullick en el PN El Rey, Salta el 12 de diciembre de 1994 (R. Clark *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
11. Hallada con nido y fotografiada en Mendoza, sin más detalles (Elba Pescetti *en* Veiga *et al.* [2005] *Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución.* Editorial RyC).
12. Unos siete individuos observados por Flavio Moschione en Acambuco, departamento General José de San Martín, Salta el 22 de octubre de 2003 (Coconier *et al.* [2007] *en* Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°6. Aves Argentinas).
13. Dos inmaduros observados y fotografiados por Mike Peake, Alan Henry, Mike Morrison y Sue Morrison en Puerto Stanley, islas Malvinas el 8 de octubre de 2004. Esto fue publicado como el primer registro confirmado de esta especie en las islas Malvinas (Black *et al.* [2005] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 5: 12-14; Mike Morrison *in litt.*), aunque las imágenes obtenidas no se encuentran disponibles.
14. Un grupo de siete individuos (cinco machos y dos hembras) fotografiado y grabado por Ignacio Roesler, Bernabé López-Lanús, Diego Monteleone y Eugenio Coconier en Acambuco, departamento General José de San Martín, Salta el 6 de octubre de 2005 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit.*; López-Lanús [2008] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).
15. Un grupo de 20 individuos observado por Flavio Moschione en Acambuco, departamento Ge-

neral José de San Martín, Salta entre el 22 y el 26 de enero de 2006 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit.*).
16. Mencionada sin detalles para la provincia de Catamarca (Carma [2009] *Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca*. CFI).
17. Un grupo de 20 ejemplares fotografiado por Alejandro Espeche en el cruce de la ruta nacional n°50 y el río Pescado, departamento Orán, Salta el 29 de noviembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76844699).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Una pareja fotografiada en Yerba Buena, departamento homónimo, Tucumán en realidad se trata de la GOLONDRINA NEGRA *Progne elegans* (Aráoz & Ortiz [2007] *Xolmis* 3: 47-48). Los reportes estivales de *P. elegans* en la provincia de Misiones podrían ser confusiones con *P. subis* (Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*), o con ejemplares melánicos de la GOLONDRINA DOMÉSTICA *Progne chalybea* (Ignacio Roesler *in litt.*). Registrada en numerosas ocasiones por Robert Clay en Asunción, Paraguay (ebird.org).

ZORZALITO COLORADO | *Catharus fuscescens* | N V

Distribución: Nidificante en una amplia franja sobre el límite entre Estados Unidos y Canadá. Luego de la etapa reproductiva migra hacia Sudamérica, llegando al N de Paraguay y S de Brasil (Heckscher *et al.* [2020] *en* Rodewald [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: 1-2. Al parecer dos individuos distintos observados (uno fotografiado) por Alejandro Bodrati y Luis Pagano en el PP Cruce Caballero, Misiones el 25 de octubre de 2010 (Pagano *et al.* [2013] *Hornero* 28: 79-83). Las fotografías obtenidas no aseguran que se trate de esta especie.
3. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 3 de noviembre de 2010 (Pagano *et al.* [2013] *op. cit.*).

Figura 39. Zorzalito Colorado *Catharus fuscescens*, MACN-Or-74192, ciudad de Córdoba, Córdoba, 17 de noviembre de 2020 (Diego Monteleone)

4. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 4 de noviembre de 2010 (Pagano *et al.* [2013] *op. cit.*).
5. Un ejemplar hallado muerto por Juan Klavins en la ciudad de Córdoba, departamento Capital, Córdoba el 17 de noviembre de 2020 (Klavins *en prep.*; ebird.org/checklist/S76493429). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 39).
Comentarios: La fecha publicada en internet para el ejemplar de Córdoba (ebird.org), no coincide con los datos de su etiqueta.
Especímenes (1): MACN-Or-74192

ZORZAL CHOCOLATE | *Turdus fumigatus* | N R

Distribución: La población más cercana a Argentina ocupa la franja costera del E de Brasil, por debajo de los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1-3**. Registrada por Eduardo Militello en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en agosto de 2011, diciembre de 2012 y entre octubre y noviembre de 2013 (Militello [2016] *EcoRegistros Revista* 6: 6-10; ebird.org).
4. Un ejemplar fotografiado por Mark Pearman en El Soberbio, departamento Guaraní, Misiones el 14 de noviembre de 2014 (M. Pearman *in litt.*).
5. Un individuo observado por Martín Toledo, David Álvarez, Javier Poblete y Juan Klavins en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 16 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24289086).
6. Un ejemplar fotografiado por Diego Villalba en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de julio de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=112947).
7. Un ejemplar fotografiado por Gustavo Durán en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 30 de octubre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=124084).
8. Un ejemplar fotografiado por Guillermo Marcaida en la posada La Misión, departamento Guaraní, Misiones el 28 de noviembre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=128715).
9. Un adulto observado por Luis Pagano entre los cruces de las rutas provinciales n°2 y n°103 cerca de Barra Bonita, departamento 25 de Mayo, Misiones el 20 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).
10. Un ejemplar fotografiado por Federico Villegas en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 12 de julio de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=276000).
11. Un adulto observado por Luis Pagano en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 13 de octubre de 2018 (L. Pagano *obs. pers.*).
12. Un ejemplar fotografiado por Patricia Leiva en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 14 de noviembre de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=362197).
13. Un ejemplar fotografiado por Marcos Sosa en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones, el 19 de diciembre de 2019 (ebird.org/checklist/S70558221).
Comentarios: Existe la posibilidad de que algunas aves reportadas en realidad correspondan a variaciones cromáticas del ZORZAL SABIÁ *Turdus leucomelas*.

TENCA | *Mimus thenca* | N

Distribución: Endémica del centro de Chile hasta los 2200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Félix Seró López en Las Ovejas, departamento Minas, Neuquén el 15 de diciembre de 2006 (Matarasso & Seró López [2008] *Hornero* 23: 41-43).
2-3. Dos grupos registrados cerca de Las Ovejas, departamento Minas, Neuquén el 15 de marzo de 2007 (Matarasso & Seró López [2008] *op. cit.*).
4. Un total de cuatro ejemplares observados y fotografiados en Andacollo, departamento Minas, Neuquén el 17 de marzo de 2007 (Matarasso & Seró López [2008] *op. cit.*).
5. Un individuo observado por Pablo Moreno en el PP Tromen, Neuquén el 12 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S35338454).
6. Un individuo observado por Silvio Montani en la RP Lagunas de Epu Lauquen, Neuquén el 12 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S102489424).

7. Un individuo observado por Javier de Leonardis en la laguna de Esquel, departamento Cushamen, Chubut el 15 de febrero de 2014 (ebird.org/checklist/S17988332).
8. Cinco ejemplares fotografiados por Jorge Veiga y José Luis Pérez sobre la ruta provincial n°21 al norte de Loncopué, departamento Ñorquín, Neuquén el 21 de febrero de 2014 (Veiga & Pérez [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 158: 1-5).
9-10. Varios ejemplares fotografiados por Sergio y Eduardo Cusano en la seccional Paimún del PN Lanín, Neuquén el 26 de julio y el 8 de agosto de 2014 (Cusano & Cusano [2015] *EcoRegistros Revista* 5: 49-53).
11. Un ejemplar fotografiado por Nahuel Aguirre en Puerto Patriada, departamento Cushamen, Chubut el 20 de noviembre de 2014 (ebird.org/checklist/S494749600).
12. Un ejemplar fotografiado por Santiago Torres en la RP Lagunas de Epu Lauquen, Neuquén el 27 de noviembre de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=70537).
13-15. Varios ejemplares fotografiados por Sergio y Eduardo Cusano en la seccional Paimún del PN Lanín, Neuquén el 22 de julio, 29 de julio y 4 de agosto de 2015 (Cusano & Cusano [2015] *op. cit.*).
16. Un ejemplar fotografiado por Julián Quillén Vidóz en Cerro Pirque, departamento Cushamen, Chubut el 19 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26016971). Por el momento la imagen no se encuentra disponible.
17. Dos individuos observados por Neli Jorquera en La Matancilla, departamento Minas, Neuquén el 21 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S25974562).
18. Tres individuos observados (uno fotografiado) por Julián Quillén Vidóz al sur de Esquel, departamento Futaleufú, Chubut el 24 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26017747).
19. Un individuo observado por Julián Quillén Vidóz en Trevelin, departamento Futaleufú, Chubut el 28 de agosto de 2016 (ebird.org/checklist/S32897176).
20. Un ejemplar fotografiado por Miguel Bean en Trevelin, departamento Futaleufú, Chubut el 24 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S34213543).
Comentarios: Matarasso & Seró López ([2008] *op. cit.*) comentan que la especie es registrada diariamente en Las Ovejas, Neuquén y reportan además el hallazgo de dos nidos en esa localidad. Omitimos las reiteradas observaciones provenientes de Las Ovejas y Andacollo, Neuquén.

CACHILO YUNGUEÑO | *Rhynchospiza dabbenei* | N (CT)

Distribución: Prácticamente endémica de Argentina en las serranías orientales de Salta, Jujuy y Tucumán (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Descripta por Charles Hellmayr ([1912] *Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern* 11: 187-190) con material colectado en Tapia, departamento Trancas, Tucumán. Considerado tradicionalmente una subespecie del CACHILO CORONA CASTAÑA *Rhynchospiza strigiceps*. Areta *et al*. ([2019] *Journal of Ornithology* 160: 973-991) realizan un análisis de las poblaciones y determinan que la subespecie *dabbenei* merece ser elevada a rango específico debido a diferencias vocales y morfológicas. Dicha propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop842.htm).
Comentarios: Las primeras menciones provienen de las provincias de Salta (Salvadori [1895] *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 10 [208]: 1-24) y Tucumán (Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221). Para una revisión de los antiguos registros ver Navas ([1965] *Hornero* 10: 215-224).

CERQUERO MUSGOSO | *Arremon dorbignii* | N (CT)

Distribución: Andes desde Bolivia hasta el NO de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Descripta por Philip Sclater ([1856] *Proceedings of the Zoological Society of London* 24: 269-272) con material proveniente Bolivia, y considerada tradicionalmente una subespecie del CERQUERO DE COLLAR *Arremon flavirostris*. Cardoso da Silva ([1991] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 111: 152-155) sugiere el estatus específico para la subespecie *dorbignii*. Más recientemente, Buainain *et al.* ([2016] *Zootaxa* 4178: 547-567) y Trujillo-Arias *et al.* ([2017] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 112: 107-121) confirman esta hipótesis mediante análisis moleculares, morfología y vocalizaciones. Estos estudios y sus conclusiones fueron aceptados por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop874.htm).
Comentarios: Habitual en las yungas argentinas y áreas de transición con el Chaco Seco, con antiguas menciones para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca (White [1882] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882: 591-629; Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221; Bruch [1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259; Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267).

ARAÑERO AMERICANO (Arañero Yanqui) | *Setophaga ruticilla* | N V

Distribución: Se reproduce en gran parte de Canadá, N y E de Estados Unidos. Luego de la etapa reproductiva se desplaza ocupando el S de México, Centroamérica y el N de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).
Registros: 1. Un individuo observado por Paula Bertolini y otros observadores en la RM Ribera Norte, partido de San Isidro, Buenos Aires el 17 y 20 de julio de 1995 (Bertolini *et al.* [1995] Informe Inédito; Gasparri *et al.* [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 234: 1-43).
2. Un macho fotografiado por Mike McRae y Nikki Summers en Cape Dolphin, islas Malvinas el 3 y 4 de diciembre de 2014. El ave fue vista por última vez en la zona el 17 de febrero de 2015 (Morrison [2015] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2014*. Falklands Conservation; Morrison [2016] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 24: 10-11; ebird.org/checklist/S44080988).
3. Un macho fotografiado por Bobby & Janet McLeod en Puerto Stanley, islas Malvinas el 26 de diciembre de 2014. Fue visto en esa localidad hasta junio de 2015, y finalmente hallado muerto por Colin Smith el 23 de agosto del mismo año (Morrison [2015] *op. cit.*; Morrison [2016] *op. cit.*).
4. Un macho adulto fotografiado por Alan Henry en Douglas, islas Malvinas el 26 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61767730).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

FUEGUERO BOREAL | *Piranga olivacea* | N V

Distribución: Nidifica en una amplia zona del NE de Estados Unidos y parte de Canadá. Durante la época no reproductiva ocupa el NO de Sudamérica llegando al centro de Bolivia (Mowbray [2020] *en* Poole & Gill [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Ricardo Fernández en la laguna Las Encadenadas, partido de Saavedra, Buenos Aires el 19 de marzo de 2017 (Fernández [2017] *EcoRegistros Revista* 7: 51-54).

Figura 40. Fueguero Boreal *Piranga olivacea*, Quequén, Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 (Matías Torreguitar)

2. Un ejemplar fotografiado por Matías Torreguitar en Quequén, partido de Necochea, Buenos Aires entre el 8 y el 17 de mayo de 2020 (Torreguitar [2020] *Nuestras Aves* 65: 91; Figura 40).

SAÍ GRANDE (Saí Gigante) | *Conirostrum binghami* | N R

Distribución: Local en los altos Andes desde el S de Colombia hasta el extremo N de Chile y O de Bolivia, mayormente entre los 3500-4200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Juan Mazar Barnett, Germán Pugnali y Marco della Seta unos 10 km al oeste de Rodeo Pampa, departamento Santa Victoria, Salta el 26 de septiembre de 1997 (Mazar Barnett *et al.* [1998] *Hornero* 15: 44-46).

Figura 41. Saí Grande *Conirostrum binghami*, municipio de Abra Pampa, Jujuy, julio de 2017 (Uriel Colina)

2. Un individuo observado por Alejandra Grigoli en el queñoal de Santa Catalina, departamento homónimo, Jujuy sin fecha (Moschione [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

3. Un individuo observado por Flavio Moschione en Lesser, departamento La Caldera, Salta sin fecha (Flavio Moschione *in litt.*).

4. Un adulto fotografiado por Uriel Colina en el "municipio de Abra Pampa, departamento Cochinoca", Jujuy en julio de 2017 (U. Colina *in litt.*; Figura 41). La fotografía fue presentada sin ninguna referencia (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones), siendo indispensable que se publiquen más detalles acerca de este registro.
Taxonomía: Conocida anteriormente como *Oreomanes fraseri* (Ridgely & Tudor [2009] *op. cit.*).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La mención para "río Senguer, Salta" (López-Lanús [2017] *op. cit.*) es un error (Flavio Moschione *in litt.*).

▪ JILGUERO DEL MONTE | *Sicalis mendozae* | N (CT)

Distribución: Endémica del desierto del Monte en el O de Argentina, desde Tucumán hasta el S de Mendoza (Areta *et al.* [2012] *Condor* 114: 654-671).
Taxonomía: Descripta por Richard Sharpe en base a dos ejemplares colectados por Hermann Burmeister en la provincia de Mendoza (Burmeister [1860] *Journal für Ornithologie* 46: 241-268; Sharpe [1888] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 12. London). Considerada posteriormente una subespecie del JILGUERO OLIVÁCEO *Sicalis olivascens*. Areta *et al.* ([2012] *op. cit.*) revisan la historia taxonómica y presentan datos que apoyan el reconocimiento de *mendozae* como especie válida. Dicha propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop539.htm).

▪ FUEGUERO OSCURO | *Ramphocelus carbo* | N R

Distribución: Ampliamente distribuida en Sudamérica por debajo de los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Registrada por Mark Scheuerman en el PN Iguazú, Misiones el 12 de agosto de 1997 (ebird.org/checklist/S5824489).
2. Un individuo observado por Germán Pugnali en el PN Iguazú, Misiones el 19 de junio de 2005 (ebird.org/checklist/S26781813).
3. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iguazú, Misiones el 14 de junio de 2006 (Moller Jensen [2006] *Nuestras Aves* 52: 33-34).
4. Un ejemplar fotografiado por Ignacio Roesler en el PN Iguazú, Misiones sin fecha (I. Roesler *in litt.*)
5. Registrada por Dave Winter en el PN Iguazú, Misiones el 22 de diciembre de 2006 (ebird.org/checklist/S48257403).
6. Un ejemplar fotografiado por Ryan Terrill en el PN Iguazú, Misiones el 29 y 30 de julio de 2007 (ebird.org/checklist/S38099378).
7. Un individuo observado por Esteban Daniels en el PN Iguazú, Misiones el 4 de septiembre de 2008 (ebird.org/checklist/S21517445).
8. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en el PN Iguazú, Misiones el 20 de octubre de 2009 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=11391).
9. Un individuo observado por Vicki Sandage en el PN Iguazú, Misiones el 12 de diciembre de 2009 (ebird.org/checklist/S7666097).
10. Registrada por Paul Brookes en el PN Iguazú, Misiones el 3 de diciembre de 2010 (ebird.org/checklist/S16706067).

11. Un ejemplar fotografiado por Federico Villegas en la posada La Misión, departamento Guaraní, Misiones el 21 de enero de 2014 (Villegas [2014] *EcoRegistros Revista* 4: 11-13).
12. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en el PP de la Araucaria, Misiones el 9 de diciembre de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=855655).
13. Un individuo observado por Martín López Aguirre en el PN Iguazú, Misiones el 18 de marzo de 2022 (ebird.org/checklist/S105506657).
Comentarios: Es altamente probable que algunos registros del PN Iguazú, Misiones correspondan al mismo individuo. Un ejemplar fotografiado en varias ocasiones por Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones parece ser un híbrido entre esta especie y un FRUTERO CORONADO *Tachyphonus coronatus* (A. Heredia *in litt.*).

MIELERO PATAS ROJAS | *Cyanerpes cyaneus* | N V

Distribución: Mayormente en el NO de Sudamérica y la región amazónica, con una población disyunta en las selvas costeras de Brasil hasta Santa Catarina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un inmaduro fotografiado por Sandra Antueno en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 28 de julio de 2018 (S. Antueno *in litt.*; Figura 42).
2. Un adulto fotografiado por Sandra Antueno en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 20 y 22 de agosto de 2018 (S. Antueno *in litt.*; Figura 43).
Comentarios: Un ejemplar fotografiado por Chris Farias en Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil el 29 de abril de 2020 (ebird.org/checklist/S68074796).

Figura 42. Mielero Patas Rojas *Cyanerpes cyaneus*, Eldorado, Misiones, 28 de julio de 2018 (Sandra Antueno)

Figura 43. Mielero Patas Rojas *Cyanerpes cyaneus*, Eldorado, Misiones, 20 de agosto de 2018 (Sandra Antueno)

CAPUCHINO IBERÁ | *Sporophila iberaensis* | N

Distribución: Localmente común en el N de Corrientes, centro y S de Paraguay y unos pocos sitios del centro de Brasil (Galluppi-Selich *et al.* [2018] *Revista Brasileira de Ornitologia* 26: 234-239).

Registros: 1. Dos individuos observados por Adrián Di Giacomo 14 km al sur de Galarza (28°12'55''S 56°43'32''W), departamento Santo Tomé, Corrientes el 18 de octubre de 2001 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *Nuestras Aves* 61: 3-5).
2. Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian ([2016] *op. cit.*) mencionan un total de 45 registros de su autoría y otros 57 registros de otros observadores, casi todos en las cuencas del río Aguapey y los Esteros del Iberá, Corrientes. El detalle de estos registros no fue publicado en dicho trabajo, y la fotografía que acompaña el artículo no posee fecha ni localidad.
3. Varios ejemplares grabados por Juan I. Areta en la estancia Rincón del Socorro, departamento Mercedes, Corrientes durante noviembre de 2005 (Areta *et al.* [2016] *PLoS ONE* 11: 10.1371/journal.pone.0154231). Dichos autores sospechan que este taxón podría representar un morfo de alguna especie ya descripta (Areta *et al.* [2016] *op. cit.*).
4. Un ejemplar fotografiado por Jorge Spinuzza en el arroyo Ayuí, Corrientes en diciembre de 2006 (J. Spinuzza *en* Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).
5. Un ejemplar filmado y fotografiado por Germán Pugnali cerca de Colonia Carlos Pellegrini, departamento San Martín, Corrientes el 1 de octubre de 2008 (ebird.org/checklist/S41076887).
6. Un ejemplar fotografiado por Alec Earnshaw en el estero Cambá Trapo, departamento San Martín, Corrientes el 4 de enero de 2009 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=146891).
7-8. Numerosos ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 27 y 28 de diciembre de 2010 (López-Lanús [2013] *Sonidos de las Aves de Pastizal*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas; xeno-canto.org).
9. Numerosos ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 11 de febrero de 2011 (xeno-canto.org).
10. Un macho adulto colectado por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 19 de febrero de 2011 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*). El espécimen (holotipo) se encuentra depositado en el MACN.
11. Numerosos ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 20 de febrero de 2011 (xeno-canto.org).
12. Un individuo escuchado en la estancia La Sirena, departamento San Martín, Corrientes el 26 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *en* Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).
13-14. Tres machos y al menos una hembra grabados y fotografiados por Bernabé López-Lanús, Adrián Galimberti y Alexander Keyel en la entrada de la estancia La Clarita, departamento San Martín, Corrientes el 29 y 30 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *op. cit.*; xeno-canto.org).
15. Dos machos observados por Bernabé López-Lanús, Adrián Galimberti y Alexander Keyel unos 2,5 km al oeste de la entrada de la estancia La Clarita, departamento San Martín, Corrientes el 30 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *op. cit.*).
16. Un macho adulto colectado por Bernabé López-Lanús cerca de la estancia Don Luis, departamento Ituzaingó, Corrientes el 13 de diciembre de 2011 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*). El espécimen (paratipo) se encuentra depositado en el MACN, y su vocalización muy probablemente corresponda al corte publicado en internet (xeno-canto.org/307510).
17. Un macho adulto grabado y colectado por Adrián Di Giacomo, Bernabé López-Lanús y Cecilia Kopuchian en la estancia El Tránsito, departamento Concepción, Corrientes el 15 de diciembre de 2011 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*; xeno-canto.org/307513). El espécimen (paratipo) se encuentra depositado en el MACN.
Taxonomía: Recientemente descripta en base a diferencias de plumaje y vocalizaciones (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*). La descripción previa y el nombre *Sporophila digiacomoi* no fueron reconocidos (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop715.htm). El nombre *Sporophila digiacomoi* (=

Sporophila digiacomoorum) debe considerarse sinónimo de *S. iberaensis*, ya que su descripción no se ajusta al CINZ y ambos están basados en la misma serie tipo. Para una discusión sobre especiación y aislamiento reproductivo en *S. iberaensis* ver Turbek *et al.* ([2021] *Science* 371: eabc0256).
Especímenes (3): **MACN-Or-**72854 (holotipo), **MACN-Or-**72855, **MACN-Or-**72856 (paratipos)

CAPUCHINO VIENTRE NEGRO | *Sporophila melanogaster* | N V

Distribución: Endémica de las sabanas del SE de Brasil, nidificando regularmente en Santa Catarina y Rio Grande do Sul (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un macho fotografiado por Julián Baigorria y otros observadores en la reserva Urutaú, departamento Candelaria, Misiones el 21 y 23 de noviembre de 2017 (Baigorria *et al.* [2020] *Hornero* 35: 141-145; Figura 44).

Figura 44. Capuchino Vientre Negro *Sporophila melanogaster*, reserva Urutaú, Misiones, 21 de noviembre de 2017 (Julián Baigorria)

CHOGÜÍ OLIVÁCEO (Celestino Oliváceo) | *Thraupis palmarum* | N

Distribución: Desde Centroamérica hasta la región SE de Brasil, mayormente por debajo de los 1300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por John Mc Donald en el PN Iguazú, Misiones el 20 de julio de 1989 (Finch [1991] *Nuestras Aves* 24: 24-25).
2. Dos individuos observados por Flavio Moschione en la RN Formosa, Formosa el 13 de enero de 1995 (F. Moschione *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
3. Un individuo observado por Esteban Abadie en el PN Iguazú, Misiones el 15 de septiembre de 1995 (E. Abadie *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit*.).
4. Un individuo observado por Dante Insúa en Puerto Península, departamento Iguazú, Misiones el 26 de enero de 1996 (D. Insúa *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit*.).
5. Observada por Juan C. Chebez en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en el año 1996 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).
6. Un individuo observado por Enrique Bertolotto en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en julio de 2004 (Monteleone *et al.* [2010] *Nuestras Aves* 55: 25-28).
7. Un individuo observado por Pablo Grilli en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 9 de abril de 2005 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
8. Un individuo observado por Juan I. Areta en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de noviembre de 2006 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
9. Observada por Ignacio Roesler en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 17 de septiembre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
10. Un ejemplar fotografiado por Ignacio Roesler y Diego Monteleone en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 28 de septiembre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
11. Dos individuos observados por Ignacio Roesler en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de octubre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
12. Cuatro individuos observados por Daniel Almirón en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 27 de octubre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
13. Un individuo observado por James Lowen en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 7 de noviembre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
14. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 8 de mayo de 2009 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
15. Un individuo observado por Juan I. Areta en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 26 de noviembre de 2009 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit*.).
16. Un ejemplar fotografiado por Dolores Fernández en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 20 de mayo de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=274116).
17. Un ejemplar fotografiado por Hugo Hulsberg en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 28 de noviembre de 2011 (ebird.org/checklist/S47197190).
18. Registrada por Marcos Lartigau en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 27 de septiembre de 2014 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=182140).
19. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de junio de 2015 (ebird.org/checklist/S24007512).
20. Dos individuos observados por Julián Quillén Vidoz en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de diciembre de 2016 (ebird.org/checklist/S32938767).
21. Un individuo observado por Eric Gulson y Teresa Pegan en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 26 de enero de 2017 (ebird.org/checklist/S33997649).
22. Un individuo observado por Ignacio Roesler en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38550798).
23. Un individuo observado por Pablo Grilli en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S47618782).
24-25. Fotografiada por Sebastián Cabanne en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 15 y

17 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38660534; ebird.org/checklist/S38785023).
26. Dos individuos observados por Ulises Ornstein y Paula Polleri en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 13 de septiembre de 2017 (ebird.org/checklist/S39165813).
27. Un ejemplar fotografiado por Dolores Fernández en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 17 de junio de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=272831).
28. Un ejemplar fotografiado por Guillermo Marcaida en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 1 de julio de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=275357).
29. Un ejemplar fotografiado por Deanna Mac Phail en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 7 de noviembre de 2018 (ebird.org/checklist/S51401104).
30. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Andrés Terán en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 1 de julio de 2019 (ebird.org/checklist/S57924002).
31. Dos individuos observados por Jorge La Grotteria en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 31 de julio de 2019 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=954951).
32. Un ejemplar fotografiado por Gabriel Moresco en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de agosto de 2019 (ebird.org/checklist/S58845554).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Había sido mencionada para la RN Formosa, Formosa (Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA) y posteriormente ratificado como un error (Hernán Povedano *en* Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*). Incluida sin detalles en la lista de aves de la provincia de Salta (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta.* Ministerio de Cultura y Turismo). Arnaldo de Winkelried Bertoni la registra por primera vez para Paraguay en la localidad fronteriza de Puerto Bertoni, Alto Paraná en agosto de 1917 (Bertoni [1919] *Hornero* 1: 255-259).

ESPECIES RARAS Y VAGANTES

En Argentina existen 123 especies que a nuestro criterio son *raras* o *vagantes*. Estas poseen menos de 10 (diez) registros documentados en total o en los últimos 50 años (*i.e.* a partir de 1972). En el caso de las *raras* suponemos que son residentes en el territorio nacional, o que al menos llegaban con cierta regularidad en el pasado. Por el contrario, la presencia de las especies *vagantes* es meramente accidental o errática. Las especies raras recientemente incorporadas a la lista nacional, se detallan en la sección Nuevas. A pesar de que algunas queden apenas afuera de esta categoría y dejen de ser raras en el futuro, preferimos incorporarlas a nuestra revisión por resultar de interés conservacionista. Se incluyen aquellas consideradas extintas o probablemente extintas a nivel nacional o global.

INAMBÚ ENANO | *Taoniscus nanus* | R

Distribución: Especie típica del *cerrado* en el SE de Brasil y NE de Argentina (Cabot [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Una hembra colectada por Noel Holden en la "*Costa del Río Bermejo, Chaco Austral, Rep. Argentina*" en el año 1900 (Collar & Andrew [1988] *Birds to Watch. The ICBP World Checklist of Threatened Birds*. ICBP Technical Publication N°8). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 45).
2. Una hembra colectada por Noel Holden en "*Chaco Austral, Río Bermejo, R. Argentina*" en el año 1901 (Collar & Andrew [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.

Figura 45. Inambú Enano *Taoniscus nanus,* NHMUK-1900.12.22.1, costa del río Bermejo, Chaco Austral, año 1900 (The Natural History Museum)

Comentarios: Félix de Azara conocía muy bien esta especie e incluso tuvo algunos ejemplares cautivos. Este autor lo describe como "muy escaso en dichas Misiones", sin precisar si corresponde a Argentina o Paraguay (Azara [1805] *Apuntamientos para la Historia Natural de los Páxaros del Paragüay y Rio de la Plata* III. Madrid). Luego la especie es incluida para Argentina por José Pereyra ([1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40) y Claës Olrog ([1959] *Las aves argentinas*. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto Miguel Lillo) como habitante de la provincia de Misiones. Juan C. Chebez ([1996] *Fauna Misionera*. LOLA) asume que estos autores malinterpretaron la referencia de Félix de Azara. Actualmente se considera como localidad tipo a Misiones, Paraguay (Silveira & Silveira [1998] *Cotinga* 9: 42-46). Considerada Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (2): **NHMUK**-1900.12.22.1, **NHMUK**-1901.4.21.6

PATO MEDIA LUNA | *Spatula discors* | V

Distribución: Su área de cría comprende desde Alaska hasta el centro de Estados Unidos. Luego realiza una migración cubriendo el S de Estados Unidos, México, el Caribe y N de Sudamérica (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Dos individuos capturados vivos por Héctor Bersezio en Chilecito, departamento homónimo, La Rioja en septiembre de 1958. Uno de ellos fue entregado a César Guerrero, formando parte de su colección personal de aves (Navas [1961] *Neotrópica* 7: 52). La fotografía no se encuentra disponible.

2. Una pareja observada en vuelo (macho colectado) por Dora Ochoa de Masramón en el dique de Renca, departamento Chacabuco, San Luis el 27 de noviembre de 1960 (Bó [1965] *Hornero* 10: 251-268). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.
3. Un macho adulto observado por Robert Storer y Frank Gill en la estancia La Segunda, partido de Chascomús, Buenos Aires el 3 de septiembre de 1961 (Storer & Gill [1961] *Neotrópica* 7: 92).
4. Un macho observado por Jeremy Tallowin en las islas Georgias del Sur en abril de 1972. El ave luego fue colectada en Cumberland Bay, Georgias del Sur el 20 de junio del mismo año (Prince & Payne [1979] *British Antarctic Survey Bulletin* 48: 103-118). El espécimen aparentemente no fue conservado.
5. Mencionada sin detalles para la provincia de Santa Fe (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
6. Registrada en el lago Pellegrini, departamento General Roca, Río Negro (Canevari [1979] *1er. Encuentro Iberoamericano de Ornitología y Mundial sobre Ecología y Comportamiento de las Aves*. Buenos Aires).
7. Un macho observado por Manuel Nores, Darío Yzurieta, Claës Olrog y Sergio Salvador en los bañados de Figueroa, departamento Figueroa, Santiago del Estero a mediados de julio de 1980 (Nores & Yzurieta [1981] *Historia Natural* 2: 33-42).
8. Un macho adulto observado por Mauricio Rumboll en la laguna Los Escarchados, departamento Lago Argentino, Santa Cruz en noviembre de 1985 (Rumboll [1991] *Nuestras Aves* 24: 23).
9. Una pareja observada por Julio Contreras en el sur de la provincia de Entre Ríos en noviembre de 1987 (J. Contreras *en* de la Peña [1997] *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. LOLA).
10. Un macho cazado unos 6 km al noroeste de Etruria, departamento San Martín, Córdoba el 12 de mayo de 1989 (Salvador & Salvador [1990] *Hornero* 13: 178-179). El espécimen no fue conservado (S. Salvador *com. pers.*).
11. Registrada en la Lagunilla, departamento Capital, Salta entre los años 1990 y 1992 (Gonzo & Mosqueira [1993] *VIII Reunión Argentina de Ornitología*. Puerto Iguazú).
12. Un macho volando en compañía de tres hembras en el bañado de Añatuya, departamentos General Taboada y Avellaneda, Santiago del Estero entre el 9 y el 14 de julio de 1992 (Sferco & Baldo [1995] *Hornero* 14: 78-79).
13. Tres ejemplares observados por Christian Savigny y Rogelio Ymbernón en la laguna de los Padres, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 11 de julio de 1992 (Savigny [2002] *Nuestras Aves* 43: 24-25).
14. Mencionada sin detalles para San Miguel del Monte, partido homónimo, Buenos Aires (Jorge Rodríguez Mata *en* Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).
15. Un grupo de once individuos observado por Pablo Michelutti en el tramo final del río Suquía, departamento Río Primero, Córdoba el 25 de febrero de 1994 (P. Michelutti *en* Yzurieta [1995] *Manual de Reconocimiento y Evaluación Ecológica de las Aves de Córdoba*. Gobierno de Córdoba). Luego Ricardo Torres y Pablo Michelutti ([2001] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 1: 1-5) mencionan que se observó "un individuo" en la misma fecha y localidad.
16. Mencionada sin detalles para la laguna Llancanelo, departamento Malargüe, Mendoza (Sosa [1995] *Multequina* 4: 65-75).
17. Un macho observado por Marcelo Dolsan en la reserva Parque Luro, departamento Toay, La Pampa en diciembre de 1996 (Cenizo *et al.* [2019] *XVIII Reunión Argentina de Ornitología*. Tandil).
18. Una pareja observada por Federico Bruno en el parque Don Tomás, departamento Capital, La Pampa el 14 de noviembre de 1999 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros; Darrieu *et al.* [2011] *Opera Lilloana* 55: 64-108).
19. Mencionada sin detalles para la provincia de Catamarca (Carma [2009] *Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca*. CFI).
20. Un individuo observado por Sandra Delgado, Carlos Marchisio y Marta Cortéz en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, departamento Capital, Córdoba el 14 de febrero de 2000 (Nores & Serra [2005] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2004*. Wetlands International).

21. Dos hembras observadas por Mariano Gelain y Roberto Orduna en la laguna Los Juncos, departamento Pilcaniyeu, Río Negro el 20 de enero de 2002 (Gelain & Orduna [2006] *Xolmis* 1: 4).
22. Mencionada sin detalles para el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre los años 2008 y 2011 (Moschione *et al.* [2011] *Aves Argentinas* 30: 14-17).
23. Un macho observado en vuelo por Julián Hernández en la laguna del Burro, partido de Chascomús, Buenos Aires el 2 de febrero de 2011 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=29543).
24. Un macho fotografiado por Robert Lewis en Grytviken, Georgias del Sur el 26 de octubre de 2012 (ebird.org/checklist/S23520785).
25. Un individuo observado en vuelo por Marcelo Gavensky en la RE Costanera Sur, Buenos Aires el 24 de enero de 2014 (Pugnali *et al*. [2016] *Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur*. Aves Argentinas; ecoregistros.org/site/registro.php?id=102280).
26. Un macho adulto fotografiado por Guillermo Rost en Rada Tilly, departamento Escalante, Chubut el 8 y 9 de noviembre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=124820).
27. Un macho fotografiado por Ignacio Roesler en la estancia La Vizcaína, departamento Lago Buenos Aires, Santa Cruz el 12 de diciembre de 2015 (Martín *et al.* [2019] *XVIII Reunión Argentina de Ornitología*. Tandil; ebird.org/checklist/S26398783).
28. Registrada por José Segovia y otros observadores en la finca del Toro, departamento Rosario de Lerma, Salta en febrero de 2018 (ver detalles en ebird.org/checklist/S57085922).
29. Un macho fotografiado por José Navarro en el dique Los Quiroga, departamento Banda, Santiago del Estero el 29 de julio de 2018 (ebird.org/checklist/S47532805). El ejemplar permaneció algunas semanas en el lugar y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org).
30. Un macho observado por José Segovia, Flavio Moschione, Ana Sureda y Azucena Rodríguez en la finca del Toro, departamento Rosario de Lerma, Salta el 10 de febrero de 2019 (ebird.org/checklist/S57085922).
31. Seis individuos observados por Héctor Inchaurraga en la ruta provincial n°24, departamento Sarmiento, Chubut el 17 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S64708265). Este registro fue desestimado por Roesler *et al.* (*en prep*.).
32. Un macho fotografiado por Alan Henry en Gull Island Pond, islas Malvinas el 28 de mayo de 2020 (ebird.org/checklist/S69761510). El ejemplar permaneció al menos hasta el 25 de julio del mismo año (ebird.org).
33. Una pareja fotografiada por Yanina Romero en el dique Los Molinos, departamento Capital, Jujuy el 20 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S82780610).
34. Un ejemplar fotografiado por Hugo Valderrey en la laguna Delfín Pérez, departamento Maracó, La Pampa el 17 de febrero de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=446255).
Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Anas* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).
Comentarios: María Lucero ([1983] *Miscelánea* 75: 1-61) menciona dos ejemplares anillados en Tucumán que seguramente pertenecían a esta especie, pero esto nunca fue confirmado. Una posible hembra adulta hallada muerta por Luis Pagano en el partido de General Villegas, Buenos Aires en el año 2008 (L. Pagano *obs. pers*.; MLP-Or-14979).
Especímenes (1): **MLP-Or-**1271

PATO SERRUCHO | *Mergus octosetaceus* | R

Distribución: Localizada en el SE de Brasil, E de Paraguay (Alto Paraná) y NE de Argentina (Misiones) (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: **1**. Un macho colectado por Ramón Lista en el arroyo Garuhapé, Misiones en septiembre de 1882 (Lista [1883] *El territorio de las Misiones*. Imprenta de la Universidad. Buenos Aires; Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
2. Un macho colectado por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 30 de abril de 1912 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Según William Partridge ([1956] *Auk* 73: 473-488) el mismo fue posiblemente obtenido en el arroyo Yabebiry, Misiones. El espécimen se encuentra depositado en la colección Shipton de la FML.
3. Mencionada sin detalles para Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
4. Una hembra colectada por Francisco Manuel Rodríguez en los saltos del río Iguazú, Misiones sin fecha (Phillips [1926] *A Natural History of the Ducks*. Houghton Mifflin). El ejemplar perteneció a la colección de Antonio Núñez y fue entregado al museo de Buenos Aires en el año 1914 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Un ejemplar colectado por Eduardo Del Ponte y Alberto Aiello en el arroyo Yacuy, Misiones cuya etiqueta dice "*septiembre de 1947*". Andrés Giai ([1951] *Hornero* 9: 247-276) menciona como fecha de captura octubre de 1947, mientras que William Partridge ([1956] *op. cit.*) el 2 de octubre de 1947. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
6. Un macho colectado por Andrés Giai en el arroyo Aguaray Guazú, Misiones el 29 de mayo de 1948 (Giai [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
7. Un macho colectado por Andrés Giai en el arroyo Urugua-í, Misiones el 20 de julio de 1948 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.
8-10. Un macho y dos hembras colectados por Andrés Giai en el arroyo Urugua-í, Misiones el 22 de julio de 1948 (Giai [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
11. Un macho colectado por Andrés Giai en el arroyo Urugua-í, Misiones el 28 de julio de 1948 (Giai [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el YPM.
12. Un macho colectado por Andrés Giai en el arroyo Urugua-í, Misiones el 4 de agosto de 1948 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH.
13. Un macho colectado por Andrés Giai en el arroyo Urugua-í, Misiones el 20 de agosto de 1948 (Giai [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.
14. Una hembra colectada por Andrés Giai y William Partridge en el arroyo Urugua-í, Misiones el 12 de septiembre de 1949 (Giai [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
15-16. Una pareja colectada por Andrés Giai y William Partridge en el arroyo Urugua-í, Misiones el 24 de marzo de 1950 (Giai [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
17-18. Dos ejemplares colectados por José Gorgues en el arroyo Yacuy, departamento Iguazú, Misiones entre fines de 1948 y principios de 1950. Este observador la registró con cierta frecuencia en la zona entre los años 1942 y 1978 (Johnson & Chebez [1985] *Historia Natural. Suplemento* 1: 1-16). Los especímenes se encuentran exhibidos en el Centro de Interpretación del PN Iguazú, Misiones (Guillermo Gil *in litt.*)
19-20. Dos ejemplares (un macho y una hembra) colectados por Alberto Anziano en el arroyo Yacuy, departamento Iguazú, Misiones entre los años 1945 y 1957 (Gelain [2008] *Xolmis* 3: 7-16) Los especímenes se encuentran depositados en el MP.
21. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 18 del arroyo Piray Guazú, Misiones el 3 de mayo de 1951 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

22. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 8 de agosto de 1951. Este ejemplar (MACN-Or-33245) fue mencionado por Partridge ([1954] *op. cit.*) como capturado el 8 de julio de 1951 y luego con fecha del 16 de agosto de 1951 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
23. Una hembra colectada por William Partridge en el arroyo Urugua-í, Misiones el 11 de agosto de 1951. Este ejemplar (NHMUK-1966.24.1) fue mencionado por Partridge ([1954] *op. cit.*) como capturado el 11 de julio de 1951 y luego con fecha del 16 de agosto de 1951 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.
24. Un macho colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 15, Misiones el 23 de septiembre de 1951 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
25. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 14 de marzo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MNRJ.
26. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 20 del arroyo Urugua-í, Misiones el 17 de mayo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
27. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 15 del arroyo Urugua-í, Misiones el 18 de mayo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.
28. Un ejemplar colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 18 de agosto de 1952. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
29-30. Una pareja colectada por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 43, Misiones el 25 de agosto de 1952 (Partridge [1956] *op. cit.*). El macho se encuentra depositado en el UMMZ y la hembra en el MACN.
31. Varios ejemplares observados por Joaquín Carreras y William Partridge en el arroyo El Soberbio, Misiones en noviembre de 1953 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*). Este registro fue posteriormente desestimado por Chebez ([2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
32-33. Dos pichones colectados por Willlliam Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 31 de agosto de 1954 (Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
34-35. Una hembra y un pichón colectados por Willlliam Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 1 de septiembre de 1954 (Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
36. Una hembra colectada por William Partridge en el km 20 del arroyo Urugua-í, Misiones el 12 de diciembre de 1954 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
37. Un ejemplar proveniente de "*Misiones*" sin fecha ni datos de colector. El espécimen se encuentra depositado en el YPM.
38. Un individuo observado por Jean Delacour en el PN Iguazú, Misiones el 29 de abril de 1956 (Delacour [1959] *The Waterfowl of the World*. Volume 3. Country Life).
39. Un macho colectado por Ricardo Moller Jensen en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 28 de julio de 1960. El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
40. Registrada por Havestron en el arroyo Las Antas cerca de la ruta provincial nº16 a la altura de Cerro 60, departamento Montecarlo, Misiones en el año 1960 (Daniel Gómez *en* Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
41. Registrada por Rosa en el cruce del arroyo Tigre y la ruta provincial nº16, departamento Montecarlo, Misiones en el año 1960 (Giraudo & Abramson [1998] *Boletín Técnico de la Fundación Vida Silvestre Argentina* 42: 1-48).
42. Un individuo observado por Joaquín Carreras en el arroyo Victoria, Misiones en noviembre de 1969 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).

43. Un ejemplar colectado en el arroyo Falso Urugua-í de Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones en el año 1970. El espécimen permaneció en la colección personal de Mariano Chudy (Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*), pero al parecer se encuentra perdido en la actualidad.
44. Registrada por Claës Olrog en el arroyo Tigre cerca de la ruta provincial nº14, departamento San Pedro, Misiones en el año 1977 (Mauricio Rumboll y C. Olrog *en* Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
45. Una pareja observada por Guillermo Harris en el PN Iguazú, Misiones en febrero de 1977 (G. Harris *en* Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
46. Un ejemplar colectado en el arroyo Piray Miní, departamento Eldorado, Misiones en la década de 1970 (Juan C. Chebez *en* Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*). El espécimen al parecer se encuentra perdido.
47. Tres individuos observados por Andrés Johnson en el arroyo Urugua-í, 17 km aguas abajo del puente de la ruta provincial n°19, Misiones el 11 de junio de 1984 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
48. Una pareja observada por Andrés Johnson en el arroyo Palacio, 37 km aguas abajo del puente de la ruta provincial n°19, Misiones el 13 de junio de 1984 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
49. Una pareja observada en el arroyo Paranay Guazú, Misiones en el año 1984 (Manuel Nores *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).
50. Un individuo observado por Daniel Forcelli, Lucio Contigiani y Tomás Waller en el arroyo Urugua-í, 15 km aguas abajo del puente de la ruta provincial n°19, Misiones el 27 de julio de 1985 (Forcelli *et al.* [1985] *op. cit.*)
51. Registrada en el arroyo Uruzú, Misiones entre agosto y septiembre de 1986 (Pablo Canevari *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).
52. Registrada por Andrés Johnson, Juan C. Chebez, Francisco Erize y Charles Luthin en el arroyo Urugua-í, Misiones en julio de 1988 (Luthin [1988] *Boletín Panamericano* 3: 1; Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).
53. Registrada por Andrés Johnson, Alejandro Giraudo y Juan C. Chebez en el arroyo Uruzú cerca de la ruta provincial nº19, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en enero de 1989 (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*).
54. Un individuo observado en el arroyo Piray Miní, departamento Eldorado, Misiones el 9 de agosto de 1993 (Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser* Mergus octosetaceus *in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust; Benstead *et al.* [1994] *Cotinga* 2: 35-36).
55. Mencionada por pobladores locales en la confluencia de los arroyos Guairapo y Piray Miní, Misiones durante el año 1993 (Bosso & Gil [2000] *Sobre la situación del Pato Serrucho* Mergus octosetaceus *en la Argentina*. Apunte preparado para el Taller sobre Pato Serrucho. São Roque Minas. Brasil).
56. Un individuo observado por cazadores locales en el arroyo Piray Guazú, Misiones en septiembre de 1995 (Bosso & Gil [2000] *op. cit.*).
57. Un individuo observado por Jorge Baldo en el arroyo Uruzú del PP Urugua-í, Misiones en el año 2002 (Rey [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
58. Tres individuos observados por Federico Miró en el arroyo Pepirí Guazú, departamento San Pedro, Misiones el 5 de julio de 2005 (Miró [2010] *Nuestras Aves* 55: 5-6).
59. Un individuo observado por Leonardo Muñoz en el arroyo Los Patos a unos 4 km de su confluencia con el arroyo Yacuy, Misiones el 16 de marzo de 2006 (L. Muñoz *en* Chebez [2008] *op. cit.*; sib.gob.ar).
60. Un individuo observado por Onésimo Olivera en el arroyo Urugua-í, Misiones en el primer semestre del año 2007 (Guillermo Gil *en* Chebez [2008] *op. cit.*).

61. Un individuo observado por Justo Herrera en el río Iguazú superior cerca del salto Dos Hermanas, PN Iguazú, Misiones el 1 de junio de 2013. Pocos días después fue nuevamente registrado por Irineo da Costa y Griselda Escobar en la misma zona (Palacio *et al.* [2016] *Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs) del Parque Nacional Iguazú. Año 2010-2015*. APN; MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Comentarios: Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-216) describe la especie haciendo referencia al Alto Paraná (latitud 27º), Paraguay en el año 1891. Notas extras de William Partridge fueron publicadas posteriormente (Partridge [1990] *Nuestras Aves* 22: 20-24). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (36): **MACN-Or-**s/n, **MACN-Or-**8521, **MACN-Or-**31328, **MACN-Or-**31330, **MACN-Or-**31331, **MACN-Or-**31332, **MACN-Or-**31760, **MACN-Or-**32367, **MACN-Or-**32368, **MACN-Or-**33204, **MACN-Or-**33245, **MACN-Or-**33868, **MACN-Or-**33902, **MACN-Or-**36576, **MACN-Or-**36577, **MACN-Or-**36578, **MACN-Or-**36579, **MACN-Or-**36580, **MACN-Or-**47581, **COFML-SHIPTON-**42, **MLP-Or-**9514, **MP-**100, **MP-**101, **CIPNI-**s/n, **CIPNI-**s/n, **AMNH-**748468, **AMNH-**748583, **FMNH-**419655, **LACM-**46537, **MNRJ-**32963, **NHMUK-**1966.24.1, **NHMUK-**1966.24.2, **NMNH-**413529, **UMMZ-**134871, **YPM-**35082, **YPM-**116261

PALOMA TROCAL | *Patagioenas speciosa* | R

Distribución: Desde México hasta el N de Bolivia, SE de Brasil, E de Paraguay y N de Argentina (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).

Registros: **1**. Una pareja observada (hembra colectada) por Andrés Giai unos 35 km al norte de Tostado, departamento 9 de Julio, Santa Fe el 12 de noviembre de 1938 (Zotta [1939] *Hornero* 7: 243-255; Giai [1950] *Hornero* 9: 121-164). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

2. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 26 de octubre de 1959 (Navas & Bó [1986] *Neotrópica* 32: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Un macho colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones en febrero de 1960 (Navas y Bó [1986] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

4. Un ejemplar colectado por Luis Maruñak en Cerro Moreno, departamento Cainguás, Misiones en septiembre de 1981 (Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30). El espécimen permaneció depositado en el CHMO, pero actualmente se desconoce su paradero (Graciela Ayala *in litt.*).

5. Registrada en forma ocasional por O. Putzolo en el oeste de la provincia de Chaco, sin fecha (Contreras *et al.* [1990] *Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación Vida Silvestre Argentina).

6. Dos individuos observados por Flavio Moschione entre Las Lomitas y el río Teuco, departamento Patiño, Formosa el 4 de diciembre de 1990 (F. Moschione *en* Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).

7. Una pareja observada en la estancia La Mansión, departamento Empedrado, Corrientes el 11 de noviembre de 1993 (Baldo *et al.* [1995] *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 26: 55-59).

8. Observada por Freddy Burgos, Gabriel Capuzzi y Maximiliano Navarro en el PP de la Araucaria, Misiones entre el 21 y el 26 de noviembre de 2001 (F. Burgos *en* Bodrati *et al.* [2010] *Nuestras Aves* 55: 9-11).

9. Un individuo observado por Alejandro Bodrati unos 300 mts al sur del PP de la Araucaria, departamento San Pedro, Misiones el 23 de noviembre de 2003 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).

10. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati cerca de la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 10 de febrero de 2004 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
11. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 17 de octubre de 2005 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
12. Un individuo escuchado por Juan I. Areta e Ingrid Holzmann en la reserva privada de Vida Silvestre Urugua-í, departamento General Manuel Belgrano, Misiones 16 de septiembre de 2008 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
13. Un individuo observado y grabado por Kristina Cockle, José Segovia y Emilse Mérida en la reserva privada Aguaray-mí, departamento Iguazú, Misiones el 9 de julio de 2009 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
14. Dos ejemplares fotografiados por Patricio Ramírez Llorens en el PP Puerto Península, Misiones el 23 de diciembre de 2013 (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
15. Un ejemplar fotografiado por Adrián Heredia y Marcelo Gavensky en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 18 de octubre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=120824).
16. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la RB Yaboty, Misiones en septiembre de 2016 (A. Bodrati *com. pers.*).
17. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el paraje Siete Estrellas, departamento San Pedro, Misiones el 8 de enero de 2020 (A. Bodrati *com. pers.*).
18. Dos ejemplares fotografiados por Claudio Sarco y María José Huc en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95166822).
Comentarios: Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1919] *Hornero* 1: 255-259) menciona haber cazado un ejemplar en Puerto Bertoni, Alto Paraná, Paraguay en el año 1915. El comentario de William Partridge con respecto a la provincia de Misiones seguramente se refiera a los ejemplares mencionados arriba (W. Partridge *en* Olrog [1963] *Opera Lilloana* 9: 1-377).
Especímenes (3): **MACN-Or-**4612a, **MACN-Or-**39238, **MACN-Or-**43360

PALOMA MONTERA VIOLÁCEA | *Geotrygon violacea* | R

Distribución: Fragmentada distribución en Centroamérica y Sudamérica, mayormente periamazónica. La población sureña ocupa el E de Brasil hasta el E de Paraguay y NE de Argentina (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).
Registros: 1. Mencionada sin detalles para el Alto Paraná, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
2. Un ejemplar colectado por Francisco Manuel Rodríguez en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones el 16 de noviembre de 1918 (Dabbene [1919] *Hornero* 1: 259-266). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Una pareja observada (hembra colectada) por Andrés Giai en el arroyo Aguaray Guazú, Misiones el 13 de junio de 1948 (Giai [1950] *Hornero* 9: 121-164; Navas & Bó [1988] *Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo* 166: 1-10). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
4. Un macho colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 10 de abril de 1953 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 22 de septiembre de 1953 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
6. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 15 de septiembre de 1957 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

7. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 14 de febrero de 1961 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
8. Una hembra colectada por William Partridge en Barra Concepción, departamento Concepción, Misiones el 18 de junio de 1961 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
9. Una hembra colectada por Claës Olrog, Leoncio Lemo, María Lucero, Estela Alabarce y Francisco Contino en Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones el 9 de noviembre de 1974 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el COFML.
10. Un macho colectado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 22 de junio de 1984. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
11. Un ejemplar colectado por Julio Contreras en Puerto San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 11 de junio de 1991 (Contreras *et. al.* [1994] *Nótulas Faunísticas* 53: 1-13). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
12. Registrada por Ernesto Krauczuk en el departamento San Ignacio, Misiones entre los años 1991 y 2002 (Krauczuk [2008] *Lundiana* 9: 29-39).
13. Registrada por Ernesto Krauczuk en El Mapacho, departamento Eldorado, Misiones entre el 24 y el 28 de marzo de 1993 (Contreras *et. al.* [1994] *op. cit.*).
14. Registrada por Andrés Johnson en la propiedad María Magdalena sobre el arroyo Piray Miní, departamento Eldorado, Misiones en agosto de 1993 (Contreras *et. al.* [1994] *op. cit.*).
15. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 11 de marzo de 1997 (Bodrati *et. al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64; A. Bodrati *in litt.*)
16. Registrada por Germán Pugnali en la reserva privada Yacutinga, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 21 de julio de 2000 (ebird.org/checklist/S26703665).
17. Una hembra hallada muerta en el PN Iguazú, Misiones el 27 de mayo de 2002 (Militello & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 32: 1-5). Al parecer el ejemplar no fue conservado.
18. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en el establecimiento Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 31 de octubre de 2003 (A. Bodrati *in litt.*).
19. Una pareja observada por Alejandro Bodrati en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 5 de febrero de 2004 (A. Bodrati *in litt.*).
20. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en el establecimiento Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 14 de febrero de 2004 (A. Bodrati *in litt.*).
21. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 17 de febrero de 2004 (Bodrati *et. al.* [2010] *op. cit.*; A. Bodrati *in litt.*).
22. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Esmeralda, Misiones el 28 de noviembre de 2004 (A. Bodrati *in litt.*).
23. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 6 de mayo de 2005 (Bodrati *et. al.* [2010] *op. cit.*; A. Bodrati *in litt.*).
24. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 17 de octubre de 2005 (A. Bodrati *in litt.*).
25. Un macho observado por Alejandro Bodrati y Emilse Mérida en el PP Caá Yarí, Misiones el 11 de octubre de 2006 (A. Bodrati *in litt.*).
26. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la reserva privada Yasy-yateré, departamento Guaraní, Misiones el 17 de octubre de 2006 (A. Bodrati *in litt.*).
27. Una posible hembra observada por Alejandro Bodrati y Juan I. Areta en la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 5 de septiembre de 2007 (A. Bodrati *in litt.*).
28. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el sendero Macuco del PN Iguazú, Misiones el 13 de junio de 2008 (A. Bodrati *in litt.*).
29. Un macho grabado por Alejandro Bodrati en la reserva Güirá-pé, departamento General Manuel

Belgrano, Misiones el 3 de agosto de 2008 (A. Bodrati *in litt.*).
30. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la propiedad Avanzini ubicada en la península Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de agosto de 2008 (A. Bodrati *in litt.*).
31. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 12 de noviembre de 2009 (A. Bodrati *in litt.*).
32. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 13 de noviembre de 2009 (A. Bodrati *in litt.*).
33. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 25 de noviembre de 2010 (A. Bodrati *in litt.*).
34. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 23 de noviembre de 2012 (A. Bodrati *in litt.*).
35. Registrada por Rodrigo Martínez Gamba en el parque natural Monte Seguín, departamento General San Martín, Misiones entre los años 2007 y 2012 (Martínez Gamba [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 163: 1-10).
36. Dos individuos observados en cercanías de la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 2 de septiembre de 2013 (DNREA [2013] *Apepú 2013. Campaña de Invierno, Parque Nacional Iguazú*. APN).
37. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el PP Caá Yarí, Misiones el 18 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24341271).
38. Un ejemplar hallado muerto en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 24 de junio de 2016 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=155670). Lamentablemente el espécimen no pudo ser conservado (Julián Baigorria *in litt.*).
39. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la reserva Itahovy, departamento Guaraní, Misiones el 8 de octubre de 2016 (A. Bodrati *in litt.*).
40. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en San José, departamento Apóstoles, Misiones el 20 de noviembre de 2017 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=242720).
41. Un ejemplar fotografiado por Matías Romano en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 8 de junio de 2019 (ebird.org/checklist/S57295961).
Comentarios: Dos ejemplares que habían sido depositados en el MACN (Navas & Bó [1988] *op. cit.*), fueron luego reidentificados como PALOMA MONTERA CASTAÑA *Geotrygon montana*: una hembra colectada por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 13 de julio de 1953 (MACN-Or-34627) y un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 19 de septiembre de 1953 (MACN-Or-34122).
Especímenes (10): MACN-Or-9638, **MACN-Or-**31240, **MACN-Or-**34125, **MACN-Or-**34628, **MACN-Or-**38242, **MACN-Or-**40080, **MACN-Or-**44060, **MACN-Or-**53429, **MACN-Or-**62028, **CO-FML-**13530

PALOMITA MORADA | *Paraclaravis geoffroyi* | R

Distribución: La mayoría de los registros en el SE de Brasil, y unos pocos provenientes del E de Paraguay y N de Argentina en la provincia de Misiones (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).
Registros: 1. Mencionada sin detalles para Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
2. Un macho inmaduro colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 18 de octubre de 1957 (Navas & Bó [1986] *Neotrópica* 32: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 46).

3. Una pareja observada cerca de Wanda, departamento Iguazú, Misiones en diciembre de 1974 (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
4. Un individuo anillado por Arturo Tarak y Miguel Christie en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1977 (A. Tarak y M. Christie *en* Olrog [1979] *op. cit.*).
5. Dos individuos observados por Hernán Povedano en el PN Iguazú, Misiones el 19 de julio de 1990 (H. Povedano *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
6. Un individuo observado por Frank Lambert en el PN Iguazú, Misiones en mayo de 1991 (F. Lambert *en* Wege & Long [1995] *Key Areas for threatened birds in the Neotropics*. BirdLife Conservation Series N°5).
7. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en el camino a la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 29 de noviembre de 2007 (Areta *et al.* [2009] *Biotrópica* 41: 66-73).

Figura 46. Palomita Morada *Paraclaravis geoffroyi,* MACN-Or-38238, arroyo Urugua-í, km 30, Misiones, 18 de octubre de 1957 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

8. Una hembra observada por José Segovia en el camino a la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 30 de noviembre de 2007 (Areta *et al.* [2009] *op. cit.*).
9. Dos individuos observados por Juan I. Areta en la reserva Güirá-pé, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de agosto de 2008 (Lees *et al.* [2021] *Frontiers in Ecology and Evolution*: doi.org/10.3389/fevo.2021.624959).
10. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el establecimiento Don Pepe, departamento San Ignacio, Misiones el 29 de junio de 2017 (ebird.org/checklist/S39465728).
Taxonomía: Anteriormente en el género *Claravis,* donde era conocida como *Claravis godefrida* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).
Comentarios: Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (1): **MACN-Or-**38238

TORCACITA ENANA | *Columbina minuta* | R

Distribución: En parches desde el S de México hasta el centro de Sudamérica. La población austral ocupa una extensa región del centro y E de Brasil, Bolivia y Paraguay (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).
Registros: 1. Mencionada sin detalles para el Alto Paraná, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102; Dabbene [1913] *Physis* 1: 241-261).
2. Un macho colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 5 de diciembre de 1951 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 21 de marzo de 1958 (Navas & Bó [1986] *Neotrópica* 32: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 47).
4. Dos individuos observados por Julio Contreras en la RP Guaycolec, Formosa el 14 de noviembre de 1992 (Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).
5. Un macho fotografiado cerca de Paso Amaro, departamento Ituzaingó, Corrientes el 2 de enero de 1993 (Pearman & Abadie [1995] *Nótulas Faunísticas* 72: 1-5).
6. Un ejemplar grabado por Juan I. Areta en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 10 de octubre de 2005 (J.I. Areta *in litt.*).
7. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Juan I. Areta en la península Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 19 de abril de 2009 (A. Bodrati *en* de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 6: 1-348).
8. Un ejemplar fotografiado por Damián Lozano en Candelaria, departamento homónimo, Misiones el 16 de octubre de 2020 (ebird.org/checklist/S75088834).

Figura 47. Torcacita Enana *Columbina minuta*, MACN-Or-38231, arroyo Urugua-í, km 10, Misiones, 21 de marzo de 1958 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

Comentarios: La mención de *Columbigallina passerina griseola* para Misiones por parte de Bertoni ([1913] *op. cit.*), en realidad se refiere a *Columbina minuta* (Partridge [1954] *op. cit.*). Rogelio Ymbernón la menciona como de presencia habitual en la zona de Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones (Juan I. Areta *in litt.*).
Especímenes (2): **MACN-Or-**33344, **MACN-Or-**38231

ANÓ PICO SURCADO | *Crotophaga sulcirostris* | V

Distribución: Desde el S de Estados Unidos hasta el N y O de Sudamérica, llegando al N de Chile y NO de Argentina (Payne [1997] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 4. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Demetrio Rodríguez en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta en octubre de 1912 (Zotta [1937] *Hornero* 6: 477-483). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 48).
2. Un individuo observado por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal en la finca Jacúlica, departa-

Figura 48. Anó Pico Surcado *Crotophaga sulcirostris*, MACN-Or-8502, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, octubre de 1912 (Diego Monteleone)

mento Santa Victoria, Salta el 16 de julio de 1988 (F. Moschione y J. San Cristóbal *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
Especímenes (1): **MACN-Or-**8502

CUCLILLO OJO COLORADO | *Coccyzus erythropthalmus* | V

Distribución: Se reproduce en una amplia región del S de Canadá y centro de Estados Unidos. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el NO y centro de Sudamérica (Payne [1997] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 4. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un macho adulto colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 6 de febrero de 1958 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 49).
2. Un individuo anillado por Carlos Gerow en la provincia de Jujuy en el año 1977 (C. Gerow *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
3. Un individuo observado por Pablo Grilli en la seccional Caimancito del PN Calilegua, Jujuy el 19 de marzo de 2008 (Camperi *et al.* [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140; P. Grilli *in litt.*).
4. Mencionada sin detalles para la reserva privada El Pantanoso, departamento Ledesma, Jujuy entre los años 2006 y 2010 (Moschione *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).

Figura 49. Cuclillo Ojo Colorado *Coccyzus erythropthalmus*, MACN-Or-38254, arroyo Urugua-í, km 30, Misiones, 6 de febrero de 1958 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

Especímenes (1): **MACN-Or-**38254

AÑAPERO CHICO | *Chordeiles pusillus* | R

Distribución: En forma fragmentada en Colombia, Venezuela, Surinam, Brasil, Bolivia y Argentina (Cleere [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un nido activo hallado por Ernesto Krauczuk en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 23 de octubre de 1995. La hembra y el huevo fueron colectados la noche del 31 de octubre, y el espécimen se encuentra depositado en el MACN (Krauczuk [2000] *Ornitología Neotropical* 11: 85-86; Figura 50).
2. Un total de 17 individuos y 5 nidos hallados en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones entre marzo de 1996 y noviembre de 2001 (Krauczuk [2013] *Atualidades Ornitológicas* 173: 58-68).
3. Varios individuos y un nido hallados por Ernesto Krauczuk y Alejandro Bodrati en Campo Prates, departamento Concepción, Misiones el 14 y 15 de noviembre de 2003 (Bodrati [2005] *en* Di

Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; A. Bodrati *in litt.*).
4. Un individuo observado por Germán Pugnali en Barra Concepción, departamento Concepción, Misiones el 27 de enero de 2004 (ebird.org/checklist/S26704685).
5. Tres individuos observados por Néstor Fariña, Olga Villalba y Juan Klavins en la reserva natural Rincón de Santa María, Corrientes el 10 de abril de 2014 (Pagano *et al.* [2017] *Nuestras Aves* 62: 14-17).
6. Dos individuos observados (uno de ellos filmado) por Luis Pagano y Alejandro Bodrati sobrevolando el poblado de Garruchos, departamento Santo Tomé, Corrientes el 14 de septiembre de 2016 (Pagano *et al.* [2017] *op. cit.*).
7. Un individuo en vuelo observado por Luis Pagano y Alejandro Bodrati en la ruta nacional n°12 sobre el arroyo Estepa, departamento Capital, Misiones en diciembre de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).

Figura 50. Añapero Chico *Chordeiles pusillus*, MACN-Or-66407, reserva Campo San Juan, Misiones, 1 de noviembre de 1995 (Diego Monteleone)

8. Un ejemplar grabado por Néstor Fariña en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 29 de noviembre de 2018 (N. Fariña *in litt.*).
9. Dos individuos observados por Julián Baigorria en la estancia Santa Cecilia, departamento Candelaria, Misiones el 10 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S85057904).
Comentarios: Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (1): MACN-Or-66407

VENCEJO NEGRUZCO | *Cypseloides fumigatus* | R

Distribución: Poblaciones dispersas en el E de Bolivia, E de Paraguay, NE de Argentina y SE de Brasil llegando hasta Rio Grande do Sul (Chantler [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Mencionada sin detalles por Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102; [1939] *Revista de la Sociedad Científica del Paraguay* 4: 3-49).
2. Una observación sin detalles proveniente de Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones en noviembre de 1974 (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
3. Cinco individuos observados por David Stejskal y John Coons en el PN Iguazú, Misiones el 11 de diciembre de 1993 (ebird.org/checklist/S40954283).
4. Unos pocos individuos observados por Carlos Ferrari en el PP Salto Encantado, Misiones el 28 de enero de 1997 (ebird.org/checklist/S19501689).

5. Cuatro individuos observados en vuelo por Alejandro y Guillermo Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 12 de marzo de 1997 (Pearman *et al.* [2010] *Ornitología Neotropical* 21: 351-359; Bodrati *et. al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64).
6. Dos individuos observados en vuelo por Mark Pearman y Germán Pugnali en la seccional 101 del PP Urugua-í, Misiones el 16 de abril de 2001 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
7. Cuatros individuos observados por Mark Pearman en el PP de la Araucaria, Misiones el 23 de enero de 2002 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
8-9. Más de cinco individuos posados observados por Mark Pearman, Ignacio Roesler y Aldo Chiappe en el PP Salto Encantado, Misiones el 25 y 26 de enero de 2002 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
10. Registrada por David Stejskal en el PN Iguazú, Misiones el 11 de octubre de 2002 (ebird.org/checklist/S52693196).
11. Mencionada sin detalles para el PP de la Araucaria, Misiones entre los años 2000 y 2002 (Krauczuk & Baldo [2004] *Atualidades Ornitológicas* 119: 1-43).
12. Dos individuos posados observados por Mark Pearman y un grupo de observadores en el PP Salto Encantado, Misiones el 8 de noviembre de 2003 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
13. Ocho individuos posados observados por Mark Pearman y un grupo de observadores en el PP Salto Encantado, Misiones el 27 de octubre de 2004 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
14. Más de cinco individuos posados (y al menos un nido ocupado) observados por Ignacio Roesler y Leif Gabrielsen en el PP Salto Encantado, Misiones el 1 de diciembre de 2004 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*). La fotografía mencionada en el texto no se encuentra disponible.
15. Un ejemplar en el nido fotografiado por Juan I. Areta en el salto Krysiuk, departamento Oberá, Misiones el 11 de enero de 2005 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
16. Un individuo con nido hallado por Juan I. Areta y Hernán Povedano en la reserva privada Valle de Cuñá Pirú, departamento Cainguás, Misiones el 13 de enero de 2005 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
17. Registrada por Luis Fernández en Puerto Rico, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 22 de enero de 2005 (ebird.org/checklist/S24928839).
18. Registrada por Hernán Alvarado en el PN Iguazú, Misiones el 9 de enero de 2006 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=490957).
19. Ocho individuos observados en vuelo por Juan I. Areta en el PP de la Araucaria, Misiones el 12 de septiembre de 2006 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
20. Cinco individuos observados en vuelo por Juan I. Areta en el PN Iguazú, Misiones el 12 de agosto de 2007 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
21. Tres nidos activos hallados por Mark Pearman en el PP Salto Encantado, Misiones el 13 de noviembre de 2007 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
22. Varios individuos observados por Diego Caiafa en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 26 de enero de 2008 (ebird.org/checklist/S62696260).
23. Varios individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 17 de octubre de 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
24-25. Entre dos y cuatro individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 25 y 26 de octubre de 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
26. Un nido ocupado fotografiado por Juan I. Areta en el salto Golondrina, departamento Guaraní, Misiones el 19 de noviembre de 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
27. Varios registros de entre dos y seis individuos efectuados por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones en octubre y noviembre entre los años 2006 y 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*; Bodrati *et. al.* [2010] *op. cit.*).
28. Un nido activo hallado por Mark Pearman en el PP Salto Encantado, Misiones el 2 de noviembre de 2009 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).

29. Mencionada sin detalles para la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones entre los años 2009 y 2011 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).
30. Al menos un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en marzo de 2012 (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones; ramonmollerjensen.com).
31. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en la RNE San Antonio, Misiones el 11 de septiembre de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=26147).
32. Un ejemplar fotografiado por Gustavo Durán en el PN Iguazú, Misiones el 25 de abril de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=97618).
33. Seis individuos observados por Guillermo Martínez en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 24 de octubre de 2015 (ebird.org/checklist/S25570506).
34. Un total de quince individuos observados por Julián Quillén Vidoz y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 27 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S38593187). Las fotografías no se encuentran disponibles.
35. Registrada por Rosana Ursino en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de abril de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=424186).
36. Un total de cinco individuos observados por Peter Colasanti en el PN Iguazú, Misiones el 22 de octubre de 2016 (ebird.org).
37. Un individuo observado por Gustavo Durán en el PN Iguazú, Misiones el 27 de noviembre de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=511749).
38. Dos o tres individuos observados por Luis Pagano entre la ruta nacional n°14 y el arroyo del Medio, departamento Leandro Alem, Misiones el 21 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers*.).
39. Un ejemplar sobre su nido observado y fotografiado por Luis Pagano en el salto Krysiuk, departamento Oberá, Misiones el 21 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers*.).
40-41. Hasta cinco individuos por día observados por Francisco Cornell en el PN Iguazú, Misiones el 5 y 6 de agosto de 2017 (ebird.org).
42. Dos individuos observados por Francisco González Táboas en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38568405).
43. Un individuo observado por Luis Tejo en Chacra Mariposa, departamento Oberá, Misiones el 20 de noviembre de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=843149).
44. Hasta seis individuos observados y fotografiados por Luis Pagano y otros observadores cerca de El Alcázar, departamento Libertador General San Martín, Misiones en marzo de 2019 (L. Pagano *obs. pers*.).
45. Dos parejas observadas por Patricio Ramírez Llorens y Bernabé López-Lanús en la propiedad Las Ratas de Forestal Belga SA, departamento San Pedro, Misiones el 24 de octubre de 2019 (ebird.org/checklist/S61820898).
46. Un número no determinado de ejemplares fotografiados por Pablo Meoniz en el PN Iguazú, Misiones el 1 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61284990; Figura 51).
47. Dos individuos observados por Patricio Ramírez Llorens y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 2 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S63961511).
48. Tres individuos observados por Pablo Meoniz en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 3 de noviembre de 2019 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1181199).
49. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 25 de enero de 2020 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=378441).
50. Dos individuos observados por Julián Quillén Vidoz y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 24 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S65013654).
51. Tres individuos observados por Marcelo Gavensky, Julián Baigorria y un grupo de observadores en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 23 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79955131).

Figura 51. Vencejo Negruzco *Cypseloides fumigatus*, PN Iguazú, Misiones, 1 de noviembre de 2019 (Pablo Meoniz)

52. Un individuo observado por Julian Baigorria, Diego Oscar y un grupo de observadores en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de agosto de 2021 (ebird.org/checklist/S93380246). Las fotografías no se encuentran disponibles.
53. Registrada por Pablo Meoniz en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 14 de septiembre de 2021 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1466482).
54. Unos tres individuos fotografiados por Mark Pearman, Martín Toledo y Damián Lozano en la ruta nacional n°12, departamento San Ignacio, Misiones el 16 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S94749966). Por el momento las fotografías no se encuentran disponibles.
55. Dos individuos observados por Santiago Torres en el PN Iguazú, Misiones el 19 de noviembre de 2021 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1503177).
Comentarios: Había sido incluida para la avifauna argentina por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Roberto Dabbene ([1917] *Hornero* 1: 3-8) menciona para esta especie las localidades de Tapia y Tafí Viejo, departamentos Trancas y Tafí Viejo respectivamente, Tucumán sin mencionar especímenes. Un año más tarde, el mismo Dabbene ([1918] *Hornero* 1: 193) describe el nido y los huevos de *Cypseloides fumigatus* provenientes de los "cerros de Tucumán". Ambos reportes quizás provengan de Lillo ([1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221), aunque claramente es una confusión con el VENCEJO PARDO *Cypseloides rothschildi*. La referencia para Santa Ana, departamento Río Chico, Tucumán tambien debería tratarse como *C. rothschildi* (Baer [1904] *Ornis* 12: 209-234). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

PICAFLOR AMATISTA | *Calliphlox amethystina* | R

Distribución: Mayormente en el N y E de Sudamérica llegando hasta la región SE de Brasil. Una población se extiende desde el N de Bolivia por el O hasta Perú y Ecuador (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
2. Un macho colectado por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 11 de septiembre de 1915 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se habría depositado en la COFML, pero lamentablemente no pudo ser hallado en dicha colección (Sebastián Aveldaño *in litt.*).
3. Un macho joven colectado por Johan Mogensen en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 13 de marzo de 1917 (Mogensen [1930] *op. cit.*). El espécimen se habría depositado en la COFML, pero lamentablemente no pudo ser hallado en dicha colección (Sebastián Aveldaño *in litt.*).
4. Un macho adulto colectado por Eduardo Del Ponte y Alberto Aiello en el arroyo Yacuy del PN Iguazú, Misiones el 2 de octubre de 1947 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Un macho joven colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 9 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
6-7. Una hembra joven y otra adulta colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 24 y 25 de febrero de 1952 respectivamente (Partridge [1954] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
8. Un macho joven colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 28 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
9. Una hembra colectada por William Partridge en el km 30 de arroyo Urugua-í, Misiones el 4 de octubre de 1954 (Navas & Bó [1993] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 16: 36-50).
10-11. Dos machos colectados por William Partridge en el km 30 de arroyo Urugua-í, Misiones el 10 y 13 de octubre de 1954 (Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
12. Un macho colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 1 de noviembre de 1957 (Navas & Bó [1993] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
13. Registrada por Pablo Cano en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1988 (P. Cano *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA).
14-15. Un macho observado por Claudio Maders en el PP Caá Yarí, Misiones el 8 de octubre de 2006 (Bodrati *et al.* [2008] *Nuestras Aves* 53: 39-41). El mismo fue fotografiado por Carlos Ferrari y Silvia Vitale el 12 de octubre de 2006, y luego por Germán Pugnali junto a una hembra el 24 de octubre del mismo año. Claudio Maders y Gastón Di Santo la registraron en el sitio hasta noviembre de 2006 (Bodrati *et al.* [2008] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S16281071).
16. Observada en reiteradas ocasiones por Claudio Maders y Gastón Di Santo en el PP Caá Yarí, Misiones durante noviembre de 2007 (Bodrati *et al.* [2008] *op. cit.*).
17. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 13 y 14 de noviembre de 2008 (Bodrati *et al.* [2008] *op. cit.*; Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64).
18. Una hembra fotografiada por Rodrigo y Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2011 (Castillo *et al.* [2012] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 88: 1-4).
19. Un individuo observado por Eugenia Boggiano en el PP Salto Encantado, Misiones el 9 de febrero de 2020 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1229275).
20. Una hembra fotografiada por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 7 de abril de 2021 (Castillo [2021] *Nuestras Aves* 66: 103-104).

Comentarios: La referencia del PICAFLOR ENANO *Microstilbon burmeisteri* para Posadas, departamento Capital, Misiones (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366), en realidad podría corresponder a esta especie (Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA).
Especímenes (9): MACN-Or-30604, **MACN-Or-**33530, **MACN-Or-**33531, **MACN-Or-**33532, **MACN-Or-**33533, **MACN-Or-**36648, **MACN-Or-**36649, **MACN-Or-**36650, **MACN-Or-**38308

POLLONA AFRICANA | *Porphyrio alleni* | V

Distribución: Amplia distribución en el África subsahariana, además de Madagascar, islas Comoras e isla Mauricio (Taylor [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Restos de un ejemplar hallados por B. Brown en Royal Bay, Georgias del Sur en diciembre de 1984 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104). Los mismos se encuentran depositados en el NHMUK.
Comentarios: La especie fue determinada en base a las medidas del ala (159 mm) y el pico (24,5 mm) (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*). Recientemente fotografiada en la isla Fernando de Noronha, Brasil (Scaldaferro Bonfa & Pivovar Plotecya [2020] *Cotinga* 42: 119-120).
Especímenes (1 esqueleto): **NHMUK-**s/n

CHORLO DE ESPOLÓN | *Vanellus cayanus* | R

Distribución: Tierras bajas en la mitad N de Sudamérica (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Incluida por Arnaldo de Winkelried Bertoni para la avifauna argentina, sin detalles (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
2. Una hembra adulta colectada por Johan Mogensen sobre la costa del río Paraná en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 15 de marzo de 1917 (Mogensen [1930] *Argentinas Dyr*. Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la colección Shipton de la FML (Figura 52).
3. Mencionada sin detalles para las provincias de Misiones y Chaco (Zotta & Da Fonseca [1936] *Hornero* 6: 343-364).
4. Un individuo observado por Flavio Moschione en el arroyo Pepirí Miní, Misiones el 1 de enero de 1987 (F. Moschione *en* Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).
5. Un ejemplar fotografiado por Miguel González en Capitán Pagé, departamento Rivadavia, Salta el 26 de diciembre de 2005 (Jensen & Areta [2007] *Hornero* 22: 55-57).
6. Un individuo observado por Alejandro Bodrati sobre la costa del río Paraná muy cerca de la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 16 de agosto de 2010 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).
Comentarios: Incluida por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir hasta ese momento evidencia alguna (ver Jensen & Areta [2007] *op. cit.*). Esta especie se consideraba como errante en las islas Malvinas, de donde Charles Abbott habría obtenido un ejemplar que luego fue enviado a Inglaterra (Abbott [1861] *Ibis* 3: 149-167; Sclater [1861] *Proceedings of the Zoological Society of London* 29: 45-47). Este autor en realidad hace referencia al TERO

Figura 52. Chorlo de Espolón *Vanellus cayanus*, COFML-SHIPTON-668, Puerto Segundo, Misiones, 15 de marzo de 1917 (Sebastián Aveldaño, Instituto Miguel Lillo)

Vanellus chilensis, como lo demuestra Richard Sharpe en su lista sinonímica del catálogo del museo británico (Sharpe [1896] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 24. London; Hein van Grouw *in litt.*).

Especímenes (1): COFML-SHIPTON-668

PLAYERO ESQUIMAL | *Numenius borealis* | R

Distribución: En el pasado nidificante al NO de Canadá y quizás Alaska. En la época no reproductiva ocupaba las pampas entre el S de Brasil y el centro de Argentina (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Referida por Charles Darwin para "Buenos Ayres", sin más detalles (Gould [1841] *The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle. Part III. Birds.* London).

2. Un ejemplar colectado por Robert Packe en las islas Malvinas, sin fecha (Sclater [1860] *Proceedings of the Zoological Society of London* 28: 382-391; Abbott [1861] *Ibis* 3: 149-167). El espécimen al parecer se encuentra perdido en la actualidad.

3-4. Grandes bandadas observadas por Henry Durnford en el valle del río Chubut, Chubut entre el 8 y el 10 de octubre de 1877 (Durnford [1878] *Ibis* 20: 389-406). Dos ejemplares fueron colectados el 8 de octubre y los especímenes se encuentran depositados en el NHMUK.

5. Un ejemplar colectado en "*Buenos Ayres*" el 9 de octubre de 1878, sin más detalles. El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.

6. Enrique Lynch Arribálzaga lo incluye para la avifauna de Baradero, partido homónimo, Buenos Aires con el nombre de *Tryngites brevirostris* (Lynch Arribálzaga [1878] *El Naturalista Argentino*. Tomo I. Entrega 11: 330-336).

7. Grandes bandadas observadas por Walter Barrows en Concepción del Uruguay, departamento Uru-

guay, Entre Ríos el 9 de septiembre de 1880 (Barrows [1884] *Auk* 1: 313-319). Un ejemplar fue colectado y el espécimen se encuentra depositado en el MCZ.
8. Un ejemplar colectado por Walter Barrows en Concepción del Uruguay, departamento Uruguay, Entre Ríos el 7 de octubre de 1880. El espécimen se encuentra depositado en el MCZ.
9. Registrada por Walter Barrows casi a diario en el trayecto entre Azul y Bahía Blanca, Buenos Aires hasta fines de febrero de 1881 (Barrows [1884] *op. cit.*). En esta expedición un ejemplar fue colectado por dicho observador en *"Sauce Chico, Potrero de Claraz"*, Buenos Aires el 17 de febrero de 1881. El espécimen se encuentra depositado en el MVZ.
10-11. Dos ejemplares colectados en *"La Plata"*, Buenos Aires en diciembre de 1895. Los especímenes se encuentran depositados en el FMNH.
12. William Hudson ([1920] *Birds of La Plata*. Dent & Sons) lo menciona como "bastante común en las pampas, apareciendo de septiembre a octubre en pequeñas bandadas de 30 o 40 hasta 100 ejemplares". Al parecer este autor no observó la especie personalmente, ya que no brinda mayores detalles.
13. Un macho colectado por Hermann Burmeister en las *"llanuras del río Salado, Buenos Aires"*, sin fecha. El espécimen se encuentra depositado en NMNH.
14. Unos 20 o 30 individuos observados por Ernest Gibson cerca de la estancia Linconia, partido de General Lavalle, Buenos Aires el 13 de febrero de 1899 (Gibson [1920] *Ibis* 62: 1-97).
15-16. Una pequeña bandada observada por Maurice Arthur Runnacles cerca de la estancia Linconia, partido de General Lavalle, Buenos Aires el 8 de abril de 1901. Aparentemente el mismo observador volvió a registrar algunos individuos en El Palenque, partido de General Lavalle, Buenos Aires el 16 de abril del mismo año (Gibson [1920] *op. cit.*).
17. Un ejemplar proveniente de Necochea, partido homónimo, Buenos Aires sin fecha (Steullet & Deautier [1935-1946] *Obra del Centenario del Museo de La Plata* 1: 1-1006). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.
18. Un ejemplar colectado por Rollo Beck en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 29 de septiembre de 1914 (Murphy [1936] *Oceanic birds of South America*. Vol. 1. American Museum of Natural History). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
19. Mencionada por Percival Reynolds como "observado en Sowchen" alrededor del año 1915, y posteriormente incluida en un listado que el mismo observador le enviara a A.T. Waldron en junio de 1932 (Humphrey *et al.* [1970] *Birds of Isla Grande [Tierra del Fuego]*. Smithsonian Institution). Estos autores suponen que dicha localidad se encuentra cerca o dentro de la estancia Viamonte, departamento Río Grande, Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* [1970] *op. cit.*).
20. Un grupo de cinco o seis individuos observados (uno colectado) por Juan Daguerre en Rosas, partido de Las Flores, Buenos Aires el 7 de febrero de 1923. Publicaciones posteriores mencionan la captura como del año 1924 (Dabbene [1924] *Hornero* 3: 284; Forbush [1929] *Birds of Massachusetts and other New England states. Part 1*. Norwood Press). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
21. Una hembra colectada por Juan Daguerre en la estancia El Toro de la localidad de Rosas, partido de Las Flores, Buenos Aires el 11 de enero de 1925 (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 420; Forbush [1929] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
22. Un macho joven colectado por Juan Daguerre en la estancia El Toro de la localidad de Rosas, partido de Las Flores, Buenos Aires en octubre de 1927. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
23. Un espécimen (MACN-Or-1083) sin datos de localidad ni colector se encuentra en exhibición en el MACN. Suponemos que fue obtenido en territorio argentino.
24. Un individuo observado por Ernest Ronald Runnacles en General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires en enero de 1937 (Wetmore [1939] *Auk* 56: 475-476).
25-26. Dos o tres individuos observados por Ernest Ronald Runnacles en General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires el 16 de febrero de 1937; y otro tres días más tarde en la misma localidad (Wetmore [1939] *op. cit.*).

27. Un individuo observado por Ernest Ronald Runnacles en General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires el 17 de enero de 1939 (Wetmore [1939] *op. cit.*).
28. Mencionada sin detalles para la provincia de Corrientes (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28).
29. Un grupo de cuatro individuos observado por Pablo Michelutti en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 13 de octubre de 1990 (Michelutti [1991] *Nuestras Aves* 25: 25).
30. Mencionada con dudas por Daniel Paz Barreto para el arroyo Maquinchao, Río Negro (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros). Curiosamente esta especie no es mencionada por este autor en un trabajo posterior (Paz Barreto [1997] *Aves de la provincia de Río Negro II. Localidades Confirmadas*. Consejo de Ecología y Medio Ambiente. San Carlos de Bariloche).
Comentarios: Henry Seebohm menciona la colecta de ejemplares por parte de H.M. Harrison "cerca de Buenos Aires" (Seebohm [1888] *The geographical distribution of the family Charadriidae*. Henry Sotheran & Co.). En realidad este explorador obtuvo especímenes en Uruguay, los cuales fueron enviados a Inglaterra (Hahn [1963] *Where is that vanished bird?: an index to the known specimens of the extinct and near extinct North American species*. Royal Ontario Museum; Aspiroz & Martínez-Curci [2018] *en* Aspiroz *et al.* [editores] *Libro Rojo de las Aves del Uruguay*. DINAMA & DINARA. Montevideo). Considerada Posiblemente Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (15): **MACN-Or-**1083, **MACN-Or-**15761, **MACN-Or-**16680, **MACN-Or-**35682, **MLP-Or-**25, **AMNH-**752067, **FMNH-**426467, **FMNH-**426468, **MCZ-**31206, **MCZ-**31207, **MVZ-**106842, **NHMUK-**1885.11.20.182, **NHMUK-**1885.11.20.183, **NHMUK-**1878.1.25.21, **NMNH-**66523

PLAYERITO MENUDO | *Calidris minuta* | V

Distribución: Nidifica en el extremo N de la región Paleártica. Luego de la etapa reproductiva se distribuye en Europa, África, oriente medio e India (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: **1**. Una hembra adulta colectada por Peter Prince en Bird Island, Georgias del Sur el 28 de

Figura 53. Playerito Menudo *Calidris minuta*, NHMUK-2001.33.1, Bird Island, Georgias del Sur, 28 de diciembre de 1977 (The Natural History Museum)

diciembre de 1977 (Prince & Croxall [1983] *British Antarctic Survey Bulletin* 59: 15-27; Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 53).
Comentarios: El primer registro para Sudamérica corresponde a un ejemplar fotografiado por Carlos Araujo Gussoni en la isla Fernando de Noronha, Brasil el 9 de octubre de 2018 (Araujo Gussoni [2019] *Atualidades Ornitológicas* 207: 28).
Especímenes (1): **NHMUK**-2001.33.1

BECASA GRIS | *Limnodromus griseus* | V

Distribución: Nidifica en el O (subespecie *caurinus*), centro (subespecie *hendersoni*) y E (subespecie *griseus*) de Norteamérica. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el sur ocupando México, el Caribe y el N de Sudamérica (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Miguel Comaleras en la estancia Cari Lauquen de la localidad de San Antonio, partido de Maipú, Buenos Aires el 25 de octubre de 1942 (Zotta [1942] *Hornero* 8: 171-178). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 54).
2. Dos individuos observados por Claës Olrog en el cabo San Antonio, partido de La Costa, Buenos Aires en noviembre de 1962 (Olrog [1967] *Hornero* 10: 292-298).
3-4. Registrada en el lago Mascardi del PN Nahuel Huapi, Río Negro en los veranos de 1969 y 1970 (Contreras *et al.* [1980] *Historia Natural* 8: 41-48).
5. Un ejemplar fotografiado por Samuel Narosky en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires



Figura 54. Becasa Gris *Limnodromus griseus*, MACN-Or-28739, San Antonio, Buenos Aires, 25 de octubre de 1942 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

el 6 de diciembre de 1977 (Narosky [1983] *Hornero* 12. *Número Extraordinario*: 74-76; Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).
6. Un individuo observado por Alejandro Ronchetti en la RM Ribera Norte, partido de San Isidro, Buenos Aires en noviembre de 1983 (Barbetti *et. al* [1985] *Refugio Educativo de la Ribera Norte*. Fundación Vida Silvestre Argentina; Gasparri *et al*. [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 234: 1-43).
7-8. Mencionada sin detalles por Pablo Michelutti para la costa sur de la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba. En el mismo trabajo se comenta un registro dudoso proveniente de La Paquita, departamento San Justo, Córdoba en el año 1978 (Yzurieta [1995] *Manual de Reconocimiento y Evaluación Ecológica de las Aves de Córdoba*. Gobierno de Córdoba).
9. Un individuo observado por Daniel Blanco, Germán Pugnali y Hernán Rodríguez Goñi en Punta Rasa, partido de la Costa, Buenos Aires entre el 10 y el 12 de octubre de 1987 (Blanco *et al.* [1988] *Punta Rasa: su importancia en la conservación de las aves migratorias*. International Council for Bird Preservation).
10-12. Un total de seis individuos observados por Daniel Blanco, Germán Pugnali y Hernán Rodríguez Goñi en Punta Rasa, partido de la Costa, Buenos Aires durante enero de 1988. El conteo máximo fueron cuatro *Limnodromus* en una transecta realizada el 23 de enero de 1988 (Blanco *et al.* [1988] *op. cit.*).
13. Un individuo observado por Jim Rising en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, Buenos Aires el 1 de enero de 1993 (Jaramillo [2000] *Cotinga* 14: 33-38).
14. Un individuo observado y escuchado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 8 de enero de 1993 (Jaramillo [2000] *op. cit.*).
15. Mencionada como de presencia ocasional en la laguna Chasicó, partido de Villarino, Buenos Aires sin mayores detalles (Zapata [1998] *Natura Neotropicalis* 29: 155-161).
16. Dos individuos observados por un grupo de investigadores en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 1 de marzo de 2009 (Rodríguez *et al.* [2010] *Flamingo* 18: 45-47; ebird.org/checklist/S20166118).
17. Un individuo observado por un grupo de investigadores en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 1 de agosto de 2010 (Rodríguez *et al.* [2010] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S20164602).
18. Un ejemplar observado y fotografiado por Facundo Gandoy, Emiliano Depino, Giselle Mangini y Federico Brissón Egli en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 13 de noviembre de 2011 (Gandoy *et al.* [2014] *Nuestras Aves* 59: 21-24).
19. Un ejemplar fotografiado por Sergio Passafaro en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 20 de septiembre de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=62926).
20. Un ejemplar filmado y fotografiado por Luis Pagano y Cecilia Chiale en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 18 de abril de 2015 (youtube.com/watch?v=QLDba67ph4E; ebird.org/checklist/S72548907). El mismo fue comunicado como *Limnodromus scolopaceus*, pero posteriores revisores concluyeron que se trataría de *L. griseus*.
21-22. Dos ejemplares fotografiados por Guillermo Spajic en el puerto de San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, Buenos Aires el 2 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S62933086). Ambos permanecieron durante varios días y pudieron ser registrados por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org). Quizás los mismos individuos fueron relocalizados en el sitio por Carlos Ferrari el 3 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S77209618).
Taxonomía: Las diferencias poblacionales y taxonómicas del género *Limnodromus* fueron estudiadas en detalle por Frank Pitelka ([1950] *University of California Publications in Zoology* 50: 1-108). Para una discusión sobre identificación ver Jaramillo & Henshaw ([1991] *Birding World* 8: 221-228), Chandler ([1998] *British Birds* 91: 93-106) y Lee & Birch ([2006] *Birding* 38 [5]: 34-42).
Comentarios: El único ejemplar obtenido fue motivo de discusión (ver Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), y aún se requieren mayores estudios para descartar con seguridad a la BECASA PICO LARGO *Limnodromus scolopaceus* (L. Pagano *obs. pers.*; Álvaro Jaramillo *in litt.*). Claudio Bertonatti y Patricio Sutton reportan un ejemplar fotografiado en Mar Chiquita, partido homónimo, Buenos Aires el 5 de abril de 1985 (Bertonatti & Sutton [1986] *Nuestras*

Aves 10: 12-13). La fotografía se encuentra depositada en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP, y en realidad corresponde a una BECASA DE MAR *Limosa haemastica*.
Especímenes (1): MACN-Or-28739

BECASINA GRANDE (Becasina Fueguina) | *Gallinago stricklandii* | R

Distribución: Patagonia austral e islas adyacentes, incluyendo las islas Malvinas (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Émile Oustalet menciona que no fue encontrada por la expedición francesa, pero la incluye en un cuadro (junto a *Gallinago nobilis*) para "Terre de Feu, Terre des États y Patagonie au sud do Rio Negro" (Oustalet [1891] *Mission scientifique du Cap Horn. 1882-1883*. Tome VI. Première Partie). Esto fue parcialmente repetido por Roberto Dabbene ([1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513).
2. Mencionada para las islas Malvinas como una especie rara que ocasionalmente nidifica (Bennett [1926] *Ibis* 68: 306-333).
3. Un individuo observado por Claës Olrog cerca de Las Cotorras, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego entre el 5 y el 11 de febrero de 1940 (Olrog [1948] *Acta Zoológica Lilloana* 5: 437-531).
4. Mencionada como hipotética para Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* [1970] *Birds of Isla Grande [Tierra del Fuego]*. Smithsonian Institution).
5. Un individuo aparentemente fotografiado por Carlos Fermani en el río Ovando del PN Tierra del Fuego, Tierra del Fuego en octubre o noviembre de 1993 (Fabián Bugnest *en* Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales*. LOLA). La fotografía no se encuentra disponible.
6. Registrada por Paul Sweet en el cerro Perito Moreno, departamento Bariloche, Río Negro sin fecha (P. Sweet *en* Kovács *et al.* [2005] *Manual Ilustrado de las aves de la Patagonia*. Río Negro).
7. Kovács *et al.* ([2005] *op. cit.*) la mencionan para la isla de los Estados, islotes del canal de Beagle y ocasionalmente Tierra del Fuego e islas Malvinas.
8. Mencionada sin detalles para el norte de la isla grande de Tierra del Fuego e islas Malvinas (Clark [1986] *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos*. LOLA).
9. Registrada por Pedro Blendinger en Lapataia, PN Tierra del Fuego, Tierra del Fuego el 23 de febrero de 1993 (Blendinger [1998] *Nuestras Aves* 38: 5-8).
10. Registrada con dudas por Philip Humphrey en la isla de los Estados, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego durante el mes de abril sin especificar el año (P. Humphrey *en* Chebez & Bertonatti [1994] *La avifauna de la isla de los Estados, islas de Año Nuevo y mar circundante [Tierra del Fuego, Argentina]*. LOLA).
11. Un ejemplar fotografiado por Dag Petersen en Sea Lion Island, islas Malvinas en enero de 1998 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). La fotografía no se encuentra disponible.
12. Dos individuos sin confirmar observados por Jon Fjeldså en el lago Roca del PN Los Glaciares, Santa Cruz sin fecha (J. Fjeldså *en* Imberti [2003] *Cotinga* 19: 15-24).
13. Un individuo observado por Pablo Sturzenbaum y Paola Imberti en la estancia Cancha Carrera, departamento Güer Aike, Santa Cruz el 13 de febrero de 2001 (P. Sturzenbaum y P. Imberti *en* Imberti [2003] *op. cit.*).
14. Un ejemplar fotografiado por Mike Morrison cerca de Cape Pembroke, islas Malvinas el 29 de diciembre de 2004. El mismo fue relocalizado en el sitio pocos días después (Woods [2017] *op. cit.*). La fotografía no se encuentra disponible.
15-16. Mencionada sin detalles para la península Mitre y el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego (Schiavini [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

17. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain y Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).
18. Un ejemplar fotografiado por Mark Pearman en la isla de los Estados, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 14 de diciembre de 2012 (igoterra.com/taxon/view/3841/Gallinago-stricklandii; M. Pearman *in litt.*).
19. Un ejemplar fotografiado por Ulises Balza en la isla de los Estados (54°44'27''S 63°49'47''W), departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 13 de diciembre de 2019 (ebird.org/checklist/S62548904; Figura 55).
20. Un individuo observado por Ulises Balza en la isla de los Estados (54°44'14''S 63°49'19''W), departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 17 de diciembre de 2019 (U. Balza *in litt.*).

Figura 55. Becasina Grande *Gallinago stricklandii*, isla de los Estados, Tierra del Fuego, 13 de diciembre de 2019 (Ulises Balza)

21. Un ejemplar capturado y fotografiado por Esteban Daniels y Jorge López Moreno en Ushuaia, departamento homónimo, Tierra del Fuego el 12 de mayo de 2022 (ebird.org).
Comentarios: Roberto Dabbene ([1910] *op. cit.*) menciona a *Gallinago nobilis* (= *Gallinago stricklandii*) con localidad Bahía Orange aludiendo al trabajo de Émile Oustalet ([1891] *op. cit.*), aunque este sitio en realidad pertenece al territorio chileno. Un ejemplar colectado por Robert Fitzroy en Tierra del Fuego se encuentra depositado en el NHMUK y es posible que provenga del territorio chileno (Hein Van Grouw *in litt.*). Robin Woods ([2017] *op. cit.*) menciona datos inéditos y comentarios de antiguos pobladores de las islas Malvinas que la nombran localmente como *Jack Snipe*.
Tanto Claës Olrog ([1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324) como Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) suponen que el ejemplar fotografiado en Río Grande, departamento homónimo, Tierra del Fuego el 24 de octubre de 1974 (Abramson [1977] *Auk* 94: 357) corresponde a *Gallinago stricklandii*. Las fotografías depositadas en el United States Geological Survey confirman que en realidad se trata de la BECASINA PATAGÓNICA *Gallinago magellanica* (Figura 13). Del mismo modo, la fotografía de Lars Petersen presentada por Di Giacomo ([2005] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina.* Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas) también corresponde a *Gallinago magellanica*.
Un ejemplar fotografiado por Jorge Veiga, Marcos Babarskas y Pablo Acerbo en la laguna Varvarco Tapia, departamento Minas, Neuquén el 31 de enero de 1997 (Acerbo [2000] *Aves del Río Neuquén.* AIC; Veiga *et al.* [2005] *Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución.* Editorial RyC). La fotografía publicada corresponde a *Gallinago magellanica*. Bernabé López-Lanús (*en* Chebez *et al.* [1998] *op. cit.*) menciona haber registrado la especie cerca del paso Tromen, Chile en enero de 1993. Llamativamente Veiga *et al.* ([2005] *op. cit.*) utilizan este registro para incluirla dentro del PN Lanín, Neuquén. Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015).* Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

PLAYERITO PICO CURVO | *Xenus cinereus* | V

Distribución: Se reproduce en una extensa área de la región Paleártica y luego migra hacia las costas de África, Australia, India y el SE asiático (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Figura 56. Playerito Pico Curvo *Xenus cinereus*, Punta Rasa, Buenos Aires, 10 de enero de 1988 (Hernán Rodríguez Goñi)

Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Hernán Rodríguez Goñi en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires en diciembre de 1987 y enero de 1988 (Pugnali *et al.* [1988] *Nótulas Faunísticas* 13: 1-2; Figura 56).

2. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en Saladillo, partido homónimo, Buenos Aires en diciembre de 1990 (B. López-Lanús *en* Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).

GAVIOTA SOMBRÍA | *Larus fuscus* | V

Distribución: Especie politípica del N de Europa y Rusia. Durante el invierno migra hacia África y el S de Asia, llegando regularmente a la costa atlántica de Norteamérica (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: **1**. Una hembra joven colectada por Emiliano Mac Donagh en el faro Segunda Barranca de la bahía San Blas, partido de Patagones, Buenos Aires el 26 de marzo de 1931 (Steullet & Deautier [1939] *Notas del Museo de La Plata* 4: 245-249). El espécimen se encuentra depositado en el MLP (Figuras 57-58).

Taxonomía: Este ejemplar fue estudiado y determinado por Robert Murphy, quien además sugirió que por el tamaño del pico podría corresponder a la subespecie *graellsii* (R. Murphy *en* Steullet & Deautier [1939] *op. cit.*).

Comentarios: Narosky & Di Giacomo ([1993] *Las Aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini) consideran este registro como posiblemente erróneo.

Especímenes (1): MLP-Or-6366

Figuras 57. Gaviota Sombría *Larus fuscus*, MLP-Or-6366, bahía San Blas, Buenos Aires, 26 de marzo de 1931 (Diego Monteleone)

Figura 58. Arriba: Gaviota Cocinera *Larus dominicanus*. Abajo: Gaviota Sombría *Larus fuscus,* MLP-Or-6366, bahía San Blas, Buenos Aires, 26 de marzo de 1931 (Diego Monteleone)

GAVIOTÍN CHICO BOREAL | *Sternula antillarum* | V

Distribución: La subespecie nominal se reproduce en el S de Estados Unidos y el Caribe, y luego realiza una migración llegando al N de Brasil (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Lynx Edicions).

Figura 59. Gaviotín Chico Boreal *Sternula antillarum*, Punta Rasa, Buenos Aires, 12 de diciembre de 2010 (Santos Di Mauro)

Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Claës Olrog en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, Buenos Aires el 1 de febrero de 1958 (Olrog [1969] *Neotrópica* 15: 7-8). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

2. Un individuo observado por Samuel Narosky en la RE Costanera Sur, Buenos Aires el 11 de mayo de 1986 (Narosky & Sutton [1991] *Nuestras Aves* 25: 28-29).

3. Hasta cinco individuos observados (uno de ellos fotografiado) por Patricio Sutton y Claudio Bertonatti en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 2 de mayo de 1988 (Narosky & Sutton [1991] *op. cit.*). Al parecer las fotografías no se encuentran disponibles.

4. Un inmaduro observado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 5 de enero de 1993 (Jaramillo [2000] *Cotinga* 14: 33-38).

5. Un individuo observado por David Fisher en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 24 de noviembre de 1998 (Jaramillo [2000] *op. cit.*).

6. Un ejemplar fotografiado por Germán Pugnali y otros observadores en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 26 de noviembre de 2005 (ebird.org/checklist/S26700237).

7. Un ejemplar fotografiado por Claudia Mora y Santos Di Mauro en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 12 de diciembre de 2010 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=26443; Figura 59).

Taxonomía: Durante mucho tiempo considerada conespecífica con el GAVIOTÍN COMÚN *Sternula albifrons* (Massey [1976] *Auk* 93: 760-773; Massey & Atwood [1978] *Bird-Banding* 49: 360-371; Gochfeld & Burger [1996] *op. cit.*). Ambas especies tradicionalmente en el género *Sterna*, aunque recientes trabajos moleculares proponen la reutilización de *Sternula* para los "pequeños gaviotines blancos" (Bridge *et al.* [2005] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35: 459-469).

Comentarios: Según Olrog ([1969] *op. cit.*) es muy posible que algunos gaviotines citados para las costas de Uruguay y Argentina como GAVIOTÍN DE RÍO *Sternula superciliaris*, en realidad pertenezcan a *Sterna albifrons* (= *Sternula antillarum*). Para una discusión sobre identificación ver Hayes ([2001] *Cotinga* 15: 10-13).

Especímenes (1): **COFML**-10832

GAVIOTÍN NEGRO | *Chlidonias niger* | V

Distribución: La subespecie *surinamensis* nidifica en una amplia región de Norteamérica, y luego de la etapa reproductiva migra hacia Centroamérica y N de Sudamérica (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: **1**. Un macho en plumaje de reposo colectado por Johan Mogensen en Tres Pozos, Jujuy el 18 de octubre de 1928 (Olrog [1969] *Neotrópica* 15: 7-8). En la etiqueta figura la localidad "*Los Pozos, Jujuy*", aunque muy probablemente se refiera a Tres Pozos, departamento General José de San Martín, Salta (ver Dabbene [1915] *Physis* 1: 532-533; Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la COFML (Figura 60).
2-3. Un individuo en vuelo observado por Samuel Narosky en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 21 de enero de 1970. Dos días más tarde, este observador halló dos individuos junto a otros gaviotines en la misma localidad (Narosky [1971] *Hornero* 11: 129-130).
4. Dos individuos observados (macho colectado) por Julio Contreras en la laguna del Viborón, departamento Maipú, Mendoza el 5 de diciembre de 1976 (Contreras [1979] *Historia Natural* 1: 1-3). El espécimen habría sido depositado en el IADIZA, pero actualmente se desconoce su paradero (José Benjamin Bender *in litt.*; Yolanda Davies *com. pers.*).
5. Dos individuos observados en la desembocadura del río Segundo, departamento San Justo, Córdoba en marzo de 1977 (Nores & Yzurieta [1979] *Hornero* 12: 45-52).
6. Registrada por Claës Olrog y Elba Pescetti en el embalse San Felipe, departamento Chacabuco, San Luis el 20 de febrero de 1981 (C. Olrog y E. Pescetti *en* Nellar Romanella [1993] *Aves de la provincia de San Luis. Lista y Distribución.* San Luis).
7. Registrada en la RP Llancanelo, Mendoza antes de 1983 (Aramburu [1983] *Lista preliminar de avifauna de la laguna Llancanelo*; Sosa [1995] *Multequina* 4: 65-75).
8-9. De dos a cuatro ejemplares observados en la laguna de Soto, departamento Capital, Corrientes en enero y febrero de 1984 (Contreras & Contreras [1984] *Historia Natural* 3: 248).
10. Un adulto en plumaje nupcial fotografiado en la RP Llancanelo, Mendoza el 10 y 11 de abril de 1984 (Martínez *et al.* [1985] *Historia Natural* 5: 25-28). La fotografía no se encuentra disponible.
11. Tres individuos observados por Olga León y Sergio Díaz Neto al sur de Puerto Vilelas, departamento San Fernando, Chaco el 1 de abril de 1988 (León & Díaz Neto [1988] *Nótulas Faunísticas* 12: 1-2).

Figura 60. Gaviotín Negro *Chlidonias niger*, COFML-13107, Tres Pozos, Jujuy, 18 de octubre de 1928 (Luis Pagano)

Esta parece ser la fuente de la posterior mención del valle del río Paraná (Chatellenaz [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 527-550).
12. Un individuo observado en el dique Cruz de Piedra, departamento Capital, San Luis el 11 de noviembre de 1990. El ave permaneció tres días en el mismo sitio (Nellar Romanella [1993] *op. cit.*).
13. Un individuo en plumaje de reposo observado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 26 de diciembre de 1991 (Jaramillo [2000] *Cotinga* 14: 33-38).
14. Un individuo en plumaje de reposo observado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 31 de diciembre de 1992 (Jaramillo [2000] *op. cit.*).
15-18. Narosky & Di Giacomo ([1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini) mencionan cuatro registros inéditos para la provincia de Buenos Aires, sin mayores detalles: observada por Davis Finch en Punta Rasa, partido de la Costa; observada por Mariano Martínez en la albúfera Mar Chiquita, partido homónimo; observada por Adrián Di Giacomo en el puerto de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón y observada por Horacio Rodríguez Moulín en General Lavalle, partido homónimo.
19. Un individuo volando sobre el río Paraguay frente a Puerto Fotheringham, departamento Laishí, Formosa el 30 de diciembre de 1994 (Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).
20. Un grupo de tres individuos observado por Alejandro Bodrati en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, Buenos Aires el 28 de septiembre de 1998 (A. Bodrati *en* Ferrari & Henschke [2002] *Nuestras Aves* 44: 19-20).
21. Dos individuos observados por Carlos Ferrari y Christian Henschke en la RE Costanera Sur, Buenos Aires el 29 de octubre de 2000 (Ferrari & Henschke [2002] *op. cit.*).
22. Mencionada sin detalles para el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre febrero de 2009 y septiembre de 2010 (Rodríguez *et al.* [2010] *Flamingo* 18: 45-47).
23. Un adulto en plumaje de reposo observado por Oscar Quiroga y Martín Alcalde en Cuyoj, departamento Banda, Santiago del Estero el 24 de noviembre de 2012 (Quiroga *et al.* [2015] *Nuestras Aves* 60: 59-60).
24. Un ejemplar fotografiado por Miguel Ansenuza en la desembocadura del río Xanaes, departamento San Justo, Córdoba el 6 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S77135258).
Taxonomía: La subespecie americana *Chlidonias niger surinamensis* fue propuesta como especie válida, pero actualmente no es reconocida como tal (Heath *et al.* [2020] *en* Billerman [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology). Además de las múltiples guías de campo, para una discusión sobre identificación del género ver Alström ([1989] *British Birds* 82: 296-319).
Comentarios: Algunas observaciones sin evidencia podrían corresponder al GAVIOTÍN ALAS BLANCAS *Chlidonias leucopterus*. El GAVIOTÍN CARA BLANCA *Chlidonias hybridus* ha sido fotografiado recientemente en Paraguay (Clay [2016] *Neotropical Birding* 19: 56-58; Clay *et al.* [2017] *Revista Brasileira de Ornitologia* 25: 128-136), por lo tanto no debe ser descartado a la hora de identificar estas confusas especies.
Especímenes (1): **COFML**-13107

PINGÜINO CRESTUDO | *Eudyptes sclateri* | V

Distribución: Su área de cría ocupa mayormente las islas Bounty y Antípodas al SE de Nueva Zelanda (Spencer Davis [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).
Registros: **1**. Un ejemplar hallado en West Point Island, islas Malvinas en noviembre de 1961. El

mismo regresó todas las temporadas entre los años 1962 y 1966. En las dos últimas se apareó con un PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, aparentemente sin éxito (Napier [1968] *British Antarctic Survey Bulletin* 16: 71-72).
2. Un individuo observado en New Island, islas Malvinas en la temporada 1980/81 (Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).
3. Un ejemplar hallado en Pebble Island, islas Malvinas en enero de 1997 y entre noviembre de 1997 y enero de 1998. El mismo fue fotografiado por Martin Scott en diciembre de 1997 (Anónimo [1998] *Birding World* 11: 258).

Figura 61. Pingüino Crestudo *Eudyptes sclateri*, Puerto San Julián, Santa Cruz, 28 de febrero de 2008 (Guillermo Rivera)

4. Un ejemplar (probablemente el mismo de la observación anterior) registrado en Pebble Island, islas Malvinas entre 1997 y 2008. En las temporadas 2005/06 y 2007/08 se apareó con un PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, aparentemente sin éxito (Morrison *et al*. [2006] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 6: 12-14; Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC; ebird.org).
5. Un ejemplar fotografiado por Mike y Donna Evans en Port Harriet, islas Malvinas el 9 de octubre de 2005 (Woods [2017] *op. cit.*).
6. Un ejemplar fotografiado por Guillermo Rivera y un grupo de observadores en Puerto San Julián, departamento Magallanes, Santa Cruz el 28 de febrero de 2008 (Darrieu *et al.* [2008] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 10: 111-145; G. Rivera *in litt*.; Figura 61).
7. Un ejemplar hallado por Roxana Goronas en la isla Pingüino, departamento Deseado, Santa Cruz el 21 de febrero de 2017 (ebird.org/checklist/S34873988). El mismo permaneció en el sitio hasta marzo y luego fue fotografiado en Las Grutas, departamento San Antonio, Río Negro el 13 de diciembre de ese año (Área Natural Protegida Bahía de San Antonio).

PINGÜINO CARA BLANCA | *Eudyptes schlegeli* | V

Distribución: Se reproduce únicamente en las islas Macquarie e islotes adyacentes al SO de Nueva Zelanda (Crossin *et al.* [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).
Registros: 1. Un individuo capturado y fotografiado por Peter Prince y otros investigadores en Bird Island, Georgias del Sur el 28 y 29 de febrero de 1984 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104). Las fotografías no se encuentran disponibles.
2. Tres parejas halladas por Ian Strange nidificando en las islas Malvinas antes de 1987 (Strange [1987] *The Falkland Islands and Their Natural History*. David & Charles; Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).
3. Un individuo observado por Philip Miller en Cape Dolphin, islas Malvinas en abril de 1992 (Woods

Figura 62. Pingüino Cara Blanca *Eudyptes schlegeli*, New Island, islas Malvinas, 18 de enero de 2011 (Nina Dehnhard)

[2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).
4. Un individuo observado por Keith Reid y otros observadores en Bird Island, Georgias del Sur el 30 de diciembre de 1992 (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*).
5. Dos individuos observados en Bird Island, Georgias del Sur en noviembre de 1998 (Clarke *et al.* [2012] *British Birds* 105: 118-144; Andrew Clarke *in litt.*).
6. Un individuo observado en Bird Island, Georgias del Sur en febrero de 2000 (Clarke *et al.* [2012] *op. cit.*; Andrew Clarke *in litt.*).
7. Un subadulto fotografiado por Allan White en Pebble Island, islas Malvinas el 4 de enero de 2005 (Morrison *et al.* [2006] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 6: 12-14). La fotografía no se encuentra disponible.
8-9. Un individuo observado en Bird Island, Georgias del Sur en abril y noviembre de 2008 (Clarke *et al.* [2012] *op. cit.*; Andrew Clarke *in litt.*).
10. Un ejemplar fotografiado por Nina Dehnhard en New Island, islas Malvinas el 18 de enero de 2011 (Dehnhard *et al.* [2012] *Marine Ornithology* 40: 95-98; Figura 62). Este ejemplar quizás fue el reportado por Tony Chater para enero de ese año en el mismo sitio (Morrison & Henry [2012] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 16: 6-9).
11. Un ejemplar fotografiado por María Regina Silva en West Point Island, islas Malvinas el 27 de enero de 2011 (ebird.org/checklist/S34324944).
12. Un ejemplar fotografiado por Daniel López Velasco en Elephant Island, Península Antártica el 22 de noviembre de 2017 (ebird.org/checklist/S65232178).
13. Un ejemplar fotografiado por Micky Reeves, Martin Anstee y Andy Pollard en Sea Lion Island, islas Malvinas el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76851649).
14. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry, David Carter y Ryan Hawksworth en Kidney Cove, islas

Malvinas el 12 de febrero de 2021 (ebird.org/checklist/S81164287). Muy probablemente el mismo ejemplar registrado nuevamente en el sitio el 24 de febrero del mismo año (ebird.org/checklist/S82364790).
Taxonomía: En el pasado considerada una forma de PINGÜINO FRENTE DORADA *Eudyptes chrysolophus*, con una baja distancia genética entre ambos (Baker *et al.* [2006] *Proceedings of the Royal Society B* 273: 11-17).
Comentarios: Había sido incluida para la avifauna argentina por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Ian Strange ([2013] *Sea Swalow* 62: 62-66) reporta la presencia de la especie en Beauchêne Island, islas Malvinas sin hacer referencia a publicaciones previas y presentando una fotografía sin fecha. Las observaciones realizadas en Bird Island, Georgias del Sur probablemente correspondan al mismo ejemplar. La especie fue catalogada como No Confirmada para las islas Malvinas (Woods [2017] *op. cit.*). Un inmaduro colectado en el estrecho de Magallanes 20 km al norte de Punta Arenas, Chile al parecer es el primer registro en el continente sudamericano (Matus & Jaramillo [2008] *Cotinga* 30: 34-40).

PINGÜINO PICO GRUESO | *Eudyptes pachyrhynchus* | V

Distribución: Se reproduce en la isla sur de Nueva Zelanda, como así también en las islas Solander, Codfish y Stewart (Mattern [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).
Registros: **1**. Un ejemplar proveniente de la bahía King George, islas Malvinas sin fecha de captura

Figura 63. Pingüino Pico Grueso *Eudyptes pachyrhynchus*, NHMUK-s/n, islas Malvinas (The Natural History Museum)

Figura 64. Pingüino Pico Grueso *Eudyptes pachyrhynchus*, UMZC-1/Sph/2/b/3, islas Malvinas (Museum of Zoology, University of Cambridge)

ni datos de colector (Woods [1988] *Guide to Birds of the Falkland Islands*. Anthony Nelson). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 63).
2. Un ejemplar proveniente de "*Falkland Islands*" sin fecha ni datos de colector. La identificación del mismo fue confirmada por Colin Miskelly (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El espécimen se encuentra depositado en el UMZC (Figura 64).
Comentarios: La especie fue catalogada como No Confirmada para las islas Malvinas (Woods [2017] *op. cit.*).
Especímenes (2): **NHMUK**-s/n, **UMZC**-1/Sph/2/b/3

PINGÜINO DE SNARES | *Eudyptes robustus* | V

Distribución: Nidificante endémico del archipiélago de Snares al S de Nueva Zelanda (Mattern [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Timothy Lamey en New Island, islas Malvinas el 10 diciembre de 1988 (Lamey [1990] *Notornis* 37: 78).
2. Registrada por Ann Crawford en Pebble Island, islas Malvinas el 10 de febrero de 2008 (ebird.org/checklist/S10344084).
3. Un adulto fotografiado por Laurent Demongin en New Island, islas Malvinas el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2008 (Demongin *et al.* [2010] *Wilson Journal of Ornithology* 122: 190-193; Figura 65).
4. Un inmaduro fotografiado por Laurent Demongin en New Island, islas Malvinas el 24 y 25 de diciembre de 2008 (Demongin *et al.* [2010] *op. cit.*).
5. Un ejemplar fotografiado por Mariana Martínez en el PN Monte León, Santa Cruz el 26 de noviembre de 2013. El mismo permaneció en el área al menos hasta el 9 de diciembre de ese año (ebird.org/checklist/S72780147).
6. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Adam y Alison Howe en Black Point, islas Malvi-



Figura 65. Pingüino de Snares *Eudyptes robustus*, New Island, islas Malvinas, 30 de noviembre de 2008 (Laurent Demongin)

nas el 21 de enero de 2014 (Morrison [2014] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2013*. Falklands Conservation; Morrison [2014] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 21: 16-17).
7. Un ejemplar fotografiado por Ariel Renán Alonso en Cabo Santo Domingo, departamento Río Grande, Tierra del Fuego el 20 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S51989793). La identificación fue confirmada por Santiago Imberti y Colin Miskelly (*in litt.*).
8. Un ejemplar observado por Canela Fernández en la estancia Palermo Aike, departamento Güer Aike, Santa Cruz el 19 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79741173).
Comentarios: Un adulto fotografiado por Fabio Olmos en Pebble Island, islas Malvinas el 11 y 12 de enero de 2006 fue mencionado como *Eudyptes robustus* (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros), y posteriormente reidentificado como PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome filholi* (ebird.org/checklist/S39208395).

ALBATROS CORONA BLANCA | *Thalassarche steadi* | R

Distribución: Nidifica en las islas Disappointment, Auckland, Bollons y Antípodas al S de Nueva Zelanda. Luego se distribuye por los mares australes siendo común en la costa occidental de Sudamérica, especialmente el centro y S de Chile (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un ejemplar hallado en una colonia de ALBATROS CEJA NEGRA *Thalassarche melanophrys* en Bird Island, Georgias del Sur durante febrero y octubre 2003. El mismo fue analizado genéticamente e identificado como *Thalassarche steadi* (Phalan *et al*. [2004] *Emu* 104: 359-361). Posteriormente se apareó con una hembra de *T. melanophrys* desde la temporada 2007/08 generando pichones esa temporada y las dos siguientes (Clarke *et al*. [2012] *British Birds* 105: 118-144).
2. Un ejemplar hallado muerto por Els Vermeulen y Alejandro Cammareri en San Antonio Oeste, departamento San Antonio, Río Negro el 4 de marzo de 2008 (Savigny & Carbajal [2015] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 180: 1-9). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
Taxonomía: Seguimos los lineamientos de Robertson & Nunn ([1998] *en* Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons), quienes consideran a las cuatro subespecies del ALBATROS DE TASMANIA *Thalassarche cauta* como especies distintas: *T. cauta*, *T. steadi*, *T. salvini* y *T. eremita*. Al igual que en otras especies del grupo, la identificación específica de los ejemplares inmaduros resulta en ocasiones imposible (Howell [2006] *Birding* 38: 56-59; Howell [2009] *Neotropical Birding* 4: 19-25).
Comentarios: Adultos observados cerca de las islas Malvinas podrían haber pertenecido a esta especie (White *et al*. [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee). Clarke *et al*. ([2012] *op. cit*.) lo consideran como un visitante raro en las islas Georgias del Sur, probablemente desde la pequeña población que migra hacia aguas templadas del océano Atlántico sur. Es posible que la mayoría de los ejemplares inmaduros registrados frente a la costa de Buenos Aires pertenezcan a esta especie (ver *Taxa No Asignados a Nivel de Especie*).
Especímenes (1): **MACN-Or-**69369

PAÍÑO VIENTRE BLANCO | *Fregetta grallaria* | R

Distribución: Regiones subtropicales del hemisferio sur. La subespecie *leucogaster* nidifica en las islas Saint Paul, Amsterdam y Tristan da Cunha de los océanos Índico y Atlántico (Onley & Scofield [2010]

Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World. Princeton University Press).
Registros: 1. Un ejemplar capturado y dibujado por Sidney Parkinson a bordo del HMS *Endeavour* en la desembocadura del río de la Plata (37°S) en diciembre de 1768 (Salvin [1876] *Ornithological Miscellany* 1: 223-238, 249-257). Al parecer el espécimen no fue conservado, ya que no se encuentra en las colecciones del NHMUK (Hein Van Grouw *in litt.*).
2. Registrada por Robert Murphy al norte de las islas Georgias del Sur el 15 de marzo de 1914 (Murphy [1914] *Auk* 31: 439-457).
3. Un individuo observado por John Dearborn y William Townsend al noroeste de las islas Georgias del Sur (52°20,7'S 40°05,9'W) el 10 de mayo de 1975 (Eakin *et al.* [1986] *Antarctic Research Series* 44: 69-86).
4. Un individuo observado por Stan da Prato unos 320 km al noreste de Cape Pembroke, islas Malvinas en agosto de 1983 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).
5. Un individuo observado por Mike Winter y William Bourne entre 110 y 150 km al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 24 de febrero de 1990 (Gregory [1994] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114: 12-20).
6. Un individuo observado por Mike Winter y William Bourne entre 110 y 150 km al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 3 de marzo de 1990 (Woods [2017] *op. cit.*).
7-8. Dos individuos registrados en la zona de los 61°S 62°W y 62°S 62°W el 29 de noviembre de 1992 (Orgeira [1997] *Hornero* 14: 184-192; Orgeira [2001] *Ornitología Neotropical* 12: 45-55; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
9-16. Ocho individuos registrados en la zona de los 45°S 51°W el 24 de diciembre de 1992 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
17-19. Tres individuos registrados en la zona de los 38°S 53°W el 2 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
20. Un individuo registrado en la zona de los 39°S 59°W el 3 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
21-22. Dos individuos registrados en la zona de los 46°S 56°W el 11 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
23-24. Dos individuos registrados en la zona de los 49°S 54°W el 12 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
25. Un individuo registrado en la zona de los 56°S 48°W el 13 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
26-27. Dos individuos registrados en la zona de los 60°S 44°W el 14 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
28. Un individuo registrado en la zona de los 54°S 61°W el 11 de enero de 1995 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
29. Un individuo registrado en la zona de los 41°S 61°W el 30 de noviembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
30-31. Dos individuos registrados en la zona de los 52°S 62°W el 2 de diciembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
32. Un individuo registrado en la zona de los 60°S 46°W el 6 de diciembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
33-46. Catorce individuos registrados en la zona de los 61°S 54°W el 7 de diciembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).
47-69. Un total de 23 individuos observados al norte y al este de las islas Malvinas entre febrero de 1998 y enero de 2001 (Woods [2017] *op. cit.*).
70. Un individuo observado por Santiago Imberti entre la isla de los Estados y las islas Malvinas el 3 de diciembre de 2004 (ebird.org/checklist/S27200236).

71-72. Dos individuos observados por Santiago Imberti entre 350 y 500 km al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 13 de marzo de 2005 (S. Imberti *en* Woods [2017] *op. cit.*).
73. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).
74-77. Cuatro individuos registrados en la zona de los 60°S 56°W el 10 de marzo de 2009 (José L. Orgeira IAA *in litt.*).
78. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).
79. Registrada por Pritam Baruah entre Tierra del Fuego y las islas Malvinas el 11 de junio de 2013 (ebird.org/checklist/S59094522).
80. Un ejemplar fotografiado por Mike Greenfelder frente a la costa de Buenos Aires el 26 octubre de 2017 (ebird.org/checklist/S40137531).
81. Un ejemplar fotografiado por Doug Gochfeld unos 450 km al este de las islas Malvinas el 20 febrero de 2019 (ebird.org/checklist/S53642608).
Taxonomía: En el pasado tratada como una subespecie del PAIÑO VIENTRE NEGRO *Fregetta tropica*. Steve Howell ([2010] *Dutch Birding* 32: 36-42) sugiere que existen unas cuatro o cinco especies de "paiños de vientre blanco": tres en el océano Pacífico y una o dos en el océano Atlántico. Tentativamente los registros argentinos son asignados a la forma *Fregetta* (*grallaria*) *leucogaster* (Gould, 1844) que nidifica en las islas Tristan da Cunha, Gough, Amsterdam y Saint Paul.
Algunos autores sugieren que *melanoleuca* es una forma de vientre blanco del PAIÑO VIENTRE NEGRO *Fregetta tropica*. En las islas Gough y Tristan da Cunha ocurre una confusa situación en donde coexisten dos formas con diferencias morfométricas, siendo las de Gough más pequeñas y de alas más cortas pero de patas más largas (Howell [2010] *op. cit.*).
Comentarios: Roberto Dabbene ([1922] *Hornero* 2: 241-254) menciona la forma *leucogaster* con relación al Atlántico sur, pero sin hacer referencia directa al territorio nacional. El mapa de esta especie presentado en dicho trabajo corresponde a la página 253 (uno de los mapas de la página anterior al parecer pertenece a *F. tropica*). Las observaciones efectuadas cerca de las islas Malvinas (White *et al.* [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee), fueron luego desestimadas por Woods ([2017] *op. cit.*).

PAÍÑO PINCOYA | *Oceanites pincoyae* | V

Distribución: Aguas alrededor de la isla de Chiloé y el seno de Reloncaví, Chile y zona adyacente de la Argentina (Harrison *et al.* [2013] *Auk* 130: 180-191).
Registros: **1**. Una hembra joven colectada por Andor Kovács en El Bolsón, departamento Bariloche, Río Negro el 15 de febrero de 1972 (Pearman [2000] *Hornero* 15: 141-143). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
2. Un macho adulto colectado por Andor Kovács en El Bolsón, departamento Bariloche, Río Negro el 5 de noviembre de 1983 (Pearman [2000] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Un individuo observado por Félix Vidoz en el lago Puelo a la altura del arroyo Ocinao, PN Lago Puelo, Chubut el 5 de febrero de 1997 (F. Vidoz *in litt.*).
4. Un individuo observado por Félix Vidoz, Néstor Palmetti, César Vigueras y Marcelo Aravena cerca de Puerto Bueno, PN Lago Puelo, Chubut el 29 de noviembre de 2003 (F. Vidoz *in litt.*).
5. Un ejemplar colectado y fotografiado por Félix Vidoz y Alberto Boyer cerca de la Puntilla de las Papas, PN Lago Puelo, Chubut el 16 de noviembre de 2006 (F. Vidoz *in litt.*; Figuras 66-67). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

Figuras 66-67. Paíño Pincoya *Oceanites pincoyae*, MACN-Or-71166, PN Lago Puelo, Chubut, 16 de noviembre de 2006 (Alberto Boyer)

6. Un ejemplar filmado por el guardaparque Nicolás Vallejo en el PN Lago Puelo, Chubut el 9 de febrero de 2014 (Félix Vidoz *in litt.*).
7. Un individuo observado por Félix Vidoz en el PN Lago Puelo, Chubut el 28 de abril de 2015 (F. Vidoz *in litt.*).
8. Un ejemplar fotografiado por el guardaparque Nicolás Vallejo en el PN Lago Puelo, Chubut el 18 de septiembre de 2017 (Félix Vidoz *in litt.*).
9. Un ejemplar fotografiado por Julián Torres en el PN Lago Puelo, Chubut el 3 de noviembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76758738). El registro figura como "no confirmado" por dicha fuente.
Taxonomía: Los especímenes provenientes de El Bolsón, Río Negro fueron publicados como los primeros PAÍÑO DE ELLIOT *Oceanites gracilis* de Argentina (Pearman [2000] *op. cit.*). Estos actualmente constituyen los paratipos de esta especie recientemente descripta para la ciencia (Harrison *et al.* [2013] *op. cit.*).
Comentarios: Balín Sívori, uno de los antiguos dueños del lago Esperanza, departamento Cushamen, Chubut comentó observar "varias veces sobre las olas al *tormentín*, un pajarito que caminaba sobre el agua cuando el lago estaba picado" (Félix Vidoz *in litt.*). Un espécimen de *Oceanites* capturado en el PN Nahuel Huapi, Río Negro permaneció depositado en el MP (Christie *et al.* [2004] *Aves del Noroeste Patagónico. Atlas y Guía*. LOLA), pero actualmente se encuentra perdido (Ignacio Roesler *in litt.*).
Especímenes (3): **MACN-Or-**52481, **MACN-Or-**53381, **MACN-Or-**71166

PAÍÑO CARA BLANCA | *Pelagodroma marina* | R

Distribución: Mayormente en mares templados y subtropicales del hemisferio sur. La subespecie nominal se reproduce en las islas Tristan da Cunha y Gough del océano Atlántico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).
Registros: 1. El ejemplar tipo provino de una captura y dibujos realizados por Sidney Parkinson a bordo del HMS *Endeavour* en diciembre de 1768. Joannis Latham ([1790] *Index Ornithologicus*. Volume II)

menciona la localidad como "mar austral, 37°S". Posteriormente Osbert Salvin ([1876] *Ornithological Miscellany* 1: 223-238, 249-257) la determina como en la desembocadura del río de la Plata a los 37°S. Al parecer el espécimen no fue conservado, ya que no se encuentra en las colecciones del NHMUK (Hein Van Grouw *in litt.*).
2. Registrada por el capitán Richard Päfsler frente a la costa patagónica (46,8°S 63°W) el 9 de mayo de 1913 (Päfsler [1915] *Ornithologische Monatsberichte* 23: 59-61). Esta quizás sea la fuente del comentario de Rodolphe Meyer de Schauensee ([1970] *A guide to the birds of South America*. Wynnewood. Livingston) con referencia a las aguas patagónicas.
3. Mencionada por Carlos Marelli para la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires (Marelli [1924] *Memorias del Ministerio de Obras Públicas 1922-1923*: 597-665). Esto fue repetido por Ringuelet & Aramburu ([1957] *Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires* 119: 1-94).
4. Mencionada sin detalles para las aguas frente a Mar del Plata, Buenos Aires (Meyer de Schauensee [1970] *op. cit.*).
5. Incluida para la avifauna argentina como visitante de altamar, sin mayores detalles (Olrog & Capllonch [1986] *Historia Natural. Suplemento* 2: 1-41).
6. Tres individuos observados a los 45°52'S 51°23'W el 24 de diciembre de 1992 (Montalti & Orgeira [1997] *Marine Ornithology* 25: 67).
7. Un individuo observado por William Curtis 230 km al norte de Cape Dolphin, islas Malvinas el 26 de septiembre de 1994 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).
8. Un individuo observado al sur de Tierra del Fuego (55°04'S 66°07'W) el 4 de junio de 1995 (Montalti & Orgeira [1997] *op. cit.*).
9. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).
10. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).
Comentarios: A. K. Ross ([1986] *Sea Swallow* 35: 66-67) describe esta especie como una de las presas obtenidas por un HALCÓN PEREGRINO *Falco peregrinus* unos 32 km al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 26 de marzo de 1986. Lamentablemente los restos no fueron conservados y la identidad del ave permanece sin confirmar (Woods [2017] *op. cit.*). Si bien optamos por incluir esta especie en la lista argentina, es imprescindible obtener mayor documentación que permita aclarar su estatus en aguas territoriales. El registro mapeado por Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides) seguramente corresponda a alguna de las citas mencionadas arriba.

PAÍÑO BOREAL | *Oceanodroma leucorhoa* | V

Distribución: Su área de cría comprende las costas de los océanos Atlántico y Pacífico norte, mientras que durante el invierno boreal se desplaza hacia mares tropicales. Las principales zonas de invernada de la población atlántica son el golfo de Guinea y las aguas frente a Brasil y Sudáfrica (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: **1**. Un ejemplar capturado y fotografiado por Steffen Hahn y Petra Quillfeldt en la península Potter de la isla King George, Shetland del Sur el 21 de febrero de 1996 (Hahn & Quillfeldt [1998] *Marine Ornithology* 26: 80; Figura 68).
2. Dos individuos observados por Santiago Imberti unos 240 km al sudeste de Miramar, Buenos Aires (40°20'S 57°07'W) el 14 marzo de 2000 (Imberti [2002] *Marine Ornithology* 30: 32-33).
3. Un individuo observado unas 120 millas al este de Puerto Stanley, islas Malvinas el 27 de marzo de 2003 (Black *et al.* [2004] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2003*. Falklands Conservation).

4. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).

Taxonomía: A veces incluida dentro del género *Hydrobates*. Especie politípica y de compleja variación geográfica, la forma nominal habita en el océano Atlántico (Ainley [1980] *Auk* 97: 837-853).

Comentarios: El ave capturada en Shetland del Sur (Hahn & Quillfeldt [1998] *op. cit.*) presentaba parche de incubación, insinuando que podría haber nidificado en esas islas.

Figura 68. Paíño Boreal *Oceanodroma leucorhoa*, King George Island, Shetland del Sur, 21 de febrero de 1996 (Steffen Hahn y Petra Quillfeldt).

PARDELA PATAS ROSAS | *Ardenna creatopus* | V

Distribución: Nidifica en las islas Juan Fernández y Mocha, en el océano Pacífico frente a Chile. Luego de la reproducción se desplaza hacia el norte llegando hasta Alaska (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Guillermo Harris en Punta Conos ubicada en el golfo San José, departamento Biedma, Chubut en mayo de 1981 (Mazar Barnett & Navas [1998] *Hornero* 15: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 69).

Taxonomía: Anteriormente en el género *Puffinus* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

Comentarios: Un individuo observado por David Doolittle en aguas del canal de Beagle frente a la isla Picton, Chile puede considerarse un registro limítrofe (ebird.org/checklist/S65973546).

Especímenes (1): **MACN-Or**-52790

Figura 69. Pardela Patas Rosas *Ardenna creatopus*, MACN-Or-52790, Punta Conos, Chubut, mayo de 1981 (Diego Monteleone)

PIQUERO DEL CABO | *Morus capensis* | V

Distribución: Se reproduce exclusivamente en las costas de Namibia y Sudáfrica. Fuera de la temporada reproductiva se dispersa hasta el golfo de Guinea y Mozambique (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo observado por Patrick Bergkamp en San Antonio Oeste, departamento San Antonio, Río Negro el 7 y 12 de noviembre de 1992 (Bergkamp [1995] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 115: 71).
2. Un ejemplar fotografiado por Margarita Acuña en el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 21 de enero de 1995 (Ramírez Llorens [1996] *Hornero* 14: 67-68).
3. Un ejemplar fotografiado por María Eugenia Echave, Patricia González y Vanesa Calvo en la bahía San Antonio, departamento homónimo, Río Negro el 19 de noviembre de 1995 (P. González *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La fotografía fue publicada posteriormente con una fecha errónea (Povedano [2016] *Aves de la provincia de Río Negro*. La Plata; Patricia González *in litt.*).
4. Un individuo observado por Patricia González, María Eugenia Echave y Vanesa Calvo en la bahía San Antonio, departamento San Antonio, Río Negro el 31 de octubre de 1996 (P. González *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
5. Un ejemplar fotografiado en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 23 de noviembre de 2007 (Rebstock *et al.* [2010] *Ostrich* 81: 167-169).
6. Un individuo observado en Punta León, departamento Rawson, Chubut el 29 de noviembre de 2007 (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*).

Figura 70. Piquero del Cabo *Morus capensis*, Punta León, Chubut, 17 de noviembre de 2008 (Walter Svagelj)

7-8. Un ejemplar fotografiado por Walter Svagelj en Punta León, departamento Rawson, Chubut el 17 de noviembre de 2008 (Figura 70). Posiblemente el mismo individuo fue observado en dicha localidad el 28 de noviembre de ese año (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*).
9. Un ejemplar fotografiado en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 25 de diciembre de 2008 (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*).
10. Un ejemplar fotografiado por Patricia González, Gimena Mora y Matías Suárez en Punta Villarino, departamento San Antonio, Río Negro el 5 de marzo de 2011. Dos días más tarde fue observado por Mirta Carbajal en la restinga Los Álamos, departamento San Antonio, Río Negro (Povedano [2016] *op. cit.*).
Comentarios: Todos los registros en territorio argentino corresponden a individuos adultos. Las observaciones realizadas en Punta León y Punta Tombo, Chubut muy probablemente correspondan al mismo ejemplar (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*). Un ejemplar fotografiado por Steve James en Las Grutas, departamento San Antonio, Río Negro en abril y junio de 2020 posiblemente se trate de esta especie (James [2020] *Neotropical Birding* 27: 5-13; ebird.org/checklist/S69762379).

PIQUERO PARDO | *Sula leucogaster* | V

Distribución: Especie politípica ampliamente distribuida en regiones tropicales. La subespecie nominal ocupa el Caribe y el océano Atlántico llegando hasta las costas de Brasil (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un adulto obtenido por César Hyppolite Bâcle en "*Buenos Aires (Argentina)*", sin fecha (Hellmayr & Conover [1948] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series*. Volume XIII. Part I). El espécimen se encuentra depositado en el MHNG.
2. Un juvenil capturado en el río de la Plata, Buenos Aires el 11 de julio de 1952. El mismo murió tres días después en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, y la fotografía del espécimen montado fue debidamente publicada (Haedo Rossi [1956] *Hornero* 10: 166-167). Este ejemplar al parecer se encuentra perdido en la actualidad, ya que no se encuentra en el MACN y tampoco en las colecciones del zoológico de Buenos Aires (Yolanda Davies y Rodrigo Fariña *in litt.*).
3. Un ejemplar observado por Pablo Canevari en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires en febrero de 1975 (P. Canevari *en* Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
4-5. Un ejemplar y dos huevos colectados por E. Biester y F. Hildebrandt supuestamente en las islas Malvinas el 3 de septiembre de 1966 y en octubre del mismo año respectivamente (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). Ambos fueron publicados como obtenidos en "Atlantik vor Brasilien, St. Pauls-Felsen" (Kinzelbach [2016] *Die Vögel. Aves. Verzeichnis des Bestands 2016. Zoologische Sammlung der Universität Rostock*. Basiliskenpresse). El espécimen (ZSRO-744) contiene los datos "*Falkland-Inseln 03.09.1966*", aunque preferimos tratarlo como un registro hipotético o probablemente erróneo.
Comentarios: Prosper Garnot ([1826] *Annales des Sciences Naturelles* 7: 39-59) mencionó a *Sula fiber* (= *Sula leucogaster*) como uno de los tres cormoranes que habitan las islas Malvinas, en su visita al archipiélago entre noviembre y diciembre de 1822. Esta cita fue repetida en numerosos trabajos, hasta que finalmente Michael Carins ([1974] *Ardea* 62: 242-245) realiza un minucioso análisis concluyendo que las aves descriptas por Garnot corresponden a inmaduros de CORMORÁN CUELLO NEGRO *Phalacrocorax magellanicus*. Los datos del espécimen del MHNG podrían referirse al sitio de compra e incluso obtenido en otras localidades visitadas por el colector como Centroamérica, Brasil o Senegal (Laurent Vallotton *in litt.*).
Especímenes (1): **MHNG**-156.065

GUANAY | *Phalacrocorax bougainvillii* | R

Distribución: Costa de Perú y N de Chile, con una población aislada en las costas del centro de Argentina (Orta [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Francisco Erize en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en enero de 1967 (Erize [1970] *Animals* 13: 235-237; Erize [1972] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 117-118).
2-3. Registrada en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en febrero de 1968 y febrero de 1969 (Francisco Erize *en* Boswall & Pritherch [1972] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 118-129).
4. Una hembra colectada por Jorge Rodríguez Mata en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 22 de diciembre de 1969. En ese momento había unas 50 parejas nidificando en el sitio (Anónimo [30.12.1969] *Diario Jornada*. Trelew & Rawson; Navas [1970] *Neotrópica* 16: 11-16; Erize [1972] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Unas diez parejas observadas y un macho colectado por Claës Olrog en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 14 de enero de 1971 (Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 267-274). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.
6. Un total de diez nidos hallados por Jeffery Boswall y Robin Prytherch en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut entre el 13 y el 19 de noviembre de 1971 (Boswall & Prytherch [1972] *op. cit.*).
7. Algunas parejas observadas por Jeffery Boswall, Donaldo MacIver y Douglas Fisher en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut entre el 10 y el 26 de octubre de 1972 (Boswall [1973] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 93: 33-36).
8. Unos 100 nidos observados por Mauricio Rumboll y Joseph Jehl en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 21 y 22 de noviembre de 1973 (Jehl & Rumboll [1976] *Transactions of the San Diego Society of Natural History* 18: 145-154).
9. Mencionada por Mauricio Rumboll como nidificando en bajo número en Cabo Dos Bahías, departamento Florentino Ameghino, Chubut sin fecha (Jehl & Rumboll [1976] *op. cit.*).
10. Varios ejemplares fotografiados y veinte anillados por Juan Daciuk en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en enero de 1974 (Daciuk [1977] *Hornero* 11: 349-360; Daciuk [1977] *Hornero* 11: 361-376).
11. Un macho joven y una hembra adulta colectados por Andor Kovács en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 26 de abril de 1978. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
12. Un macho adulto colectado por Andor Kovács en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 5 de noviembre de 1978. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
13. Un pequeño grupo fotografiado por Juan C. Chebez en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en diciembre de 1978 (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
14. Varios nidos fotografiados por Martín de la Peña en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 5 de noviembre de 1979 (de la Peña [1980] *Historia Natural* 1: 109-112).
15-17. Tres ejemplares adultos registrados en Punta León, departamento Rawson, Chubut durante las temporadas 1980/81 y 1981/82. La población de este sitio alcanzó los 9 ejemplares en el periodo 1982/83 (Malacalza [1984] *Contribución N°84*. CeNPat. Conicet).
18-19. Un total de 33 parejas registradas en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut durante las temporadas 1980/81 y 1981/82 (Malacalza [1984] *op. cit.*).
20. Siete parejas nidificando en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut durante la temporada 1982/83 (Malacalza [1984] *op. cit.*).
21. Varios ejemplares fotografiados por Carlos Saibene y Samuel Narosky en Punta Tombo, departa-

mento Florentino Ameghino, Chubut el 15 de noviembre de 1983. En ese momento había entre 7 y 10 nidos en el lugar (C. Saibene *in litt.*; ver también de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 3: 1-165). Las fotografías se encuentran depositadas en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP.
22. Un total de ocho individuos (tres parejas puras y dos parejas mixtas con el CORMORÁN REAL *Phalacrocorax albiventrer*) registradas en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut en diciembre de 1992 (Malacalza y Bertellotti [2001] *Ornitología Neotropical* 12: 83-86).
23-24. Un total de nueve parejas (tres en Punta León y seis en Punta Lobería, Chubut) censadas entre los años 1993 y 1995 (Yorio [1998] *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural; Yorio [1999] *Bird Conservation International* 9: 299-314). Es probable que algunas de las aves registradas en Punta Lobería correspondan a híbridos entre esta especie y *Phalacrocorax albiventer* (Malacalza & Bertellotti [2001] *op. cit.*).
25. Un individuo observado por Juan Manuel Grande en Punta León, departamento Rawson, Chubut el 29 de noviembre de 1999 (ebird.org/checklist/S31832035).
26. Cuatro individuos puros hallados en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut en diciembre de 1999. Dos de ellos estaban formando parejas mixtas con *Phalacrocorax albiventer* y los otros dos con híbridos entre *P. bougainvillii* x *P. albiventer* (Malacalza & Bertellotti [2001] *op. cit.*; Bertellotti *et al*. [2003] *Biodiversity and Conservation* 12: 743-747).
27. Cinco individuos (una pareja pura y tres individuos apareados con *Phalacrocorax albiventer* o con híbridos) observados por Germán Pugnali y otros observadores en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 18 de noviembre de 2002 (Pugnali [2002] *Nuestras Aves* 44: 6-7).
28. Cuatro individuos observados en el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego entre el 9 y el 18 de noviembre de 2002 (Savigny *et al.* [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires).
29. Walter Svagelj comenta que actualmente existe "un único individuo adulto de Guanay" en Punta León, departamento Rawson, Chubut sin mayores detalles (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Comentarios: Claës Olrog ([1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264) menciona que fueron unas 200 parejas las que se encontraban nidificando en Punta Tombo, Chubut en diciembre de 1969. El espécimen NMNH-A15682 posee una localidad errónea, tal como figura en su etiqueta (Christopher Milenksy *in litt.*). Los especímenes DMNS-16282 y DMNS-16719 corresponden a inmaduros de CORMORÁN CUELLO NEGRO *Phalacrocorax magellanicus* (Andrew Doll *in litt.*). Para un resumen sobre el estado de las poblaciones de cormoranes en la costa patagónica ver Frere *et al.* ([2005] *Hornero* 20: 35-52). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *op. cit.*).
Especímenes (5): **MACN-Or-**51508, **MACN-Or-**52482, **MACN-Or-**52483, **MACN-Or-**52484, **CO-FML-**13155

ÁGUILA MONERA | *Morphnus guianensis* | R

Distribución: Desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Sudamérica, la Amazonía, SE de Brasil, E de Paraguay y NE de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).
Registros: 1. Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-216) la incluye para "Paraguay y Misiones Argentinas", y comenta la colecta de un ejemplar en la frontera entre Paraguay y Argentina (27°18'S) en octubre de 1887. Este dato quizás sea la fuente para la posterior mención

Figura 71. Águila Monera *Morphnus guianensis*, MJF-s/n, Cerro Azul, Misiones, entre 1980 y 1981 (Diego Monteleone)

de Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102). El espécimen al parecer se encuentra perdido.
2. Un ejemplar colectado en Cerro Azul, departamento Leandro Alem, Misiones entre fines de 1980 y mayo de 1981 (Cecilia Foerster *com. pers.*). El espécimen se encuentra depositado en el MJF (Figura 71).
3. Una pareja observada por Mauricio Rumboll y Roberto Straneck en el PN Iguazú, Misiones en septiembre de 1980 (Olrog [1985] *en* Newton & Chancellor [editores] *Conservation Studies on Raptors.* ICBP Technical Publication N°5).
4. Un individuo observado por Javier Pereira y Pablo Rodríguez en el PP Urugua-í, Misiones el 23 de mayo de 1996 (J. Pereira y P. Rodríguez *en* Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
5. Un individuo observado por Mark Pearman en el PP El Piñalito, Misiones el 26 de septiembre de 1999 (Pearman [2001] *Cotinga* 16: 76-80).
6. Registrada por Ricardo Melsew y Agustín Paviolo en el PN Iguazú, Misiones sin fecha ni otros detalles (Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).
Comentarios: La observación realizada por Freddy Burgos cerca de Tobuna, departamento San Pedro, Misiones (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros) fue finalmente descartada por el mismo observador (Freddy Burgos *in litt.*). El espécimen depositado en el MJF ya había sido mencionado en la literatura (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*; Chebez [2008] *op. cit.*). La proveniencia y fecha de dicho espécimen fueron recientemente aclaradas mediante una entrevista con la curadora del Museo de la Selva Juan Foerster (Cecilia Foerster *com. pers.*). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (1): MJF-s/n

HARPÍA | *Harpia harpyja* | R

Distribución: Desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Sudamérica, SE de Brasil, Paraguay y N de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).
Registros: 1-2. Mencionada para Chaco y Orán por Martín de Moussy, sin mayores detalles (de Moussy [1860] *Description géographique et statistique de la Confédération Argentine*. Tome Deuxieme. Librairie de Firmin Didot Frères). Estas localidades fueron repetidas por varios autores posteriores.
3. Un ejemplar colectado en la "sierra de Misiones" en el año 1887 (Bertoni [1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-216). Este dato quizás sea la fuente para la posterior mención de San Pedro, departamento homónimo, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102). El espécimen al parecer se encuentra perdido en la actualidad.
4. Observada por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en el año 1923 (F. Kruse *en* Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta; Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30).
5. Un individuo adulto observado por Claës Olrog en la frontera entre Tucumán y Salta en octubre de 1950 (Olrog [1950] *Acta Zoológica Lilloana* 9: 471-474).
6. Un ejemplar cazado en Campo Grande, departamento Cainguás, Misiones sin más detalles (Foerster [1972] *Neotrópica* 18: 146-148). Al parecer el espécimen no fue conservado.
7. Un ejemplar capturado y mantenido vivo durante una semana en Eldorado, departamento homónimo, Misiones sin fecha (Foerster [1972] *op. cit.*). Aparentemente el espécimen no fue conservado.
8. Una hembra juvenil capturada por Otto Krausmann en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones y entregada a Juan Foerster el 25 de mayo de 1972 (Foerster [1972] *op. cit.*). El ejemplar permaneció durante años en el zoológico Zoo Bal Park de esa localidad, hasta que finalmente murió en julio de 2001 (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros; Guillermo Gil *in litt.*). El espécimen se encuentra depositado en el CNH.
9. Una hembra adulta colectada en Palmera Fondo, departamento San Pedro, Misiones en abril de 1958 (Navas & Bó [1991] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 15: 95-106). Al parecer había sido capturada viva por Müller en el km 46 de la ruta provincial n°17 entre Eldorado y Bernardo de Irigoyen, Misiones en el año 1958 (Federico Kruse *en* Forcelli *et al.* [1985] *op. cit.*; Chebez [1992] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
10. Un ejemplar colectado por Rubén Maletti en Cerro Moreno, departamento Cainguás, Misiones antes de 1980 (Chebez [1992] *op. cit.*; Ordano & Bosisio [1997] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 117: 77-79). El espécimen se encuentra depositado en el MFA.
11. Un individuo observado por Guillermo Gil, Justo Herrera, Carlos Galliari y Miguel Rinas en el arroyo Urugua-í, departamento Iguazú, Misiones el 22 de agosto de 1986 (Chebez [1992] *op. cit.*).
12. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa, en base a la literatura previa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52).
13. Un antiguo nido hallado en el paraje Campana (26°47'S 54°55'W), departamento San Pedro, Misiones el 28 de abril de 1987. El mismo se encontraba activo al menos hasta julio de 1984, y un juvenil fue capturado a unos 2 km del lugar a fines de 1987 (Chebez *et al.* [1990] *Hornero* 13: 155-158).
14. Un pichón capturado cerca del arroyo del Niño, departamento Eldorado, Misiones en noviembre de 1987. El nido fue visitado por Juan C. Chebez el 24 de abril de 1988 (Chebez *et al.* [1990] *op. cit.*). El ejemplar aún permanece en el zoológico Zoo Bal Park de Montecarlo, departamento homónimo, Misiones (Guillermo Gil *in litt.*).
15. Un antiguo nido hallado en la sierra Morena, departamento Iguazú, Misiones el 4 de septiembre de 1988. En el lugar se encontró un pichón lastimado que murió al poco tiempo, y cuyo espécimen permaneció en el centro de visitantes del PP Urugua-í, Misiones (Chebez *et al.* [1990] *op. cit.*). El espécimen al parecer se encuentra perdido (Guillermo Gil *in litt.*).

16. Un nido exitoso hallado en el establecimiento María Magdalena, departamento Eldorado, Misiones a fines de 1990. El mismo fue estudiado por Eduardo De Lucca y otros investigadores entre agosto de 1991 y marzo de 1992 (De Lucca [1996] *Hornero* 14: 70-72). Algunas fotografías obtenidas por Daphne Cooper de Colcombette fueron publicadas posteriormente (Chebez [2008] *op. cit.*).
17. Registrada en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones el 19 de junio de 1995 (Mark Pearman *en* Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Puerto Iguazú).
18. Registrada por O. Barquinero en el puente de los López, departamento San Pedro, Misiones en el año 1997 (O. Barquinero *en* Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*).
19. Un nido caído hallado por Jorge Anfuso sobre el arroyo Victoria cerca de Pozo Azul, departamento San Pedro, Misiones en el año 1999. El pichón al parecer fue capturado y vendido en la zona de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Brasil (Anfuso *et al.* [2008] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 21: 1-13).
20. Un juvenil filmado por Luis Sáenz en el campo Los Palmitos, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en noviembre de 2003. Posteriormente se lo volvió a hallar junto a un nido y dos adultos, que fueron estudiados por Jorge Anfuso y otros investigadores entre marzo y noviembre de 2004 (Anfuso *et al.* [2008] *op. cit.*).
21. Un adulto observado por Claudio Maders y Hugo Geier al sur del PP Esmeralda cerca de la comunidad Tacuarujú, Misiones en el año 2004 (Bodrati *et al.* [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina.* Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).
22. Mencionada sin detalles para el camino hacia la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones (Ricardo Melsew *en* Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).
23. Una pareja observada por Ignacio Roesler, Mark Pearman y Emilio Jordan en el PN Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 2007 (I. Roesler *en* Anfuso *et al.* [2008] *op. cit.*).
24. Un adulto observado por Alejandro Bodrati en el límite entre la reserva natural Guaraní y la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 26 de junio de 2012 (Bodrati [2016] *Nuestras Aves* 61: 26).
25. Un individuo adulto observado por Horacio Matarasso y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 23 de julio de 2013 (Palacio *et al.* [2016] *Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs) del Parque Nacional Iguazú. Año 2010-2015*. APN; ebird.org/checklist/S21045549).
26. Un ejemplar inmaduro colectado en la provincia de Misiones, sin datos de fecha ni colector (Daniel Acosta *com. pers.*). El espécimen se encuentra exhibido en el CNH.
Comentarios: Claës Olrog ([1950] *op. cit.*) menciona un ejemplar inmaduro cazado en la localidad de Timbó, departamento Burruyacu, Tucumán e incorporado a la COFML el 10 de agosto de 1949. Este ejemplar fue reidentificado como ÁGUILA CORONADA *Buteogallus coronatus* (Chebez [1995] *Nuestras Aves* 31: 21-23). Los registros recientes de una hembra adulta provenientes del PN Calilegua, Jujuy no fueron incluidos debido a que existen dudas con respecto al origen del ave (Morales *et al.* [2019] *Nuestras Aves* 64: 8-10). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (4): **MACN-Or-**38203, **MFA-ZV-**2020, **CNH-**s/n, **CNH-**s/n

ÁGUILA CRESTUDA NEGRA | *Spizaetus tyrannus* | R

Distribución: Desde México hasta el N de Sudamérica, SE de Brasil, Paraguay y NE de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).

Registros: **1**. Una hembra adulta colectada por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 2 de abril de 1912 (Dabbene [1916] *Physis* 2: 428; Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la colección Shipton de la FML.
2. Un ejemplar colectado por Francisco Manuel Rodríguez en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones el 14 de septiembre de 1912 (Dabbene [1916] *op. cit.*; Dabbene [1926] *Hornero* 3: 390-396). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Un individuo observado por William Partridge en el PN Iguazú, Misiones con fecha 3 de septiembre sin precisar el año (Partridge [1990] *Nuestras Aves* 23: 21-24).
4. Un individuo observado en dos ocasiones por Andrés Giai en el arroyo Urugua-í, departamento Iguazú, Misiones en agosto de 1948 (Giai [1952] *Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Parte 1*. Mundo Agrario. Editorial Haynes).
5. Un individuo observado por un grupo de cazadores en la provincia de Misiones, en octubre de 1949. El mismo intentó ser colectado, aunque sin éxito (Giai [1952] *op. cit.*).
6. Un ejemplar colectado por Pedro Kowaliczin en Campo Viera, departamento Oberá, Misiones en junio de 1984 (Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30). El espécimen permaneció depositado en el CHMO, pero actualmente se desconoce su paradero (Graciela Ayala *in litt.*).
7. Un individuo observado sobre la ruta nacional nº11 unos 50 km al norte de la ciudad de Formosa, departamento Formosa, Formosa el 21 de noviembre de 1985 (Salvador & Narosky [1987] *Nuestras Aves* 13: 9-11).
8. Un ejemplar herido cerca del arroyo Bonito de la localidad de Montecarlo, departamento homónimo, Misiones a fines de 1987. El mismo permaneció en el zoológico Zoo Bal Park de esa localidad al menos hasta septiembre de 1988 (Chebez [1989] *Nuestras Aves* 20: 6-7).
9. Un juvenil capturado en Leandro Alem, departamento homónimo, Misiones en el año 1990 (Jorge Anfuso *in litt.*). El mismo permaneció durante años en el centro de recría Güirá Oga de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones (ver Cámara [1996] *Nuestras Aves* 35: 17-20).
10. Un individuo observado por Flavio Moschione en la RP Guaycolec, Formosa el 5 de mayo de 1991 (F. Moschione *en* Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).
11. Un individuo observado por Jorge Anfuso en el PN Iguazú, Misiones en octubre de 1991 (J. Anfuso *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
12. Una pareja observada por Jorge Anfuso en el PN Iguazú, Misiones el 15 y 17 de noviembre de 1991 (J. Anfuso *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
13. Un individuo observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 11 de marzo de 1993 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
14. Un individuo observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 3 de junio de 1993 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
15. Dos adultos observados por Julián Baigorria y Facundo Barbar en el departamento General Manuel Belgrano (26°01'31,5''S 54°37'W), Misiones el 26 de marzo de 2004 (Baigorria *et al.* [2008] *Nuestras Aves* 53: 36).
16. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el PP Moconá, Misiones el 14 de julio de 2004 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1058380).
17. Una pareja observada por Agustín Quaglia en el departamento General Manuel Belgrano (26°01'01,8"S 54°07'35,3"W), Misiones el 22 de septiembre de 2004 (Baigorria *et al.* [2008] *op. cit.*).
18. Un individuo observado cerca del paraje El Socorro del PP Esmeralda, Misiones en febrero de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
19. Un adulto grabado por Alejandro Bodrati en la seccional 101 del PP Urugua-í, Misiones el 4 de junio de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*; xeno-canto.org/707448).
20. Un individuo observado por Daniel Almirón y Norberto Oste en el establecimiento San Jorge,

departamento Iguazú, Misiones el 9 de septiembre de 2008 (ebird.org/checklist/S20171928).
21. Un adulto observado por Emilio White en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones en agosto de 2009 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).
22. Un adulto observado por Alejandro Bodrati, Juan I. Areta y Emilio White en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 28 de noviembre de 2009 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*).
23. Un adulto observado en el PP Cruce Caballero, Misiones el 5 de diciembre de 2009 (Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64). El año 2010 referido en el artículo es un error (Alejandro Bodrati *com. pers.*).
24. Un ejemplar fotografiado por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 10 agosto de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=23066).
25. Un individuo observado por Matías Martínez en arroyo Yacuy del PN Iguazú, Misiones en el año 2013 (Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).
26. Un individuo observado por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 8 de mayo de 2013 (ebird.org/checklist/S14043258).
27. Mencionada sin detalles para la provincia de Salta (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo).
28. Varias observaciones y fotografías de una pareja y un juvenil en Puerto Esperanza, departamento Iguazú, Misiones entre agosto de 2014 y abril de 2015 (Martínez [2016] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 189: 1-7). Los ejemplares continúan siendo registrados en dicha localidad (ebird.org).
29. Un individuo observado por Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 4 de noviembre de 2016 (G. Moresco *en* Casado [2016] *Especies de vertebrados de valor especial del Parque Nacional Iguazú*. APN).
30. Un adulto fotografiado por Gabriel Acevedo en el PN Iguazú, Misiones el 27 de agosto de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=283757).
31. Un ejemplar escuchado por Giselle Mangini y Juan Manuel Fernández en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 5 de septiembre de 2018 (ebird.org/checklist/S48548512).
32. Un individuo observado por Fernando Cabral y Elvis Ramírez en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 6 de octubre de 2018 (ebird.org/checklist/S49000345).
33. Un adulto fotografiado por Sergio Moya al sudoeste de Leandro Alem, departamento homónimo, Misiones el 18 de septiembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76265112).
34. Un ejemplar grabado por Miguel Castelino y otros observadores en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 8 de mayo de 2021 (ebird.org/checklist/S87505625). Por el momento la grabación no se encuentra disponible.
35. Registrada por Marcelo Gavensky en el PN Iguazú, Misiones el 15 de mayo de 2021 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1402812).
35. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 30 de julio de 2021 (ebird.org/checklist/S92503600).
36. Un ejemplar grabado por Fernando Cabral en el PP Caá Yarí, Misiones el 19 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95450279). Por el momento la grabación no se encuentra disponible.
37. Un ejemplar fotografiado por Marcos Lartigau en la reserva privada San José, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 6 de noviembre de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=471667).
38. Un ejemplar fotografiado por Ignacio Marcilese en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 19 de mayo de 2022 (ebird.org/checklist/S110694915).
Comentarios: Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (2): **MACN-Or-**8395, **COFML-SHIPTON-**060

AGUILUCHO GRIS | *Buteo nitidus* | R

Distribución: La subespecie *pallidus* en Bolivia, S de Brasil y N de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).

Registros: 1. Mencionada por Eduardo Holmberg para la fauna argentina, sin detalles (Holmberg [1898] *en* de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires).

2. Un adulto colectado por Johan Mogensen en Las Palmas, departamento Bermejo, Chaco el 5 de junio de 1915 (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la colección Shipton de la FML (Figura 72).

3. Mencionada por Andrés Giai para el departamento 9 de Julio, Santa Fe (Giai [1950] *Hornero* 9: 121-164).

4. Un adulto observado por Claës Olrog en la sierra de Calilegua, departamento Ledesma, Jujuy en noviembre de 1971 (Olrog [1985] *en* Newton & Chancellor [editores] *Conservation Studies on Raptors*. ICBP Technical Publication N°5).

5-7. Individuos adultos observados por Claës Olrog en el extremo oriental de la provincia de Chaco en octubre de 1974, noviembre de 1976 y noviembre de 1981 (Olrog [1985] *op. cit.*).

8-9. Mencionada sin detalles para el oeste de Castelli, departamento General Güemes, Chaco y para el centro de dicha provincia (Contreras *et al.* [1990] *Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación Vida Silvestre Argentina).

Figura 72. Aguilucho Gris *Buteo nitidus*, COFML-SHIPTON-510, Las Palmas, Chaco, 5 de junio de 1915 (Sebastián Aveldaño, Instituto Miguel Lillo)

10-12. Un total de tres individuos observados en el sector oriental de la provincia de Formosa entre junio de 1984 y octubre de 1993 (Contreras [1993] *Nótulas Faunísticas* 39: 1-4).

13. Mencionada sin detalles para el noroeste de la provincia de Corrientes (Contreras *et al.* [1994] *Nótulas Faunísticas* 52: 1-8).

14. Observada en la estancia Puerto Valle, departamento Ituzaingó, Corrientes en enero de 1990 (Contreras *et al.* [1994] *op. cit.*).

15. Un individuo observado por Yolanda Davies en Profundidad, departamento Candelaria, Misiones el 29 de marzo de 1993 (Contreras *et al.* [1994] *op. cit.*).

16. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en el PN Río Pilcomayo, Formosa el 7 de junio

de 1995 (López-Lanús [1997] *Inventario de las aves del Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina*. LOLA).
17. Una pareja observada por Bernabé López-Lanús en el PN Río Pilcomayo, Formosa el 27 de julio de 1995 (López-Lanús [1997] *op. cit.*).
18. Un individuo observado por Pedro Blendinger en la finca El Oculto (23°05'S 64°32'W), departamento Orán, Salta entre el 13 y el 16 de enero de 2001 (Malizia *et al.* [2005] *Ornitología Neotropical* 16: 231-251; P. Blendinger *in litt.*).
19. Un individuo observado por Germán Pugnali en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 23 de octubre de 2003 (ebird.org/checklist/S26745026).
20. Un individuo observado por Martín Manassero y Horacio Luna en el paraje San Juan, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 de octubre de 2005 (Luna & Manassero [2008] *Nuestras Aves* 52: 12-13).
21. Una pareja observada por Martín Manassero y Horacio Luna en la estancia Santa María, departamento General Obligado, Santa Fe el 19 de agosto de 2006 (Luna & Manassero [2008] *op. cit.*).
22. Registrada en la estancia La Blanca, departamento Santo Tomé, Corrientes entre septiembre de 2003 y abril de 2004 (Capllonch *et al.* [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 483-498).
23. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en Capioví, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 15 de mayo de 2015 (ebird.org/checklist/S23490999).
Taxonomía: Para un estudio sobre poblaciones ver Millsap *et al.* ([2011] *Condor* 113: 326-339). Estos autores afirman que las subespecies *plagiatus* (desde Estados Unidos hasta el noroeste de Costa Rica) y *nitidus* (desde el sudoeste de Costa Rica hasta el norte de Argentina) deberían ser consideradas especies distintas.
Comentarios: Ignacio Roesler y Matías Juhant ([2004] *I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de Rapaces.* La Plata) sospechan que los registros de *Buteo nitidus* en el PN Calilegua, Jujuy podrían ser confusiones con el AGUILUCHO ALAS ANCHAS *Buteo platypterus*. Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (1): COFML-SHIPTON-510

MARTÍN PESCADOR ENANO | *Chloroceryle aenea* | R

Distribución: La subespecie nominal desde Costa Rica hasta la mitad N de Sudamérica, incluyendo N de Bolivia, Paraguay, N de Argentina y centro-sur de Brasil (Woodall [2001] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 6. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo observado por Judith Hutton en el PN Iguazú, Misiones en septiembre de 1981 (Chebez [2009] *Otros que se van.* Albatros).
2. Un ejemplar hallado muerto por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 28 de julio de 1988 (Castelino [1990] *Nótulas Faunísticas* 21: 1-2). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 24 de septiembre de 1993 (F. Moschione *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
4. Un individuo observado por Robert Williams, Natasha White y Guy Kirwan en el PN Iguazú, Misiones el 16 de marzo de 1997 (Williams & White [1997] *Cotinga* 8: 91).
5. Registrada por José Vizcaichipi en la laguna Galarza, departamento Santo Tomé, Corrientes en el año 2005 (J. Vizcaichipi *en* López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).

6-7. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati sobre la ruta provincial nº22, departamento San Pedro, Misiones el 25 de mayo y el 18 de julio de 2009 (A. Bodrati *en* de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 7: 1-344). Uno de los avistajes se efectuó cerca del poblado de Cruce Caballero (26°36'13''S 53°55'00''W) (A. Bodrati *in litt.*).
8. Un ejemplar fotografiado por Juan Díaz Colodrero en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes en septiembre de 2011 (J. Díaz Colodrero *in litt.*).
9. Un individuo observado por Juan Díaz Colodrero en el arroyo Uruzú del PP Urugua-í, Misiones sin fecha (J. Díaz Colodrero *in litt.*).
10. Una pareja observada (macho fotografiado) por Emilio Gonzáles en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes el 27 de marzo de 2012. Los ejemplares permanecieron durante varios días en la zona (Gonzáles & Giraudo [2014] *Nuestras Aves* 59: 9-11).
11. Una hembra hallada muerta en el PN Iguazú, Misiones sin fecha. La misma fue ingresada a la colección del MACN el 5 de mayo de 2012 (Sebastián Cabanne *com. pers.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
12. Una hembra fotografiada por Diego Xargay en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes el 14 de abril de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=48455).
13. Una hembra observada por Alejandro Bodrati y Luis Pagano en la estancia La Blanca, departamento Santo Tomé, Corrientes el 13 de septiembre de 2016 (L. Pagano *obs. pers.*).
14. Una hembra fotografiada por Juan Carlos Lancioni y Diego Pérez en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes el 26 de mayo de 2018 (ebird.org/checklist/S70572200).
15. Un macho fotografiado por Walter Jacobo en Bahía Carayá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 28 de marzo de 2019 (ebird.org/checklist/S54513339).
16. Un ejemplar fotografiado por Natalia Tenaglia en el portal Cambyretá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 22 de julio de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=405494).
17. Un ejemplar fotografiado por Alejandra Boloqui, Sabina de Lucca y Diego Demarco en la reserva privada Don Luis, departamento Ituzaingó, Corrientes el 28 y 29 de julio de 2020 (ebird.org/checklist/S71899021).
Especímenes (2): MACN-Or-53351, **MACN-Or-**72906

CHARAO | *Amazona pretrei* | R

Distribución: Restringida a los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina en el SE de Brasil. Ocasionalmente ingresa al E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: **1**. Un macho colectado por Francisco Manuel Rodríguez en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en diciembre de 1909. El mismo habia sido publicado como de "octubre de 1909" (Orfila [1938] *Hornero* 7: 1-21). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 73).
2. Un macho colectado en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en septiembre de 1917 (Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP). El espécimen no pudo ser hallado en la colección del MACN.
3. Grandes bandadas observadas por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en el año 1924 (F. Kruse *en* Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta).
4. Un individuo observado por Juan C. Chebez en el arroyo Urugua-í cerca del barrero Palacio, departamento Iguazú, Misiones en febrero de 1980 (Chebez *et al.* [1981] *Iguazú* 1: 1-98; Chebez [1985] *Nuestras Aves* 6: 17-19).

Figura 73. Charao *Amazona pretrei*, MACN-Or-8080, Santa Ana, Misiones, diciembre de 1909 (Luis Pagano)

5. Tres individuos observados por Hernán Fernández en el PP de la Araucaria, Misiones en marzo de 1995 (H. Fernández *en* Wege & Long [1995] *Key Areas for threatened birds in the Neotropics*. BirdLife Conservation Series N°5; Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA).
6. Tres individuos observados por Federico Bruno y Ramón Olivera en el PP de la Araucaria, Misiones el 13 de mayo de 2000 (F. Bruno *en* Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
7. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PP de la Araucaria, Misiones el 3 de marzo de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
8. Dos individuos observados por Pablo Grilli en el PP de la Araucaria, Misiones en abril de 2005 (P. Grilli *in litt.*).

Comentarios: Tommaso Salvadori ([1891] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 20. London) cita un ejemplar del "Río de la Plata". Este espécimen al parecer se encuentra perdido, aunque existe otro con la misma localidad (Knox & Walters [1994] *Extinct and Endangered Birds in the Collections of The Natural History Museum*. The British Ornithologists' Club. Occasional Publications N°1; Hein van Grouw *in litt.*). Un ejemplar adulto sin número, fecha ni datos de colector se encuentra depositado en el MACN y figura como proveniente de "*Tucumán*". Los ejemplares sin datos depositados en el MRAC al parecer se encuentran actualmente en el CNH (Chebez [1994] *op. cit.*; Damián Lozano y Daniel Acosta *in litt.*).

El registro efectuado por Flavio Moschione y Leonardo Pastorino al norte de Garuhapé, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 11 de diciembre de 1982 (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*) fue posteriormente rectificado como perteneciente al LORO VINOSO *Amazona vinacea* (Alejandro Bodrati *com. pers.*). De la misma manera, la observación de Flavio Moschione y Javier San Cristóbal al sur de Candelaria, departamento homónimo, Misiones el 18 de julio de 1987 (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*;

Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros) también correspondía a *Amazona vinacea* (Segovia & Cockle [2012] *Hornero* 27: 27-37).
Mencionada con dudas para el PN Mburucuyá, Corrientes en base a una observación efectuada por David Corfield y Judith Hutton el 2 de enero de 1992 (Gómez & Babarskas [1992] *en* Gómez *et al.* [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN). Posteriormente Chatellenaz *et al.* ([2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160) la excluyen del listado asumiendo que se trató de un error. Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (1): **MACN-Or**-8080

LORO NUCA ESCAMADA | *Amazona mercenarius* | V

Distribución: Andes desde Venezuela hasta el N de Bolivia, entre los 1500-3000 msnm (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un ejemplar colectado por Georg Hieronymus en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta en el año 1872 (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324). El espécimen se encuentra depositado en el MZUC (Figura 74).
Comentarios: Nores & Yzurieta ([1994] *Bird Conservation International* 4: 313-328) mencionan la fecha de captura como del año 1882. Según las colecciones botánicas depositadas en el herbario CORD (UNC-Conicet), Georg Hieronymus visitó junto a Paul Lorentz la zona de Orán en el año 1873 (ver además Vervoorst [1972] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 49: 63-75).
Especímenes (1): **MZUC**-886

Figura 74. Loro Nuca Escamada *Amazona mercenarius*, MZUC-886, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, año 1872 o 1873 (Luis Pagano)

GUACAMAYO AZUL | *Anodorhynchus glaucus* | R

Distribución: Anteriormente en el SE de Paraguay, NE de Argentina, SE de Brasil y NO de Uruguay (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1-2. José Sánchez Labrador ([1767] *Peces y aves del Paraguay natural ilustrado*. Editorial Castex) la menciona como abundante en la orilla oriental del río Uruguay y rara en las selvas del río Paraguay aproximadamente entre los años 1753 y 1767. El mismo autor comenta que durante esos años existía un ejemplar aparentemente domesticado en la reducción jesuítica La Concepción de

Nuestra Señora (actualmente Concepción de la Sierra), departamento Concepción, Misiones.
3-4. Algunas parejas observadas por Félix de Azara entre los 27° y 29° de latitud sur. Este autor comenta que los pobladores lo mencionan hacia el sur hasta los 33°30'S, lo que correspondería a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe (Azara [1805] *Apuntamientos para la Historia Natural de los Páxaros del Paragüay y Rio de la Plata*. Volumen 3. Imprenta de la viuda de Ibarra).
5. Un número no determinado de ejemplares colectados por Alcide d'Orbigny en Rincón San Luis, ubicado cerca de la estancia Rincón de Luna y el río Batel (= Esteros del Batel), Corrientes en julio de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale*. Paris). Uno de los especímenes se encuentra depositado en el MNHN (Figura 75).
6. Mencionada por Alcide d'Orbigny ([1835-1847] *op. cit.*) como observada y colectada en Paso Reito cerca del río Santa Lucía, Corrientes en julio de 1827. Los ejemplares no fueron conservados o se encuentran perdidos en la actualidad.
7. Un número no determinado de ejemplares obtenidos por Alcide d'Orbigny en los alrededores de Iribicuá (unas siete leguas al este de Itatí), departamento Itatí, Corrientes en diciembre de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *op. cit.*). Las aves fueron utilizadas como alimento por los integrantes de la expedición.
8. Varias parejas observadas por Alcide d'Orbigny en una navegación por el río Paraná desde Iribicuá (unas siete leguas al este de Itatí), departamento Itatí hasta Itá Ibaté, departamento General Paz, Corrientes en diciembre de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *op. cit.*).

Figura 75. Guacamayo Azul *Anodorhynchus glaucus*, MNHN-ZO-MO-2003-3617, Corrientes, julio de 1827 (Patrick Boussès, Muséum National d'Histoire Naturelle)

9. Mencionada por Alcide d'Orbigny como habitante a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay entre los 27° y 31° de latitud sur (A. d'Orbigny *en* Saint-Hilaire [1837-1838] *Histoire naturelle des perroquets*. Levrault). En el río Paraná la localidad más austral mencionada por este viajero es Santa Lucía (29°S), departamento Lavalle, Corrientes. Por lo tanto las mayores latitudes deberían corresponder al río Uruguay (Collar *et al*. [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP).

10. Un ejemplar colectado supuestamente por Flamant en "*Corrientes*", sin fecha (Collar *et al*. [1992] *op. cit.*). El mismo perteneció a la colección de Adolphe Boucard y fue presentado por Philip Sclater ante la Sociedad Zoológica de Londres en el año 1879 (Sclater [1879] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1879: 551). El espécimen se encuentra depositado en el MNHN.

11. Un ejemplar proveniente de "*Frontière du Paraguay, Rep. Argentine*", sin más detalles (Collar *et al*. [1992] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MHNG, y fue ingresado a los catálogos de dicha colección alrededor de julio de 1831 (Laurent Vallotton *in litt*.).

12-13. Dos ejemplares colectados por Thomas Jefferson Page en "*Corrientes*" el 1 de agosto de 1854 (Page [1859] *La Plata, the Argentine confederation, and Paraguay*. Harper & Brothers). La localidad concreta aparentemente sería el arroyo Riachuelo, departamento Capital, Corrientes (Collar *et al*. [1992] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el NMNH.

14. Un ejemplar supuestamente colectado por Thomas Jefferson Page cuya etiqueta dice "*Exploration of the Paraná: Capt. T.J. Page*". Posteriormente fue agregada la leyenda "*March 1860*", lo que sugiere una proveniencia diferente (Collar *et al*. [1992] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH.

15. Mencionada por Martín de Moussy para la provincia de Corrientes, sin mayores detalles (de Moussy [1860] *Description géographique et statistique de la Confédération Argentine*. Tome Deuxieme. Librairie de Firmin Didot Frères).

16. Mencionada como *Ara glauca* por el comandante Luis Fontana con referencia a la región chaqueña (Fontana [1881] *El gran chaco*. Imprenta de Ostwald y Martínez).

17. Una pareja observada sobre el río Pilcomayo a los 23°S de latitud, Formosa (Baldrich [1890] *Las Comarcas Vírgenes. El Chaco Central Norte*. Imprenta de Jacobo Peuser).

18. Mencionada por Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102) como habitante de las costas de los ríos Paraná (27°S) y Uruguay (29°S).

19. Unas pocas parejas observadas por Félix Contreras cerca de Riachuelo, departamento Capital, Corrientes entre los años 1900 y 1915 (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Bertonatti [2016] *en* López de Casenave & González Táboas [editores] *Aves Argentinas: 100 años*. Aves Argentinas).

20. Una pareja nidificando observada por Floro Ramírez unos 8 km al noreste de la ciudad de Corrientes, departamento Capital, Corrientes alrededor del año 1930 (Bertonatti [2016] *op. cit.*).

Comentarios: La localidad de Iribicuá mencionada por Alcide d'Orbigny se encuentra aproximadamente a los 27°20'S 57°50'W, en lo que actualmente corresponde al departamento Itatí, Corrientes (Parchappe & d'Orbigny [1835] *Carte d'une partie de la Rép.que Argentine comprenant les provinces de Corrientes et des Missions dressé sur les lieux en 1828*. Levrault; Collar *et al*. [1992] *op. cit.*). Las colecciones del capitán Thomas Jefferson Page fueron estudiadas por John Cassin (Page [1859] *op. cit.*).

Las citas referidas a la provincia de Misiones son muy vagas y por lo tanto preferimos excluirlas del análisis. Roberto Dabbene ([1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513) menciona un reporte del río Uruguay, Misiones según Holmberg ([1898] *en* de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires). Sin embargo, este último autor no incluye mayores detalles. Julio y Andrés Contreras afirman que antiguos pobladores de Las Lomas, Corrientes recordaban haber visto esta especie en las afueras de la ciudad capital en las décadas de 1910 y 1920 (Chebez [1994] *op. cit.*; Bertonatti [2016] *op. cit.*).

Antonio Chacón comenta la presencia de esta especie en el arroyo Batel cerca de la localidad de Tala y en la desembocadura del arroyo Garapé, Corrientes en 1967 y 1968 respectivamente. El mismo autor

menciona que pescadores deportivos observaron dos loros con las características de *Anodorynchus glaucus* en el río Itá Ibaté, Corrientes entre los años 1984 y 1985 (Bertonatti [2016] *op. cit.*). Considerada Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (6): **MHNG-**133.31, **MNHN-ZO-MO-**2003-3614, **MNHN-ZO-MO-**2003-3617, **NMNH-**20944, **NMNH-**256884, **NMNH-**256885

MARACANÁ LOMO ROJO | *Primolius maracana* | R

Distribución: Mayormente en el E de Brasil hasta Mato Grosso do Sul y São Paulo, E de Paraguay y NE de Argentina (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: **1**. Un macho colectado por Santiago Venturi en Iguazú, Misiones el 8 de marzo de 1897. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
2. Un ejemplar supuestamente colectado por Hermann Burmeister en la provincia de Misiones en agosto de 1899 (Orfila [1936] *Hornero* 6: 197-225). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Un macho colectado por Roberto Dabbene en Iguazú, Misiones en octubre de 1900 (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366; Orfila [1936] *op. cit*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
4-5. Dos hembras colectadas en "*Salto Iguazú, Misiones*" el 2 y 11 de agosto de 1910. Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.
6. Un ejemplar colectado al parecer por Francisco Manuel Rodríguez en "*Misiones*" en marzo de 1911. El espécimen se encuentra depositado en el MLP.
7. Un ejemplar colectado por Roberto Dabbene en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en septiembre de 1912 (Dabbene [1914] *op. cit.*; Orfila [1936] *op. cit.*). El espécimen no pudo ser hallado en las colecciones, aunque existe un ejemplar montado sin datos (MACN-Or-1697a) que podría pertenecer a dicha expedición.
8. Un macho colectado por Johan Mogensen en Iguazú, Misiones el 5 de febrero de 1917. El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.
9-10. Un macho y una hembra colectados por Johan Mogensen en Iguazú, Misiones el 6 de febrero de 1917 (Orfila [1936] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
11. Numerosos individuos observados por Johan Mogensen en los Saltos del Iguazú, Misiones el 11 de marzo de 1917 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Si bien este autor menciona haberle disparado a algunos ejemplares, no fueron hallados especímenes para esa fecha y localidad.
12-13. Dos hembras colectadas por Johan Mogensen en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 6 y 7 de abril de 1917 (Mogensen [1930] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en la colección Shipton de la FML.
14. Un ejemplar colectado por Johan Mogensen en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 12 de abril de 1917 (Mogensen [1930] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.
15-17. Dos machos y una hembra colectados por James Lee Peters en "*Puerto Aguirre*" (actualmente Puerto Iguazú), Misiones el 14 de julio de 1920. Los especímenes se encuentran depositados en el MCZ.
18. Un ejemplar colectado por Juan Haider en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en enero de 1925 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). El espécimen se encuentra depositado en el MAS.
19-20. Un macho y un ejemplar sin sexar colectados por Francisco Manuel Rodríguez en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 3 de septiembre de 1932 (Navas & Bó [1988] *Comunicaciones*

Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo 166: 1-10). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

21-22. Un macho y un ejemplar sin sexar colectados por Francisco Manuel Rodríguez en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 16 de septiembre de 1932 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

23. Registrada en forma habitual por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en el año 1935 (F. Kruse *en* Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta; Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30).

24. Una hembra colectada por Serafín Pierotti en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 14 de octubre de 1946. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

25. Un macho colectado por Serafín Pierotti en el arroyo del Tigre, departamento San Ignacio, Misiones el 25 de septiembre de 1947 (Nores & Yzurieta [1994] *Bird Conservation International* 4: 313-328; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

26. Un ejemplar colectado por Tomas de Apóstol en Manantiales, departamento Mburucuyá, Corrientes en el año 1947 (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28; Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen había sido depositado en el MAB, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad (Raúl Aguirre Barrios *in litt.*).

27-30. Cuatro especímenes (3 machos y una hembra) colectados por Alberto Anziano en el Alto Iguazú, Misiones en noviembre de 1948 (Chebez [1992] *op. cit.*; Gelain [2008] *Xolmis* 3: 7-16). Los especímenes se encuentran depositados en el MP.

31. Un ejemplar colectado por Andrés Giai y William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 10 de noviembre de 1949 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

32. Un macho colectado por Andrés Giai y William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 5 de marzo de 1950 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

33. Un macho colectado por William Partridge en el km 60 del río Iguazú, Misiones el 9 de marzo de 1951 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

34-35. Grandes bandadas observadas por William Partridge en Puerto Bemberg (actualmente Puerto Libertad), departamento Iguazú, Misiones en enero y agosto de 1951 (Partridge [1990] *Nuestras Aves* 22: 20-24).

36-37. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 19 y 20 de febrero de 1952 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

38. Una hembra colectada por Marcelino Salas en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 29 de abril de 1952 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

39. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 21 de octubre de 1953 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

40. Un macho colectado por Serafín Pierotti en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones el 16 de septiembre de 1956 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

41. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 17 de marzo de 1958. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

42-43. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 18 de marzo de 1958. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

4-45. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 26 de marzo de 1958. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

46-47. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 27 de abril de 1958. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.
48. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 26 de mayo de 1958. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
49-50. Una hembra y un macho colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 6 y 17 de julio de 1958 respectivamente. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.
51. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 1 de agosto de 1958. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
52. Una hembra colectada por Alberto Anziano en el Alto Iguazú, Misiones en el año 1958 (Gelain [2008] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MP.
53. Registrada por Don Eckelberry aparentemente en forma regular en el PN Iguazú, Misiones durante un viaje realizado en el año 1959 (Eckelberry [1965] *The Wilson Journal of Ornithology* 77: 111).
54-55. Dos machos colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 5 de mayo de 1959. Los especímenes se encuentran depositados en el LACM.
56. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 10 de junio de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
57-60. Tres machos y una hembra colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 29 de junio de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit*). Los especímenes se encuentran depositados en el LACM.
61. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 8 de julio de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
62. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 1 de agosto de 1959 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
63-64. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 13 y 28 de agosto de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el LACM.
65. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 4 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
66. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 13 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
67-68. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 14 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
69. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 15 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
70. Una hembra colectada por Andor Kovács en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 8 de julio de 1969. El espécimen se encuentra depositado en el LSUMZ.
71. Un ejemplar colectado en Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones en la década de 1970 (Forcelli *et al.* [1985] *op. cit.*; Chebez [1992] *op. cit.*). El espécimen permaneció en la colección personal de Mariano Chudy, pero desconocemos su actual localización.
72. Registrada por Martín de la Peña en el PN Iguazú, Misiones el 10 de febrero de 1973 (M. de la Peña *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA; de la Peña [2013] *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Ediciones Biológica).

73. Un grupo de seis ejemplares fotografiados en la baja cuenca del arroyo Urugua-í cerca del barrero Palacio, departamento Iguazú, Misiones en febrero de 1980 (Chebez [1992] *op. cit.*). La fotografía nunca fue publicada y no se encuentra disponible en la actualidad.
74. Dos parejas observadas por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en diciembre de 1984 o enero de 1985 (F. Kruse *en* Forcelli *et al.* [1985] *op. cit.*; Chebez [1992] *op. cit.*).
75. Una bandada observada por Hugo Chaves en la reserva privada Lapacho Cué, arroyo Piray Miní, departamento Eldorado, Misiones en el año 1990 (H. Chaves *en* Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
76. Un ejemplar macho colectado en *"Salto Iguazú"*, sin más datos. El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.
Comentarios: El espécimen COFML-6404 fue publicado como proveniente de Argentina, pero en realidad fue obtenido por Serafín Pierotti en San Antonio do Sudoeste, Paraná, Brasil (ver Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*). Existe un registro sin confirmar por Ignacio Roesler y otros observadores en el PP Moconá, Misiones en julio de 1999; y otro por Paula Bertolini en el PP Cruce Caballero, Misiones (Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*). Bodrati *et al.* ([2006] *Hornero* 21: 37-43) realizan una compilación de registros, comentan la situación actual de la especie y las posibles causas de su extinción en el territorio nacional. Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (64): **MACN-Or-**5493, **MACN-Or-**2786a, **MACN-Or-**2786a, **MACN-Or-**2786a, **MACN-Or-**2786a, **MACN-Or-**4785, **MACN-Or-**31810, **MACN-Or-**32412, **MACN-Or-**32910, **MACN-Or-**33482, **MACN-Or-**33483, **MACN-Or-**33892, **MACN-Or-**34126, **MACN-Or-**39245, **MACN-Or-**41681, **MACN-Or-**41682, **COFML-**4887, **COFML-**6543, **COFML-**10279, **COFML-**15403, **COFML-**15404, **COFML-SHIPTON-**631a, **COFML-SHIPTON-**631b, **MLP-Or-**s/n (= 107), **MP-**260, **MP-**261, **MP-**262, **MP-**263, **MP-**264, **MAS-Or-**1173, **AMNH-**474146, **AMNH-**769458, **AMNH-**769459, **AMNH-**769460, **AMNH-**769461, **AMNH-**769477, **AMNH-**769478, **AMNH-**769479, **AMNH-**769480, **AMNH-**769481, **AMNH-**769482, **AMNH-**769483, **FMNH-**50290, **FMNH-**57796, **FMNH-**58906, **LACM-**47017, **LACM-**47018, **LACM-**47019, **LACM-**47020, **LACM-**47021, **LACM-**47022, **LACM-**47023, **LACM-**47024, **LACM-**47025, **LACM-**47026, **LACM-**47027, **LACM-**47028, **LACM-**47029, **LACM-**47030, **LACM-**47031, **LSUMZ-**69173, **MCZ-**85215, **MCZ-**85216, **MCZ-**85217

GUACAMAYO ROJO | *Ara chloropterus* | R

Distribución: Extensa región del centro de Sudamérica, desde Colombia y Venezuela hasta el S de Brasil, E de Bolivia, Paraguay y N de Argentina (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Mencionada por Florián Paucke ([1942] *Hacia allá y para acá. Una estada entre los indios Mocobíes, 1749-1767*. Universidad Nacional de Tucumán) refiriéndose a cierta región del noreste de Argentina.
2. Una pareja observada (uno de ellos colectado) por Alcide d'Orbigny en una navegación por el río Paraná desde Iribicuá (unas siete leguas al este de Itatí), departamento Itatí hasta Itá Ibaté, departamento General Paz, Corrientes en diciembre de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale.* Paris). Aparentemente el espécimen no fue conservado (Patrick Bousses *in litt.*).
3-4. Mencionada por Martín de Moussy para la provincia de Misiones y el valle de Orán en la provincia de Salta (de Moussy [1860] *Description géographique et statistique de la Confédération Argentine*. Tome Deuxieme. Librairie de Firmin Didot Frères).

5. Mencionada por Luis Fontana con referencia a la región chaqueña (Fontana [1881] *El Gran Chaco*. Imprenta de Ostwald y Martínez).
6. Dos especímenes y un cráneo obtenidos por Justo González Acha en el Alto Pilcomayo, Formosa sin fecha (Holmberg [1887] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 19: 1-388; Holmberg [1898] *en* de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires). Al parecer dichos especímenes se encuentran perdidos en la actualidad.
7. Registrada por Antonio Pitaluga en el riacho Quiá, Chaco sin fecha (Holmberg [1887] *op. cit*).
8. Dos juveniles capturados por Carlos Rodríguez Lubary en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en el año 1883 (Holmberg [1887] *op. cit*). Se desconoce el destino de estos ejemplares.
9. Observada regularmente por Arnaldo de Winkelried Bertoni en vuelo sobre el río Paraná, desde la costa argentina hacia Paraguay a la altura de Puerto Bertoni. Dicha localidad se encuentra frente al departamento Iguazú, Misiones. Este autor menciona además la captura de un ejemplar en el Alto Paraná, Paraguay (26°53') en junio de 1891 (Bertoni [1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-213).

Figura 76. Guacamayo Rojo *Ara chloropterus*, MAS-Or-1172, Posadas, Misiones, diciembre de 1932 o 1952 (Diego Monteleone)

10. Mencionada por Santiago Venturi para el Chaco Austral, sin más detalles (S. Venturi *en* Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513).
11. Un macho colectado por Ulpiano Cáseres en la provincia de Formosa en diciembre de 1917 (Dabbene [1918] *Hornero* 1: 98; Orfila [1936] *Hornero* 6: 197-225). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
12. Mencionada por Ernesto Lynch Arribálzaga para la zona del río Bermejo en la región chaqueña, sin mayores detalles (Lynch Arribálzaga [1920] *Hornero* 2: 85-98).
13. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40).
14. Tres individuos observados por Federico Kruse en Puerto Delicia, departamento Eldorado, Misiones en el año 1942 (F. Kruse *en* Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final.* Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta).
15. Un macho colectado por Herminda Solani (o Solari) en Posadas, departamento Capital, Misiones en diciembre de 1952 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). El espécimen se encuentra depositado en el MAS, y su etiqueta figura como colectado en diciembre de 1932 (Figura 76).

16-19. Al menos cuatro registros realizados por el cuerpo de guardaparques en la RN Iguazú, Misiones entre los años 1989 y 1990 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
20-21. Al parecer dos individuos distintos observados por Sergio Acosta sobrevolando la RN Iguazú, Misiones en julio de 1992 y el 18 de septiembre del mismo año (S. Acosta *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
22. Una pareja observada por Carlos Saibene, Sergio Acosta y Walter Maciel en el PN Iguazú, Misiones el 24 de septiembre de 1992 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
23. Un individuo observado en vuelo por Ángel Caradonna en el km 6 de la ruta nacional n°12, departamento Iguazú, Misiones el 6 de mayo de 1993 (A. Caradonna *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
24. Dos individuos observados por José Calo en el río Iguazú inferior, km 12, departamento Iguazú, Misiones el 5 de octubre de 1993 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
25. Un individuo observado en vuelo por Ángel Caradonna en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en el año 1994 (A. Caradonna *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
26. Registrada por Horacio Foerster en el PP Urugua-í, Misiones sin fecha (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
27. Un individuo observado por Patricio Ramírez Llorens y Jessica Cañete en el PN Iguazú, Misiones en marzo de 2016 (P. Ramírez Llorens y J. Cañete *en* Casado [2016] *Especies de vertebrados de valor especial del Parque Nacional Iguazú*. APN).
Comentarios: Con respecto a la mención de Roberto Dabbene, llamativamente la especie no es incluida por Ernst Hartert y Santiago Venturi ([1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Chebez & Casañas ([2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina) asumen que el ejemplar obtenido por Bertoni fue colectado en la costa argentina del río Paraná. Las observaciones recientes del PN Iguazú, Misiones podrían corresponder a ejemplares escapados de cautiverio. Descartamos los registros correspondientes a la reintroducción efectuada en los Esteros del Iberá, Corrientes. Considerada Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (2): MACN-Or-9298, **MAS-Or-**1172

TICOTICO CEJA BLANCA | *Anabacerthia amaurotis* | R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta el E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 5 de agosto de 1959 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
2-3. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 4 y 7 de septiembre de 1959 (Partridge [1961] *op. cit.*). Un espécimen se encuentra depositado en el MACN y el restante en la COFML (Figura 77).
4. Un individuo observado en el arroyo Urugua-í, Misiones el 19 de julio de 1993 (Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser* Mergus octosetaceus *in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust).
5. Un individuo observado por Ignacio Roesler y Diego Monteleone en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones en diciembre de 1998 (D. Monteleone *obs. pers.*).

6. Un ejemplar observado y grabado en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 4 de febrero de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
7-9. Un total de tres individuos observados en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 18 y 20 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
10. Un individuo observado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 16 de febrero de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
11-13. Tres individuos observados en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 4 y 5 de abril de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
14. Un individuo observado por Tim Perkins en el rincón sudoeste del PP Urugua-í, Misiones el 30 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
15. Un ejemplar observado y grabado en el PP Urugua-í, Misiones el 31 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
16. Una pareja observada por Alejandro Bodrati, José Segovia y Luis Pagano en la RB Yaboty, Misiones el 24 de agosto de 2007 (A. Bodrati *in litt.*).
17. Un individuo observado por Daniel Almirón en la reserva privada Refugio Tangará, departamento Guaraní, Misiones entre el 16 y el 19 de enero de 2010 (ebird.org/checklist/S27385603).
18. Un individuo observado por Gina Sheridan en el PP Urugua-í, Misiones el 6 de noviembre de 2012 (ebird.org/checklist/S19102791).
19. Un individuo observado por Adam Timpf y David Bell en el PP Urugua-í, Misiones el 7 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S27387958).
20. Dos individuos observados por Martín López Aguirre en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 21 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S103904022).
Comentarios: Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (3): **MACN-Or-**39385, **MACN-Or-**39386, **COFML-**13397

Figura 77. Ticotico Ceja Blanca *Anabacerthia amaurotis*, MACN-Or-39386, Tobuna, Misiones, 4 de septiembre de 1959 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

CANASTERO ESTRIADO | *Pseudasthenes humicola* | R

Distribución: Centro de Chile desde Antofagasta a Malleco, hasta los 2200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Mencionada por Luis Fontana para la provincia de Mendoza, sin detalles (Fontana [1908] *Enumeración sistemática de las aves de la región andina*. Escuela Nacional de Industrias Químicas de San Juan; Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513).

2. Una hembra colectada por Carlos Reed en la provincia de Mendoza en marzo de 1911 (Reed [1916] *Las aves de la provincia de Mendoza*. Museo Educacional de Mendoza; Cory & Hellmayr [1925] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series*. Volume XIII. Part IV). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH (Figura 78).

Figura 78. Canastero Estriado *Pseudasthenes humicola,* NMNH-237185, Mendoza, marzo de 1911 (Smithsonian Institution, National Museum of Natural History)

Comentarios: La inclusión de *Synallaxis humicola* por parte de Alcide d'Orbigny para la provincia de Corrientes (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale*. Paris), muy probablemente se refiera al CANASTERO CHAQUEÑO *Asthenes baeri* (Hellmayr [1921] *Novitates Zoologicae* 28: 230-276). Virgilio Roig ([1965] *Boletín de Estudios Geográficos* 49: 175-222) menciona para esta especie la localidad de Potrerillos, departamento Luján de Cuyo, Mendoza sin hacer referencia a ningún espécimen. Este autor lo describe como "frecuente en toda la precordillera" y lo mapea para gran parte de dicha provincia.

Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) incluyen a este espécimen como "capturado en Potrerillos, sin fecha", sospechando que pudo haber sido colectado por Luis Fontana. En los datos de etiqueta no figura el colector, pero la letra y el tipo de etiqueta coinciden con las de Carlos Reed depositadas en el MLP (L. Pagano *obs. pers.*). El nido hallado por Martín de la Peña en Potrerillos, Mendoza en enero de 1984 (de la Peña [1987] *Nidos y Huevos de las Aves Argentinas*. Ediciones Lux) fue reidentificado como perteneciente a la BANDURRITA PATAGÓNICA *Ochetorhynchus phoenicurus* (M. de la Peña *in litt.*).

Especímenes (1): **NMNH**-237185

TESORITO | *Phibalura flavirostris* | R

Distribución: Restringida a la región SE de Brasil, E de Paraguay y Misiones en Argentina, mayormente por debajo de los 1400 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para el norte de Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2-3. Dos machos colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 14 y 15 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

4. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 19 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

5. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 23 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

6-12. Siete ejemplares colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 3 de marzo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). Cinco especímenes se encuentran depositados en el MACN, uno en la COFML y el restante en el MLP.
13. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 5 de marzo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
14. Registrada por Samuel Narosky en el PN Iguazú, Misiones el 12 de junio de 1975 (S. Narosky *en* Saibene *et al*. [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
15-20. Un total de seis ejemplares anillados por Miguel Christie en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1977 (M. Christie *en* Saibene *et al*. [1996] *op. cit.*).
21-22. Dos ejemplares colectados por A. Pohorilow al norte de Campo Viera, departamento Oberá, Misiones en octubre de 1983 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros). Los especímenes se encuentran exhibidos en el CHMO.
23. Una pareja observada por Gustavo Herrera en el límite sur del PP Cruce Caballero, Misiones el 18 de marzo de 1994 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=470942).
24. Mencionada por Paula Bertolini para el PP Cruce Caballero, Misiones (Bertolini [1998] *Documento base para la discusión del plan de manejo del Parque Provincial Cruce Caballero*. PRODIA-MERNR; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
25. Un individuo observado por Freddy Burgos y otros observadores en el PP de La Araucaria, Misiones el 12 de julio de 2001 (Krauczuk & Baldo [2004] *Atualidades Ornitológicas* 119: 1-43; ebird.org/checklist/S44607195).
26. Un individuo observado por Gabriel Capuzzi en el PP de la Araucaria, Misiones el 30 de agosto de 2002 (G. Capuzzi *en* Bodrati & Cockle [2006] *Ornitología Neotropical* 17: 243-258).
27. Una pareja observada en el PP Cruce Caballero, Misiones el 24 de junio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
28. Un macho observado en el PP de la Araucaria, Misiones 7 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
29. Una pareja observada en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 18 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
30. Una hembra observada en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones el 23 de septiembre de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
31. Una pareja observada en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 10 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
32. Una pareja observada por Néstor Fariña en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 15 de agosto de 2005 (N. Fariña *en* Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
33. Una pareja observada por Alejandro Bodrati sobre la ruta nacional n°14 unos 7 km al sudeste del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 16 de julio de 2008 (A. Bodrati *com. pers*.).
34. Una pareja observada por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 8 de agosto de 2008 (A. Bodrati *com. pers*.).
35. Un grupo de seis machos y tres hembras observados por Alejandro Bodrati 1 km al oeste de Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 23 de marzo de 2009 (A. Bodrati *com. pers*.).
36. Dos machos y una hembra observados por Alejandro Bodrati sobre la ruta nacional n°14 cerca del paraje Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 24 de marzo de 2009 (A. Bodrati *com. pers*.)
37. Un ejemplar fotografiado por Gabriel San Juan y Eduardo Zanin en el PP Puerto Península, Misiones el 27 de abril de 2011 (San Juan & Zanin [2011] *EcoRegistros Revista* 1. Artículo 11).
38-39. Un ejemplar fotografiado por Leonardo Wolf en el PN Iguazú, Misiones el 7 de julio de 2011. El mismo observador la volvió a registrar en el invierno de 2012 en dicha localidad, aunque sin poder documentarla (L. Wolf *in litt.*).

40. Un ejemplar fotografiado por Luis Cañete en el PN Iguazú, Misiones el 25 de mayo de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=380823).
41. Un ejemplar fotografiado por Adrián Castillo en la reserva privada Mainumby, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de junio de 2016 (Baigorria & Castillo [2017] *XVII Reunión Argentina de Ornitología*. Puerto Iguazú; facebook.com/rmainumby).
42. Registrada por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en septiembre de 2016 (Baigorria & Castillo [2017] *op. cit.*; Julián Baigorria *in litt.*).
43. Un individuo observado por Luis Pagano y Alejandro Bodrati en el km 1050 de la ruta nacional n°14, departamento San Pedro, Misiones el 27 de noviembre de 2018 (L. Pagano *obs. pers.*).
44. Un ejemplar fotografiado por Víctor Vega y Martín López Aguirre en el PN Iguazú, Misiones el 28 de julio de 2019 (ebird.org/checklist/S59856101).
45. Un individuo observado por Mark Pearman, Martín Toledo y Damián Lozano en la reserva privada Curindy, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 16 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S94749961).
Taxonomía: Recientemente se propuso considerar como especie válida la forma boliviana *Phibalura flavirostris boliviana* (Hennessey [2011] *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 454-458). Una supuesta hembra de *Phibalura flavirostris boliviana* observada por Jorge Baldo cerca de San Lucas, departamento Valle Grande, Jujuy. Finalmente dicho registro fue descartado por el mismo observador (J. Baldo *in litt.*).
Especímenes (14): **MACN-Or-**33624, **MACN-Or-**33625, **MACN-Or-**33626, **MACN-Or-**33627, **MACN-Or-**33628, **MACN-Or-**33630, **MACN-Or-**33632, **MACN-Or-**33633, **MACN-Or-**33634, **MACN-Or-**33635, **COFML-**11109, **MLP-Or-**12589, **CHMO-**s/n, **CHMO-**s/n

PÁJARO CAMPANA | *Procnias nudicollis* | R

Distribución: Desde el NE de Brasil hasta el E de Paraguay y NE de Argentina, hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Escuchada en raras ocasiones por Florencio de Basaldúa en la provincia de Misiones, durante un viaje realizado entre los años 1897 y 1898 (de Basaldúa [1901] *Pasado, presente y porvenir del territorio nacional de Misiones*. La Plata).
2. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
3. Un ejemplar colectado por Andrés Giai en Cerro Azul, departamento Leandro Alem, Misiones en enero de 1945 (Pereyra [1951] *Hornero* 9: 291-347). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
4. Un macho joven colectado por William Partridge en Puerto Bossetti, km 30, Misiones el 13 de julio de 1958 (Navas & Bó [1988] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 15: 11-37). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Una pareja observada por Julio Contreras en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 12 de mayo de 1971 (J. Contreras *en* Herrera [1995] *Nuestras Aves* 31: 19-20).
6. Una hembra joven colectada por la Dirección Provincial de Recursos Naturales en el "*departamento Iguazú, Misiones*" el 5 de marzo de 1975 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). El espécimen se encuentra depositado en el MAS.
7. Una pareja observada por Julio y Andrés Contreras en Rincón de Santa María, Paso Mbaracayá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 17 de enero de 1978 (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 61-70; Herrera [1995] *op. cit.*).
8. Un individuo escuchado por Martín de la Peña en el PN Iguazú, Misiones el 12 de octubre de 1981 (M. de la Peña *en* Herrera [1995] *op. cit.*).

9. Un individuo escuchado por Justo Herrera y Daniel Somay en el PN Iguazú, Misiones el 7 de agosto de 1983 (J. Herrera y D. Somay *en* Herrera [1995] *op. cit.*).
10. Un individuo escuchado por Justo Herrera en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1985 (J. Herrera *en* Herrera [1995] *op. cit.*).
11. Un individuo escuchado por Juan C. Chebez y Miguel Rinas en el PP Cruce Caballero, Misiones en noviembre de 1985 (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros)
12. Un individuo observado por Segismundo Welcz, León Florentín y Horacio Foerster en el PP Moconá, Misiones el 13 de noviembre de 1989 (S. Welcz, L. Florentín y H. Foerster *en* Chebez [1994] *op. cit.*).
13. Dos individuos observados por Andrés Johnson y Daphne Cooper de Colcombette en Eldorado, departamento homónimo, Misiones en octubre de 1990 (A. Johnson y D. Cooper de Colcombette *en* Chebez [1994] *op. cit.*; Herrera [1995] *op. cit.*).
14. Dos individuos escuchados por Pablo Giorgis en el PN Iguazú, Misiones el 20 de agosto de 1991 (P. Giorgis *en* Herrera [1995] *op. cit.*).
15. Un macho adulto observado por Gustavo Herrera en el PN Iguazú, Misiones el 7 de mayo de 1992 (Herrera [1995] *op. cit.*).
16. Registrada por Justo Herrera en la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 25 de agosto de 1996 (J. Herrera *en* Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
17. Registrada en el arroyo Yacuy del PN Iguazú, Misiones el 5 de agosto de 1998 (DRNEA-CIES [1997/98] *Registros de especies de vertebrados de valor especial del Parque Nacional Iguazú*. APN; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
18. Registrada por Jorge Anfuso en el centro de recría Güirá Oga de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en el año 1998 (J. Anfuso *en* Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*).
19. Un grupo registrado por Germán Pugnali en el río Iguazú superior, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 29 de junio de 2003 (ebird.org/checklist/S26708065).
20. Dos o tres machos escuchados por Luis Pagano en el PP Moconá, Misiones el 17 de julio de 2004 (L. Pagano *obs. pers.*).
21. Varios ejemplares observados y grabados en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones entre el 26 y el 29 de septiembre de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
22. Un individuo escuchado por Agustín Zarco y Gustavo Aprile en la reserva privada Yacutinga, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 17 de septiembre de 2006 (ebird.org/checklist/S70618518).
23. Cuatro individuos observados por Ricardo Melsew y Cecilia Belloni sobre la ruta nacional n°101 del PN Iguazú, Misiones en julio de 2012 (Palacio *et al.* [2016] *Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs) del Parque Nacional Iguazú. Año 2010-2015*. APN).
24. Tres individuos observados por Justo Herrera sobre la ruta nacional n°101 del PN Iguazú, Misiones en agosto de 2012 (Palacio *et al.* [2016] *op. cit.*).
25. Unos ocho individuos (dos machos adultos vocalizando, juveniles y hembras) fotografiados por Emilio White en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones en agosto de 2012. Las aves permanecieron durante aproximadamente un mes en el sitio (E. White *in litt.*; Figura 79).
26. Un ejemplar grabado por Sebastián Cabanne, Pablo Tubaro y Ana Barreira en la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 24 de septiembre de 2012. La grabación se encuentra depositada en la Colección de Sonidos del MACN.
27. Escuchada por Guillermo Gil y Marcelo Cavicchia entre el arroyo Yacuy y la seccional Apepú, PN Iguazú, Misiones en julio de 2013 (Palacio *et al.* [2016] *op. cit.*; Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).
28. Un total de tres individuos vocalizando cerca de la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 4

Figura 79. Pájaro Campana *Procnias nudicollis*, establecimiento San Jorge, Misiones, agosto de 2012 (Emilio White)

de septiembre de 2013 (DNREA [2013] *Apepú 2013. Campaña de Invierno, Parque Nacional Iguazú*. APN).
29. Un ejemplar fotografiado por Adrián Castillo en la reserva privada Mainumby, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de agosto de 2016 (Baigorria & Castillo [2017] *XVII Reunión Argentina de Ornitología*. Puerto Iguazú; Julián Baigorria *in litt.*).
30. Escuchada por Pablo Serur en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de septiembre de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=616797).
31. Escuchada por Pablo Serur en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 5 de noviembre de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=834480).
32. Un macho observado por Emilio White en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones en mayo de 2020 (E. White *in litt.*).
33. Un macho inmaduro grabado por Mauricio Martínez en el PN Iguazú, Misiones el 19 de agosto de 2020. El ejemplar permaneció en el sitio los días posteriores y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org/checklist/S72609997).
34. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en el PN Iguazú, Misiones el 18 de julio de 2021 (ebird.org/checklist/S92268241).
Comentarios: El espécimen MACN-Or-63403 con localidad Iguazú, Misiones proviene de un decomiso y se desconoce su origen (Yolanda Davies *com. pers.*). El ejemplar inmaduro sin datos exhibido en el CNH proviene de Paraguay (Amado Martínez *com. pers.*). Escuchada durante septiembre en las islas y las costas argentina y brasilera del río Iguazú, Misiones (Rogelio Ymbernón *en* Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64). Registrada con cierta regularidad en la zona del *perobal* del PN Iguazú, Misiones durante el otoño e invierno (Gabriel Moresco *in litt.*). Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (3): **MACN-Or-**35963, **MACN-Or-**38530, **MAS-Or-**4512

BAILARÍN CASTAÑO | *Piprites pileata* | R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil llegando hasta Misiones, Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 3 de septiembre de 1959 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
2-3. Un macho observado por Claudio Maders y Gastón Di Santo en el PP Caá Yarí, Misiones entre el 26 y el 28 de abril de 2006. Posteriormente Néstor Fariña obtuvo grabaciones en el mismo sitio el 22 de mayo de 2006, escuchando otro individuo a la distancia. Claudio Maders y Gastón Di Santo volvieron a registrar el ave el 24 y 29 de mayo del mismo año (Maders *et al.* [2007] *Ornitología Neotropical* 18: 127-131).
4. Un individuo escuchado por Claudio Maders en un segundo territorio del PP Caá Yarí, Misiones el 30 de abril de 2006 (Maders *et al.* [2007] *op. cit.*).
5. Una pareja observada (macho y nido fotografiados) en el PP Caá Yarí, Misiones entre el 11 y el 24 de octubre de 2006. El nido fue hallado en el suelo el 31 de octubre de ese año, siendo colectado y depositado en el MLP (Cockle *et al.* [2008] *Cotinga* 29: 166-168).
6-7. Una hembra observada y un segundo individuo escuchado por Claudio Maders y Gastón Di Santo en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 13 de octubre de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *Cotinga* 31: 95-100).
8. Una pareja observada por Claudio Maders y Gastón Di Santo en el límite entre el PP Caá Yarí y la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 11 de noviembre de 2006 (Cockle *et al.* [2008] *op. cit.*; Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).
9. Una pareja observada por Alejandro Bodrati y Néstor Fariña en otro sector del límite entre el PP Caá Yarí y la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 5 de junio de 2007 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).
10-11. Un macho fotografiado y otro individuo escuchado cerca del arroyo San Juan de la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 31 de agosto de 2009 (Bodrati *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 76-78).
Comentarios: Omitimos las observaciones publicadas en internet debido a que corresponden a los mismos territorios e individuos descriptos en los trabajos mencionados. Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (1): **MACN-Or-**39436

MOSQUETA PECHO PARDO | *Hemitriccus obsoletus* | R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil llegando al extremo NE de Argentina, entre los 500-2300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1-2. Observada por Carlos Saibene y Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 4 de mayo y el 21 de julio de 1991 (Saibene & Castelino [1993] *Hornero* 13: 308).
3. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati y Juan I. Areta en el PP Esmeralda, Misiones el 18 de septiembre de 2005 (Bodrati & Areta [2006] *Ornitología Neotropical* 17: 597-600).
4. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en el PP Caá Yarí, Misiones el 8 de mayo de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 3-5). En esta localidad fue registrada en forma regular por varios ob-

servadores entre mayo de 2006 y septiembre de 2009 (ebird.org).
5. Un individuo escuchado y observado por Alejandro Bodrati, Kristina Cockle y Néstor Fariña en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 7 de noviembre de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).
6. Hasta cuatro individuos observados por Ernesto Krauczuk en la reserva privada Selva Paranaense Don Otto, departamento Eldorado, Misiones el 27 de diciembre de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).
7. Un ejemplar grabado y fotografiado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en la reserva privada Refugio Tangará, departamento Guaraní, Misiones el 9 de febrero de 2007 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).
8. Un ejemplar observado y grabado por Alejandro Bodrati en el arroyo Paraíso, límite entre el PP Caá Yarí y la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 22 de mayo de 2011 (A. Bodrati *in litt.*).
9. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Luis Pagano en el arroyo Paraíso del PP Caá Yarí, Misiones el 16 de abril de 2013 (A. Bodrati *in litt.*).

Figura 80. Mosqueta Pecho Pardo *Hemitriccus obsoletus*, PP Caá Yarí, Misiones, 4 de noviembre de 2020 (Facundo Di Sallo)

10. Un individuo observado y escuchado por Julián Quillén Vidoz en el PP Caá Yarí, Misiones el 5 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S24577773).
11. Un ejemplar observado y fotografiado por Facundo Di Sallo y Alejandro Bodrati en el PP Caá Yarí, Misiones el 4 de noviembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76463287; Figura 80). El mismo posee un territorio en el lugar y fue relocalizado por otros observadores (ebird.org).
Comentarios: Incluida por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) asumiendo que uno de los ejemplares hallados en el PN Iguazú, Misiones había sido grabado (Saibene & Castelino [1993] *op. cit.*). Por el contrario, estos autores no obtuvieron grabaciones de la especie (Miguel Castelino *en* Bodrati & Areta [2006] *op. cit.*). La mayoría de los registros ocurren en un sector restringido del arroyo Paraíso, departamento Guaraní, Misiones y seguramente representan una pequeña población local.

FIOFÍO BELICOSO | *Elaenia chiriquensis* | R

Distribución: Desde Costa Rica y Panamá hasta el E de Sudamérica incluyendo el extremo NE de Argentina, mayormente por debajo de los 1500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 8 de mayo de 1959 (Partridge [1964] *Neotrópica* 10: 41-48). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.

2-3. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 13 y 14 de octubre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
4. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 27 de octubre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 17 de diciembre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
6-11. Cuatro machos y dos hembras colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 21 de diciembre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). Tres especímenes se encuentran depositados en el MACN y los restantes en el MLP.
12. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 21 de noviembre de 1960 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
13-15. Dos machos y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 19 de enero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Dos especímenes se encuentran depositados en el MACN y el restante en el MLP.
16-17. Dos machos colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 20 y 23 de enero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
18-19. Dos machos colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 1 y 6 de febrero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
20. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 20 de febrero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
21-23. Un macho y dos ejemplares sin sexar colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 23 de febrero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
24-25. Una hembra y un ejemplar sin sexar colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 9 y 10 de marzo de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
26. Un macho colectado en el cerro Santa Bárbara, departamento homónimo, Jujuy el 6 de enero de 1966 (Olrog & Contino [1966] *Neotrópica* 12: 66). El espécimen parece estar perdido en la actualidad.
27-29. Dos hembras y un macho colectados por Claës Olrog, Juan Simón Guanuco y Ricardo Ojeda en el arroyo Rosario, ruta provincial n°21, departamento San Pedro, Misiones el 25 de octubre de 1977. Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.
30. Un total de diez ejemplares anillados por Claës Olrog en el paraje Paraíso, departamento San Pedro, Misiones entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 1977 (Patricia Capllonch *in litt.*).
31. Un ejemplar anillado por Carlos Gerow en El Cucho, departamento Palpalá, Jujuy el 21 de diciembre de 1978 (Patricia Capllonch *in litt.*).
32. Un ejemplar capturado y fotografiado por Patricia Capllonch en la estancia La Blanca, departamento Santo Tomé, Corrientes entre el 14 y el 21 de abril de 2004 (Capllonch *et al.* [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 483-498; Alderete & Capllonch [2010] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 58: 1-5).
33. Un ejemplar escuchado por Alejandro Bodrati cerca del puente internacional Tancredo Neves de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 3 de septiembre de 2015 (A. Bodrati *en* de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 9: 1-441).
Comentarios: Según Claës Olrog y Francisco Contino ([1966] *op. cit.*) el ejemplar colectado en Jujuy tenía un largo de cola de 71 mm. Esta medida es muy superior al rango de 62-64 mm dado por William Partridge para los machos adultos de Misiones (Partridge [1964] *op. cit.*), pero coincidiendo con el rango del FIOFÍO GRANDE *Elaenia spectabilis* (70-82,5 mm en machos; Zimmer [1941] *American Museum Novitates* 1108: 1-23). No existen medidas disponibles para los ejemplares anillados en Misiones, Jujuy

ni Corrientes (Patricia Capllonch *in litt.*). Mencionada como bastante común en las capueras y yerbales de Puerto Bemberg (actualmente Puerto Libertad), departamento Iguazú, Misiones (Partridge [1964] *op. cit.*).

Especímenes (27): **MACN-Or-**38539, **MACN-Or-**39542, **MACN-Or-**39543, **MACN-Or-**39544, **MACN-Or-**39546, **MACN-Or-**39548, **MACN-Or-**39550, **MACN-Or-**44777, **MACN-Or-**44778, **MACN-Or-**44779, **MACN-Or-**44780, **MACN-Or-**44781, **MACN-Or-**44782, **MACN-Or-**44783, **MACN-Or-**44784, **MACN-Or-**44785, **MACN-Or-**44787, **MACN-Or-**44788, **MACN-Or-**44789, **COFML-**14530, **COFML-**14531, **COFML-**14532, **MLP-Or-**12594, **MLP-Or-**12595, **MLP-Or-**13644, **MLP-Or-**13645, **MLP-Or-**13880

BURLISTO CABEZA GRIS | *Attila phoenicurus* | R

Distribución: Se reproduce en la región SE de Brasil, y posteriormente realiza una migración hacia el centro de la Amazonía (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: **1**. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 4 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.

2-3. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 10 y 11 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

4-5. Un macho y un ejemplar sin sexar colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 20 de octubre de 1953. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

6-7. Dos machos colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 23 y 24 de octubre de 1953. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

8. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 31 de octubre de 1953. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

9. Un ejemplar sin sexar colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones en octubre de 1953. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

10-11. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 28 de noviembre de 1954. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

12. Un ejemplar colectado por Claës Olrog, Juan Simón Guanuco y Ricardo Ojeda sobre la ruta provincial nº21 unos 48 km al sudeste de San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 27 de octubre de 1977. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

13. Observada por Flavio Moschione en el arroyo Yabebiry, Misiones en el año 1987 (F. Moschione *en* Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).

14. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Narosky & Yzurieta [1987] *Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini).

15. Observada en El Alcázar, departamento Libertador General San Martín, Misiones sin fecha (Adrián Di Giacomo *en* Chebez [1994] *op. cit.*).

16. Una pareja hallada por Mark Pearman a unos 9 km de Mesa Redonda, RB Yaboty, Misiones el 1 de febrero de 2004 (Bodrati *et al.* [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Mark Pearman *in litt.*; MLNS-139214). Las aves fueron registradas hasta marzo de ese año (Germán Pugnali y Daniel Almirón *en* ebird.org).

Figura 81. Burlisto Cabeza Gris *Attila phoenicurus*, reserva natural Guaraní, Misiones, 19 de noviembre de 2020 (Martjan Lammertink)

17. Dos individuos observados mientras vocalizaban en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 18 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
18-21. Grabada por Alejandro Bodrati en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones en octubre de 2005, octubre de 2006 y octubre y noviembre de 2007 (A. Bodrati *com. pers.*).
22-24. Grabada por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones en los años 2013, 2014 y 2016 (A. Bodrati *com. pers.*).
25. Un macho colectado por Natalia García y Natalia Trujillo en el PN Mburucuyá, Corrientes el 28 de enero de 2015 (García *et al.* [2016] *Revista Brasileira de Ornitologia* 24: 68-71). La fecha publicada como "28 de mayo de 2015" es un error (N. García *in litt.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
26. Una pareja territorial registrada por Alejandro Bodrati y Facundo Di Sallo en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones en noviembre y diciembre de 2020 (A. Bodrati y F. Di Sallo *in litt.*; ebird.org; Figura 81).
27. Registrada por Santiago Torres y Wálter Gómez Umpierrez en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 15 de noviembre de 2021 (ecoregistros.org). Probablemente el mismo ejemplar fotografiado por Diego Monteleone y Cagan Sekercioglu en dicha localidad el 21 de diciembre de 2021 (D. Monteleone *obs. pers.*; ebird.org).
Taxonomía: Anteriormente incluido en el género monotípico *Pseudattila*. Melvin Traylor ([1977] *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 148: 129-184) la incorpora dentro del género *Attila*.
Comentarios: Un ejemplar observado por Hernán Povedano en el PN Iguazú, Misiones a comienzos de la década de 1990 necesita confirmación (H. Povedano *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel

nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (13): **MACN-Or-**33637, **MACN-Or-**33638, **MACN-Or-**34334, **MACN-Or-**34335, **MACN-Or-**34336, **MACN-Or-**34337, **MACN-Or-**34338, **MACN-Or-**36871, **MACN-Or-**36872, **MACN-Or-**73447, **COFML-**11110, **COFML-**14511, **MLP-Or-**12590

BENTEVEO PICO FINO | *Pitangus lictor* | V

Distribución: Ampliamente distribuida en la mitad N de Sudamérica, mayormente por debajo de los 500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un individuo observado por Samuel Narosky y Juan Klimaitis en Los Talas, partido de Berisso, Buenos Aires el 6 de mayo de 1979. El mismo fue colectado el 26 de mayo de ese año (Narosky [1983] *Hornero* 12. *Número Extraordinario*: 74-76; Klimaitis & Milat [1993] *Catálogo Sistemático de las Aves en Exhibición*. Museo Ornitológico Municipal de Berisso). El espécimen se encuentra depositado en el MOMB.
2. Un ejemplar fotografiado por Horacio Pomi en Los Talas, partido de Berisso, Buenos Aires el 13 de septiembre de 2012. El ave permaneció en el sitio al menos hasta noviembre de ese año, pudiendo ser registrada por otros observadores (Klimaitis *et al*. [2015] *Garganchillo. Nueva Serie* 7: 3-9; Figura 82).
Taxonomía: Durante mucho tiempo en el género *Philohydor*, creado en base a diferencias en la siringe y la forma del nido (Lanyon [1984] *American Museum Novitates* 2797: 1-28).
Especímenes (1): MOMB-171/79

Figura 82. Benteveo Pico Fino *Pitangus lictor*, Los Talas, Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 (Cristian Klimaitis)

YETAPÁ CHICO | *Alectrurus tricolor* | R

Distribución: Especie típica del *cerrado*, ocupando el SE de Brasil, N de Bolivia y NE de Paraguay hasta los 1100 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por Alcide d'Orbigny en "*Corrientes*" entre marzo de 1827 y abril de 1828 (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale*. Paris). El espécimen se encuentra depositado en el MNHN (Figura 83).

2. Un ejemplar colectado por Roberto Dabbene en "*Misiones*" en octubre de 1900 (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 84).

3-5. Una hembra adulta, un macho inmaduro y un ejemplar sin sexar colectados por William Partridge en Parada Leis, departamento Capital, Misiones



Figura 83. Yetapá Chico *Alectrurus tricolor*, MNHN-ZO-MO-2003-2140, Corrientes, entre 1827 y 1828 (Patrick Boussès, Muséum National d'Histoire Naturelle)

Figura 84. Yetapá Chico *Alectrurus tricolor*. Izquierda: MACN-Or-5493, Misiones, octubre de 1900. Derecha: MACN-Or-734, sin datos (Diego Monteleone)

el 11 de julio de 1961 (Navas & Bó [1988] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 15: 11-37). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
6-7. Un adulto y un macho joven colectados por William Partridge en Parada Leis, departamento Capital, Misiones el 27 de julio de 1961 (Navas & Bo [1988] *op. cit*.). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
8. Un macho observado por Samuel Narosky cerca de Colonia Carlos Pellegrini, departamento San Martín, Corrientes el 6 de septiembre de 1979 (S. Narosky, inédito).
9. Mencionada sin detalles para la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes (Chebez [2005] *Guías de las reservas naturales de la Argentina*. Tomo 3. Albatros).
10. Un macho adulto observado por José Vizcaichipi sobre la ruta provincial n°40 cerca de la estancia La Clarita, departamento San Martín, Corrientes en octubre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *en* Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).
11. Un macho observado por Alejandro Bodrati sobre la ruta nacional n°14 unos 10 km al noreste de San José, departamento Capital, Misiones el 22 de marzo de 2022 (Bodrati & Monteleone *en prep*.).
Comentarios: El espécimen macho adulto MACN-Or-734 podría ser parte de la expedición de Roberto Dabbene a la provincia de Misiones (Figura 84). Había sido incluida para la avifauna del PN Mburucuyá, Corrientes en base a una observación de Judith Hutton en diciembre de 1990 (Gómez & Babarskas [1992] *en* Gómez *et al.* [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN). Posteriormente Chatellenaz *et al*. ([2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160) la excluyen del listado asumiendo que se trató de un error. Considerada Posiblemente Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (7): **MACN-Or-**5493, **MACN-Or-**44607, **MACN-Or-**44608, **MACN-Or-**44609, **MACN-Or-**44610, **MACN-Or-**44611, **MNHN-ZO-MO-**2003-2140

GAUCHO ANDINO | *Agriornis albicauda* | R

Distribución: Local en los Andes desde Ecuador hasta el N Chile y NO de Argentina, mayormente entre los 2500-4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Luis Dinelli en el cerro Muñoz, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 25 de mayo de 1906 (Lillo [1909] *Apuntes de Historia Natural* 1: 21-26). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.
2. Una hembra colectada por Johan Mogensen en Aconquija, Tucumán el 12 de agosto de 1912. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Un ejemplar colectado por Leo Miller y Howarth Boyle arriba de Tafí del Valle, departamento homónimo, Tucumán en abril de 1916 (Chapman [1926] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 55: 134-702; Zimmer [1937] *American Museum Novitates* 930: 1-27). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
4. Un ejemplar colectado por Johan Mogensen en Corral Quemado, departamento Belén, Catamarca el 4 de diciembre de 1918 (Collar *et al*. [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP). El espécimen se encuentra depositado en el MCZ.
5. Dos individuos observados por Claës Olrog en El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán en mayo de 1948 (Olrog [1949] *Acta Zoológica Lilloana* 7: 139-159). Al parecer una hembra fue capturada en dicha expedición el 19 de mayo de 1948, pero lamentablemente no pudo ser hallada en las colecciones.

Figura 85. Gaucho Andino *Agriornis albicauda*, quebrada del Corralito, Tucumán, 5 de abril de 2021 (Andrés Terán)

6-7. Dos ejemplares colectados por Claës Olrog arriba de Tafí del Valle, departamento homónimo, Tucumán el 1 de junio de 1952. Nores & Yzurieta (*en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*) mencionan que fueron obtenidos en "mayo y junio de 1952", información que parece errónea ya que no existirían especímenes de mayo de 1952. Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.
8. Un individuo observado por Pedro Blendinguer en el cerro Muñoz, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 30 de marzo de 1991 (Blendinguer [1998] *Nuestras Aves* 38: 5-8).
9. Dos individuos observados por Robert Dobbs y Paul Martin en El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 21 de octubre de 1997 (ebird.org/checklist/S24357851).
10. Un individuo observado por Mark Pearman arriba de El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 30 de septiembre de 2001 (M. Pearman *in litt.*).
11. Dos individuos observados por Germán Pugnali en El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 9 de julio de 2003 (ebird.org/checklist/S26738733).
12. Un individuo observado por Santiago Imberti en El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 10 de agosto de 2003 (ebird.org/checklist/S27190137).
13-14. Registrada en La Ciénaga y en El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán entre los años 2003 y 2005 (Capllonch [2007] *Acta Zoológica Lilloana* 51: 151-160; Capllonch *et al.* [2011] *Acta Zoológica Lilloana* 55: 50-63).
15. Patricia Capllonch la menciona como de presencia habitual a lo largo de la ruta provincial n°307 en el valle de Tafí, departamento Tafí del Valle, Tucumán entre los meses de julio y agosto (Capllonch [2007] *op. cit.*).
16. Mencionada sin detalles para Caspalá y Santa Ana, departamento Valle Grande, Jujuy (Moschione [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de

Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Burgos *et al.* [2009] *Lista de las aves de la provincia de Jujuy, Argentina*. Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy).
17. Mencionada sin detalles para la RP Laguna Leandro, Jujuy (Moschione [2005] *op. cit.*; Burgos *et al.* [2009] *op. cit.*).
18-20. Mencionada sin detalles para el PN Los Cardones, la sierra de Santa Victoria y la sierra de Zenta, Salta (Moschione [2005] *op. cit.*).
21-26. Mencionada sin detalles para seis localidades de la provincia de Tucumán (Di Giacomo [2005] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).
27-28. Dos individuos observados en el filo del Pantanito y en el cerro Picacho, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] *Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro*. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy; González *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).
29. Mencionada para las inmediaciones del MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy sin detalles (Moschione *et al.* [2011] *Aves Argentinas* 30: 14-17).
30. Un adulto observado por Luis Pagano en el río Tranca, departamento Santa Victoria, Salta el 17 de julio de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).
31. Un individuo observado por Luis Pagano sobre la ruta provincial nº7 cerca del acceso a Lizoite, departamento Santa Victoria, Salta el 20 de julio de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).
32. Un individuo observado por Mario Mosqueira en El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 14 de septiembre de 2017 (ebird.org/checklist/S39522999).
33. Un individuo observado por Nicolás Bejarano en Casa de Piedra, departamento Rosario de Lerma, Salta el 19 de mayo de 2018 (ebird.org/checklist/S51466169).
34. Un individuo observado por Pablo Grilli y Laura Dodyk al oeste de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S51551098).
35. Un ejemplar filmado y fotografiado por Giselle Mangini y Facundo Gandoy en la quebrada del Corralito, departamento Trancas, Tucumán el 22 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79771703). En el lugar al parecer existe una pequeña población local, ya que las aves fueron nuevamente registradas por otros observadores (ebird.org; Figura 85).
Taxonomía: Anteriormente conocida como *Agriornis andicola* (Ridgely & Tudor [2009] *op. cit.*).
Comentarios: Existen numerosas confusiones con la raza puneña del GAUCHO PARDO *Agriornis micropterus andecola* y con el GAUCHO SERRANO *Agriornis montanus*, por lo tanto las observaciones sin documentar deben tomarse con mucha cautela. El ave colectada por la expedición sueca en El Moreno, departamento Tumbaya, Jujuy (Lönnberg [1903] *Ibis* 45: 441-471) probablemente corresponda a *Agriornis micropterus*. Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (6): **MACN-Or-**8633, **COFML-**00474, **COFML-**7969, **COFML-**7972, **AMNH-**141430, **MCZ-**99389

BURLISTO BOREAL | *Contopus virens* | V

Distribución: Nidifica en una extensa región al E de Estados Unidos. Posteriormente ocupa el NO de Sudamérica incluyendo N de Bolivia y SE de Perú (Watt *et al.* [2020] *en* Rodewald [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: **1**. Una pareja colectada por Gunnar Höy en San Ramón de la Nueva Orán, departamento

Orán, Salta el 12 de septiembre de 1978 (Höy [1981] *Historia Natural* 2: 43-44). Uno de los especímenes se encuentra depositado en el MACN (Figura 86).
2. Un ejemplar grabado y fotografiado por Oscar Spitznagel, Flavio Moschione y Juan I. Areta en El Gallinato, departamento La Caldera, Salta entre el 27 de febrero y el 3 de abril de 2016 (Spitznagel *et al.* [2018] *Cotinga* 40: 114-116; xeno-canto.org/402740).
3. Un individuo observado y escuchado por Flavio Moschione en Las Blancas, departamento Rosario de Lerma, Salta el 31 de marzo de 2020 (ebird.org/checklist/S66459170).
Especímenes (1): **MACN-Or-**53004

Figura 86. Burlisto Boreal *Contopus virens*, MACN-Or-53004, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, 12 de septiembre de 1978 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

ZORZAL AZULADO | *Turdus flavipes* | R

Distribución: La subespecie nominal en la región SE de Brasil, incluyendo el SE de Paraguay y Misiones en Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un macho adulto colectado por Gustavo Niederlein en "*Pinar de San Pedro*", Misiones en septiembre de 1887 (Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). El espécimen se encuentra depositado en el MZUC (Figura 87).
2. Mencionada sin detalles para Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

Figura 87. Zorzal Azulado *Turdus flavipes*, MZUC-124, pinar de San Pedro, Misiones, septiembre de 1887 (Luis Pagano)

3-4. Dos machos colectados en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 30 de octubre de 1953 (Chebez [1992] *Hornero* 13: 257-258; Navas & Bó [1993] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 16: 36-50). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
5-7. Tres machos colectados en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 31 de octubre de 1953 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
8. Un macho colectado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 1 de noviembre de 1953 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

Figura 88. Zorzal Azulado *Turdus flavipes*, posada La Lorenza, Misiones, 25 de septiembre de 2016 (Emilio White)

9-12. Cuatro machos colectados en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 6, 14, 25 y 28 de septiembre de 1954 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
13-14. Dos machos colectados en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 2 y 12 de octubre de 1954 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
15. Mencionada por William Partridge para el PN Iguazú, Misiones durante una visita entre el 25 y el 27 de septiembre de 1959 (Chebez [1992] *op. cit.*).
16. Un ejemplar grabado y fotografiado por Leandro Castillo en la reserva privada de Vida Silvestre Urugua-í, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 22 de noviembre de 2014 (Amicone [2015] *Vida Silvestre* 131: 22-26; xeno-canto.org/256917).
17. Un ejemplar fotografiado por Emilio White en la posada La Lorenza, departamento Iguazú, Misiones el 25 de septiembre de 2016. El ejemplar permaneció varios días en el lugar (E. White *in litt.*; Figura 88).
18. Un individuo escuchado y observado por Alejandro Bodrati en la propiedad Las Ratas de Forestal Belga SA, departamento San Pedro, Misiones el 13 de noviembre de 2021 (A. Bodrati *in litt.*).
Especímenes (13): **MACN-Or-**34486, **MACN-Or-**34487, **MACN-Or-**34488, **MACN-Or-**34489, **MACN-Or-**34490, **MACN-Or-**34491, **MACN-Or-**37184, **MACN-Or-**37185, **MACN-Or-**37186, **MACN-Or-**37187, **MACN-Or-**37188, **MACN-Or-**37189, **MZUC-**124

ARAÑERO ESTRIADO | *Setophaga striata* | V

Distribución: Se reproduce en una extensa franja desde Alaska al E de Canadá. Luego migra a través de Estados Unidos y el Caribe, ocupando el NO de Sudamérica hasta Bolivia (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: **1**. Un macho en plumaje reproductivo colectado en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 11 de enero de 1958 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
2. Un macho en plumaje reproductivo colectado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 31 de mayo de 1959 (Partridge [1961] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Varios machos observados en los alrededores de Villa Gesell, partido homónimo, Buenos Aires entre el 12 y el 15 de febrero de 1966 (Olrog [1967] *Acta Zoológica Lilloana* 22: 249-254; Olrog [1967] *Hornero* 10: 292-298).
4. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN).
5. Dos individuos observados por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 6 de enero de 1987 (F. Moschione *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
6. Un macho en plumaje reproductivo fotografiado por Francisco Erize en Colonia Carlos Pellegrini, departamento San Martín, Corrientes el 15 de abril de 2007 (Erize [2008] *Nuestras Aves* 53: 44).
7. Un macho observado por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 25 de noviembre de 2010 (Bodrati [2012] *Nuestras Aves* 57: 13-14).
8. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la reserva Itahovy, departamento Guaraní, Misiones el 23 de noviembre de 2016 (Pagano & Bodrati *en prep.*).
9. Un macho en plumaje reproductivo fotografiado por Malena Ruzak en Leandro Alem, departamento homónimo, Misiones el 25 de mayo de 2019 (Ruzak & Moya [2020] *Nuestras Aves* 65: 71).
10. Un individuo en plumaje de reposo observado por Silvia Vitale y Carlos Ferrari en el portal Cambyretá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 16 de octubre de 2019 (ebird.org/checklist/S61371270).
11. Un macho inmaduro fotografiado por Marcos Enrique en cercanías de Miguel Torres, departamento General López, Santa Fe el 29 de mayo de 2020 (Enrique & Capovilla [2021] *Nuestras Aves* 66: 111)
Taxonomía: Conocido tradicionalmente como *Dendroica striata* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).
Especímenes (2): **MACN-Or-**38936, **MACN-Or-**39683

▪ DIADEMA | *Catamblyrhynchus diadema* | R

Distribución: Andes desde el N de Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, entre los 2300-3500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Francisco Contino en Santa Bárbara, departamento homónimo, Jujuy el 23 de septiembre de 1957 (Höy *et al.* [1963] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 43: 295-308). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 89).
2. Mencionada sin detalles para el PN Calilegua, Jujuy (Fjeldså & Krabbe [1990] *Birds of the High Andes*. University of Copenhagen).
3. Tres individuos observados por Juan Mazar Barnett y Bernabé López-Lanús en el PN Calilegua, Jujuy el 13 de julio de 1993 (Di Giacomo *et al.* [1997] *Hornero* 14: 264-266).
4. Un macho joven colectado por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 17 de agosto de 1993 (Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 89).
5. Un individuo observado por Pablo Giorgis en el PN Calilegua, Jujuy el 28 de agosto de 1995 (P. Giorgis *en* Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*).

6. Registrada por H. Zawacki en el PN Calilegua, Jujuy el 7 de junio de 1996 (Néstor Sucunza *en* Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*).
7. Un individuo observado por Alejandro y Guillermo Bodrati en el PN Calilegua, Jujuy el 1 de agosto de 1996 (A. y G. Bodrati *en* Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*).
8. Un individuo observado por Mario Mosqueira en el extremo sur de la sierra de Santa Bárbara, departamento homónimo, Jujuy en el año 1996 (M. Mosqueira *in litt.*). Esto fue publicado como "Sierra de Santa Bárbara, Salta" (Rougès & Seaman [2001] *Nuestras Aves* 42: 28-29).
9. Registrada por Javier Cerutti en el PN Calilegua, Jujuy en octubre de 1997 (J. Cerutti *en* Rougès & Seaman [2001] *op. cit.*).
10. Un individuo capturado por Mercedes Rougès y Dana Seaman en el PN El Rey, Salta el 28 de agosto de 1998 (Rougès & Seaman [2001] *op. cit.*). Al parecer el ejemplar no fue colectado.
11. Un inmaduro observado por Mark Pearman en el PN Calilegua, Jujuy el 1 de septiembre de 1998 (M. Pearman *in litt.*)
12. Un ejemplar fotografiado y filmado por Hernán Alvarado en el PN Calilegua, Jujuy el 22 de julio de 2003 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=3549; Figura 90).
13. Un individuo observado por Fabrice Schmitt en el PN Calilegua, Jujuy el 15 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S47324865).
14. Registrada en la reserva privada El Pantanoso, departamento Ledesma, Jujuy entre los años 2006 y 2010 (Moschione *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).
15. Dos ejemplares fotografiados por Ulises Ornstein, Darío Unterkofler, Julián Hernández y un grupo de observadores en el PN Calilegua, Jujuy el 18 de julio de 2011 (ebird.org/checklist/S37398638).
16. Un individuo observado por Michelle Delaloye y otros observadores en el PN Calilegua, Jujuy el 15 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S33625428).
17. Un individuo observado por Santiago Torres en el PN Calilegua, Jujuy el 15 de septiembre de 2019 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=973431).
Comentarios: La mayoría de los registros ocurren entre junio y septiembre, sugiriendo que la especie sería un visitante invernal en las yungas argentinas. Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (2): **MACN-Or-**54361, **MACN-Or-**54591

Figura 89. Diadema *Catamblyrhynchus diadema*. Arriba: MACN-Or-54591, sierra de Santa Bárbara, Jujuy, 23 de septiembre de 1957. Abajo: MACN-Or-54361, PN Baritú, Salta, 17 de agosto de 1993 (Luis Pagano)

Figura 90. Diadema *Catamblyrhynchus diadema*, PN Calilegua, Jujuy, 22 de julio de 2003 (Hernán Alvarado)

JILGUERO COLA BLANCA | *Sicalis citrina* | R

Distribución: Poblaciones dispersas en Sudamérica. Localmente en el NE de Brasil, el *cerrado*, Bolivia y NO de Argentina mayormente entre los 800-2800 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por Fritz Schulz en la "*Sierra de Tucuman*", sin fecha (Cabanis [1883] *Journal für Ornithologie* 31: 106-111). El espécimen se encuentra depositado en el ZBM (Figura 91).

2. Un macho colectado por Miguel Lillo en las cumbres de Mala Mala, departamento Lules, Tucumán el 6 de abril de 1901 (Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221; Lillo [1905] *Fauna Tucumana: Aves*. Revista de Letras y Ciencias Sociales). El espécimen se encuentra depositado en la COFML (Figura 92).

3. Una hembra colectada por Juan Simón Guanuco en Hualinchay, departamento Trancas, Tucumán el 4 de mayo de 1957 (Olrog [1962] *Acta Zoológica Lilloana* 18: 111-120). El espécimen se encuentra depositado en la COFML (Figura 92).

4-5. Mencionada por Paul Handford como bastante común en los alrededores de Tafí del Valle, departamento homónimo, Tucumán en los veranos de 1972/73 y 1973/74 (Handford [1983] *Neotrópica* 29: 97-105).

6. Más de 50 individuos observados por Mark Pearman cerca de Canto El Monte (22°21'S 64°43'W), departamento Santa Victoria, Salta el 26 de diciembre de 1996 (Pearman [2001] *Cotinga* 16: 76-80).

7. Un individuo observado por Francisco Cornell en Volcán, departamento Tumbaya, Jujuy el 24 de febrero de 2002 (ebird.org/checklist/S11453901).

Figura 91. Jilguero Cola Blanca *Sicalis citrina*, ZMB-26562, Sierra de Tucumán (Carola Radke, Museum für Naturkunde)

Figura 92. Jilguero Cola Blanca *Sicalis citrina*. Arriba: COFML-10744, Hualinchay, Tucumán, 4 de mayo de 1957. Abajo: COFML-2269, cumbres de Mala Mala, Tucumán, 6 de abril de 1901 (Luis Pagano)

8. Numerosos individuos observados por Ignacio Roesler en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta en enero de 2004 (I. Roesler *in litt.*).
9. Una pareja observada cerca de Villamonte, departamento Santa Bárbara, Jujuy sin fecha (Segovia & Moschione [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires; José Segovia *in litt.*).
10. Un total de nueve ejemplares hallados muertos y fotografiados en Termas de Reyes, departamento Doctor Manuel Belgrano, Jujuy el 18 de julio de 2010 (Colina & Portales [2012] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 106: 1-8). Lamentablemente los especímenes no fueron conservados (Freddy Burgos *in litt.*).
11-13. Mencionada sin detalles para las localidades de Tafí del Valle, Piedra Tendida y Sierra de Medina, Tucumán (Ortiz *et al.* [2013] *Biológica* 16: 39-71).
14. Dos individuos observados por Emiliano García Loyola en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 27 de septiembre de 2014 (ebird.org/checklist/S27372681).
15. Un individuo observado por Frank Dijkstra entre Purmamarca y Salinas Grandes, departamento Tumbaya, Jujuy el 9 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S24778566).
16. Tres individuos observados por Julián Quillén Vidoz en Tafí del Valle, departamento homónimo, Tucumán el 6 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32170572).
17. Mencionada sin detalles para Yavi, departamento homónimo, Jujuy (Mamaní *et al.* [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 245: 1-19).
18. Unos seis individuos observados y grabados por Freddy Burgos y Américo Vilte en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta el 19 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S52161180).
19. Un ejemplar fotografiado por Giselle Mangini y Facundo Gandoy sobre la ruta provincial n°325 al oeste de Monteros, departamento homónimo, Tucumán el 27 de junio de 2021 (ebird.org/checklist/S91089030; Figura 93).
20. Unos doce ejemplares fotografiados por Ulises Ornstein, Daniel Almirón y Hugo Hulsberg en el camino a Mecoyita, departamento Santa Victoria, Salta el 8 de noviembre de 2021 (ebird.org/checklist/S97547759).
Taxonomía: *Orospina pratensis* fue descripto por Jean Cabanis en base al ejemplar depositado en el

Figura 93. Jilguero Cola Blanca *Sicalis citrina*, ruta provincial n°325, Tucumán, 27 de junio de 2021 (Giselle Mangini)

ZMB (Cabanis [1883] *op. cit.*), y luego pasó a la sinonimia de *Sicalis citrina*. Posteriormente los ejemplares de Argentina fueron asignados a la forma nominal (Hellmayr [1938] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series*. Volume XIII. Part XI). Actualmente la forma *pratensis* no es reconocida, y los especímenes argentinos determinados como subespecie *occidentalis* (Jaramillo [2020] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Comentarios: Claës Olrog ([1962] *op. cit.*) menciona que la hembra fue colectada en San Pedro de Colalao, departamento Trancas, Tucumán. Ortiz *et al.* ([2013] *op. cit.*) citan un espécimen proveniente de "Altos de la Totora, Trancas, Tucumán" que no pudo ser hallado en la COFML. Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (3): **COFML**-2269, **COFML**-10744, **ZMB**-26562

FUEGUERO ESCARLATA | *Ramphocelus bresilius* | V

Distribución: Franja costera del E de Brasil hasta Santa Catarina, mayormente por debajo de los 400 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un macho inmaduro colectado por Gustavo Niederlein en "*Pepirí Guazú, río Alto Uruguay*", Misiones el 27 de abril de 1887 (Höy [1973] *Physis. Sección C* 32: 222-223). El espécimen se encuentra depositado en el MZUC (Figura 94).

Figura 94. Fueguero Escarlata *Ramphocelus bresilius*, MZUC-110482, Pepirí Guazú, Río Alto Uruguay, Misiones, 27 de abril de 1887 (Luis Pagano)

2. Un individuo observado cerca de Santo Pipó, departamento San Ignacio, Misiones el 14 de enero de 1984 (Chebez *et al.* [1984] *Hornero* 12: 221-222).
3. Un individuo observado por Hugo Chaves en Colonia Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en el año 1989 (H. Chaves *en* Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).
4. Un individuo observado por Matías Entrocassi y Sandra Chediak en el PN Iguazú, Misiones el 2 de octubre de 1992 (M. Entrocassi y S. Chediak *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
5. Un macho observado por Hernán Povedano en la reserva natural Punta Lara, partido de Ensenada, Buenos Aires en agosto de 1999. El mismo permaneció en el sitio durante algunos meses (Pagano *et al.* [2012] *en* Roesler & Agostini [editores] *Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara. Provincia de Buenos Aires, Argentina.* Temas de Naturaleza y Conservación N°8. Aves Argentinas).
Comentarios: La posibilidad de que algunos de estos registros correspondan a ejemplares provenientes del comercio de aves ya fue analizada por otros autores. Confusiones con su congénere o con la subespecie misionera del FUEGUERO *Piranga flava saira* no pueden descartarse. Un ejemplar sin datos se encuentra exhibido en CHMO.
Especímenes (1): **MZUC**-110482

AFRECHERO CANELA | *Charitospiza eucosma* | V

Distribución: Especie típica del *cerrado*, ocupando el centro de Brasil y extremo NE de Bolivia hasta los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: **1**. Un macho colectado en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 7 de agosto de 1958 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 95).

2. Un macho colectado por Brian Schmidt al sur de Tafí del Valle, departamento homónimo, Tucumán el 18 de noviembre de 1996 (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH.

Comentarios: La localización dada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) para el espécimen de Tucumán parece ser errónea según datos de la etiqueta, siendo la correcta "*Tafí del Valle, 15 km S, 5 km E, 26°59'S 65°39'W, 1700m*".

Especímenes (2): **MACN-Or-**39140, **NMNH-**645526

Figura 95. Afrechero Canela *Charitospiza eucosma*, MACN-Or-39140, arroyo Urugua-í, km 10, Misiones, 7 de agosto de 1958 (Diego Monteleone)

CORBATITA AMARILLO | *Sporophila nigricollis* | V

Distribución: La población más cercana a Argentina ocupa una extensa región del E y S de Brasil (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: **1**. Un macho adulto colectado en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 17 de noviembre de 1959 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 96).

2. Una pareja observada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 5, 6 y 8 de enero de 1985 (F. Moschione *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

Especímenes (1): **MACN-Or-**39761

Figura 96. Corbatita Amarillo *Sporophila nigricollis*, MACN-Or-39761, arroyo Urugua-í, km 10, Misiones, 17 de noviembre de 1959 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

CACHILO DE ANTIFAZ | *Coryphaspiza melanotis* | R

Distribución: Localizado en el SE de Brasil, E de Paraguay y NE de Argentina; con una población disyunta en el N de Bolivia (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: **1**. Una hembra colectada por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 de diciembre de 1902 (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 11-267; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

2. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 10 de septiembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

3. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 10 de octubre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

4-5. Dos machos colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 18 de octubre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

6. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 8 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

7. Una hembra colectada por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 10 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *Ornitología Neotropical* 23: 467-488). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

8. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 16 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

9-10. Un macho y una hembra colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 23 y 24 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

11. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 de diciembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

12-13. Dos machos colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe en octubre de 1905 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *op. cit.*). Los especimenes se encuentran depositados en el MACN.

14-15. Dos machos colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Villa Ocampo, departamento General Obligado Santa Fe el 11 y 18 de noviembre de 1905 (S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño [2016] *Historia Natural. Tercera Serie* 6: 111-114). Los especímenes se encuentran depositados en el FMNH.

16. Un nido hallado por Santiago Venturi en Villa Ocampo, departamento General Obligado, Santa Fe el 26 de diciembre de 1905 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi *en* Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *op. cit.*). Al parecer el mismo no fue colectado.

17. Observada por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 30 de diciem-

bre de 1911 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Este autor aporta una minuciosa descripción y medidas, lo que sugiere que habría obtenido algún ejemplar.
18. Un macho colectado por William Partridge en la estancia Rincón de las Mercedes de Colonia Garabí, departamento Santo Tomé, Corrientes el 18 de abril de 1962 (Short [1971] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 9: 282-309). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
19-21. Tres machos colectados por William Partridge en la estancia Puerto Valle, departamento Ituzaingó, Corrientes el 14 y 22 de noviembre de 1962 (Short [1971] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
22-23. Varios individuos observados (dos colectados) por Lester Short y Richard Crossin 14 km al norte de Ituzaingó, departamento homónimo, Corrientes entre el 22 y el 26 de octubre de 1967 (Short [1971] *op. cit.*). Un macho obtenido el 22 de octubre se encuentra depositado en el AMNH, aunque el restante no fue hallado en la colección del MACN (Yolanda Davies *in litt.*).
24. Mencionada para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y probablemente Formosa (Short [1975] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163-352).
25. Un individuo observado por Samuel Narosky en San José, departamento Apóstoles, Misiones el 18 de agosto de 1986 (S. Narosky *en* Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA).
26. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Short [1975] *op. cit.*; Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN; Narosky & Yzurieta [1987] *Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini).
27. Registrada por Marcos García Rams en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 6 de noviembre de 1996 (M. García Rams *com. pers.*).
28. Dos individuos observados en la estancia Puerto Valle, departamento Ituzaingó, Corrientes sin fecha (Giraudo *et al.* [2003] *en* Álvarez [editor] *Fauna del Iberá*. EUDENE; Giraudo *et al.* [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).
29. Un ejemplar grabado y fotografiado por Ricardo Clark, Davis Finch y un grupo de observadores en Caza Pava (ruta nacional n°14, 32 km al sur de Gobernador Virasoro), departamento Santo Tomé, Corrientes el 6 de octubre de 1997 (Giraudo & Di Giacomo [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Finch [2008] *en* López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones; R. Clark *in litt.*; Figura 97).
30. Registrada por Marcos García Rams en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 5 de diciembre de 1997 (M. García Rams *com. pers.*).
31. Un individuo observado por Ricardo Clark y un grupo de observadores en Caza Pava (ruta nacional n°14, 32 km al sur de Gobernador Virasoro), departamento Santo Tomé, Corrientes el 10 de octubre de 1998 (Giraudo & Di Giacomo [2005] *op. cit.*; R. Clark *in litt.*).
32. Registrada por Marcos García Rams en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 10 de noviembre de 1999 (M. García Rams *com. pers.*).
33. Un individuo observado y fotografiado por

Figura 97. Cachilo de Antifaz *Coryphaspiza melanotis*, Caza Pava, Corrientes, 6 de octubre de 1997 (Ricardo Clark)

Ricardo Clark y un grupo de observadores en Caza Pava (ruta nacional n°14, 30 km al sur de Gobernador Virasoro), departamento Santo Tomé, Corrientes el 20 de noviembre de 1999 (Giraudo & Di Giacomo [2005] *op. cit.*; R. Clark *in litt.*).
34. Un ejemplar grabado por Miguel Castelino en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 12 de enero de 2003 (Castelino [2008] *en* López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).
35. Mencionada sin detalles para la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes (Krauczuk & Di Giacomo [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).
36. Un supuesto inmaduro observado por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 25 de junio de 2009 (López-Lanús *et al.* [2013] *en* Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).
Comentarios: Mariano Ordano y Andrea Bosisio ([1997] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 117: 77-79) presentan cuatro ejemplares colectados por Guillermo Martínez Achenbach en el departamento Capital, Santa Fe. Luego esos mismos aparecen como CACHILO CANELA *Donacospiza albifrons* (Ordano & Bosisio [2001] *Catálogo de aves del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe, Argentina*. *Serie Catálogos* 7: 1-85; Fandiño & Giraudo [2012] *op. cit.*). José Pereyra menciona haber colectado esta especie en Zelaya, partido de Pilar, Buenos Aires en junio de 1922 (Pereyra [1938] *Memorias del Jardín Zoológico de La Plata* 9: 1-304). Dichos ejemplares también fueron reidentificados como *Donacospiza albifrons* (Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).
Los registros del PN Mburucuyá, Corrientes necesitan confirmación (Gómez & Babarskas [1992] *en* Gómez *et al.* [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN; Chatellenaz *et al.* [2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160). Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Especímenes (20): **MACN-Or** 7235a, **MACN-Or**-7235b, **MACN-Or**-7235c, **MACN-Or**-7235d, **MACN-Or**-48324, **MACN-Or**-48325, **MACN-Or**-48326, **MACN-Or**-48327, **COFML**-2198, **COFML**-2200, **AMNH**-100261, **AMNH**-199117, **AMNH**-519700, **AMNH**-519701, **AMNH**-519702, **AMNH**-509703 (= 519703), **AMNH**-519704, **AMNH**-519705, **FMNH**-56800, **FMNH**-56801

SOLDADITO GRIS | *Lophospingus griseocristatus* | R

Distribución: Andes de Bolivia y NO de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado por Felipe Silvestri en "*Salta*" en julio de 1898 (Zotta [1940] *Hornero* 7: 359-365). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 98).
2. Un individuo anillado por Carlos Gerow en Huacalera, departamento Tilcara, Jujuy en el año 1975 (C. Gerow *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
3. Dos individuos observados por Fabrice Schmitt en La Quiaca, departamento Yavi, Jujuy el 26 de octubre de 2002 (ebird.org/checklist/S47324600).
4. Un individuo observado por Luis Fernández en Abra Pampa, departamento Cochinoca, Jujuy el 1 de agosto de 2008 (ebird.org/checklist/S33581472).
5. Un individuo observado por Freddy Burgos en la sierra de Zenta, departamento Valle Grande, Ju-

juy el 29 de mayo de 2011 (Burgos [2017] *XVII Reunión Argentina de Ornitología*. Puerto Iguazú; ebird.org/checklist/S41475042).
6-8. Mencionada por Flavio Moschione para las siguientes localidades de la provincia de Salta: Pucará, departamento Santa Victoria; quebrada de Escoipe, departamento Chicoana e Ingeniero Maury, departamento Rosario de Lerma (F. Moschione *com. pers.*).
9. Registrada por Flavio Moschione en el cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] *Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro*. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy; F. Moschione *com. pers.*).
10. Un individuo capturado en el Valle Encantado del PN Los Cardones, Salta en octubre de 2018 (Enrique Derlindati *in litt.*). El ejemplar no fue colectado y al parecer no existen fotografías del mismo.
Especímenes (1): **MACN-Or-**5425a

Figura 98. Soldadito Gris *Lophospingus griseocristatus*, MACN-Or-5425a, Salta, julio de 1898 (Diego Monteleone)

SAÍRA MILITAR | *Tangara cyanocephala* | V

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, incluyendo el extremo E de Paraguay y NE de Argentina hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Una hembra adulta colectada en "*Misiones*" el 20 de julio de 1908 (Zotta [1940] *Hornero* 7: 359-365). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 99).
Especímenes (1): **MACN-Or-**5422a

Figura 99. Saíra Militar *Tangara cyanocephala,* MACN-Or-5422a, Misiones, 20 de julio de 1908 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

TAXA NO ASIGNADOS A NIVEL DE ESPECIE

Se presentan dos casos que no pudieron ser asignados a nivel de especie. Mayores estudios permitirán en el futuro resolver la identidad de las poblaciones que habitan en la Argentina.

ALBATROS "TIPO CAUTA" | *Thalassarche cauta/steadi*

La especie *Diomedea* (*Thalassarche*) *cauta* ha sido referida para la avifauna argentina desde hace tiempo, e incluida sin detalles por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El consenso actual sigue los lineamientos de Robertson & Nunn ([1998] *en* Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons), quienes consideran a las cuatro subespecies del ALBATROS DE TASMANIA *Thalassarche cauta* como especies diferentes: *T. cauta*, *T. steadi*, *T. salvini* y *T. eremita*. Algunos autores utilizan la denominación "albatros *tipo cauta*" para los taxa *T. cauta* y *T. steadi*, ambos casi indistinguibles en el campo.
El grupo *cauta/steadi* fue objeto de estudios taxonómicos basados en morfología y genética (Double *et al.* [2003] *Emu* 103: 287-294; Abbott & Double [2003] *Molecular Ecology* 12: 2747-2758; Abbott & Double [2003] *Molecular Ecology* 12: 2953-2962). Al no tener detalles sobre los antiguos registros es muy difícil asignarlos a una especie determinada, y la identificación de los ejemplares inmaduros resulta en ocasiones imposible (Howell [2006] *Birding* 38: 56-59; Howell [2009] *Neotropical Birding* 4: 19-25). Las evidencias sugieren que *T. steadi* es la más habitual en el océano Atlántico sur, mientras que por el momento no existen pruebas que aseguren la presencia de *T. cauta* en aguas argentinas.

Registros: **1**. Un ejemplar colectado en las islas Georgias del Sur el 16 de noviembre de 1926 (Bourne [1977] *Cormorant* 2: 7-10; Prince & Croxall [1983] *British Antarctic Survey Bulletin* 59: 15-27). El mismo había sido determinado como *T. cauta cauta* (Bourne [1977] *op. cit.*), pero actualmente no es posible asignarlo a nivel de especie (Christian Savigny *in litt.*). El espécimen se encuentra depositado en el NML (Figura 100).
2. Un individuo observado unos 225 km al este de Cape Pembroke, islas Malvinas el 16 junio de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *Sea Swallow* 34: 18-28; Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).
3. Un individuo observado a unos 11 km de Cape Pembroke, islas Malvinas el 26 junio de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *op. cit.*; Woods [2017] *op. cit.*).
4. Un individuo observado unos 40 km al sudeste de Lively Island, islas Malvinas el 2 de julio de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *op. cit.*; Woods [2017] *op. cit.*).
5. Un individuo observado a 1,6 km de Volunteer Point, islas Malvinas el 6 de agosto de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *op. cit.*; Woods [2017] *op. cit.*).
6. Un individuo observado unos 29 km al este de Cape Pembroke, islas Malvinas el 10 de abril de 1985 (Wolsey [1986] *Annual Report 1985*: 21-23. Falkland Island Trust).
7. Un individuo observado por M. Whitehouse cerca de las islas Georgias del Sur (52°06'S 53°01'W) el 26 de enero de 1986 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104).
8-12. Cinco individuos observados al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 28 de marzo de 1987 (Curtis [1988] *Sea Swallow* 37: 3-8).
13-14. Dos adultos observados unas 80 millas al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 27 de enero de 1992 (Curtis [1994] *Sea Swallow* 43: 19-28).
15. Un individuo observado por Germán Pugnali y un grupo de observadores frente a la costa de Necochea, Buenos Aires el 23 de abril de 1996 (ebird.org/checklist/S26662166).
16. Un inmaduro observado por Santiago Imberti frente a la bahía San Blas, Buenos Aires el 14 de marzo de 2000 (ebird.org/checklist/S27041063).
17-40. Un total de 24 individuos (la mayoría inmaduros y dos adultos *cauta/steadi*) registrados cerca de las islas Malvinas entre febrero de 1998 y enero 2001. Todas las observaciones ocurrieron entre enero y mayo (White [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).
41. Un adulto observado por Tim Reid al borde del banco Burdwood el 15 de noviembre de 2001

Figura 100. Albatros "tipo cauta" *Thalassarche cauta/steadi,* NML-1926.3299, Georgias del Sur, 16 de noviembre de 1926 (World Museum)

(Henry & Reid [2002] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 2: 17-18).
42. Un inmaduro observado por Tim Reid al sudeste de Beauchêne Island, islas Malvinas el 10 de abril de 2002 (Black *et al.* [2003] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 3: 17-18).
43. Un individuo observado por Joe Hanfman, Butch Pierce y Charlie Mayhood en el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 2 de febrero de 2003 (ebird.org/checklist/S3660585).
44. Un individuo observado por Carl Ball frente a la costa de Buenos Aires el 24 de enero de 2008 (ebird.org/checklist/S4106889).

45-62. Un total de 18 inmaduros observados (algunos fotografiados) por Manuel Marín aproximadamente a los 41°02'S 57°03'W el 8 de marzo de 2008 (Marín [2011] *Notornis* 58: 101-103).
63. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Federico Schulz frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires en febrero de 2008 (F. Schulz *en* Savigny & Carbajal [2015] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 180: 1-9).
64-84. Un total de 20 inmaduros y un adulto observados en la zona de los 39°S 56°W y 41°S 57°W entre el 5 y el 19 de mayo de 2008 (Seco Pon & Tamini [2013] *Revista Brasileira de Ornitologia* 21: 263-268). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
85. Registrada por Carlos Agulián y otros observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 17 de julio de 2009 (ebird.org/checklist/S66941342).
86. Mencionada como de presencia ocasional en la costa de San Antonio Oeste, departamento San Antonio, Río Negro entre los años 1986 y 2010 (Llanos *et al.* [2011] *Check List* 7: 782-797).
87. Un inmaduro observado por Manuel Marín a los 40°30'S 56°58'W el 10 de marzo de 2010 (Marín [2011] *op. cit.*).
88-101. Un total de 13 adultos y un inmaduro observados en la zona de los 41°S 57°W y 44°S 60°W entre el 19 y el 27 de mayo de 2010 (Seco Pon & Tamini [2013] *op. cit.*). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
102-112. Un total de 10 inmaduros y un adulto observados en la zona de los 39°S 55°W y 40°S 57°W entre el 1 y el 13 de junio de 2010 (Seco Pon & Tamini [2013] *op. cit.*). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
113-115. Un adulto y dos inmaduros observados en la zona de los 41°S 60°W y 42°S 59°W entre el 24 y el 29 de noviembre de 2011 (Seco Pon & Tamini [2013] *op. cit.*). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
116. Un adulto fotografiado por Christian Savigny unas 150 millas al noreste de Mar del Plata, Buenos Aires el 3 de abril de 2013 (Savigny & Carbajal [2015] *op. cit.*).
117. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Diego Monteleone, Ulises Ornstein, Luis Pagano y un grupo de observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 23 de febrero de 2014 (Savigny & Carbajal [2015] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S17192051).
118. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Diego Monteleone y un grupo de observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 10 de julio de 2016 (ebird.org/checklist/S30643700).
119-123. Unos cinco ejemplares inmaduros fotografiados por un grupo de observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 26 y 27 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S65116105; ebird.org/checklist/S40202842).
Comentarios: La primera mención para Argentina corresponde a un ejemplar colectado por el vapor *Undine* a los 35°44'S 53°W el 6 de septiembre de 1926, y nombrado como *Diomedella cauta platei* (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 311-348). El mismo fue utilizado por Gregory Mathews para crear el taxón *Diomedella cauta atlantica*, luego sinónimo de *Diomedea cauta salvini* (Mathews [1933] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 53: 213-214; Murphy [1936] *Oceanic birds of South America*. Vol. 1. American Museum of Natural History). Este espécimen (MACN-Or-1151a) posteriormente fue reidentificado por Christopher Robertson como *Diomedea cauta cauta* (Navas & Camperi [1999] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Nueva Serie* 1: 109-113), aunque el sitio de captura en realidad pertenece al territorio uruguayo (Mark Pearman *en* Savigny & Carbajal [2015] *op. cit.*).
Especímenes (1): **NML**-1926.3299

CARPINTERITO | *Picumnus sp.*

El CARPINTERITO OCELADO *Picumnus dorbignyanus* fue descripto por Frédéric de Lafresnaye ([1845] *Revue Zoologique* 8: 1-10) en base a un espécimen de Bolivia sin localidad precisa. La especie fue mencionada para la avifauna argentina durante mucho tiempo, e incluida sin detalles por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Los reportes históricos y modernos la refieren tanto para los bosques montanos como para los bosques del pedemonte en el extremo noroeste del país, donde vive en simpatría con la subespecie local del CARPINTERITO BARRADO *Picumnus cirratus thamnophiloides*. Esta última posee un diseño intermedio entre *P. cirratus pilcomayensis* y *P. dorbignyanus*, y no se descarta que exista cierto grado de hibridación (Short [1975] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163-352).

Este complejo escenario genera cierta confusión al momento de identificar los *Picumnus* de la región noroeste, tanto en el campo como estudiando especímenes de museo (ver Olrog [1958] *Acta Zoológica Lilloana* 15: 5-18; Olrog [1958] *Acta Zoológica Lilloana* 16: 83-90; Camperi [1990] *Hornero* 13: 147-153). Se necesitan estudios detallados para entender la real situación de los fenotipos escamados y barrados. Por todo esto, y a pesar de existir numerosas publicaciones, todavía es discutible la presencia de *P. dorbignyanus* en Argentina. Incluso se ha sugerido la existencia de especímenes del CARPINTERITO ESCAMADO *Picumnus albosquamatus* en la provincia de Salta (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides). En este trabajo preferimos tratar los registros como "no confirmados", hasta que nuevas evidencias permitan asignarlos en forma certera a un taxón determinado.

Registros: **1**. Una hembra colectada por Henry Durnford en "*Salta*" el 13 de junio de 1878 (Salvin [1880] *Ibis* 22: 351-366; Hargitt [1890] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 18. London; Dabbene

Figura 101. Carpinterito *Picumnus* sp. De izquierda a derecha: NHMUK-85.11.20.251, Salta, 27 de junio de 1878. NHMUK 85.11.20.353, Salta, 27 de junio de 1878. NHMUK-85.11.20.251, Salta, 13 de junio de 1878 (The Natural History Museum)

[1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 101).

2-3. Dos hembras colectadas por Henry Durnford en "*Salta*" el 27 de junio de 1878 (Salvin [1880] *op. cit.*; Hargitt [1890] *op. cit.*; Dabbene [1910] *op. cit*). Los especímenes se encuentran depositados en el NHMUK (Figura 101).

4. Un macho colectado por Alfredo Borelli en San Lorenzo (actualmente Calilegua), Jujuy en el año 1896 (Salvadori [1897] *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 12 [292]: 1-36; Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MZUT (Figura 102).

5. Una hembra colectada por Joseph Steinbach en el río San Francisco, Jujuy el 23 de julio de 1905 (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). El espécimen no pudo ser localizado.

6. Un macho adulto colectado por Luis Dinelli en "*Jujuy*" el 29 julio de 1906 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; Laubmann [1930] *Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Vogel*. Strecker & Schröder; Pergolani de Costa [1940] *Hornero* 7: 382-395). El espécimen se encuentra depositado en el ZSM (Figura 103).

7. Una hembra colectada por Juan Esteban, Claës Olrog y Octavio Budin en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta el 11 de diciembre de 1950. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

8. Un macho colectado por Francisco Contino en Yuto, departamento Ledesma, Jujuy el 12 de octubre de 1955. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

9. Una hembra colectada por Claës Olrog en San Francisco, departamento Valle Grande, Jujuy el 3 agosto de 1956. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

10. Una hembra colectada por Ángel Contino en "*Iruya, Salta*" el 15 de octubre de 1987. La altitud mencionada en la etiqueta (800 msnm) deja dudas con respecto al origen del ejemplar. El espécimen se encuentra depositado en el WFVZ.

Figura 102. Carpinterito *Picumnus* sp., MZUT-Av-14012, San Lorenzo, Jujuy, año 1896 (Luca Ghiraldi, Museo Regionale di Scienze Naturali)

Figura 103. Carpinterito *Picumnus* sp., ZSM-08.605, Jujuy, 29 julio de 1906 (Markus Unsöld, Zoologische Staatssammlung)

11. Incluida en la avifauna del PN El Rey, Salta (Chalukian [1989] *Relevamiento ecológico del Parque Nacional El Rey: Fauna*. APN).
12. Un individuo observado por Pedro Blendinguer en la seccional Caimancito del PN Calilegua, Jujuy entre el 14 y el 19 de julio de 1991 (Blendinguer [1998] *Nuestras Aves* 38: 5-8).
13. Un individuo observado por Pedro Blendinguer en la seccional Aguas Negras del PN Calilegua, Jujuy entre el 19 y el 22 de julio de 1991 (Blendinguer [1998] *op. cit.*).
14-15. Dos machos capturados por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 17 de agosto de 1993 (Di Giacomo *et al.* [1997] *Hornero* 14: 264-266; Salvador & Di Giacomo [2014] *Historia Natural. Tercera Serie* 4: 63-88). Los ejemplares no fueron colectados (A. Di Giacomo *in litt.*).
16. Mencionada por Mercedes Rougès para el PN El Rey, Salta (Rougès [1997] *Dinámica de las comunidades de aves en el gradiente altitudinal de las selvas de montaña del Parque Nacional El Rey*. APN).
17. Una pareja observada en la finca San Andrés, departamento Orán, Salta el 3 de noviembre de 1997 (Chani *et al.* [2002] *Nuestras Aves* 43: 13).
18. Una hembra con pichones observada en la finca San Andrés, departamento Orán, Salta el 21 de abril de 1998 (Chani *et al.* [2002] *op. cit.*).
19-20. Al menos dos ejemplares grabados por Niels Krabbe en el PN Calilegua, Jujuy el 4 y 6 de febrero de 2000 (Krabbe *et al.* [2001] *Sonidos de aves de Calilegua*. LOLA).
21. Un individuo observado por Oscar Braslavsky y Gisela Müller en el PN Calilegua, Jujuy el 19 de septiembre de 2003 (sib.gob.ar).
22. Una hembra colectada por personal del Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina

(PIDBA) unos 40 km al noroeste del cruce de la ruta nacional n°50 y la ruta provincial n°18 (camino a San Andrés), departamento Orán, Salta el 12 de enero de 2004. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.
23. Registrada por Pedro Blendinguer en la RN El Nogalar, Salta entre enero y marzo de 2005 (Blendinguer [2005] *Dinámica del reclutamiento de Pino del Cerro* [Podocarpus parlatorei]*: bases ecológicas para su manejo en bosques de montaña del noroeste argentino*. APN).
24. Incluida sin detalles para la avifauna de la RP Las Lancitas, Jujuy (Segovia & Moschione [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires).
25. Un individuo observado por Guillermo Gil en el PN Baritú, Salta el 28 de octubre de 2006 (sib.gob.ar).
26-28. Tres individuos capturados en zona de selva pedemontana (23°57'40''S 64°53'3''W), departamento Ledesma, Jujuy en enero de 2006 y febrero de 2007 (Miranda *et al.* [2010] *Ornitología Neotropical* 21: 323-337). Al parecer no se obtuvieron especímenes ni fotografías.
29-30. Dos ejemplares grabados por Peter Boesman en el PN Calilegua, Jujuy el 19 y 20 de octubre de 2013 (xeno-canto.org/272970; xeno-canto.org/272971).
Comentarios: Claës Olrog ([1958] *op. cit.*) presenta los diseños básicos de las plumas pectorales de *Picumnus* (*cirratus*) *jelskii*, *Picumnus cirratus* y *Picumnus dorbignyanus*. Este autor comenta la presencia de *P. dorbignyanus* en las provincias de Jujuy y Salta, aunque sospecha que dichas menciones pueden ser erróneas y en realidad corresponder a *P. (cirratus) jelskii*.
Tres especímenes colectados por Gunnar Höy pertenecen a *Picumnus cirratus thamnophiloides*: un macho proveniente de Aguaray, departamento General José de San Martín, Salta en septiembre de 1955 (FMNH-258632); una hembra colectada en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta en julio de 1957 (FMNH-258634) y un ejemplar obtenido en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta el 16 de junio de 1977 (MACN-Or-54587).
El espécimen MZUT-Av-14012 fue reidentificado por Tommaso Salvadori como *Picumnus cirratus* (Luca Ghiraldi *in litt.*). A pesar de figurar en informes internos del PN El Rey, Salta la especie no fue incluida en el inventario de dicha área protegida (Babarskas *et al.* [1995] *Inventario de Aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina*. LOLA).
Especímenes asignados a *Picumnus dorbignyanus* (13): **MACN-Or**-54587, **COFML**-6788, **COFML**-10051, **COFML**-10402, **COFML**-17653, **FMNH**-258632, **FMNH**-258634, **MZUT-Av**-14012, **NHMUK**-85.11.20.251, **NHMUK**-85.11.20.352, **NHMUK** 85.11.20.353, **WFVZ**-43733, **ZSM**-08.605

POSIBLES CAMBIOS TAXONÓMICOS

Los siguientes taxa han sido sugeridos como especies válidas por algunos autores, en cuyo caso representarían una adición a la avifauna local. Por el momento preferimos mantenerlas en la categoría de subespecie, a la espera de trabajos que confirmen en forma definitiva su estatus taxonómico.

SURI | *Rhea (pennata) tarapacensis*

Distribución: Andes desde el S de Perú hasta el N de Chile y NO de Argentina, entre los 3500-4500 msnm (Folch [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Taxonomía: Descripta por Charles Chubb ([1913] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 33: 79-81) en base a material colectado en Canchosa, Tarapacá, Chile. Considerada por mucho tiempo como la forma altoandina del CHOIQUE *Rhea pennata*, ambos tradicionalmente en el género *Pterocnemia*. Cuestiones relacionadas al número de escutelaciones tarsales, morfología y ecología justifican su tratamiento como especies distintas (Fjeldså & Krabbe [1990] *Birds of the High Andes.* University of Copenhagen; Jaramillo [2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press).
Comentarios: Roberto Dabbene ([1911] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 21: 293-307) fue el primero en sospechar la presencia de este taxón en territorio argentino. Esto fue confirmado mediante un ejemplar obtenido por Johan Mogensen en Pasto Ventura, cerro Nevado, Catamarca (Dabbene [1919] *Hornero* 1: 259-266; Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri).

PATO INCA | *Anas (flavirostris) oxyptera*

Distribución: Andes desde el centro de Perú hasta el NO de Argentina (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Taxonomía: Descripta por Franz Meyen ([1834] *Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher* 8: 59-124) con material proveniente del sur de Perú. Tradicionalmente considerada una subespecie del PATO BARCINO *Anas flavirostris*. Estudios moleculares recientes sugieren la validez del taxón *oxyptera* como especie plena (Graham *et al.* [2017] *Genome Biology and Evolution* 10: 14-32). Para una descripción y comparación entre ambos taxa, ver Jaramillo ([2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Comentarios: Las primeras menciones locales de la población *oxyptera* fueron publicadas por Tommaso Salvadori ([1897] *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 12 [292]: 1-36), Einar Lönnberg ([1903] *Ibis* 45: 441-471) y Carlos Bruch ([1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259).

PAÍÑO FUEGUINO | *Oceanites (oceanicus) chilensis*

Distribución: Se reproduce en la región del cabo de Hornos, Chile y luego se dispersa hacia la corriente de Humboldt (Drucker *et al.* [2020] *en* Billerman [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Taxonomía: Nombre originalmente utilizado por Wilfred Alexander ([1928] *Birds of the Ocean.* New York) para las aves que nidifican cerca del cabo de Hornos, Chile aunque sin mayores detalles. Posteriormente Robert Murphy ([1936] *Oceanic birds of South America*. Vol. 2. American Museum of Natural History) lo describe formalmente con material proveniente de la isla Wollaston, Chile. Por el momento se lo considera una subespecie del PAÍÑO DE WILSON *Oceanites oceanicus*. Si bien se requieren mayores estudios, este taxón bien podría representar una especie válida (Howell & Zufelt [2019] *Oceanic Birds of the World.* Princeton University Press; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Comentarios: Las leves diferencias de plumaje con respecto a otras subespecies del PAÍÑO DE WI-

LSON *Oceanites oceanicus* lo convierten en un taxón críptico que pasa desapercibido para la mayoría de los observadores. Al parecer es relativamente frecuente en aguas al sur y al este de Tierra del Fuego (ebird.org). Para una discusión sobre la confusa historia taxonómica de la subespecie *chilensis* ver Palma *et al.* ([2012] *Notornis* 59: 74-78; [2012] *Notornis* 59: 187-188).

CARPINTERO BATARAZ BOLIVIANO | *Dryobates (lignarius) puncticeps*

Distribución: Restringida al centro y S de Bolivia y extremo NO de Argentina (Winkler *et al.* [2020] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Taxonomía: Actualmente representa una población aislada del CARPINTERO BATARAZ GRANDE *Dryobates lignarius*. Las diferencias genéticas, morfológicas y vocales podrían justificar su tratamiento como especies separadas, en cuyo caso el nombre *puncticeps* estaría disponible (Winkler *et al.* [2020] *op. cit.*; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides; Areta, Pearman & Burgos *en prep.*).
Comentarios: El primer registro en territorio nacional corresponde a un individuo observado por Juan Mazar Barnett, Germán Pugnali y Marco della Seta cerca de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 27 de septiembre de 1997 (Mazar Barnett *et al.* [1998] *Cotinga* 9: 64-75). Actualmente se la considera muy rara y localizada en el noroeste argentino, con unas pocas observaciones en dicha localidad.

ATAJACAMINOS ÑAÑARCA | *Systellura (longirostris) atripunctata*

Distribución: Andes desde el centro de Perú hasta el N de Chile y NO de Argentina (Cleere [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).
Taxonomía: Descripta por Frank Chapman ([1923] *American Museum Novitates* 67: 1-12) en base a material colectado en Acobamba, Junín, Perú. Tradicionalmente considerada una subespecie de *Systellura longirostris*, aunque las vocalizaciones son lo suficientemente diagnósticas como para ser consideradas especies distintas (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides). Nuevas investigaciones a escala regional permitirán resolver las relaciones taxonómicas entre las diversas subespecies del complejo (Areta *et al. en prep.*).
Comentarios: Relativamente frecuente en las serranías de la región noroeste. Algunas de sus menciones más antiguas la refieren para Tucumán (Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221), Catamarca (Fontana [1908] *Enumeración sistemática de las aves de la región andina*. Escuela Nacional de Industrias Químicas de San Juan) y Jujuy (Budin [1931] *Hornero* 4: 401-411).

CARPINTERO REAL | *Colaptes (melanochloros) melanolaimus*

Distribución: Las subespecies *nigroviridis* y *leucofrenatus* en casi toda la mitad norte de Argentina hasta Neuquén y Río Negro, excepto Misiones (del Hoyo *et al.* [2020] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Taxonomía: El CARPINTERO REAL *Colaptes melanochloros* está conformado por dos grupos taxonómicos cuyo estatus fue discutido en varias ocasiones (Dabbene [1913] *Physis* 1: 241-261; Steullet &

Deautier [1935-1946] *Obra del Centenario del Museo de La Plata* 1: 1-1006; Zotta [1938] *Hornero* 7: 89-124). El grupo *melanolaimus* ocupa la mitad norte de Argentina, mientras que *melanochloros* se restringe a la provincia de Misiones y extremo norte de Corrientes. En la mayoría de los trabajos aparecen como especies diferentes, aunque la existencia de una zona de intergradación motivó a tratarlas como una única especie (Short [1971] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 9: 282-309; Short [1972] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 149: 1-109).
Comentarios: Las diferencias vocales, ecológicas y morfológicas hacen suponer nuevamente a algunos investigadores que *Colaptes melanochloros* y *Colaptes melanolaimus* deberían ser tratadas como especies distintas (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

CAMINERA TRINADORA | *Geositta (rufipennis) fasciata*

Distribución: Andes centrales arriba de los 2400 msnm y el O de Patagonia hasta Santa Cruz (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Taxonomía: En nuestro país la CAMINERA COLORADA *Geositta rufipennis* comprende dos grupos taxonómicos que seguramente merezcan el estatus de especie. El grupo *rufipennis* habita la cordillera de los Andes desde Jujuy hasta Mendoza, y las sierras subandinas de Córdoba y San Luis. El grupo *fasciata* se distribuye desde Mendoza occidental hasta Santa Cruz (Pearman & Areta [2020] *op. cit.*; Areta, Pearman & Jaramillo *en prep.*). Para mayores detalles, descripciones e ilustraciones ver Pearman & Areta ([2020] *op. cit.*).
Comentarios: Ambas poblaciones se conocen desde hace tiempo en territorio argentino (Zotta [1938] *Hornero* 7: 89-124).

REMOLINERA FUEGUINA | *Cinclodes (antarcticus) maculirostris*

Distribución: Localizada en costas marinas del extremo S de Chile y Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Descripta por Roberto Dabbene en base a un ejemplar proveniente de la isla Hermite, cabo de Hornos, Chile (Dabbene [1917] *Physis* 3: 58-59). Ampliamente tratada como una subespecie de la REMOLINERA NEGRA *Cinclodes antarcticus*. BirdLife International considera la forma *maculirostris* como especie válida (datazone.birdlife.org), aunque estudios moleculares recientes no hallaron diferencias significativas entre ambas poblaciones (Campagna *et al.* [2012] *Biological Journal of the Linnean Society* 106: 865-879).
Comentarios: La primera mención para Argentina corresponde a una pareja colectada por Juan Daguerre y Alberto Carcelles en la isla de Año Nuevo, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 2 de febrero de 1935 (Zotta [1938] *Hornero* 7: 46-64).

COLUDITO DEL ALTIPLANO | *Leptasthenura (aegithaloides) berlepschi*

Distribución: Andes del S de Perú, Bolivia, N de Chile y NO de Argentina hasta los 4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Taxón descripto por Ernst Hartert en base a un macho colectado en Augusto Pericheli,

Jujuy y otros especímenes provenientes de Jujuy, Salta y Tucumán (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Tradicionalmente considerada una subespecie del COLUDITO COLA NEGRA *Leptasthenura aegithaloides*. BirdLife International propone que la forma *berlepschi* sea reconocida como especie válida (datazone.birdlife.org).
Comentarios: La localidad de Augusto Pericheli fue señalada como "Angosta Perchela" por Raymond Paynter ([1995] *Ornithological Gazetteer of Argentina*. Museum of Comparative Zoology. Harvard University), aunque muy probablemente se refiera al Angosto del Perchel (= Villa El Perchel), departamento Tilcara, Jujuy. Para mayores detalles y descripciones ver Jaramillo ([2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

CACHIRLA PUNEÑA | *Anthus (furcatus) brevirostris*

Distribución: Andes en el centro y S de Perú, Bolivia y NO de Argentina hasta los 4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Descripta por Wladyslaw Taczanowski ([1874] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1874: 501-565) con material proveniente de Junín, Perú. Largamente considerada una subespecie de la CACHIRLA UÑA CORTA *Anthus furcatus*. La divergencia molecular y sus particulares vocalizaciones sugieren firmemente que el taxón *brevirostris* sea reconocido como especie válida (Van Els & Norambuena [2018] *Ibis* 160: 158-172; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Comentarios: El primer registro para Argentina corresponde a dos ejemplares colectados por Octavio Budin en Abra Pampa, departamento Cochinoca, Jujuy el 16 de febrero de 1958 (Olrog [1959] *Acta Zoológica Lilloana* 17: 421-428).

LOICA SERRANA | *Leistes (loyca) obscurus*

Distribución: Endémica de los pastizales altoserranos en las provincias de Córdoba y San Luis (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Taxonomía: Descripta por Manuel Nores y Darío Yzurieta ([1979] *Academia Nacional de Ciencias. Miscelláneas* 61: 4-8) con material proveniente de Pampa de Achala, Córdoba. Actualmente considerada una subespecie de la LOICA *Leistes loyca*. Nuevas investigaciones sugieren que la población serrana debería ser tratada como especie distinta (Pearman & Areta [2020] *op. cit.*; Pearman, Areta & Fraga *en prep.*).
Comentarios: Especie frecuente en la zona altoserrana de Córdoba y San Luis, con antiguas menciones en la literatura ornitológica (Stempelman & Schulz [1890] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 10: 393-409; Frenzel [1891] *Journal für Ornithologie* 39: 113-126; Laubmann [1930] *Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Vogel*. Strecker & Schröder; Castellanos [1934] *Hornero* 5: 307-338).

Totanus glottis.
Cat: #. 62 Rio de la Plata.
1860. Amérique.

ESPECIES HIPOTÉTICAS

Las siguientes 72 especies se han reportado para la avifauna argentina sin las pruebas necesarias que confirmen su presencia en el país. Es indispensable que dichas observaciones sean sustentadas por grabaciones de audio, videos, fotografías o especímenes. Por el momento quedan excluidas del listado nacional hasta que se presente dicha documentación. Para otras especies erróneamente reportadas en la literatura ver Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

PATO CASTAÑO | *Netta erythrophthalma*

Distribución: La subespecie nominal con distribución en parches desde Venezuela hasta el NO de Argentina y E de Brasil. La subespecie *brunnea* en el E y S de África (Carboneras [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Dos machos y dos hembras observados por Claës Olrog en la laguna Runtuyoc, departamento Cochinoca, Jujuy el 2 de junio de 1949 (Olrog [1949] *Acta Zoológica Lilloana* 7: 209-217).
2-3. Observada por Rodolfo Miatello en la laguna Los Nacimientos y en el río Cazadero Grande, Catamarca en el año 1978 (R. Miatello *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
4. Tres individuos observados por Alberto Seufferheld y Dionisio Mamaní en la laguna Larga, departamento Rinconada, Jujuy el 23 de febrero de 1994 (A. Seufferheld y D. Mamaní *en* Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales*. LOLA).
5. Dos machos observados en el PN El Rey, Salta el 11 de enero de 1998 (Serra *et al.* [1999] *Nuestras Aves* 40: 20).
6. Un macho observado en Jerónimo Cortés, departamento San Justo, Córdoba el 11 de febrero de 1998 (Michelutti & Torres [2006] *Nuestras Aves* 51: 32-34).
7-8. Un macho observado en cercanías de Miramar, departamento San Justo, Córdoba el 28 de marzo de 1998; y otro en la misma localidad 11 de noviembre de 1999 (Michelutti & Torres [2006] *op. cit.*).
9. Un macho y dos hembras observados en la laguna de Pusseto, departamento San Justo, Córdoba el 25 de julio de 2002 (Michelutti & Torres [2006] *op. cit.*).
10. Un total de nueve individuos reportados sin detalles en un censo realizado en el año 2004 (Nores & Serra [2005] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2004*. Wetlands International). Al parecer estas aves fueron registradas entre San Salvador de Jujuy, departamento Capital, Jujuy y Yacuiba, Bolivia en el año 2003 (Serra [2010] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2005*. Wetlands International).
11. Nueve individuos observados por Ada Echevarría, José María Chani, Claudia Marano y María Cocimano en el embalse El Cadillal, departamento Tafí Viejo, Tucumán el 6 de febrero de 2005 (Serra [2006] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2005*. Wetlands International).
12. Un macho adulto observado por Carlos Agulián en la laguna Runtuyoc, departamento Cochinoca, Jujuy el 7 de marzo de 2005 (ebird.org/checklist/S16279142).
13. Un "grupito" observado en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy en julio de 2005 (Freddy Burgos *en* Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
14. Nueve individuos observados por Pablo y Matías Michelutti en la isla El Mistolar de la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 14 de febrero de 2008 (Serra [2009] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2008*. Wetlands International).
15. Cuatro individuos observados por Francisco Cornell en Abra Pampa, departamento Cochinoca, Jujuy el 13 de abril de 2008 (ebird.org/checklist/S11453535).
16. Un macho adulto observado por Daniel Almirón en Abra Pampa, departamento Cochinoca, Jujuy el 27 de enero de 2009 (ebird.org/checklist/S16437380).
17-18. Cuatro individuos observados por Pablo y Matías Michelutti en la laguna del Plata, departamentos San Justo y Río Primero, Córdoba; y otros cinco en los bañados del río Dulce, departamento Tulumba, Córdoba el 10 de julio de 2009 (Serra [2010] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2009*. Wetlands International).
19. Ocho individuos reportados sin detalles en el censo de aves acuáticas de julio de 2011 (Rabuffetti [2012] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2011*. Wetlands International).
20. Un macho observado por Sergio Salvador a la vera de la ruta nacional n°60 cerca de Cortaderas, departamento Tinogasta, Catamarca el 15 de diciembre de 2015 (S. Salvador *com. pers.*).
Comentarios: Había sido incluida por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Chebez *et al.* ([1998]

op. cit.) mencionan que esta especie ha sido confirmada por Jorge Cajal para la RP San Guillermo, San Juan a través de una comunicación personal de Eduardo Haene. Llamativamente Haene *et al.* ([2001] *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción* 72: 59-67) no la incluyen en el listado de esa área protegida.
Un registro de 22 individuos en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 24 de febrero de 1996 requiere confirmación (Wetlands International [2015] *Waterbird Population Estimates, 5th edition*. Wetlands International). Freile *et al.* ([2016] *Wildfowl* 66: 3-21) reportan cuatro individuos en San Salvador de Jujuy en julio de 2009 que no pudimos hallar en la literatura. Con numerosos registros modernos, es llamativa la ausencia de documentación obligando a mantener a la especie como hipotética para la avifauna argentina.

PAVA DE MONTE ANDINA | *Penelope montagnii*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta Bolivia. La subespecie *sclateri* endémica de las yungas de Bolivia (del Hoyo [1994] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 2. Lynx Edicions).
Registros: 1-2. Dos grupos observados por Flavio Moschione entre Casas Viejas y el río Trigohuaico, departamento Santa Victoria, Salta el 29 de julio de 1992 (F. Moschione *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
Comentarios: Mencionada previamente en base a dos ejemplares colectados por José María Gómez en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta el 2 y 3 de febrero de 1960 (Olrog [1960] *Neotrópica* 6: 58-59). Estudios posteriores demostraron que pertenecían a la PAVA DE MONTE ALISERA *Penelope dabbenei* (Canevari & Caziani [1988] *II International Cracid Symposium.* Caracas).

PALOMA PLOMIZA | *Patagioenas plumbea*

Distribución: En la región del Chocó al NO de Sudamérica, la Amazonía y el SE de Brasil (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).
Registros: 1. Mencionada con dudas para la provincia de Misiones (Zotta [1937] *Hornero* 6: 531-554; Olrog [1963] *Opera Lilloana* 9: 1-377).
2. Un ejemplar fotografiado por Jake Manson, Mark Pearman y Marcelo Zambrano en el PP Moconá, Misiones el 29 de octubre de 2003 (Pearman *et al*. [2011] *Nuestras Aves* 56: 7-9). La fotografía se encuentra depositada en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP, aunque la calidad de la misma no permite identificarla con certeza.
3. Un ejemplar grabado por Federico Schulz en el PP Moconá, Misiones en mayo de 2004 (Schulz [2008] *en* López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones). La grabación es demasiado breve y apenas audible, bien podría tratarse de cualquier otra especie del género.
4. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 12 de mayo de 2009 (Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64; Pearman *et al*. [2011] *op. cit.*).
5. Un individuo escuchado por Bernabé López-Lanús en el PP Moconá, Misiones en diciembre de 2012 (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).
Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Arnaldo de Winkelried Bertoni menciona la captura de dos ejemplares en Puerto Bertoni, Alto Paraná, Paraguay en julio de 1917 y julio de 1918 (Bertoni [1919] *Hornero* 1: 255-

259). Estos registros limítrofes quizás hayan motivado los primeros comentarios referidos a la provincia de Misiones (Zotta [1937] *op. cit.*; Olrog [1963] *op. cit.*).

PINGÜINO OJO AMARILLO | *Megadyptes antipodes*

Distribución: Se reproduce en la isla sur de Nueva Zelanda, en la isla Stewart y en las islas subantárticas Auckland y Campbell (Seddon *et al.* [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).
Registros: 1. Mencionada como errante para las islas Malvinas, sin más detalles (Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).
Comentarios: Especie no mencionada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

PINGÜINO DEL PACÍFICO | *Spheniscus humboldti*

Distribución: Nidifica en la costa sudamericana del océano Pacífico, desde el centro de Perú al S de Chile (De la Puente *et al.* [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).
Registros: 1. Referida para la isla de Año Nuevo, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego de donde Santiago Venturi mencionó huevos blancos cuyas medidas fueron de 72 x 61 mm (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Esta cita fue repetida en trabajos posteriores (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1913] *Physis* 1: 241-261).
2. Un ejemplar empetrolado recuperado en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires sin fecha (Canevari *et al.* [1991] *Nueva guía de las Aves Argentinas*. Fundación Acindar). Al parecer existiría una fotografía del mismo (Jorge Rodríguez Mata *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), pero no se encuentra disponible.
Comentarios: Roberto Dabbene ([1910] *op. cit.*; [1914] *op. cit.*) también la menciona para la provincia de Tierra del Fuego. Este dato quizás provenga de Herman Schalow

Figura 104. Pingüino Patagónico *Spheniscus magellanicus,* MAS-Or-4789, Punta Quilla, Santa Cruz, 7 de febrero de 1979 (Diego Monteleone).

([1898] *Zoologische Jahrbücher.* Supplement 4. Band 3: 641-748), quien comenta que un huevo de esta especie fue colectado en dicha localidad. Luego Charles Hellmayr descarta esta información asegurando que pertenece al PINGÜINO PATAGÓNICO *Spheniscus magellanicus* (Hellmayr [1932] *Field Museum of Natural History. Zoological Series* 19: 1-472).
Un ejemplar colectado por Leonardo Díaz en Punta Quilla, departamento Corpen Aike, Santa Cruz el 7 de febrero de 1979 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). Este espécimen (MAS-Or-4789) fue revisado por Christian Savigny, concluyendo que en realidad se trata de un juvenil de PINGÜINO PATAGÓNICO *Spheniscus magellanicus* (C. Savigny *en* López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones; Figura 104).

PINGÜINO DEL CABO | *Spheniscus demersus*

Distribución: Se reproduce exclusivamente en las costas de Namibia y Sudáfrica (Crawford *et al*. [2013] *en* Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 27 de diciembre de 1986 (Rumboll [1990] *Nuestras Aves* 22: 28). El mismo fue fotografiado, pero lamentablemente la imagen no se encuentra disponible.
Comentarios: Un ejemplar de PINGÜINO PATAGÓNICO *Spheniscus magellanicus* con las características de *S. demersus* fue hallado en Punta Tombo, Chubut (John Hornbuckle *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

ALBATROS DE CAMPBELL | *Thalassarche impavida*

Distribución: Restringida a la isla Campbell al S de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).
Registros: 1. Un individuo observado por Santiago Imberti en Cabo Vírgenes, departamento Güer Aike, Santa Cruz el 18 de diciembre de 2002 (ebird.org/checklist/S24575818).
Taxonomía: Considerada tradicionalmente una subespecie del ALBATROS CEJA NEGRA *Thalassarche melanophrys*. Recientes trabajos moleculares sugieren que ambos taxa difieren lo suficiente como para considerarlas especies distintas (Shirihai & Jarret [2002] *The complete guide to Antarctic wildlife*. Princeton University Press).
Comentarios: Un ALBATROS REAL DEL SUR *Diomedea epomophora* anillado en la isla Campbell fue recuperado en la península Valdés, departamento Biedma, Chubut el 2 de junio de 1969 (Daciuk [1972] *Neotrópica* 18: 40-44). Esto demuestra que aves de esta isla eventualmente llegan a las costas argentinas.

PETREL BRASILERO (Petrel de Trinidade) | *Pterodroma arminjoniana*

Distribución: Se reproduce en las islas Trindade y Martín Vaz del océano Atlántico sur, y en la isla Round en el océano Índico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un individuo observado por William Curtis unos 350 km al sudeste de las islas Malvinas (54°01'S 54°46'W) el 12 de octubre de 1994 (Bourne & Curtis [1997] *The Warrah. Falklands Conservation* 12: 7-9).
2. Un individuo observado por Christian Savigny en el golfo San Matías, Río Negro el 21 de julio de 2003 (Savigny *et al*. [2005] *Hornero* 20: 183-186).
3. Un individuo observado por Santiago Imberti entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (52°38'S 48°25'W) el 13 de marzo de 2005 (Luigi *et al.* [2009] *en* Mohr *et al.* [editores] *Ilhas Oceânicas Brasileiras: da pesquisa ao manejo. Volume II*. Ministerio do Meio Ambiente).
4. Dos individuos de morfo claro observados por Santiago Imberti entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (52°16'S 51°58'W) el 14 de marzo de 2005 (Luigi *et al.* [2009] *op. cit.*).
Taxonomía: La población que cría en el océano Pacífico conocida como PETREL HERÁLDICO *Pterodroma heraldica*, actualmente se la considera una especie distinta (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).
Comentarios: Recientemente incluida con evidencia en la avifauna uruguaya (Abreu *et al.* [2010] *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 240-241).

PAÍÑO EUROPEO | *Hydrobates pelagicus*

Distribución: Cría en islas de Noruega, Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Canarias y el mar Mediterráneo. En invierno se dispersa al sur llegando hasta Sudáfrica (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Dos individuos observados por William Curtis a unas 30 millas de Cape Carysfort, islas Malvinas el 7 de diciembre de 1994 (Bourne & Curtis [1997] *The Warrah. Falklands Conservation* 12: 7-9).
Taxonomía: Algunos trabajos sugieren que existen dos especies: PAÍÑO BRITÁNICO *Hydrobates pelagicus* que cría en el noroeste de Europa, y PAIÑO DEL MEDITERRÁNEO *Hydrobates melitensis* que se reproduce en el mar Mediterráneo (Robb *et al*. [2008] *Petrels Night and Day*. The Sound Approach).

PETREL MOTEADO | *Pterodroma inexpectata*

Distribución: Especie típica del océano Pacífico, con colonias de nidificación en Nueva Zelanda y en las islas Fiordland, Solander, Stewart y Snares (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Hans Meltofte y Claus Horneman 130 millas al sudeste del cabo de Hornos (58°45'S 65°30'W) el 18 de diciembre de 1993 (Meltofte & Horneman [1995] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 115: 71-72; H. Meltofte *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La posición original dada por estos autores es incorrecta.
2. Un individuo observado por William Curtis al sudeste de las islas Malvinas (54°17,1'S 59°02,7'W) el 28 de diciembre de 1994 (Curtis [1995] *Sea Swallow* 44: 63-64).
3-6. Un total de cuatro individuos observados por Richard Heil y Blair Nikula unas 60 millas al norte de Smith Island, Península Antártica el 23 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40574389).
7. Un individuo observado por Richard Heil y Blair Nikula unas 33 millas al norte de Livingston Island, Península Antártica el 24 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40575132).
Comentarios: Colectada en aguas fueguinas del océano Pacífico durante la primera expedición de James Cook en el año 1769 (Clark [1986] *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos*. LOLA; Clark *et al.*

[1992] *Notornis* 39: 133-144; Curtis [1995] *op. cit.*). Una observación y una fotografía en el pasaje de Drake en marzo de 2008 y marzo de 2009 respectivamente, al parecer ocurrieron fuera de la jurisdicción argentina (Espin *et al.* [2009] *Seabird* 22: 54-55; ebird.org/checklist/S43998395).

PETREL DE PARKINSON | *Procellaria parkinsoni*

Distribución: Endémica de cría de Nueva Zelanda, nidificando en las islas Little Barrier y Great Barrier. En la etapa post reproductiva se dispersa hacia el océano Pacífico oriental, mientras que los inmaduros pasan algunos años en la corriente de Perú (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1-2. Registrada en dos ocasiones frente a la costa de Buenos Aires en los meses de febrero y abril, sin más detalles (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Taxonomía: Para una discusión sobre identificación ver Howell ([2006] *Birding* 38: 52-64).
Comentarios: Uno de los registros corresponde a un ejemplar fotografiado por Luis Pagano y un grupo de observadores unas 20 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 23 de febrero de 2014 (L. Pagano *obs. pers.*; Figura 105). Las fotografías fueron analizadas por Brent Stephenson, concluyendo que se trataba del PETREL NEGRO *Procellaria westlandica* (B. Stephenson *in litt.*).

Figura 105. Petrel Negro *Procellaria westlandica,* Mar del Plata, Buenos Aires, 23 de febrero de 2014 (Luis Pagano)

AVE FRAGATA GRANDE | *Fregata minor*

Distribución: Mayormente en zonas tropicales de los océanos Índico y Pacífico. La subespecie *nicolli* se restringe al océano Atlántico, nidificando en las islas Martín Vaz y Trindade frente a la costa de Brasil (Orta [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Una "posible" hembra adulta de esta especie observada por Bernabé y Máximo López-Lanús en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 24 enero de 2007 (López-Lanús & López-Lanús [2011] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 73: 1-7).
Taxonomía: La subespecie *nicolli*, única presente en el océano Atlántico, no cuenta con registros recientes de nidificación y parece estar condenada a la extinción (Orta [1992] *op. cit.*).
Comentarios: Las descripciones y bocetos aportados por López-Lanús & López-Lanús ([2011] *op. cit.*) no aseguran la identificación como *Fregata minor*. El plumaje descripto y representado no coincide con ninguno conocido para el género (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

GARCITA VERDOSA | *Butorides virescens*

Distribución: Desde el centro de Estados Unidos y E de Canadá hasta Panamá y el Caribe (Martínez-Vilalta & Motis [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo observado en reiteradas ocasiones por Flavio Moschione y Leonardo Pastorino en el PN Iguazú, Misiones el 13 y 15 de diciembre de 1982 (Moschione [1984] *Nuestras Aves* 5: 11-12).
2. Un adulto observado por Bernabé López-Lanús y Sofía Salazar en el riacho Pilagá, departamento Formosa, Formosa el 3 de octubre de 2014 (López-Lanús & Mencia [2017] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 228: 1-29).
Taxonomía: Aún no existe consenso con respecto a los límites de especie entre *Butorides virescens* y la GARCITA AZULADA *Butorides striata*, y muchas veces son consideradas conespecíficas. Para un análisis más profundo ver Hayes ([2002] *North American Birds* 56: 4-10) y Hayes *et al.* ([2013] *North American Birds* 67: 4-8).
Comentarios: Con respecto al registro del PN Iguazú, Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) comentan que Mauricio Rumboll negó haberla observado. Estos autores concluyen que es poco probable la presencia de *Butorides virescens* en Argentina.

CUERVILLO ESCARLATA | *Eudocimus ruber*

Distribución: Restringida al N de Sudamérica hasta el delta del Amazonas. Una población aislada recolonizó las costas de São Paulo, Brasil (Matheu & del Hoyo [1992] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).
Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40).
2. Una bandada observada en el bajo del Yacaré, departamento La Paz, Entre Ríos en el año 1979 (Ceruti [1990] *Revista de Antropología* 5: 60-76).
3. Incluida por Claës Olrog para la avifauna argentina, sin mayores detalles (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN). Esto se basó en una supuesta fotografía tomada por Zapico Antuña en los Esteros del Iberá, Corrientes (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros). La imagen nunca fue publicada y al parecer se encuentra perdida.
4. Un individuo observado en el arroyo Feliciano, Entre Ríos en el año 1988 (Ceruti [1990] *op. cit.*).

ESPARVERO YUNGUEÑO | *Accipiter ventralis*

Distribución: Andes desde Venezuela y Colombia hasta el O de Bolivia, mayormente entre los 900-2700 msnm (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).
Registros: 1. Un individuo observado por Matías Juhant en la seccional El Monolito del PN Calilegua, Jujuy en el año 2005 (Juhant [2006] *II Congreso de Rapaces Neotropicales*. Puerto Iguazú).
2-3. Un total de cuatro individuos observados por Ignacio Roesler en el PP Potrero de Yala y el PN Calilegua, Jujuy sin fecha (I. Roesler *en* Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros). Si bien es imposible asegurar que se tratara de *Accipiter ventralis*, hay que descartar al ESPARVERO ESTRIADO *Accipiter erythronemius* ya que las aves eran de morfotipo blanco liso y uno de ellos oscuro (I. Roesler *in litt.*).

4. Un adulto de la fase marrón observado por Luis Pagano cerca de la seccional El Monolito del PN Calilegua, Jujuy el 4 de enero de 2018 (L. Pagano *obs. pers.*).
5. Un adulto observado por Luis Pagano cerca de El Duraznillo, departamento Valle Grande, Jujuy el 6 de Julio de 2018 (L. Pagano *obs. pers.*).
Taxonomía: Seguimos el tratamiento propuesto por Thiollay ([1994] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the birds of the world*. Vol. 2. Lynx Edicions) en considerar a este taxón como especie válida.

CHORLO DORADO EUROPEO | *Pluvialis apricaria*

Distribución: Nidifica en el extremo N de la región Paleártica occidental, y luego realiza una corta migración hacia Europa y las costas del Mediterráneo (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Mencionada como accidental para las islas Malvinas, sin más detalles (Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).
Comentarios: Especie no mencionada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La identificación a campo del género *Pluvialis* suele ser complicada. Esta especie puede generar confusión con el CHORLO PAMPA *Pluvialis dominica*, el cual fue registrado en varias ocasiones en las islas Malvinas (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).

CHORLITO DE WILSON | *Charadrius wilsonia*

Distribución: Región Caribe y N de Sudamérica, con algunas poblaciones residentes en el N de Brasil y Perú (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Dos individuos observados en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre febrero de 2009 y septiembre de 2010 (Rodríguez *et al.* [2010] *Flamingo* 18: 45-47; Flavio Moschione *com. pers.*).

ALCARAVÁN | *Burhinus superciliaris*

Distribución: Zonas áridas al O de los Andes, desde el S de Ecuador hasta el extremo N de Chile. Al parecer sedentario en la mayoría de su rango (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PN San Guillermo, San Juan el 3 de abril de 1999 (Pagano & Bodrati *en prep.*).

BECASA CANELA | *Limosa fedoa*

Distribución: Se reproduce en el centro de Estados Unidos y luego realiza una corta migración hacia las costas del Pacífico y el Caribe. Se han reportado individuos errantes hasta el norte de Chile (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un individuo observado en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre septiembre y noviembre de 2009 (Rodríguez *et al.* [2010] *Flamingo* 18: 45-47; Camperi *et al.* [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140).
Comentarios: La referencia a la localidad de Las Doncellas, departamento Cochinoca, Jujuy (Camperi *et al.* [2012] *op. cit.*) se trataría de un error (Flavio Moschione *com. pers.*). Numerosos registros modernos en el centro de Chile, especialmente en la desembocadura del río Elqui, el estero Tongoy y Concón (ebird.org).

PLAYERITO VIENTRE NEGRO | *Calidris alpina*

Distribución: Nidificante circumpolar en Alaska, Canadá, Groenlandia, N de Europa y Siberia. La población americana realiza una migración post reproductiva a lo largo de la costa del océano Pacífico (subespecie *pacifica*) y el Atlántico (subespecie *hudsonia*) llegando hasta México (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Un individuo observado por Julius Kieser en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 12 de marzo de 1981 (Kieser [1982] *American Birds* 36: 1024-1025).
2. Un individuo observado por Santiago Imberti en la RP de Aves Playeras, Santa Cruz el 8 de enero de 2006 (Darrieu *et al.* [2008] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 10: 111-145).
3. Un individuo observado por Flavio Moschione en los bañados del Quirquincho, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *com. pers.*).
Comentarios: Especie no mencionada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Un individuo observado en la laguna Ganso, departamento Presidente Hayes, Paraguay el 29 de junio de 2001 (Lesterhuis & Clay [2003] *Hornero* 18: 65-67).

PLAYERITO OCCIDENTAL | *Calidris mauri*

Distribución: Se reproduce en Alaska y el extremo oriental de Rusia. Luego de la etapa reproductiva ocupa las costas del S de Estados Unidos, el Caribe y N de Sudamérica (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 19 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32892821).
Comentarios: Durante el verano austral se desplaza mayormente a través de la costa del océano Pacífico, con numerosos registros modernos en el centro de Chile (ebird.org).

BECASINA DE LOS PÁRAMOS | *Gallinago jamesoni*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta Bolivia, entre los 3000-3500 msnm (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Un individuo observado por Jorge Baldo en el paraje Archibarca, departamento Susques, Jujuy el 5 de marzo de 2003 (J. Baldo *in litt.*).
2. Un individuo observado por Flavio Moschione en el cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy entre los años 2008 y 2010 (González *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).

PITOTOY VAGABUNDO | *Tringa incana*

Distribución: Nidifica en Alaska y extremo O de Canadá. Posteriormente se dispersa a través del océano Pacífico llegando a las costas de Australia (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Flavio Moschione, José Segovia y Francisco Cornell en la laguna Vilama, departamento Rinconada, Jujuy el 17 de febrero de 2018 (ebird.org/checklist/S43394808; Figura 106). La fotografía obtenida no aporta pruebas suficientes para separarla con certeza del muy similar *Tringa brevipes*.
2. Un individuo observado por Flavio Moschione y José Segovia en Abra Pampa, departamento Cochinoca, Jujuy el 3 de febrero de 2021 (ebird.org/checklist/S82107850).
Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Heteroscelus* (Hayman *et al.* [1986] *op. cit.*).

Figura 106. Pitotoy *Tringa* sp., laguna Vilama, Jujuy, 17 de febrero de 2018 (José Segovia)

PITOTOY PATAS VERDES | *Tringa nebularia*

Distribución: Nidifica en casi toda la región Paleártica y luego realiza una migración hacia África, S de Asia y Australia (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado en "*Buenos Ayres*", sin más detalles (Schlegel [1864] *Revue méthodique et critique des collections déposées dans cet établissement*. Tome V. Muséum d'histoire naturelle des

Figura 107. Pitotoy Patas Verdes *Tringa nebularia*, RMNH-32812, "Buenos Aires" (Pepijn Kamminga, Naturalis Biodiversity Center)

Figura 108. Pitotoy Patas Verdes *Tringa nebularia*, RMNH-32813, "Río de la Plata", año 1860 (Pepijn Kamminga, Naturalis Biodiversity Center)

Pays-Bas; Seebohm [1888] *The geographical distribution of the family Charadriidae*. Henry Sotheran & Co.; Dabbene [1920] *Hornero* 2: 99-128). El espécimen (RMNH-32812) se encuentra depositado en el RMNH (Figura 107).
2. Un ejemplar colectado en el "*Río de La Plata*" en el año 1860 (Schlegel [1864] *op. cit.*; Seebohm [1888] *op. cit.*; Dabbene [1920] *op. cit.*). El espécimen (RMNH-32813) se encuentra depositado en el RMNH (Figura 108).
Comentarios: La proveniencia de estos ejemplares fue puesta en duda por Hellmayr & Conover ([1948] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series*. Volume XIII. Part I), y por ahora preferimos excluirla de la lista debido a la falta de detalles. El primer registro para Sudamérica corresponde a un adulto fotografiado en Pointe Saint-François, Guayana Francesa el 16 de febrero de 2006 (Claessens & Comité d'Homologation de Guyane [2015] *Cotinga* 37: 66-78).

GAVIOTA PERUANA | *Larus belcheri*

Distribución: Costa e islas del océano Pacífico, desde el N de Perú hasta el N de Chile. Existen dispersiones hacia el centro de Chile, S de Ecuador y Panamá (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).
Registros: 1. Un juvenil sobrevolando la laguna Llancanelo, departamento Malargüe, Mendoza sin fecha (Sosa [1995] *Multequina* 4: 65-75; Heber Sosa *in litt.*).
2. Avistajes de grupos de hasta cinco individuos en la laguna Las Salinas, departamento San Rafael, Mendoza en el año 2001 (Heber Sosa *in litt.*)
3. Un individuo observado en el lago Nahuel Huapi frente a San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, Río Negro en enero de 2005 (Lorenzo Sympson *en* Gelain [2010] *Aves de la Patagonia Argentina: atlas ornitológico de Río Negro*. San Juan; Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).
4. Un individuo observado por Juan C. Chebez en el lago Nahuel Huapi frente a San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, Río Negro en enero de 2006 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).
Comentarios: Es posible que los datos provenientes de San Carlos de Bariloche, Río Negro correspondan a la misma observación. Omitimos los registros con relación a la costa atlántica y las islas Malvinas, ya que seguramente pertenezcan a la GAVIOTA CANGREJERA *Larus atlanticus*.

GAVIOTÍN DE SAN FÉLIX | *Anous stolidus*

Distribución: Mayormente en regiones tropicales de los océanos Índico y Atlántico. La subespecie nominal habita el Caribe e islas del Atlántico, llegando hasta el golfo de Guinea y Camerún (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un ejemplar colectado por E. Biester y F. Hildebrandt supuestamente en las islas Malvinas en octubre de 1966 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El mismo había sido publicado como proveniente de "Atlantik vor Brasilien, St. Pauls-Felsen, Oktober 1966" (Kinzelbach [2016] *Die Vögel. Aves. Verzeichnis des Bestands 2016. Zoologische Sammlung der Universität Rostock*. Basiliskenpresse). Este espécimen (ZSRO-2174) posee actualmente la leyenda "*Falkland-Inseln, St. Pauls-Felsen*", por lo que preferimos mantenerlo como un registro hipotético o quizás erróneo.
Comentarios: Existen reportes recientes en aguas frente a Rio Grande do sul, Brasil (Antunes Dias *et al.* [2010] *Iheringia. Série Zoologia* 100: 379-390) y en La Paloma, Uruguay (Abente *et al.* [2010] *Achará Digital* 1: 7).

GAVIOTÍN ROSADO | *Sterna dougallii*

Distribución: La subespecie nominal en el E de Norteamérica, el Caribe, N de Sudamérica, NO de Europa, E y S de África. La población americana pasa la etapa no reproductiva mayormente en el océano Atlántico (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Lynx Edicions).
Comentarios: 1. Mencionada como rara en Punta Rasa, partido de la Costa, Buenos Aires donde algunos ejemplares fueron recapturados con redes y fotografiados (Anónimo [2005] *Vida Silvestre* 93: 33; Petracci *et al.* [2005] *Guía de las aves playeras y marinas migratorias del sur de América del Sur*; Esteban Bremer *in litt.*). Lamentablemente las fotografías aún no se encuentran disponibles.

GAVIOTÍN DE FORSTER | *Sterna forsteri*

Distribución: Se reproduce en aguas interiores de Norteamérica, y luego migra al sur ocupando el S de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Lynx Edicions).
Registros: **1**. Un juvenil fotografiado por Gustavo Bruno en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 7 de abril de 2012 (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
Comentarios: La fotografía nunca fue publicada y su identificación aún merece ser debidamente evaluada.

GAVIOTÍN ELEGANTE | *Thalasseus elegans*

Distribución: Restringida a las costas del Pacífico, nidificando en California y Baja California. Durante la época no reproductiva se desplaza hacia el sur llegando al centro de Chile (Gochfeld & Burger [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo observado por Mike Bingham en Puerto Stanley, islas Malvinas el 9 de agosto de 1996 (White & Henry [2001] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 1: 16-18).
Comentarios: Había sido mencionada para la estancia Rincón de Cobo, partido de La Costa, Buenos Aires (Lowen & Mazar Barnett [2010] *Nuestras Aves* 55: 12-16). Posteriormente se determinó que estas aves correspondían a variaciones del GAVIOTÍN PICO AMARILLO *Thalasseus sandvicensis* (Lowen [2016] *Neotropical Birding* 19: 49; James Lowen *in litt.*). Para una discusión sobre las poblaciones de *Thalasseus sandvicensis* ver Shoch & Aspiroz ([2016] *Neotropical Birding* 19: 44-57).

AÑAPERO ALAS CORTAS | *Chordeiles acutipennis*

Distribución: Desde el S de Estados Unidos hasta el centro Sudamérica. La subespecie nominal en el E de Brasil, N de Bolivia y Paraguay (Cleere [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PN Chaco, Chaco el 23 de diciembre de 2000 (Bodrati & Areta [2010] *Hornero* 25: 67-73).

2. Dos individuos observados por Flavio Moschione sobre el límite del PP Fuerte Esperanza, Chaco el 9 de enero de 2002 (F. Moschione *en* Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
3. Un grupo de siete individuos observado por Flavio Moschione en Los Leones, departamento Rivadavia, Salta el 7 de diciembre de 2002 (F. Moschione *en* Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
4. Un individuo y una pareja observados por Juan I. Areta sobrevolando la comunidad de Pozo Cercado, departamento Ramón Lista, Formosa el 12 de diciembre de 2003 (Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
5. Cuatro individuos observados por Juan I. Areta sobre la comunidad de El Cantor, departamento Ramón Lista, Formosa el 20 de diciembre de 2003 (Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
6. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en Joaquín V. González, departamento Anta, Salta el 11 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S51586824).

VENCEJO DE CHIMENEA | *Chaetura pelagica*

Distribución: Se reproduce en una extensa región al E de Estados Unidos. Su área de invernada es poco conocida, pero visita regularmente el E de Ecuador, O y E de Perú, NO de Brasil y N de Chile (Chantler [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo fotografiado David Stejskal y John Rowlett 1 km al norte de Tumbaya, departamento homónimo, Jujuy el 18 de noviembre de 1997 (D. Stejskal *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Por el momento la fotografía no se encuentra disponible (D. Stejskal *in litt.*).
2. Un individuo observado por Héctor Slongo y Steve Hilty en Yavi, departamento homónimo, Jujuy el 12 de noviembre de 2012 (H. Slongo *in litt.*).
Comentarios: Un ejemplar capturado y fotografiado por Ignacio Roesler y Rich Lindie en Humahuaca, departamento homónimo, Jujuy el 25 de octubre de 2018 (I. Roesler *in litt.*; Figuras 109-110). La identificación del mismo aún requiere confirmación.

Figuras 109-110. Vencejo *Chaetura* sp., Humahuaca, Jujuy, 25 de octubre de 2018 (Ignacio Roesler)

COLIBRÍ CHICO | *Colibri cyanotus*

Distribución: La subespecie *crissalis* en los Andes de Perú, Bolivia y NO de Argentina (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo capturado en la cuesta del Clavillo, departamento Andalgalá, Catamarca el 23 de enero de 1993 (Bertelli *et al.* [1997] *Hornero* 14: 269). Aparentemente el ejemplar no habría sido colectado.
2. Varios individuos observados por Flavio Moschione en El Algarrobal, Cachi Adentro, departamento Cachi, Salta en diferentes visitas del mes de octubre sin especificar el año (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata).
3. Al menos tres individuos observados por Flavio Moschione en El Algarrobal, Cachi Adentro, departamento Cachi, Salta el 26 de abril de 2007 (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).
4. Mencionada sin detalles para la provincia de Jujuy (Burgos *et al.* [2009] *Lista de las aves de la provincia de Jujuy, Argentina*. Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy).
Taxonomía: Anteriormente conocida como *Colibri thalassinus* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).
Comentarios: Un ejemplar colectado por Serafín Pierotti en Agua Rosada, departamento Trancas, Tucumán el 16 de marzo de 1957 (Olrog [1963] *Neotrópica* 9: 94). Este espécimen (COFML-10445) fue posteriormente reidentificado como inmaduro de COLIBRÍ GRANDE *Colibri coruscans* (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). A pesar de ser incluida en la lista de aves de Jujuy (Burgos *et al.* [2009] *op. cit.*), la misma no se menciona en un trabajo recopilatorio para dicha provincia (Camperi *et al.* [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140).

COQUETA VERDE | *Lophornis chalybeus*

Distribución: La subespecie nominal en el SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta Santa Catarina (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Observada en reiteradas ocasiones por Claës Olrog en Villa Gesell, partido homónimo, Buenos Aires entre los años 1967 y 1971 (Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264).
2. Una hembra observada por Martín de la Peña en Esperanza, departamento Las Colonias, Santa Fe el 8 de marzo de 1988 (de la Peña [1988] *Nuestras Aves* 16: 17-18).
3. Dos hembras observadas en el riacho Pilagá, departamento Formosa, Formosa el 12 de diciembre de 1988 (Salvador & Salvador [1990] *Hornero* 13: 178-179).
4. Dos hembras y un macho observados en el arroyo Tabay al norte de Jardín América, departamento San Ignacio, Misiones el 21 de diciembre de 1988 (Salvador & Salvador [1990] *op. cit.*).
5. Un individuo observado en el PN El Palmar, Entre Ríos en abril de 1994 (Pedro Moreyra y Marcelo Zanello *en* Marateo *et al.* [2009] *Cotinga* 31: 47-60).
6. Una hembra observada por Javier Heredia en el PP Salto Encantado, Misiones el 16 de octubre de 2006 (J. Heredia *en* Chebez [2009] *Otros que se van.* Albatros; J. Heredia *in litt.*).
Comentarios: Juan C. Chebez ([2009] *op. cit.*) comenta que el mismo Claës Olrog le comunicó la captura de un ejemplar de esta especie, del cual desconoce su paradero. Narosky & Yzurieta ([1987] *Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini) mencionan la observación de un individuo de *Lophornis* en el PN Iguazú, Misiones sin mayores detalles. Bernabé López-Lanús ([2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones) supone que todos los registros provienen de confusiones con polillas del género *Aellopos*.

PICAFLOR PICUDO | *Heliomaster longirostris*

Distribución: La subespecie nominal desde Costa Rica hasta el centro de Brasil y N de Bolivia (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un macho observado por Flavio Moschione a la vera del riacho Porteño en Villa General Güemes, departamento Patiño, Formosa el 20 de enero de 1988 (F. Moschione *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions; Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).
2. Un individuo filmado por Rodrigo Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 2001 (Chebez *et al.* [2004] *Hornero* 19: 1-5). Lamentablemente el material no se encuentra disponible.
3. Observada por Flavio Moschione en reiteradas ocasiones en la RP Loro hablador, Chaco sin fecha (Moschione & Bishels [2004] *Listado de las Aves del Parque Provincial Loro Hablador, provincia del Chaco.* Proyecto Elé & Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata).
4. Observada por Flavio Moschione en más de una ocasión en el PN Copo, Santiago del estero sin fecha (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*).
5. Registrada por Flavio Moschione en las inmediaciones de la RN Pizarro, Salta sin fecha (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*). Este registro es una de las fuentes para su inclusión en la avifauna de dicha provincia (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta.* Ministerio de Cultura y Turismo).
6. Observada por Silvia Strelkov y Carlos Cuñado en la RP Las Lancitas, Jujuy sin fecha (Flavio Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*).
7. Dos machos observados por Flavio Moschione sobre el río Teuco en los alrededores de El Sauzalito, departamento General Güemes, Chaco el 1 de febrero de 2007 (F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*).
8. Un individuo observado por Marcelo Gavensky sobre la ruta provincial n°13 entre Palma Sola y La Estrella, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 11 de noviembre de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=683391).
Comentarios: Martín de la Peña reportó una hembra fotografiada en Esperanza, departamento Las Colonias, Santa Fe el 10 de noviembre de 1976 (de la Peña [1978] *Enciclopedia de las aves argentinas. Fascículo IV.* Santa Fe; de la Peña [1988] *Nuestras Aves* 16: 17-18). Esta cita fue repetida en varias ocasiones, hasta que finalmente el mismo autor concluye que éste y otros dos ejemplares en realidad correspondían al PICAFLOR DE BARBIJO *Heliomaster furcifer* (de la Peña [2004] *Nuestras Aves* 47: 31; de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 6: 1-348).

PICAFLOR COLA CASTAÑA | *Hylocharis sapphirina*

Distribución: Fragmentada en el N y centro de Sudamérica, incluyendo E de Brasil, E de Paraguay y NE de Argentina (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Observada por Adolfo Doering en las riberas del río Guayquiraró, límite entre Corrientes y Entre Ríos durante enero y febrero de 1873 (Doering [1874] *Periódico Zoológico* 1: 237-258). Al parecer no se habría obtenido ningún ejemplar.
2. Un ejemplar capturado en Concepción del Uruguay, departamento Uruguay, Entre Ríos y entregado

a Walter Barrows el 13 de octubre de 1880 (Barrows [1884] *Auk* 1: 20-30). No queda claro si se conservó el espécimen, y en tal caso parece estar perdido.
3. William Hudson lo menciona como abundante en los bosques sobre el río de la Plata, Buenos Aires (Sclater & Hudson [1889] *Argentine Ornithology*. Vol. 2. RH Porton). Es muy probable que se refiera al PICAFLOR BRONCEADO *Hylocharis chrysura*.
4. Mencionada sin demasiados detalles por Johannes Frenzel para la provincia de Córdoba, antes de junio de 1890 (Frenzel [1891] *Journal für Ornithologie* 39: 113-126).
5-7. Un total de tres ejemplares colectados por Graham Kerr en Puerto Bermejo, departamento Bermejo, Chaco y en Capitán Page (24°47'S 58°45'W), departamento Pilagás, Formosa entre enero de 1890 y marzo de 1891 (Kerr [1892] *Ibis* 34: 120-152). Los especímenes aparentemente no fueron conservados.
8. Mencionada sin detalles para las provincias de Formosa, Chaco y Misiones (Short [1975] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163-352; Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
9. Mencionada sin detalles para la provincia de Corrientes (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28).
10. Registrada por Juan C. Chebez en el PN Iguazú, Misiones en febrero de 1983 (J.C. Chebez *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
11. Un individuo observado por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal en el PN Río Pilcomayo, Formosa entre el 20 y el 28 de enero de 1988 (F. Moschione y J. San Cristóbal *en* López-Lanús [1997] *Inventario de las aves del Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina*. LOLA).
12. Mencionada para el noreste de la provincia de Chaco cerca del río Bermejo, en septiembre sin precisar el año (Contreras *et al.* [1990] *Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
13. Registrada por Julio Contreras en la provincia de Entre Ríos en el año 1990, sin mayores detalles (J. Contreras *en* de la Peña [1997] *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. LOLA).
14. Una pareja observada regularmente por Alejandro Bodrati en la estancia San Gará, departamento Ituzaingó, Corrientes entre el 22 y el 26 de mayo de 1993 (A. Bodrati *in litt.*).
15. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Salto Encantado, Misiones el 8 de marzo de 1997 (A. Bodrati *in litt.*).
16. Un macho observado por Emilio White y Gustavo Zurita en la estancia Guaycolec, departamento Formosa, Formosa en diciembre de 1998 (Ramírez Llorens *et al.* [2003] *Nuestras Aves* 46: 36-40).
17. Mencionada como residente y nidificante en el área comprendida entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y la localidad de Barranqueras, departamentos Bermejo y 1º de Mayo, Chaco entre 1996 y 2003 (Chatellenaz [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 527-550).
18-19. Un macho y tres hembras observados por Martín Manassero, Horacio Luna y Luciano Acquaviva en el paraje San Juan ubicado al oeste de Villa Guillermina, departamento General Obligado, Santa Fe el 6 y 7 de enero de 2003 (Manassero *et al.* [2004] *Nuestras Aves* 47: 31-33).
20. Un individuo observado por Martín Manassero, Horacio Luna y Luciano Acquaviva al oeste de Villa Guillermina, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 y 10 de enero de 2004 (Manassero *et al.* [2004] *op. cit.*).
21. Una hembra observada por Eduardo Militello y Valeria Calvo en el PN Iguazú, Misiones el 21 de marzo de 2004 (sib.gob.ar).
22. Un macho observado por Ignacio Roesler en el PN Mburucuyá, Corrientes entre el 24 y el 27 de marzo de 2005 (I. Roesler *in litt.*).
23. Mencionada sin detalles para varias localidades de la provincia de Entre Ríos (Beltzer *et al.* [2006] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Entre Ríos.* Serie Climax N°13. Ceride-Conicet).
24. Una pareja observada por Juan C. Chebez en la estancia Rincón del Socorro, departamento Mercedes, Corrientes el 14 de marzo de 2007 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).
25. Incluida sin detalles para la avifauna del PN Mburucuyá, Corrientes (Chatellenaz *et al.* [2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160).

26. Mencionada sin detalles para la mitad oriental de la provincia de Formosa (Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).
27. Registrada en la estancia San Antonio, departamento San Martín, Corrientes el 10 de septiembre de 2013 (ebird.org/checklist/S24989270).
28. Un individuo observado en Los Gallegos, departamento San Martín, Santiago del Estero el 11 de enero de 2014 (Quiroga *et al.* [2016] *Nuestras Aves* 61: 49-53).
29. Una hembra grabada y fotografiada por Adrián Galimberti y Bernabé López-Lanús en la estancia Virocay, departamento Santo Tomé, Corrientes el 23 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *en* Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas; xeno-canto.org/106538; Figura 111). La identificación del ejemplar generó opiniones diversas, por lo tanto preferimos tratar el registro con cautela hasta que se consiga mayor evidencia.

Figura 111. Picaflor *Hylocharis* sp., estancia Virocay, Corrientes, 23 de noviembre de 2011 (Adrián Galimberti)

30. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 23 de diciembre de 2016 (ebird.org/checklist/S33181281).
31. Un macho inmaduro observado por Luis Pagano, Alejandro Bodrati y Néstor Fariña en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 18 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).

Comentarios: Había sido incluida para la avifauna argentina por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Los primeros registros para Entre Ríos fueron puestos en duda por Lester Short ([1975] *op. cit.*). Henry Durnford ([1877] *Ibis* 19: 166-203) la había mencionado con relación a Buenos Aires, cita que fue repetida por otros autores. Finalmente Narosky & Di Giacomo ([1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini) descartan este registro aludiendo que se trataba del PICAFLOR BRONCEADO *Hylocharis chrysura*.

PICAFLOR VIENTRE PUNTEADO | *Taphrospilus hypostictus*

Distribución: Mayormente en los Andes desde Ecuador hasta el NO de Argentina (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un individuo adulto observado por Flavio Moschione entre Lipeo y El Cedral, depar-

tamento Santa Victoria, Salta el 22 de octubre de 2006 (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata; F. Moschione *in litt.*).
Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

MARTÍN PESCADOR ROJIZO | *Chloroceryle inda*

Distribución: Desde Nicaragua hasta la mitad N de Sudamérica, incluyendo N de Bolivia y E de Paraguay. También cerca de la costa en el SE de Brasil (Woodall [2001] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 6. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un macho observado por Flavio Moschione en la reserva privada El Pantanoso, departamento Ledesma, Jujuy entre los años 2006 y 2010 (Moschione *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).
2. Incluida sin detalles en la avifauna de la provincia de Salta (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo).

YACAMARÁ | *Galbula ruficauda*

Distribución: Desde el S de México hasta el centro de Sudamérica. Las subespecies *rufoviridis* y *heterogyna* en el centro de Brasil y el N de Bolivia (Tobias *et al.* [2002] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 7. Lynx Edicions).
Registros: 1. Un ejemplar capturado por Hermann Burmeister en San Pedro, departamento homónimo, Misiones sin fecha (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad.
2. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en la provincia de Misiones "en diciembre de 1972 o 1973" (M. Rumboll *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

GUACAMAYO CANINDÉ | *Ara ararauna*

Distribución: Amplia distribución amazónica hasta el N de Bolivia, S de Brasil y NE de Paraguay (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Mencionada por Florián Paucke ([1942] *Hacia allá y para acá. Una estada entre los indios Mocobíes, 1749-1767*. Universidad Nacional de Tucumán) refiriéndose a cierta región del noreste de Argentina.
2. Un ejemplar aparentemente hallado en el Chaco permaneció un tiempo en el jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires (Holmberg [1898] *en* de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires). Se desconoce si el espécimen fue conservado, y en tal caso se encuentra perdido en la actualidad.
3. Mencionada por Ernesto Lynch Arribálzaga para la zona del río Bermejo en la región chaqueña, sin mayores detalles (Lynch Arribálzaga [1920] *Hornero* 2: 85-98).

4. Una hembra al parecer proveniente de la provincia de Formosa permaneció cautiva en el zoológico de la ciudad de Santiago del Estero, y posteriormente fue donada a la fundación Miguel Lillo el 8 de mayo de 1985 (L. Pagano *obs. pers.*). El espécimen (COFML-14833) se encuentra depositado en la COFML (Figura 112).
5. Mencionada por Gunnar Höy como rara en la zona de San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta (Höy [1969] *Hornero* 11: 53-56).
6. Tres parejas observadas por Gunnar Höy en el río Caraparí cerca del límite con Bolivia, departamento General José de San Martín, Salta en el año 1952 (Höy [1969] *op. cit.*).
Comentarios: Las citas referidas a la provincia de Misiones (Orfila [1936] *Hornero* 6: 197-225; Zotta [1937] *Hornero* 6: 531-554; Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40) quizás provengan de interpretaciones de la literatura citada. Las menciones de la PARABA BARBA AZUL *Ara glaucogularis* (= *A. caninde*) en Argentina se refieren con seguridad a *Ara ararauna*, ya que *Ara glaucogularis* es un endemismo de los llanos de Moxos, departamento El Beni, Bolivia (Forshaw & Knigth [2010] *op. cit.*). Es posible que las observaciones de Gunnar Höy ([1969] *op. cit.*) provengan de una confusión con el GUACAMAYO VERDE *Ara militaris* (Di Giacomo [2007] *en* Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°6. Aves Argentinas). Para una revisión acerca de la nomenclatura de estas especies ver Dabbene ([1920] *Hornero* 2: 56; [1921] *Hornero* 2: 225).

Figura 112. Guacamayo Canindé *Ara ararauna*, COFML-14833, "Formosa" (Luis Pagano)

COTORRA DE ACANTILADOS | *Myiopsitta luchsi*

Distribución: Valles intermontanos del centro de Bolivia, entre los 1300-3000 msnm (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un grupo en vuelo observado por Flavio Moschione cerca de El Angosto, departamento Santa Catalina, Jujuy sin fecha (F. Moschione *com. pers.*).
2. Dos individuos observados por Mark Pearman en el río Tranca, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de diciembre de 1996 (M. Pearman *in litt.*).
3. Dos o tres individuos escuchados por Ignacio Roesler entre Yavi y Yavi Chico, departamento Yavi, Jujuy en noviembre de 2003 (I. Roesler *in litt.*).
4. Una pareja escuchada en vuelo por Luis Pagano entre Yavi y Yavi Chico, departamento Yavi, Jujuy el 12 de enero de 2009 (L. Pagano *obs. pers.*).
5. Un grupo de diez individuos observado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle unos 12 km al este de Suripugio (22°13'46''S 65°16'00''W), departamento Yavi, Jujuy el 2 de junio de 2010 (A. Bodrati *in litt.*).
Comentarios: Camperi *et al.* ([2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140) mencionan un registro en Yavi Chico, departamento Yavi, Jujuy el 13 de junio de 2009. El mismo fue descartado por el autor aludiendo que se trataba de la COTORRA *Myiopsitta monachus*, ya que los pobladores mantienen a esta especie en cautiverio y no se descartan eventuales escapes (Freddy Burgos *in litt.*).

LORO CICA | *Triclaria malachitacea*

Distribución: Restringida a la región SE de Brasil, desde el S de Bahia hasta Rio Grande do Sul y extremo NE de Argentina (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en abril de 1983 (Rumboll [1990] *Nuestras Aves* 22: 28).
2. Un individuo observado por Roberto Straneck y Miguel Castelino en el arroyo Urugua-í, Misiones en noviembre de 1986 (Canevari *et al.* [1991] *Nueva guía de las aves argentinas*. Fundación Acindar).
3. Un individuo observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones en el año 1999 (M. Castelino *en* Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
Comentarios: No es posible descartar que algunas de estas observaciones correspondan a ejemplares escapados de cautiverio.

CHIRIPEPÉ ALA ROJA | *Pyrrhura devillei*

Distribución: Localizada en el SE de Bolivia, N de Paraguay y SO de Brasil (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un individuo junto a un grupo de CATITA CHIRIRÍ *Brotogeris chiriri* observado por Flavio Moschione cerca de Dragones, departamento General José de San Martín, Salta el 15 de enero de 1995 (Moschione [2008] *Evaluación de la Situación de las Especies de Psitácidos de Interés de Conservación en el Chaco Argentino.* Fundación Biodiversidad; Moschione *et al.* [2008] *XII Reunión Argentina de Ornitología*. San Martín de los Andes).

JANDAIA | *Aratinga jandaya*

Distribución: Endémica de la región NE de Brasil en los estados de Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia y Goiás (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).
Registros: 1. Un individuo junto a un grupo de CHIRIPEPÉ CABEZA VERDE *Pyrrhura frontalis* observado por Carlos Saibene en el PN Iguazú, Misiones el 7 de mayo de 1992 (Saibene [1994] *Nuestras Aves* 30: 26).
Taxonomía: Anteriormente considerada como una subespecie de la COTORRA SOL *Aratinga solstistialis*, tal como fue publicado por Saibene ([1994] *op. cit.*).
Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), asumiendo que el ave observada en el PN Iguazú se trataba de un ejemplar escapado de cautiverio.

CHOCA PLOMIZA | *Thamnophilus schistaceus*

Distribución: Amplia distribución en el O y S de la Amazonía hasta los 1300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un macho adulto colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy en marzo de 1931 (Zotta [1938] *Hornero* 7: 46-64). El espécimen (MACN-Or-2506a) se encuentra depositado en el MACN.
2. Una hembra colectada por Emilio Budin en Tapia, departamento Trancas, Tucumán en mayo de 1931 (Zotta [1938] *op. cit.*). El espécimen (MACN-Or-2506b) se encuentra depositado en el MACN y su año de colecta no se lee claramente, pudiendo ser 1931 o 1934.
3. Reportada en forma anónima para el PN Iguazú, Misiones en una lista efectuada en el año 1988 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
Comentarios: Seguimos a Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), quienes asumen que los especímenes de Jujuy y Tucumán fueron mal etiquetados.

CHOCA ESTRIADA | *Dysithamnus stictothorax*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil hasta los 1100 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un macho colectado por Claës Olrog en Dos de Mayo, departamento Cainguás, Misiones el 20 de julio de 1973 (Olrog [1973] *Neotrópica* 19: 145-146). El espécimen habría sido depositado en el museo de Dos de Mayo, Misiones pero actualmente parece estar perdido (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
2-3. Dos ejemplares anillados por Arturo Tarak y Miguel Christie en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1977 (A. Tarak y M. Christie *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
4. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1987 (F. Moschione *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
5. Mencionada sin detalles para los alrededores de Bernardo de Irigoyen, departamento General Manuel Belgrano, Misiones (Mark Pearman *en* Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser* Mergus octosetaceus *in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust).

Comentarios: Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) describen los acontecimientos ocurridos luego de la colecta del espécimen en Dos de Mayo, Misiones.

GALLITO NUCA CANELA | *Melanopareia torquata*

Distribución: Especie típica del *cerrado*, ocupando el centro de Brasil, E de Bolivia y extremo NE de Paraguay hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Observada por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 27 de enero de 1912 (Mogensen [1930] *Argentinas Dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Al parecer este autor intentó colectar algunos ejemplares.

TICOTICO DE COLLAR | *Anabazenops fuscus*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Bahia hasta Santa Catarina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Jonas Nilsson en el PN Iguazú, Misiones el 15 de enero de 2005. Si bien el registro carece de documentación, el autor realiza una minuciosa descripción y un dibujo del ave (J. Nilsson *in litt*.).
Comentarios: La posible confusión con una hembra de BATARÁ PECHO NEGRO *Biatas nigropectus* no puede descartarse por completo.

TICOTICO GOTEADO | *Margarornis squamiger*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, mayormente entre los 2000-3500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en el PN Baritú, Salta el 13 de noviembre de 1992 (Di Giacomo *et al.* [1995] *Hornero* 14: 67-68).
2. Un individuo observado por Mark Pearman en el PN Calilegua, Jujuy el 16 de agosto de 2000 (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
3. Dos individuos observados por Flavio Moschione entre Río Seco y San Pedrito, departamento General José de San Martín, Salta el 10 de julio de 2003 (Coconier *et al.* [2007] *en* Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°6. Aves Argentinas).
4. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús y Eugenio Coconier en el Cluster San Pedrito, departamento General José de San Martín, Salta el 2 de julio de 2005 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit*.).
Comentarios: Un posible individuo escuchado y observado fugazmente por Ignacio Roesler en la finca Falcón, departamento General José de San Martín, Salta el 3 de octubre de 2005 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit*.). Una grabación realizada por Luis Pagano y José Segovia en la reserva privada Eco-Portal de Piedra, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 11 de diciembre de 2011 requiere confirmación (L. Pagano *obs. pers*.).

ESPINERO PECHO NARANJA | *Phacellodomus ferrugineigula*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Minas Gerais y Espírito Santo hasta Rio Grande do Sul (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Dos individuos y algunos nidos observados por Gustavo Serrano y Víctor Matuchaka en el PP Moconá, Misiones en julio de 2002 (losquesevan.com/el-espinero-ojo-colorado-nueva-especie-de-ave-para-argentina.599c).
2. Probablemente los mismos nidos del registro anterior hallados por Mark Pearman e Ignacio Roesler en el PP Moconá, Misiones en agosto de 2002 (M. Pearman *in litt.*).
3-4. Un nido abandonado y un individuo escuchado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 14 y 18 de octubre de 2005 respectivamente (A. Bodrati *com. pers.*).
5. Un individuo escuchado por Alejandro Bodrati en la reserva privada Yasy-yateré, departamento Guaraní, Misiones el 20 de octubre de 2006 (A. Bodrati *com. pers.*).
Taxonomía: Considerada anteriormente una subespecie del ESPINERO OJO ROJO *Phacellodomus erythrophthalmus*. Diferencias vocales, morfológicas y ecológicas aportan suficiente evidencia para tratarlas como especies distintas (Simon *et al.* [2008] *Revista Brasileira de Ornitologia* 16: 107-124).
Comentarios: Las observaciones del PP Moconá, Misiones provienen de un sector localizado y probablemente correspondan a los mismos individuos o una pequeña población relictual. Existen reportes en los alrededores de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil (ebird.org).

MOSQUETA RABADILLA CANELA | *Phyllomyias uropygialis*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, entre los 1800-3100 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 22 de agosto de 1993 (Di Giacomo [1995] *Hornero* 14: 77-78).
Comentarios: Un ave con las características de esta especie fue observada por Ignacio Roesler cerca de Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 20 de enero de 2004 (I. Roesler *in litt.*).

PICOCHATO CHICO | *Platyrinchus leucoryphus*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta el E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo anillado en el "norte de Misiones" en abril de 1978 (Mauricio Rumboll *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
2. Observada por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones "a principios de los 80's" (M. Rumboll *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
3. Un individuo observado por Pablo Cano en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1989 (P. Cano *en* Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP).
4. Un individuo observado por Jorge Protomastro en el PN Iguazú, Misiones en octubre de 1997 (J. Protomastro *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

5. Un individuo observado por Greg Roberts en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1998 (G. Roberts *en* Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). Este observador luego la menciona como registrada el 15 de enero de 1999 en dicha localidad, probablemente refiriéndose a la misma observación (G. Roberts *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
6. Un individuo registrado cerca de Aristóbulo del Valle, departamento Cainguás, Misiones entre octubre de 2004 y septiembre de 2006 (Giraudo *et al.* [2008] *Biodiversity and Conservation* 17: 1251-1265).
Comentarios: Es llamativa la ausencia de registros documentados en nuestro país, ya que la especie es de presencia regular en el área Cataratas del PN do Iguaçu, Brasil (ebird.org).

SUIRIRÍ GARGANTA BLANCA | *Tyrannus albogularis*

Distribución: Desde el S de Venezuela y las Guayanas hasta el S de Brasil y N de Bolivia. La población austral migra al O de Amazonas durante el invierno (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Dante Meller en la costa brasileña del río Uruguay frente al PP Moconá, Misiones el 9 de noviembre de 2020 (wikiaves.com.br/4081287). Al parecer el ave luego cruzó hacia territorio argentino, aunque no pudo ser documentada.
Comentarios: Recientemente registrada en Calera del Rey, departamento Maldonado, Uruguay (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=416630).

DORMILONA ENANA | *Muscisaxicola fluviatilis*

Distribución: Al O de la Amazonía hasta los 800 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un ejemplar colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 23 de septiembre de 1905 (Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366; Esteban [1953] *Acta Zoológica Lilloana* 13: 349-362). El espécimen no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Aveldano *in litt.*).
2. Un macho colectado por Miguel Lillo en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 18 de noviembre de 1905 (Esteban [1953] *op. cit.*). El espécimen no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Aveldano *in litt.*).
3. Un ejemplar colectado por Miguel Lillo en "*Tucumán*" en agosto de 1908 (Dabbene [1914] *op. cit.*). El espécimen (MACN-Or-7968a) se encuentra depositado en el MACN.
4. Un ejemplar colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 14 de noviembre de 1911 (Dabbene [1914] *op. cit.*; Esteban [1953] *op. cit.*). El espécimen no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Aveldano *in litt.*).
5. Un ejemplar colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 17 de enero de 1912 (Dabbene [1914] *op. cit.*; Esteban [1953] *op. cit.*). Este espécimen (COFML-00038) fue reidentificado como DORMILONA CHICA *Muscisaxicola maculirostris* y se encuentra depositado en la COFML.
6-7. Dos ejemplares (un macho y una hembra) colectados por Emilio Budin en Laguna del Paredón, Jujuy el 13 y 24 marzo de 1912 (Esteban [1953] *op. cit.*). El ejemplar hembra del 24 de marzo (MACN-Or-38150) se encuentra depositado en el MACN, mientras que el restante no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Aveldano *in litt.*).
8. Una hembra colectada por Claës Olrog y Octavio Budin en Abra Pampa, departamento Cochinoca,

Jujuy el 30 de mayo de 1949 (Esteban [1953] *op. cit.*). El ejemplar (COFML-5999) fue reidentificado como M. *maculirostris* y se encuentra depositado en la COFML.
9. Registrada por Manuel Nores en Tilcara, departamento homónimo, Jujuy en el año 1978 (M. Nores *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
Comentarios: Charles Hellmayr había confirmado la identificación del espécimen de Tucumán como *Muscisaxicola fluviatilis* (Dabbene [1914] *op. cit.*). Sin embargo Smith & Vuilleumier ([1971] *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 141: 179-268) reidentifican cuatro especímenes como *Muscisaxicola maculirostris*, y sospechan que el restante también pertenecería a esta especie. Ver discusión en Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Es altamente improbable la presencia de esta especie amazónica en los Andes áridos del noroeste argentino.

ZORZALITO CARA GRIS | *Catharus minimus*

Distribución: Nidifica en una extensa franja del N de Canadá, Alaska y extremo oriental de Rusia. Luego de la etapa reproductiva ocupa el NO de Sudamérica hasta el N de Bolivia y SE de Perú (Whitaker [2020] *en* Rodewald [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: 1. Un individuo observado por Luis Pagano sobre la ruta provincial n°83 entre Abra Honda y Abra Colorada, departamento Valle Grande, Jujuy el 3 de enero de 2018 (Pagano & Bodrati *en prep*.).

ZORZALITO ROJIZO | *Hylocichla mustelina*

Distribución: Nidificante en una extensa región del E de Estados Unidos y extremo SE de Canadá. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el S de México y Centroamérica (Evans *et al.* [2020] *en* Poole [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Registros: 1. Un ejemplar capturado en Puerto Stanley, islas Malvinas en febrero de 1970 (Roger Tory Peterson *en* Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264). El espécimen se encuentra perdido en la actualidad.
Comentarios: Para mayores detalles sobre este registro ver Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

CACHILO SABANERO | *Ammodramus aurifrons*

Distribución: Mayormente en la Amazonía, extendiéndose al norte a traves del río Orinoco (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Flavio Moschione en Campo Cauzutí, departamento General José de San Martín, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *in litt.*).

ARAÑERO DE AGUA | *Parkesia noveboracensis*

Distribución: Se reproduce en una amplia región desde Alaska hasta el E de Canadá. Luego migra hacia el S de México, el Caribe, Centroamérica y N de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).
Registros: 1. Un individuo observado por Flavio Moschione, María Inés López, Cristina López e Isabel Barrios en el PP Pereyra Iraola, Buenos Aires el 26, 27 y 28 de agosto de 1988 (Moschione [1988] *Gargan-chillo* 7: 14-15).
Taxonomía: Conocida tradicionalmente como *Seiurus noveboracensis* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

REINITA PEREGRINA | *Leiothlypis peregrina*

Distribución: Se reproduce en una extensa región de Canadá. Luego de la etapa reproductiva realiza una migración a través del E de Estados Unidos hasta el S de México, Centroamérica y NO de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).
Registros: 1. Un individuo en plumaje no reproductivo observado por Juan I. Areta y Gabriel Núñez en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 29 de marzo de 2013 (Areta *en prep.*).
Taxonomía: Conocida tradicionalmente como *Vermivora peregrina* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).
Comentarios: Un ejemplar errante capturado y fotografiado en Putre, Tarapacá, Chile el 17 de noviembre de 1996 (Torres-Mura & Hertel [2006] *Cotinga* 26: 8-9).

PITIAYUMÍ BOREAL | *Setophaga americana*

Distribución: Su área de reproducción se restringe al E de Canadá y Estados Unidos. Luego realiza una corta migración hacia el S de México y las islas del Caribe (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).
Registros: 1. Mencionada como "bastante común" en El Cantadero, departamento Capital, La Rioja entre los años 1981 y 1987 (Nores & Cerana [1990] *Revista Chilena de Historia Natural* 63: 37-48).
2. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la Reserva Itahovy, departamento Guaraní, Misiones el 23 de noviembre de 2016 (Pagano & Bodrati *en prep.*).
Taxonomía: Anteriormente en el género *Parula* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).
Comentarios: La mención para El Cantadero, La Rioja probablemente sea sólo un error de tipeo, ya que en la lista no se incluye a su congénere local el PITIAYUMÍ *Setophaga pitiayumi*.

ARAÑERO PETEQUIA | *Setophaga petechia*

Distribución: Se reproduce en casi todo el territorio de Estados Unidos y Canadá. Posteriormente migra a través de México y el Caribe hasta Centroamérica y el N de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Un individuo observado al este de la provincia de Chubut, sin mayores detalles (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).
Taxonomía: El ave registrada pertenecería a la subespecie *aestiva* (Pearman & Areta [2020] *op. cit*.).

ARAÑERO DE WILSON | *Cardellina pusilla*

Distribución: Se reproduce en una extensa región de Alaska, Canadá y NO de Estados Unidos. Luego migra hacia el S de México y Centroamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).
Registros: 1. Dos individuos observados en el sector Los Morados del cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] *Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro*. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy; González *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).
Taxonomía: Conocida tradicionalmente como *Wilsonia pusilla* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

ARAÑERO GARGANTA NEGRA | *Myioborus miniatus*

Distribución: Andes desde el N de Venezuela hasta el S de Bolivia entre los 700-2500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 17 de agosto de 1993 (Di Giacomo [1995] *Hornero* 14: 77-78).
2. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Baritú, Salta sin fecha (F. Moschione *com. pers*.).
Comentarios: El individuo mencionado por Flavio Moschione y José Segovia para la RP Las Lancitas, Jujuy el 29 de enero de 2004 (Segovia & Moschione [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires), fue posteriormente reidentificado como juvenil de ARAÑERO CORONA ROJIZA *Myioborus brunniceps* (J. Segovia *com. pers*.).

SAÍ GRIS | *Conirostrum cinereum*

Distribución: Andes desde el S de Colombia hasta el N de Chile y O de Bolivia, mayormente entre los 2500-4000 msnm. En Perú y Chile habita localmente a nivel del mar (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Dos machos vocalizando observados por Flavio Moschione en Purmamarca, departamento Tumbaya, Jujuy sin fecha (F. Moschione *com. pers*.).

YAL GARGANTA BLANCA | *Idiopsar erythronotus*

Distribución: Local en los altos Andes del S de Perú, N de Chile y SO de Bolivia, entre los 3600-4700

msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Una pareja observada por Flavio Moschione en el paso Socompa, departamento Los Andes, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *in litt.*).
Taxonomía: En una reciente revisión de la familia Thraupidae, Burns *et al.* ([2016] *Zootaxa* 4088: 329-354) proponen el género *Idiopsar* para *Phrygilus erythronotus*. Esta propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop730.htm).
Comentarios: La mención de Johan Mogensen ([1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri) para el Aconquija, Tucumán se refiere al COMESEBO PUNEÑO *Idiopsar dorsalis*.

DIUCA ALA BLANCA | *Idiopsar speculifer*

Distribución: Altos Andes desde el centro de Perú hasta el N de Chile y O de Bolivia, entre los 4000-5300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Una pareja y un nido con huevo hallados por Gunnar Höy en la serranía de Tres Cruces, departamento Humahuaca, Jujuy en febrero de 1973 (Höy [1976] *Physis. Sección C* 35: 205-209).
2. Dos individuos observados por Mario Mosqueira cerca del abra del Cóndor (22°53'38''S 65°16'34''W), departamento Humahuaca, Jujuy en mayo de 1997 (M. Mosqueira *in litt.*).
3. Dos individuos observados por Jorge Baldo y Yanina Arzamendia cerca de Alfarcito (23°19'S 65°58'W), departamento Cochinoca, Jujuy el 24 de septiembre de 2008 (J. Baldo *in litt.*).
4. Un individuo observado por Flavio Moschione en Esquina Blanca, departamento Humahuaca, Jujuy sin fecha (dato mencionado en ebird.org/checklist/S68576872).
5. Una pareja observada por Flavio Moschione al norte del abra del Acay, Salta sin fecha (dato mencionado en ebird.org/checklist/S68576872).
6. Un individuo observado por Flavio Moschione en Corral Colorado, departamento Los Andes, Salta el 30 de abril de 2020 (ebird.org/checklist/S68576872).
Taxonomía: En una reciente revisión de la familia Thraupidae, Burns *et al.* ([2016] *Zootaxa* 4088: 329-354) erigen el nuevo género *Chionodacrion* para *Diuca speculifera*. Seguimos las opiniones del SACC, quienes prefieren utilizar por el momento el género *Idiopsar* para este taxón (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop730.htm).
Comentarios: Varios nidos hallados en un glaciar de la cordillera Vilcanota, departamento Cuzco, Perú (Hardy & Hardy [2008] *The Wilson Journal of Ornithology* 120: 613-617; Castañeda [2015] *Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú* 10: 40-41).

PAYADOR VIENTRE GRIS | *Diglossa carbonaria*

Distribución: Endémica de los Andes de Bolivia entre los 2500-4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Dos individuos observados por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal en el arroyo Sansana, departamento Yavi, Jujuy el 6 de enero de 1988 (Moschione & San Cristóbal [1993] *Hornero* 13: 107).

Comentarios: En las colecciones de Fritz Schulz se encuentra un ejemplar de *Diglossa* sin datos, identificado por Charles O'Brien como perteneciente al grupo *carbonaria*. Gunnar Höy lo reidentifica como *Diglossa humeralis aterrima*, sospechando que el ave pudo haber sido obtenida por Gustavo Niederlein en la provincia de Misiones (Höy [1973] *Physis. Sección* C 32: 222-223). El espécimen se encuentra actualmente depositado en el MZUC, aunque es altamente improbable que provenga de dicha provincia.

AFRECHERO PIZARRA | *Haplospiza rustica*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta Bolivia, mayormente entre los 1500-3000 msnm (Ridgely & Tudor [2009)] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Al menos dos individuos observados por Flavio Moschione a la vera del río Bermejo en Candado Chico cerca de El Arrazayal, departamento Orán, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *in litt*.).

CORBATITA OLIVÁCEO | *Sporophila frontalis*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil llegando al extremo NE de Argentina y E de Paraguay, mayormente entre los 800-1500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
2. Un individuo anillado por Arturo Tarak en el PN Iguazú, Misiones en septiembre de 1978 (A. Tarak *en* Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
3. Un individuo observado por Ernesto Krauczuk en el PP Esmeralda, Misiones el 25 de agosto de 1993 (E. Krauczuk *en* Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Puerto Iguazú).
4. Dos individuos observados por Christian Savigny en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 19 de mayo de 2004 (C. Savigny *en* Areta *et al.* [2009] *Biotrópica* 41: 66-73; Savigny [2010] *Nuestras Aves* 55: 20-22).
5. Un individuo cantando observado por Javier Heredia en el PP Caraguatay, Misiones el 17 de octubre de 2006 (J. Heredia *in litt*.).
6. Un individuo observado por Juan I. Areta e Ignacio Roesler en el PN Iguazú, Misiones el 16 de enero de 2008 (Areta *et al.* [2009] *op. cit*.). El mismo parecía tener un plumaje subadulto no definitivo, ya que presentaba una coloración algo diluida (I. Roesler *in litt*.).
Comentarios: La falta de conocimiento en las variaciones de plumaje del CORBATITA PICUDO *Sporophila falcirostris* podría generar confusiones al momento de identificar esta especie.

CORBATITA PLOMIZO | *Sporophila plumbea*

Distribución: La población más cercana a Argentina ocupa una extensa región del S de Brasil, N de Bolivia y E de Paraguay hasta los 1400 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Entre Ríos (Zelich [1977] *Revista Ser. Escuela Nacional Superior Mariano Moreno* 19: 85-95).
2. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 13 y 14 de diciembre de 1982 (F. Moschione *en* Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
3. Registrada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1985 (F. Moschione *en* Chebez [1994] *op. cit.*).
4-5. Registros sin confirmar en los departamentos San Pedro y Cainguás, Misiones en los años 1983 y 1988 (Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA; Juan C. Chebez *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
6. Una pareja observada por Eduardo Militello en el PN Iguazú, Misiones el 20 de octubre de 2002 (Militello & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 32: 1-5).
Taxonomía: Una forma de pico amarillo que se reproduce en el sur de Brasil fue recientemente descripta como una especie diferente, CORBATITA DE BELTON *Sporophila beltoni* (Repenning & Fontana [2013] *Auk* 130: 791-803). Las observaciones de Argentina no tienen detalle suficiente como para asignarlas a una forma determinada.
Comentarios: Roberto Dabbene ([1914] *Physis* 1: 293-366) incluye a *Sporophila plumbea* para la provincia de Misiones aludiendo a las publicaciones de Bertoni ([1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-213; [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102). Este último autor coleccionó un ejemplar en Puerto Bertoni, Paraguay el 14 de abril de 1899 y lo describió con el nuevo nombre de *Spermophila aurantiirostris*. Dicho espécimen se encuentra perdido y su identidad fue recientemente discutida por Repenning & Fontana ([2013] *op. cit.*), quienes concluyen que muy probablemente correspondía al CORBATITA BLANCO *Sporophila leucoptera*.
Un ejemplar inmaduro colectado en Recreo, departamento La Capital, Santa Fe el 25 de febrero de 1942 (Martínez Achenbach ([1957] *Anales del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*. Tomo I. Zoología). Este espécimen (MFA-ZV-793) fue luego reidentificado como CAPUCHINO CANELA *Sporophila hypoxantha* (Ordano & Bosisio [2001] *Serie Catálogos* 7: 1-118). Más tarde, Fandiño & Giraudo ([2012] *Ornitología Neotropical* 23: 467-488) suponen que el mismo podría corresponder tanto a *Sporophila hypoxantha* como al CAPUCHINO CASTAÑO *Sporophila hypochroma*. La inclusión para el PN Iguazú, Misiones probablemente se refiera a las observaciones mencionadas (Saibene *et al.* ([1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA).

CORBATITA GARGANTA BLANCA | *Sporophila albogularis*

Distribución: Restringida al NE de Brasil incluyendo el estado de Bahia, hasta los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: **1**. Un ejemplar fotografiado por Iván Eroles en la reserva natural Isla Verde, partido de Morón, Buenos Aires el 19 de mayo de 2019 (ebird.org/checklist/S56533567). El ave permaneció varios días en el sitio y pudo ser registrada por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org).
Comentarios: A pesar de la abundante evidencia existen serias dudas con respecto al origen del ave. La especie es probablemente residente, y los registros de Minas Gerais y Espírito Santo fueron considerados como ejemplares escapados de cautiverio (Jaramillo [2020] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

FRUTERO CANELA | *Schistochlamys ruficapillus*

Distribución: Extensa región del E de Brasil, mayormente por debajo de los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Un individuo observado por Davis Finch en el PN Iguazú, Misiones el 26 de octubre de 1994 (Abadie [1996] *Cotinga* 5: 76-77).
2. Un individuo (quizás el mismo de la observación anterior) observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 5 de noviembre de 1994 (Abadie [1996] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA).
3. Una pareja observada por Esteban Abadie en Colonia Almirante Brown (actualmente Colonia Andresito), departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 13 de septiembre de 1995 (Abadie [1996] *op. cit.*).
4. Dos individuos observados por Daniel Almirón en el PN Iguazú, Misiones el 1 y 3 de julio de 2000 (ebird.org/checklist/S17572261).

SAÍRA ESPALDA NEGRA | *Stilpnia peruviana*

Distribución: Restringida a la costa del SE de Brasil hasta los 700 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366).
2. Un macho colectado por Aguirre en "*Buenos Aires*" en febrero de 1910 (Dabbene [1914] *op. cit.*). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero al parecer se encuentra perdido en la actualidad (Yolanda Davies *com. pers.*).
Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Tangara* (Ridgely & Tudor [2009] *op. cit.*).
Comentarios: No es posible descartar que el espécimen perdido haya correspondido a un ejemplar escapado de cautiverio.

ESPECIES ELIMINADAS Y NO ACEPTADAS

Algunas especies han sido recientemente mencionadas para la avifauna argentina, pero por diversos motivos no fueron aceptadas por la comunidad ornitológica o se discuten en el presente trabajo. Se tratan además cambios taxonómicos, errores de identificación y especímenes mal determinados. *Netta erythrophthalma* e *Hylocharis sapphirina* también fueron excluidas de la lista principal y se discuten en la sección Hipotéticas. Para otras especies erróneamente mencionadas en la literatura ver Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

BURRITO CUYANO | *Laterallus jamaicensis*

Distribución: En parches desde Estados Unidos hasta Sudamérica a través de la costa del Pacífico. La subespecie *salinasi* en el centro de Chile (Taylor [1996] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).
Comentarios: Especie eliminada. No existe evidencia concreta que certifique la presencia de esta especie en Argentina, todos los registros dentro del territorio pertenecerían al BURRITO NEGRUZCO *Porzana spiloptera* (Straneck [1999] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 1: 173-180; Pagano *et al.* [2011] *Neotropical Birding* 8: 40-43; López-Lanús *et al.* [2012] *Hornero* 27: 183-188).

PAÍÑO DE ELLIOT | *Oceanites gracilis*

Distribución: Aguas frías de la corriente de Humboldt entre Ecuador y el centro de Chile, incluyendo las islas Galápagos (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).
Taxonomía: La subespecie *galapagoensis* a veces se considera una especie separada, sin embargo la superposición de medidas y la falta de características consistentes sugieren que debe mantenerse como subespecie de *Oceanites gracilis* (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).
Comentarios: Especie eliminada. Mark Pearman ([2000] *Hornero* 15: 141-143) analiza dos especímenes del MACN publicándolos como los primeros *Oceanites gracilis* de Argentina. Actualmente esos mismos ejemplares son los paratipos de una nueva especie descripta para el centro y sur de Chile, PAÍÑO PINCOYA *Oceanites pincoyae* (Harrison *et al.* [2013] *Auk* 130: 180-191; ver *Oceanites pincoyae*).

PICAFLOR SOMBRÍO | *Eupetomena cirrochloris*

Distribución: Endémica del E de Brasil, desde Goiás hasta Rio Grande do Sul (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).
Taxonomía: Anteriormente en el género *Aphantochroa* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).
Comentarios: No aceptada. Un ejemplar fotografiado por Roberto Güller en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 30 de abril de 2001 (Chebez *et al.* [2004]

Figuras 113-114. Picaflor Esmeralda *Chrysuronia versicolor*, Puerto Iguazú, Misiones, 30 de abril de 2001 (Roberto Güller)

Hornero 19: 1-5; Anónimo [2005] *Nuestras Aves* 49: 11). Las fotografías se encuentran depositadas en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP y no corresponden a esta especie (Figuras 113-114). La combinación de caracteres de plumaje es asignable al PICAFLOR ESMERALDA *Chrysuronia versicolor* (Juan I. Areta y Vítor de Q. Piacentini *in litt.*). Además, Ignacio Roesler observó al ejemplar en el sitio identificándolo como un joven de *C. versicolor* (I. Roesler *in litt.*).

PICAFLOR FAJA BLANCA | *Chrysuronia brevirostris*

Distribución: Restringida a Venezuela, extremo N de Brasil y las Guayanas (Schuchmann [1999] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 5. Lynx Edicions).
Taxonomía: Anteriormente incluida en el género *Amazilia* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins). Chebez *et al.* ([2008] *Las Ciencias* 1: 67-81) sugieren que las aves de vientre blanco registradas en Puerto Iguazú y en el PN Iguazú, Misiones corresponden a *Amazilia (versicolor) brevirostris*. Estos autores elevan el taxón *brevirostris* a nivel específico, y proponen que las aves del norte de Sudamérica sean tratadas como *Chrysuronia chionopectus* (Chebez *et al.* [2008] *op. cit.*).
Comentarios: No aceptada. Tal como lo mencionan los autores citados, se requieren mayores estudios para entender la variación de plumaje descripta. Por el momento la evidencia aportada no es concluyente, y probablemente corresponda a variaciones del PICAFLOR ESMERALDA *Chrysuronia versicolor* (L. Pagano *obs. pers.*; Juan I. Areta *in litt.*).

CARPINTERITO OCELADO | *Picumnus dorbignyanus*

Distribución: Poblaciones disyuntas en los Andes del centro de Perú y Bolivia (Winkler & Christie [2002] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 7. Lynx Edicions).
Taxonomía: Descripta por Frédéric de Lafresnaye ([1845] *Revue Zoologique* 8: 1-10) en base a un espécimen de Bolivia sin localidad precisa.
Comentarios: Especie eliminada. A pesar de las numerosas menciones en la literatura, por el momento se desconoce evidencia alguna que confirme la presencia de esta especie en territorio nacional (ver *Taxa No Asignados a Nivel de Especie*).

BANDURRITA PUNEÑA | *Upucerthia jelskii*

Distribución: Andes desde el centro de Perú hasta el N de Chile y NO de Argentina, mayormente entre los 3500-4500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Especie eliminada. Seguimos el tratamiento de Areta & Pearman ([2013] *Condor* 115: 131-142), quienes consideran que la BANDURRITA ANDINA *Upucerthia validirostris* y la BANDURRITA PUNEÑA *Upucerthia jelskii* representan una sola especie con vocalizaciones similares y variación clinal en su morfología.

REMOLINERA DE LENGA | *Cinclodes lopezlanusorum*

Distribución: Endémica de los bosques de lenga en la región austral de Chile y Argentina (López-Lanús [2019] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).
Taxonomía: No aceptada. Recientemente descripta como especie nueva en una publicación sin revisión (López-Lanús [2019] *op. cit.*). Esta población es vocal y morfológicamente indistinguible de la REMOLINERA PARDA *Cinclodes fuscus*. Las mínimas diferencias expuestas por López-Lanús ([2019] *op. cit.*) son insuficientes para tratarla como especie válida, y la propuesta no fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop846.htm).

CACHIRLA GRANDE | *Anthus antarcticus*

Distribución: Endémica de las islas Georgias del Sur en el océano Atlántico (Tyler [2020] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Taxonomía: Especie eliminada. Descripta por Jean Cabanis ([1884] *Journal für Ornithologie*: 32: 252-254) en base al material obtenido durante la expedición alemana entre los años 1882 y 1883. Considerada especie válida por casi todos los autores, aunque trabajos moleculares recientes sugieren que este taxón debería considerarse como una subespecie de la CACHIRLA GOTEADA *Anthus correndera* (Van Els & Norambuena [2018] *Ibis* 160: 158-172; Norambuena *et al.* [2018] *PeerJ* 6: e5886). Si bien las aves de Georgias del Sur tienen pocas diferencias con *Anthus correndera grayi*, el canto difiere de otras especies de *Anthus* (Van Els & Norambuena [2018] *op. cit.*).

CAPUCHINO DE COLLAR | *Sporophila zelichi*

Distribución: Nidifica localmente en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y luego migra hacia el norte llegando a Paraguay y Brasil (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Taxonomía: Descripta en base a dos especímenes y dos ejemplares en cautiverio provenientes de los departamentos Colón y Concordia, Entre Ríos (Narosky [1977] *Hornero* 11: 345-348).
Comentarios: Especie eliminada. Nuevos estudios demostraron que algunos capuchinos del género *Sporophila* poseen fases de coloración. Actualmente se considera a "*Sporophila zelichi*" como una forma fenotípicamente distinta del CAPUCHINO PECHO BLANCO *Sporophila palustris* (Areta [2008] *Journal of Field Ornithology* 79: 352-363).

CAPUCHINO DEL PANTANAL | *Sporophila nigrorufa*

Distribución: Muy localizada en el E de Bolivia y SO de Brasil (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).
Comentarios: No aceptada. Un ejemplar fotografiado por Roberto Güller en el PN Lihue Calel, La Pampa el 14 de enero de 2008 (Güller [2008] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 20: 1-3). Seguimos las opiniones vertidas por Guy Kirwan y Juan I. Areta ([2009] *Neotropical Birding* 4: 69-72), quienes cuestionan la identificación y el origen del ave.

CAPUCHINO COBRIZO | *Sporophila bouvreuil*

Distribución: Ampliamente distribuida en el E de Brasil hasta Minas Gerais y São Paulo (Machado & Silveira [2010] *Papéis Avulsos de Zoologia* 50: 517-533).
Taxonomía: El CAPUCHINO BOINA NEGRA *Sporophila bouvreuil pileata* fue tradicionalmente incluida en la avifauna argentina (Dabbene [1915] *Physis* 1: 532-533; Zotta [1944] *Hornero* 8: 481-483). En una reciente revisión taxonómica, la forma *pileata* fue elevada a rango específico (Machado & Silveira [2010] *op. cit.*; Machado & Silveira [2011] *Zootaxa* 2781: 49-62), siendo hasta ahora el único taxón del complejo que habita nuestro país.
Comentarios: No aceptada. Un ejemplar fotografiado por Aníbal Parera, Carlos Figuerero y Horacio Cardozo al norte de Mercedes, departamento homónimo, Corrientes el 4 de enero de 2008 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros; Machado & Silveira [2010] *op. cit.*; Figura 115). La identificación del ave fue motivo de discusión, y bien podría corresponder a un CAPUCHINO CORONA GRIS *Sporophila cinnamomea* con melanismo en la corona o quizás un híbrido entre *Sporophila cinnamomea* x *Sporophila pileata* (Areta *et al.* [2016] *PLoS ONE* 11: 10.1371/journal.pone.0154231).

Figura 115. Capuchino *Sporophila* sp., Mercedes, Corrientes, 4 de enero de 2008 (Aníbal Parera)

CORBATITA DE DUBOIS | *Sporophila ardesiaca*

Distribución: Residente en el E de Brasil desde Bahia hasta São Paulo (Jaramillo [2020] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).
Taxonomía: De estatus taxonómico incierto, esta especie podría representar un morfo del CORBATITA AMARILLO *Sporophila nigricollis* o quizás un híbrido entre ésta última y el CORBATITA *Sporophila caerulescens* (Jaramillo [2020] *op. cit.*).
Comentarios: No aceptada. Un macho fotografiado por Antonio Canz y Diego Ortiz en el dique Celestino Gelsi de la localidad El Cadillal, departamento Tafí Viejo, Tucumán el 11 de enero de 2020. El mismo permaneció en la zona hasta mediados de marzo de ese año (Canz & Ortiz [2020] *EcoRegistros Revista* 10: 13-16). El plumaje y el contexto de este registro dejan dudas con respecto a la identificación del ejemplar, incluso los autores especulan que podría tratarse de un morfo de *Sporophila caerulescens*.

JILGUERO VENTANERO | *Sicalis holmbergi*

Distribución: Endémica del sistema serrano de Ventania en el SO de la provincia de Buenos Aires (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).
Taxonomía: Recientemente descripta como especie nueva en una publicación sin revisión (López-Lanús [2017] *op. cit.*). Esta propuesta no fue reconocida por el SACC, ya que en realidad se trataría de una

población aislada del JILGUERO GRANDE *Sicalis auriventris* (Areta *et al.* [2012] *Condor* 114: 654-671; museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop748.htm).

Comentarios: No aceptada. Observada por Eduardo Holmberg en la sierra de Curamalal, partido de Saavedra, Buenos Aires durante diciembre de 1883 (Holmberg [1884] *La sierra de Curá-Malal. Informe presentado al excelentísimo señor gobernador de la provincia de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha.* Buenos Aires). Al parecer los especímenes colectados en esta expedición se encuentran perdidos. Existe un espécimen colectado por Merkle en "*Curamalán Chico*", Buenos Aires en julio de 1925 (MLP-Or-5742). Samuel Narosky, Sergio Salvador y Carlos Saibene encuentran un *Sicalis* en el cerro Curamalal en noviembre de 1983, asumiendo que son los primeros registros del JILGUERO AUSTRAL *Sicalis lebruni* para la provincia de Buenos Aires (Narosky *et al.* [1984] *Hornero* 12: 209-211). A partir de allí, casi todas las publicaciones posteriores mencionan a *Sicalis lebruni* como residente y nidificante en el sistema serrano de Ventania (Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).

APÉNDICE 1

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
RHEIIFORMES				
Rheidae				
1	*Rhea americana*	Ñandú	Greater Rhea	
2	*Rhea pennata*	Choique	Lesser Rhea	
TINAMIFORMES				
Tinamidae				
3	*Tinamus solitarius*	Macuco	Solitary Tinamou	
4	*Crypturellus obsoletus*	Tataupá Rojizo	Brown Tinamou	
5	*Crypturellus undulatus*	Tataupá Listado	Undulated Tinamou	
6	*Crypturellus parvirostris*	Tataupá Chico	Small-billed Tinamou	
7	*Crypturellus tataupa*	Tataupá Montaraz	Tataupa Tinamou	
8	*Rhynchotus rufescens*	Colorada	Red-winged Tinamou	
9	*Rhynchotus maculicollis*	Guaipo	Huayco Tinamou	
10	*Nothoprocta ornata*	Inambú Serrano	Ornate Tinamou	
11	*Nothoprocta cinerascens*	Inambú Montaraz	Brushland Tinamou	
12	*Nothoprocta pentlandii*	Inambú Silbón	Andean Tinamou	
13	*Nothura darwinii*	Inambú Pálido	Darwin's Nothura	
14	*Nothura maculosa*	Inambú Campestre	Spotted Nothura	
15	*Taoniscus nanus*	Inambú Enano	Dwarf Tinamou	R
16	*Eudromia elegans*	Martineta Copetona	Elegant Crested-Tinamou	
17	*Eudromia formosa*	Martineta Chaqueña	Quebracho Crested-Tinamou	
18	*Tinamotis pentlandii*	Quiula Puneña	Puna Tinamou	
19	*Tinamotis ingoufi*	Quiula Patagónica	Patagonian Tinamou	
ANSERIFORMES				
Anhimidae				
20	*Chauna torquata*	Chajá	Southern Screamer	
Anatidae				
21	*Dendrocygna bicolor*	Sirirí Colorado	Fulvous Whistling-Duck	
22	*Dendrocygna viduata*	Sirirí Pampa	White-faced Whistling-Duck	
23	*Dendrocygna autumnalis*	Sirirí Vientre Negro	Black-bellied Whistling-Duck	
24	*Anser anser*	Ganso Doméstico	Graylag Goose	I
25	*Cygnus melancoryphus*	Cisne Cuello Negro	Black-necked Swan	
26	*Coscoroba coscoroba*	Coscoroba	Coscoroba Swan	
27	*Oressochen jubatus*	Ganso de Monte	Orinoco Goose	
28	*Oressochen melanopterus*	Guayata	Andean Goose	
29	*Chloephaga picta*	Cauquén Común	Upland Goose	Mp
30	*Chloephaga hybrida*	Caranca	Kelp Goose	
31	*Chloephaga poliocephala*	Cauquén Real	Ashy-headed Goose	Mp
32	*Chloephaga rubidiceps*	Cauquén Colorado	Ruddy-headed Goose	Mp
33	*Cairina moschata*	Pato Real	Muscovy Duck	
34	*Sarkidiornis sylvicola*	Pato Crestudo	Comb Duck	
35	*Callonetta leucophrys*	Pato de Collar	Ringed Teal	
36	*Amazonetta brasiliensis*	Pato Cutirí	Brazilian Teal	
37	*Merganetta armata*	Pato de Torrente	Torrent Duck	
38	*Tachyeres patachonicus*	Quetro Volador	Flying Steamer-Duck	
39	*Tachyeres pteneres*	Quetro Austral	Flightless Steamer-Duck	
40	*Tachyeres brachypterus*	Quetro Malvinero	Falkland Steamer-Duck	E
41	*Tachyeres leucocephalus*	Quetro Cabeza Blanca	White-headed Steamer-Duck	E
42	*Lophonetta specularioides*	Pato Crestón	Crested Duck	
43	*Speculanas specularis*	Pato de Anteojos	Spectacled Duck	
44	*Spatula puna*	Pato Puneño	Puna Teal	
45	*Spatula versicolor*	Pato Capuchino	Silver Teal	
46	*Spatula platalea*	Pato Cuchara	Red Shoveler	
47	*Spatula clypeata*	Pato Cuchara Boreal	Northern Shoveler	N V Mn

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
48	*Spatula rhynchotis*	Pato Cuchara Australiano	Australian Shoveler	N V
49	*Spatula discors*	Pato Media Luna	Blue-winged Teal	V Mn
50	*Spatula cyanoptera*	Pato Colorado	Cinnamon Teal	
51	*Mareca sibilatrix*	Pato Overo	Chiloe Wigeon	Mp
52	*Anas bahamensis*	Pato Gargantilla	White-cheeked Pintail	
53	*Anas georgica*	Pato Maicero	Yellow-billed Pintail	
54	*Anas flavirostris*	Pato Barcino	Yellow-billed Teal	
55	*Netta peposaca*	Pato Picazo	Rosy-billed Pochard	
56	*Mergus octosetaceus*	Pato Serrucho	Brazilian Merganser	R
57	*Heteronetta atricapilla*	Pato Cabeza Negra	Black-headed Duck	
58	*Nomonyx dominicus*	Pato Fierro	Masked Duck	
59	*Oxyura jamaicensis*	Pato Zambullidor Grande	Ruddy Duck	
60	*Oxyura vittata*	Pato Zambullidor Chico	Lake Duck	
GALLIFORMES **Cracidae**				
61	*Penelope superciliaris*	Yacupoí	Rusty-margined Guan	
62	*Penelope dabbenei*	Pava de Monte Alisera	Red-faced Guan	
63	*Penelope bridgesi*	Pava de Monte Yungueña	Yungas Guan	N (CT)
64	*Penelope obscura*	Pava de Monte Ribereña	Dusky-legged Guan	
65	*Pipile jacutinga*	Yacutinga	Black-fronted Piping-Guan	
66	*Ortalis canicollis*	Charata	Chaco Chachalaca	
67	*Crax fasciolata*	Muitú	Bare-faced Curassow	
Odontophoridae				
68	*Callipepla californica*	Codorniz de California	California Quail	I
69	*Odontophorus capueira*	Urú	Spot-winged Wood-Quail	
Phasianidae				
70	*Lophura nycthemera*	Faisán Plateado	Silver Pheasant	I
PHOENICOPTERIFORMES **Phoenicopteridae**				
71	*Phoenicopterus chilensis*	Flamenco Austral	Chilean Flamingo	
72	*Phoenicoparrus andinus*	Parina Grande	Andean Flamingo	
73	*Phoenicoparrus jamesi*	Parina Chica	James's Flamingo	
PODICIPEDIFORMES **Podicipedidae**				
74	*Rollandia rolland*	Macá Cara Blanca	White-tufted Grebe	
75	*Tachybaptus dominicus*	Macá Gris	Least Grebe	
76	*Podilymbus podiceps*	Macá Pico Grueso	Pied-billed Grebe	
77	*Podiceps major*	Macá Grande	Great Grebe	Mp
78	*Podiceps occipitalis*	Macá Plateado	Silvery Grebe	Mp
79	*Podiceps juninensis*	Macá Andino	Northern Silvery Grebe	N (CT)
80	*Podiceps gallardoi*	Macá Tobiano	Hooded Grebe	Ec Mp
COLUMBIFORMES **Columbidae**				
81	*Columba livia*	Paloma Doméstica	Rock Pigeon	I
82	*Patagioenas speciosa*	Paloma Trocal	Scaled Pigeon	R
83	*Patagioenas picazuro*	Paloma Picazuró	Picazuro Pigeon	
84	*Patagioenas maculosa*	Paloma Manchada	Spot-winged Pigeon	
85	*Patagioenas fasciata*	Paloma Nuca Blanca	Band-tailed Pigeon	
86	*Patagioenas araucana*	Paloma Araucana	Chilean Pigeon	
87	*Patagioenas cayennensis*	Paloma Colorada	Pale-vented Pigeon	Ma
88	*Geotrygon montana*	Paloma Montera Castaña	Ruddy Quail-Dove	
89	*Geotrygon violacea*	Paloma Montera Violácea	Violaceous Quail-Dove	R
90	*Leptotila verreauxi*	Yerutí Gris	White-tipped Dove	
91	*Leptotila rufaxilla*	Yerutí Colorada	Gray-fronted Dove	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
92	*Leptotila megalura*	Yerutí Yungueña	Large-tailed Dove	
93	*Zentrygon frenata*	Paloma Montera Grande	White-throated Quail-Dove	
94	*Zenaida meloda*	Torcaza Ala Blanca	West Peruvian Dove	N
95	*Zenaida auriculata*	Torcaza	Eared Dove	
96	*Claravis pretiosa*	Palomita Azulada	Blue Ground Dove	
97	*Paraclaravis geoffroyi*	Palomita Morada	Purple-winged Ground Dove	R
98	*Metriopelia ceciliae*	Palomita Moteada	Bare-faced Ground Dove	
99	*Metriopelia morenoi*	Palomita Ojo Desnudo	Bare-eyed Ground Dove	E
100	*Metriopelia melanoptera*	Palomita Cordillerana	Black-winged Ground Dove	
101	*Metriopelia aymara*	Palomita Dorada	Golden-spotted Ground Dove	
102	*Columbina minuta*	Torcacita Enana	Plain-breasted Ground Dove	R
103	*Columbina talpacoti*	Torcacita Colorada	Ruddy Ground Dove	
104	*Columbina squammata*	Torcacita Escamada	Scaled Dove	
105	*Columbina picui*	Torcacita Picuí	Picui Ground Dove	
CUCULIFORMES **Cuculidae**				
106	*Guira guira*	Pirincho	Guira Cuckoo	
107	*Crotophaga major*	Anó Grande	Greater Ani	Ma
108	*Crotophaga ani*	Anó Chico	Smooth-billed Ani	
109	*Crotophaga sulcirostris*	Anó Pico Surcado	Groove-billed Ani	V
110	*Tapera naevia*	Crespín	Striped Cuckoo	
111	*Dromococcyx phasianellus*	Yasiyateré Grande	Pheasant Cuckoo	
112	*Dromococcyx pavoninus*	Yasiyateré Chico	Pavonine Cuckoo	
113	*Coccycua cinerea*	Cuclillo Chico	Ash-colored Cuckoo	Ma
114	*Piaya cayana*	Tingazú	Squirrel Cuckoo	
115	*Coccyzus melacoryphus*	Cuclillo Canela	Dark-billed Cuckoo	Ma
116	*Coccyzus americanus*	Cuclillo Pico Amarillo	Yellow-billed Cuckoo	Mn
117	*Coccyzus euleri*	Cuclillo Ceniciento	Pearly-breasted Cuckoo	Ma
118	*Coccyzus erythropthalmus*	Cuclillo Ojo Colorado	Black-billed Cuckoo	V Mn
NYCTIBIIFORMES **Nyctibiidae**				
119	*Nyctibius aethereus*	Urutaú Coludo	Long-tailed Potoo	
120	*Nyctibius griseus*	Urutaú	Common Potoo	Mp
CAPRIMULGIFORMES **Caprimulgidae**				
121	*Chordeiles nacunda*	Ñacundá	Nacunda Nighthawk	Mp
122	*Chordeiles pusillus*	Añapero Chico	Least Nighthawk	R Ma
123	*Chordeiles minor*	Añapero Boreal	Common Nighthawk	Mn
124	*Chordeiles gundlachii*	Añapero Caribeño	Antillean Nighthawk	N V Mn
125	*Lurocalis semitorquatus*	Añapero Castaño	Short-tailed Nighthawk	Ma
126	*Systellura longirostris*	Atajacaminos Ñañarca	Band-winged Nightjar	Mp
127	*Nyctidromus albicollis*	Curiango	Common Pauraque	
128	*Eleothreptus anomalus*	Atajacaminos Ala Negra	Sickle-winged Nightjar	Ma?
129	*Uropsalis lyra*	Atajacaminos Lira	Lyre-tailed Nightjar	
130	*Setopagis parvula*	Atajacaminos Chico	Little Nightjar	Ma
131	*Hydropsalis maculicaudus*	Atajacaminos Ceja Blanca	Spot-tailed Nightjar	N R Ma?
132	*Hydropsalis torquata*	Atajacaminos Tijera	Scissor-tailed Nightjar	Mp
133	*Macropsalis forcipata*	Atajacaminos Coludo	Long-trained Nightjar	
134	*Nyctiphrynus ocellatus*	Atajacaminos Ocelado	Ocellated Poorwill	
135	*Antrostomus sericocaudatus*	Atajacaminos Oscuro	Silky-tailed Nightjar	
136	*Antrostomus rufus*	Atajacaminos Colorado	Rufous Nightjar	Ma
APODIFORMES **Apodidae**				
137	*Cypseloides rothschildi*	Vencejo Pardo	Rothschild's Swift	Ma

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
138	*Cypseloides fumigatus*	Vencejo Negruzco	Sooty Swift	R
139	*Cypseloides senex*	Vencejo de Cascada	Great Dusky Swift	
140	*Streptoprocne zonaris*	Vencejo de Collar	White-collared Swift	
141	*Streptoprocne biscutata*	Vencejo Nuca Blanca	Biscutate Swift	N R
142	*Chaetura cinereiventris*	Vencejo Chico	Gray-rumped Swift	
143	*Chaetura meridionalis*	Vencejo de Tormenta	Sick's Swift	Ma
144	*Aeronautes montivagus*	Vencejo Montañés	White-tipped Swift	
145	*Aeronautes andecolus*	Vencejo Blanco	Andean Swift	
146	*Tachornis squamata*	Vencejo Palmero	Fork-tailed Palm-Swift	N V
Trochilidae				
147	*Florisuga mellivora*	Picaflor Nuca Blanca	White-necked Jacobin	N V
148	*Florisuga fusca*	Picaflor Negro	Black Jacobin	Vi
149	*Phaethornis pretrei*	Ermitaño Canela	Planalto Hermit	
150	*Phaethornis eurynome*	Ermitaño Escamado	Scale-throated Hermit	
151	*Colibri coruscans*	Colibrí Grande	Sparkling Violetear	
152	*Colibri serrirostris*	Colibrí Mediano	White-vented Violetear	
153	*Polytmus guainumbi*	Picaflor de Antifaz	White-tailed Goldenthroat	Ma
154	*Chrysolampis mosquitus*	Picaflor Topacio	Ruby-topaz Hummingbird	N R
155	*Anthracothorax nigricollis*	Picaflor Vientre Negro	Black-throated Mango	
156	*Sephanoides sephaniodes*	Picaflor Rubí	Green-backed Firecrown	Mp
157	*Adelomyia melanogenys*	Picaflor Yungueño	Speckled Hummingbird	
158	*Sappho sparganurus*	Picaflor Cometa	Red-tailed Comet	
159	*Oreotrochilus estella*	Picaflor Puneño	Andean Hillstar	
160	*Oreotrochilus leucopleurus*	Picaflor Andino	White-sided Hillstar	
161	*Oreotrochilus adela*	Picaflor Colorado	Wedge-tailed Hillstar	
162	*Eriocnemis glaucopoides*	Picaflor Frente Azul	Blue-capped Puffleg	
163	*Patagona gigas*	Picaflor Gigante	Giant Hummingbird	Mp
164	*Heliomaster squamosus*	Picaflor Garganta Escamada	Stripe-breasted Starthroat	N R
165	*Heliomaster furcifer*	Picaflor de Barbijo	Blue-tufted Starthroat	Mp
166	*Microstilbon burmeisteri*	Picaflor Enano	Slender-tailed Woodstar	
167	*Calliphlox amethystina*	Picaflor Amatista	Amethyst Woodstar	R Ma
168	*Chlorostilbon lucidus*	Picaflor Verde	Glittering-bellied Emerald	Mp
169	*Stephanoxis loddigesii*	Picaflor Copetón	Purple-crowned Plovercrest	
170	*Thalurania furcata*	Picaflor Zafiro	Fork-tailed Woodnymph	
171	*Thalurania glaucopis*	Picaflor Corona Violácea	Violet-capped Woodnymph	
172	*Eupetomena macroura*	Picaflor Tijereta	Swallow-tailed Hummingbird	N
173	*Chrysuronia versicolor*	Picaflor Esmeralda	Versicolored Emerald	
174	*Leucochloris albicollis*	Picaflor Garganta Blanca	White-throated Hummingbird	
175	*Chionomesa lactea*	Picaflor Pecho Azul	Sapphire-spangled Emerald	N R
176	*Hylocharis chrysura*	Picaflor Bronceado	Gilded Hummingbird	Mp
177	*Elliotomyia chionogaster*	Picaflor Vientre Blanco	White-bellied Hummingbird	
178	*Chlorestes cyanus*	Picaflor Lazulita	White-chinned Sapphire	N R
GRUIFORMES **Aramidae**				
179	*Aramus guarauna*	Carau	Limpkin	
Rallidae				
180	*Rallus antarcticus*	Gallineta Chica	Austral Rail	Mp?
181	*Porphyrio martinica*	Pollona Azul	Purple Gallinule	Mp
182	*Porphyrio alleni*	Pollona Africana	Allen's Gallinule	V
183	*Porphyrio flavirostris*	Pollona Celeste	Azure Gallinule	Ma
184	*Laterallus melanophaius*	Burrito Canela	Rufous-sided Crake	
185	*Laterallus exilis*	Burrito Pecho Gris	Gray-breasted Crake	
186	*Laterallus leucopyrrhus*	Burrito Colorado	Red-and-white Crake	
187	*Coturnicops notatus*	Burrito Enano	Speckled Rail	Mp?

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
188	*Micropygia schomburgkii*	Burrito Ocelado	Ocellated Crake	N R
189	*Mustelirallus albicollis*	Burrito Grande	Ash-throated Crake	
190	*Mustelirallus erythrops*	Burrito Pico Rojo	Paint-billed Crake	Ma
191	*Pardirallus maculatus*	Gallineta Overa	Spotted Rail	Mp
192	*Pardirallus nigricans*	Gallineta Negruzca	Blackish Rail	
193	*Pardirallus sanguinolentus*	Gallineta Pico Pintado	Plumbeous Rail	
194	*Aramides ypecaha*	Ipacaá	Giant Wood-Rail	
195	*Aramides cajaneus*	Chiricote	Gray-cowled Wood-Rail	
196	*Aramides saracura*	Saracura	Slaty-breasted Wood-Rail	
197	*Porphyriops melanops*	Pollona Pintada	Spot-flanked Gallinule	Mp?
198	*Porzana flaviventer*	Burrito Amarillo	Yellow-breasted Crake	Mp?
199	*Porzana spiloptera*	Burrito Negruzco	Dot-winged Crake	Mp?
200	*Gallinula galeata*	Pollona Negra	Common Gallinule	
201	*Fulica rufifrons*	Gallareta Escudete Rojo	Red-fronted Coot	
202	*Fulica cornuta*	Gallareta Cornuda	Horned Coot	
203	*Fulica gigantea*	Gallareta Gigante	Giant Coot	
204	*Fulica armillata*	Gallareta Ligas Rojas	Red-gartered Coot	
205	*Fulica ardesiaca*	Gallareta Andina	Slate-colored Coot	
206	*Fulica leucoptera*	Gallareta Chica	White-winged Coot	
Heliornithidae				
207	*Heliornis fulica*	Ipequí	Sungrebe	
CHARADRIIFORMES Charadriidae				
208	*Pluvialis dominica*	Chorlo Pampa	American Golden-Plover	Mn
209	*Pluvialis squatarola*	Chorlo Ártico	Black-bellied Plover	Mn
210	*Oreopholus ruficollis*	Chorlo Cabezón	Tawny-throated Dotterel	Mp
211	*Vanellus cayanus*	Chorlo de Espolón	Pied Lapwing	R
212	*Vanellus chilensis*	Tero	Southern Lapwing	
213	*Vanellus resplendens*	Tero Serrano	Andean Lapwing	
214	*Charadrius modestus*	Chorlito Pecho Canela	Rufous-chested Dotterel	Mp
215	*Charadrius semipalmatus*	Chorlito Palmado	Semipalmated Plover	Mn
216	*Charadrius mongolus*	Chorlito Mongol	Lesser Sand-Plover	N V
217	*Charadrius collaris*	Chorlito de Collar	Collared Plover	
218	*Charadrius alticola*	Chorlito Puneño	Puna Plover	
219	*Charadrius falklandicus*	Chorlito Doble Collar	Two-banded Plover	Mp
220	*Phegornis mitchellii*	Chorlito de Vincha	Diademed Sandpiper-Plover	
Haematopodidae				
221	*Haematopus palliatus*	Ostrero Pardo	American Oystercatcher	
222	*Haematopus ater*	Ostrero Negro	Blackish Oystercatcher	
223	*Haematopus leucopodus*	Ostrero Austral	Magellanic Oystercatcher	
Recurvirostridae				
224	*Himantopus mexicanus*	Tero Real	Black-necked Stilt	
225	*Recurvirostra andina*	Avoceta Andina	Andean Avocet	
Chionidae				
226	*Chionis albus*	Paloma Antártica	Snowy Sheathbill	Mp
Pluvianellidae				
227	*Pluvianellus socialis*	Chorlito Ceniciento	Magellanic Plover	Mp
Scolopacidae				
228	*Bartramia longicauda*	Batitú	Upland Sandpiper	Mn
229	*Numenius borealis*	Playero Esquimal	Eskimo Curlew	R Mn
230	*Numenius phaeopus*	Playero Trinador	Whimbrel	Mn
231	*Numenius arquata*	Playero Gigante	Eurasian Curlew	N V
232	*Limosa haemastica*	Becasa de Mar	Hudsonian Godwit	Mn
233	*Arenaria interpres*	Vuelvepiedras	Ruddy Turnstone	Mn

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
234	*Calidris canutus*	Playero Rojizo	Red Knot	Mn
235	*Calidris virgata*	Playero de Rompiente	Surfbird	Mn
236	*Calidris pugnax*	Combatiente	Ruff	N V
237	*Calidris himantopus*	Playero Zancudo	Stilt Sandpiper	Mn
238	*Calidris ferruginea*	Playero Zarapitín	Curlew Sandpiper	N V
239	*Calidris alba*	Playerito Blanco	Sanderling	Mn
240	*Calidris bairdii*	Playerito Unicolor	Baird's Sandpiper	Mn
241	*Calidris minuta*	Playerito Menudo	Little Stint	V
242	*Calidris minutilla*	Playerito Menor	Least Sandpiper	N Mn
243	*Calidris fuscicollis*	Playerito Rabadilla Blanca	White-rumped Sandpiper	Mn
244	*Calidris subruficollis*	Playerito Canela	Buff-breasted Sandpiper	Mn
245	*Calidris melanotos*	Playerito Pectoral	Pectoral Sandpiper	Mn
246	*Calidris pusilla*	Playerito Enano	Semipalmated Sandpiper	Mn
247	*Limnodromus griseus*	Becasa Gris	Short-billed Dowitcher	V Mn
248	*Gallinago stricklandii*	Becasina Grande	Fuegian Snipe	R
249	*Gallinago undulata*	Becasina Gigante	Giant Snipe	N R
250	*Gallinago paraguaiae*	Becasina de Bañado	Pantanal Snipe	
251	*Gallinago magellanica*	Becasina Patagónica	Magellanic Snipe	N (CT) Mp
252	*Gallinago andina*	Becasina Andina	Puna Snipe	
253	*Phalaropus tricolor*	Falaropo Común	Wilson's Phalarope	Mn
254	*Phalaropus lobatus*	Falaropo Pico Fino	Red-necked Phalarope	N V Mn
255	*Phalaropus fulicarius*	Falaropo Pico Grueso	Red Phalarope	Mn
256	*Xenus cinereus*	Playerito Pico Curvo	Terek Sandpiper	V
257	*Actitis macularius*	Playerito Manchado	Spotted Sandpiper	Mn
258	*Tringa solitaria*	Pitotoy Solitario	Solitary Sandpiper	Mn
259	*Tringa melanoleuca*	Pitotoy Grande	Greater Yellowlegs	Mn
260	*Tringa semipalmata*	Playero Ala Blanca	Willet	Mn
261	*Tringa flavipes*	Pitotoy Chico	Lesser Yellowlegs	Mn
Thinocoridae				
262	*Attagis gayi*	Agachona Grande	Rufous-bellied Seedsnipe	
263	*Attagis malouinus*	Agachona Patagónica	White-bellied Seedsnipe	
264	*Thinocorus orbignyianus*	Agachona de Collar	Gray-breasted Seedsnipe	
265	*Thinocorus rumicivorus*	Agachona Chica	Least Seedsnipe	Mp
Jacanidae				
266	*Jacana jacana*	Jacana	Wattled Jacana	
Rostratulidae				
267	*Nycticryphes semicollaris*	Aguatero	South American Painted-snipe	Mp
Stercorariidae				
268	*Stercorarius chilensis*	Escúa Canela	Chilean Skua	Mp?
269	*Stercorarius maccormicki*	Escúa Polar	South Polar Skua	Ma
270	*Stercorarius antarcticus*	Escúa Parda	Brown Skua	Mp
271	*Stercorarius pomarinus*	Salteador Grande	Pomarine Jaeger	Mn
272	*Stercorarius parasiticus*	Salteador Chico	Parasitic Jaeger	Mn
273	*Stercorarius longicaudus*	Salteador Coludo	Long-tailed Jaeger	Mn
Rynchopidae				
274	*Rynchops niger*	Rayador	Black Skimmer	Mn-Mp
Laridae				
275	*Xema sabini*	Gaviota de Sabine	Sabine Gull	N V Mn
276	*Chroicocephalus serranus*	Gaviota Andina	Andean Gull	
277	*Chroicocephalus maculipennis*	Gaviota Capucho Café	Brown-hooded Gull	Mp
278	*Chroicocephalus cirrocephalus*	Gaviota Capucho Gris	Gray-hooded Gull	Mp
279	*Leucophaeus scoresbii*	Gaviota Gris	Dolphin Gull	
280	*Leucophaeus modestus*	Gaviota Garuma	Gray Gull	N V
281	*Leucophaeus atricilla*	Gaviota Reidora	Laughing Gull	N V Mn

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
282	*Leucophaeus pipixcan*	Gaviota Chica	Franklin's Gull	Mn
283	*Larus atlanticus*	Gaviota Cangrejera	Olrog's Gull	Ec Mp
284	*Larus dominicanus*	Gaviota Cocinera	Kelp Gull	
285	*Larus fuscus*	Gaviota Sombría	Lesser Black-backed Gull	V
286	*Anous minutus*	Gaviotín Corona Blanca	Black Noddy	N V
287	*Onychoprion fuscatus*	Gaviotín Sombrío	Sooty Tern	N V
288	*Sternula antillarum*	Gaviotín Chico Boreal	Least Tern	V Mn
289	*Sternula superciliaris*	Gaviotín de Río	Yellow-billed Tern	
290	*Phaetusa simplex*	Atí	Large-billed Tern	
291	*Gelochelidon nilotica*	Gaviotín Pico Grueso	Gull-billed Tern	
292	*Chlidonias niger*	Gaviotín Negro	Black Tern	V Mn
293	*Chlidonias leucopterus*	Gaviotín Ala Blanca	White-winged Tern	N V
294	*Sterna hirundo*	Gaviotín Golondrina	Common Tern	Mn
295	*Sterna paradisaea*	Gaviotín Ártico	Arctic Tern	Mn
296	*Sterna hirundinacea*	Gaviotín Sudamericano	South American Tern	Mp
297	*Sterna vittata*	Gaviotín Antártico	Antarctic Tern	Mp
298	*Sterna trudeaui*	Gaviotín Lagunero	Snowy-crowned Tern	
299	*Thalasseus sandvicensis*	Gaviotín Pico Amarillo	Sandwich Tern	Mp
300	*Thalasseus maximus*	Gaviotín Real	Royal Tern	Mp
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**				
301	*Aptenodytes patagonicus*	Pingüino Rey	King Penguin	
302	*Aptenodytes forsteri*	Pingüino Emperador	Emperor Penguin	
303	*Pygoscelis adeliae*	Pingüino Ojo Blanco	Adelie Penguin	
304	*Pygoscelis antarcticus*	Pingüino de Barbijo	Chinstrap Penguin	
305	*Pygoscelis papua*	Pingüino de Vincha	Gentoo Penguin	
306	*Spheniscus magellanicus*	Pingüino Patagónico	Magellanic Penguin	Mp
307	*Eudyptes sclateri*	Pingüino Crestudo	Erect-crested Penguin	V
308	*Eudyptes chrysolophus*	Pingüino Frente Dorada	Macaroni Penguin	
309	*Eudyptes schlegeli*	Pingüino Cara Blanca	Royal Penguin	V
310	*Eudyptes moseleyi*	Pingüino de Tristán	Tristan Penguin	N V
311	*Eudyptes chrysocome*	Pingüino Penacho Amarillo	Rockhopper Penguin	Mp
312	*Eudyptes pachyrhynchus*	Pingüino Pico Grueso	Fiordland Penguin	V
313	*Eudyptes robustus*	Pingüino de Snares	Snares Penguin	V
PROCELLARIIFORMES **Diomedeidae**				
314	*Diomedea epomophora*	Albatros Real del Sur	Royal Albatross	
315	*Diomedea sanfordi*	Albatros Real del Norte	Northern Royal Albatross	N (CT)
316	*Diomedea exulans*	Albatros Errante	Wandering Albatross	
317	*Diomedea antipodensis*	Albatros de las Antípodas	Antipodean Albatross	N (CT) R
318	*Diomedea dabbenena*	Albatros de Tristán	Tristan Albatross	N (CT) R
319	*Phoebetria fusca*	Albatros Oscuro	Sooty Albatross	
320	*Phoebetria palpebrata*	Albratros Manto Claro	Light-mantled Albatross	
321	*Thalassarche chlororhynchos*	Albatros Pico Fino	Yellow-nosed Albatross	
322	*Thalassarche melanophris*	Albatros Ceja Negra	Black-browed Albatross	
323	*Thalassarche chrysostoma*	Albatros Cabeza Gris	Gray-headed Albatross	
324	*Thalassarche bulleri*	Albatros de Buller	Buller's Albatross	N R
325	*Thalassarche steadi*	Albatros Corona Blanca	White-capped Albatross	R
326	*Thalassarche salvini*	Albatros de Salvin	Salvin's Albatross	N (CT) R
Oceanitidae				
327	*Fregetta grallaria*	Paíño Vientre Blanco	White-bellied Storm-Petrel	R
328	*Fregetta tropica*	Paíño Vientre Negro	Black-bellied Storm-Petrel	
329	*Oceanites oceanicus*	Paíño de Wilson	Wilson's Storm-Petrel	
330	*Oceanites pincoyae*	Paíño Pincoya	Pincoya Storm-Petrel	V

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
331	*Garrodia nereis*	Paíño Gris	Gray-backed Storm-Petrel	
332	*Pelagodroma marina*	Paíño Cara Blanca	White-faced Storm-Petrel	R
Hydrobatidae				
333	*Oceanodroma leucorhoa*	Paíño Boreal	Leach's Storm-Petrel	V
334	*Hydrobates hornbyi*	Paíno de Collar	Hornby's Storm-Petrel	N V
Procellariidae				
335	*Macronectes giganteus*	Petrel Gigante Antártico	Southern Giant-Petrel	
336	*Macronectes halli*	Petrel Gigante Oscuro	Northern Giant-Petrel	
337	*Fulmarus glacialoides*	Petrel Plateado	Southern Fulmar	
338	*Thalassoica antarctica*	Petrel Antártico	Antarctic Petrel	
339	*Daption capense*	Petrel Damero	Cape Petrel	
340	*Pagodroma nivea*	Petrel Blanco	Snow Petrel	
341	*Aphrodroma brevirostris*	Petrel Pizarra	Kerguelen Petrel	
342	*Pterodroma macroptera*	Petrel Alas Grandes	Great-winged Petrel	N
343	*Pterodroma mollis*	Petrel Collar Gris	Soft-plumaged Petrel	
344	*Pterodroma incerta*	Petrel Cabeza Parda	Atlantic Petrel	
345	*Pterodroma lessonii*	Petrel Cabeza Blanca	White-headed Petrel	
346	*Halobaena caerulea*	Petrel Azulado	Blue Petrel	
347	*Pachyptila vittata*	Prión Pico Ancho	Broad-billed Prion	
348	*Pachyptila turtur*	Prión Pico Corto	Fairy Prion	
349	*Pachyptila desolata*	Prión Pico Grande	Antarctic Prion	
350	*Pachyptila belcheri*	Prión Pico Fino	Slender-billed Prion	
351	*Procellaria cinerea*	Petrel Ceniciento	Gray Petrel	
352	*Procellaria aequinoctialis*	Petrel Barba Blanca	White-chinned Petrel	
353	*Procellaria conspicillata*	Petrel de Anteojos	Spectacled Petrel	N
354	*Procellaria westlandica*	Petrel Negro	Westland Petrel	
355	*Calonectris diomedea*	Pardela Grande	Cory's Shearwater	
356	*Calonectris edwardsii*	Pardela de Cabo Verde	Cape Verde Shearwater	N R
357	*Ardenna grisea*	Pardela Oscura	Sooty Shearwater	
358	*Ardenna carneipes*	Pardela Patas Claras	Flesh-footed Shearwater	N V
359	*Ardenna gravis*	Pardela Cabeza Negra	Great Shearwater	
360	*Ardenna creatopus*	Pardela Patas Rosas	Pink-footed Shearwater	V
361	*Puffinus puffinus*	Pardela Boreal	Manx Shearwater	
362	*Puffinus assimilis*	Pardela Chica	Little Shearwater	
363	*Pelecanoides urinatrix*	Yunco Común	Common Diving-Petrel	
364	*Pelecanoides georgicus*	Yunco Geórgico	South Georgia Diving-Petrel	
365	*Pelecanoides magellani*	Yunco Magallánico	Magellanic Diving-Petrel	
CICONIIFORMES **Ciconiidae**				
366	*Ciconia maguari*	Cigüeña Americana	Maguari Stork	
367	*Jabiru mycteria*	Yabirú	Jabiru	
368	*Mycteria americana*	Tuyuyú	Wood Stork	
SULIFORMES **Fregatidae**				
369	*Fregata magnificens*	Ave Fragata	Magnificent Frigatebird	
Sulidae				
370	*Morus capensis*	Piquero del Cabo	Cape Gannet	V
371	*Sula variegata*	Piquero Variado	Peruvian Booby	N V
372	*Sula leucogaster*	Piquero Pardo	Brown Booby	V
Anhingidae				
373	*Anhinga anhinga*	Aninga	Anhinga	
Phalacrocoracidae				
374	*Phalacrocorax gaimardi*	Cormorán Gris	Red-legged Cormorant	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
375	*Phalacrocorax brasilianus*	Biguá	Neotropic Cormorant	
376	*Phalacrocorax magellanicus*	Cormorán Cuello Negro	Magellanic Cormorant	
377	*Phalacrocorax bougainvillii*	Guanay	Guanay Cormorant	R
378	*Phalacrocorax atriceps*	Cormorán Imperial	Imperial Cormorant	
379	*Phalacrocorax georgianus*	Cormorán Geórgico	South Georgia Cormorant	E
380	*Phalacrocorax bransfieldensis*	Cormorán Antártico	Antarctic Cormorant	
PELECANIFORMES Pelecanidae				
381	*Pelecanus thagus*	Pelícano Peruano	Peruvian Pelican	N V
Ardeidae				
382	*Tigrisoma lineatum*	Hocó Colorado	Rufescent Tiger-Heron	
383	*Tigrisoma fasciatum*	Hocó Oscuro	Fasciated Tiger-Heron	
384	*Cochlearius cochlearius*	Garza Cucharona	Boat-billed Heron	
385	*Botaurus pinnatus*	Mirasol Grande	Pinnated Bittern	
386	*Ixobrychus exilis*	Mirasol Chico	Least Bittern	
387	*Ixobrychus involucris*	Mirasol Estriado	Stripe-backed Bittern	
388	*Nycticorax nycticorax*	Garza Bruja	Black-crowned Night-Heron	
389	*Nyctanassa violacea*	Garza Bruja Coronada	Yellow-crowned Night-Heron	N V
390	*Butorides striata*	Garcita Azulada	Striated Heron	Mp
391	*Bubulcus ibis*	Garcita Bueyera	Cattle Egret	
392	*Ardea cocoi*	Garza Mora	Cocoi Heron	
393	*Ardea alba*	Garza Blanca	Great Egret	
394	*Syrigma sibilatrix*	Chiflón	Whistling Heron	
395	*Pilherodius pileatus*	Garcita Real	Capped Heron	N R
396	*Egretta thula*	Garcita Blanca	Snowy Egret	
397	*Egretta caerulea*	Garza Azul	Little Blue Heron	
Threskiornithidae				
398	*Plegadis chihi*	Cuervillo de Cañada	White-faced Ibis	
399	*Plegadis ridgwayi*	Cuervillo Puneño	Puna Ibis	
400	*Mesembrinibis cayennensis*	Tapicurú	Green Ibis	
401	*Phimosus infuscatus*	Cuervillo Cara Pelada	Bare-faced Ibis	
402	*Theristicus caerulescens*	Bandurria Mora	Plumbeous Ibis	Mp
403	*Theristicus caudatus*	Bandurria Boreal	Buff-necked Ibis	Mp
404	*Theristicus branickii*	Bandurria Andina	Andean Ibis	N V
405	*Theristicus melanopis*	Bandurria Austral	Black-faced Ibis	Mp
406	*Platalea ajaja*	Espátula Rosada	Roseate Spoonbill	Mp
CATHARTIFORMES Cathartidae				
407	*Sarcoramphus papa*	Jote Real	King Vulture	
408	*Vultur gryphus*	Cóndor Andino	Andean Condor	
409	*Coragyps atratus*	Jote Cabeza Negra	Black Vulture	
410	*Cathartes aura*	Jote Cabeza Colorada	Turkey Vulture	
411	*Cathartes burrovianus*	Jote Cabeza Amarilla	Lesser Yellow-headed Vulture	
412	*Cathartes melambrotus*	Jote Cabeza Amarilla Grande	Greater Yellow-headed Vulture	N V
ACCIPITRIFORMES Pandionidae				
413	*Pandion haliaetus*	Águila Pescadora	Osprey	Mn
Accipitridae				
414	*Gampsonyx swainsonii*	Milano Chico	Pearl Kite	
415	*Elanus leucurus*	Milano Blanco	White-tailed Kite	
416	*Chondrohierax uncinatus*	Milano Pico Garfio	Hook-billed Kite	
417	*Leptodon cayanensis*	Milano Cabeza Gris	Gray-headed Kite	
418	*Elanoides forficatus*	Milano Tijereta	Swallow-tailed Kite	Mn-Ma
419	*Morphnus guianensis*	Águila Monera	Crested Eagle	R

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
420	*Harpia harpyja*	Harpía	Harpy Eagle	R
421	*Spizaetus tyrannus*	Aguila Crestuda Negra	Black Hawk-Eagle	R
422	*Spizaetus melanoleucus*	Águila Viuda	Black-and-white Hawk-Eagle	
423	*Spizaetus ornatus*	Águila Crestuda Real	Ornate Hawk-Eagle	
424	*Spizaetus isidori*	Águila Poma	Black-and-chestnut Eagle	
425	*Busarellus nigricollis*	Aguilucho Pampa	Black-collared Hawk	
426	*Rostrhamus sociabilis*	Caracolero	Snail Kite	Mp
427	*Harpagus diodon*	Milano de Corbata	Rufous-thighed Kite	Ma
428	*Ictinia mississippiensis*	Milano Boreal	Mississippi Kite	Mn
429	*Ictinia plumbea*	Milano Plomizo	Plumbeous Kite	Ma
430	*Circus cinereus*	Gavilán Ceniciento	Cinereous Harrier	
431	*Circus buffoni*	Gavilán Planeador	Long-winged Harrier	
432	*Accipiter poliogaster*	Esparvero Grande	Gray-bellied Hawk	
433	*Accipiter superciliosus*	Esparvero Chico	Tiny Hawk	
434	*Accipiter striatus*	Esparvero Estriado	Sharp-shinned Hawk	
435	*Accipiter bicolor*	Esparvero Variado	Bicolored Hawk	
436	*Accipiter chilensis*	Peuquito	Chilean Hawk	N (CT)
437	*Geranospiza caerulescens*	Gavilán Patas Largas	Crane Hawk	
438	*Buteogallus meridionalis*	Aguilucho Colorado	Savanna Hawk	
439	*Buteogallus urubitinga*	Águila Negra	Great Black Hawk	
440	*Buteogallus solitarius*	Águila Solitaria	Solitary Eagle	
441	*Buteogallus coronatus*	Águila Coronada	Chaco Eagle	
442	*Rupornis magnirostris*	Taguató	Roadside Hawk	
443	*Parabuteo unicinctus*	Gavilán Mixto	Harris's Hawk	
444	*Parabuteo leucorrhous*	Taguató Negro	White-rumped Hawk	
445	*Geranoaetus albicaudatus*	Aguilucho Alas Largas	White-tailed Hawk	Mp
446	*Geranoaetus polyosoma*	Aguilucho Ñanco	Variable Hawk	Mp
447	*Geranoaetus melanoleucus*	Águila Mora	Black-chested Buzzard-Eagle	Mp
448	*Pseudastur polionotus*	Aguilucho Blanco	Mantled Hawk	N R
449	*Buteo nitidus*	Aguilucho Gris	Gray-lined Hawk	R
450	*Buteo platypterus*	Aguilucho Alas Anchas	Broad-winged Hawk	N Mn
451	*Buteo albigula*	Aguilucho Andino	White-throated Hawk	Ma-Mp
452	*Buteo brachyurus*	Aguilucho Cola Corta	Short-tailed Hawk	
453	*Buteo swainsoni*	Aguilucho Langostero	Swainson's Hawk	Mn
454	*Buteo albonotatus*	Aguilucho Jote	Zone-tailed Hawk	
455	*Buteo ventralis*	Aguilucho Cola Rojiza	Rufous-tailed Hawk	
STRIGIFORMES **Tytonidae**				
456	*Tyto alba*	Lechuza de Campanario	Barn Owl	
Strigidae				
457	*Megascops choliba*	Alilicucu Común	Tropical Screech-Owl	
458	*Megascops hoyi*	Alilicucu Yungueño	Montane Forest Screech-Owl	
459	*Megascops sanctaecatarinae*	Alilicucu Orejudo	Long-tufted Screech-Owl	
460	*Megascops atricapilla*	Alilicucu Grande	Black-capped Screech-Owl	
461	*Pulsatrix perspicillata*	Lechuzón Mocho Grande	Spectacled Owl	
462	*Pulsatrix koeniswaldiana*	Lechuzón Mocho Chico	Tawny-browed Owl	
463	*Bubo virginianus*	Ñacurutú	Great Horned Owl	
464	*Bubo magellanicus*	Tucúquere	Magellanic Horned Owl	
465	*Strix hylophila*	Lechuza Listada	Rusty-barred Owl	
466	*Strix chacoensis*	Lechuza Chaqueña	Chaco Owl	
467	*Strix rufipes*	Lechuza Austral	Rufous-legged Owl	
468	*Ciccaba virgata*	Lechuza Estriada	Mottled Owl	
469	*Ciccaba huhula*	Lechuza Negra	Black-banded Owl	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
470	*Glaucidium bolivianum*	Caburé Yungueño	Yungas Pygmy-Owl	
471	*Glaucidium brasilianum*	Caburé Chico	Ferruginous Pygmy-Owl	
472	*Glaucidium nana*	Caburé Austral	Austral Pygmy-Owl	Mp
473	*Athene cunicularia*	Lechucita Vizcachera	Burrowing Owl	
474	*Aegolius harrisii*	Lechucita Canela	Buff-fronted Owl	
475	*Asio clamator*	Lechuzón Orejudo	Striped Owl	
476	*Asio stygius*	Lechuzón Negruzco	Stygian Owl	
477	*Asio flammeus*	Lechuzón de Campo	Short-eared Owl	
TROGONIFORMES **Trogonidae**				
478	*Trogon curucui*	Surucuá Aurora	Blue-crowned Trogon	
479	*Trogon surrucura*	Surucuá Cola Blanca	Surucua Trogon	
480	*Trogon rufus*	Surucuá Amarillo	Black-throated Trogon	
CORACIIFORMES **Momotidae**				
481	*Baryphthengus ruficapillus*	Yeruvá	Rufous-capped Motmot	
482	*Momotus momota*	Burgo	Amazonian Motmot	
Alcedinidae				
483	*Megaceryle torquata*	Martín Pescador Grande	Ringed Kingfisher	
484	*Chloroceryle amazona*	Martín Pescador Mediano	Amazon Kingfisher	
485	*Chloroceryle aenea*	Martín Pescador Enano	American Pygmy Kingfisher	R
486	*Chloroceryle americana*	Martín Pescador Chico	Green Kingfisher	
GALBULIFORMES **Bucconidae**				
487	*Notharchus swainsoni*	Chacurú Grande	Buff-bellied Puffbird	
488	*Nystalus chacuru*	Chacurú Cara Negra	White-eared Puffbird	
489	*Nystalus maculatus*	Durmilí	Spot-backed Puffbird	
490	*Nonnula rubecula*	Chacurú Chico	Rusty-breasted Nunlet	
PICIFORMES **Ramphastidae**				
491	*Ramphastos toco*	Tucán Grande	Toco Toucan	
492	*Ramphastos dicolorus*	Tucán Pico Verde	Red-breasted Toucan	
493	*Selenidera maculirostris*	Arasarí Chico	Spot-billed Toucanet	
494	*Pteroglossus bailloni*	Arasarí Banana	Saffron Toucanet	
495	*Pteroglossus castanotis*	Arasarí Fajado	Chestnut-eared Aracari	
Picidae				
496	*Picumnus cirratus*	Carpinterito Barrado	White-barred Piculet	
497	*Picumnus temminckii*	Carpinterito Cuello Canela	Ochre-collared Piculet	
498	*Picumnus nebulosus*	Carpinterito Ocráceo	Mottled Piculet	
499	*Melanerpes candidus*	Carpintero Blanco	White Woodpecker	
500	*Melanerpes flavifrons*	Carpintero Arcoiris	Yellow-fronted Woodpecker	
501	*Melanerpes cactorum*	Carpintero del Cardón	White-fronted Woodpecker	
502	*Dryobates fumigatus*	Carpintero Oliva Oscuro	Smoky-brown Woodpecker	
503	*Dryobates spilogaster*	Carpintero Oliva Manchado	White-spotted Woodpecker	
504	*Dryobates mixtus*	Carpintero Bataraz Chico	Checkered Woodpecker	
505	*Dryobates lignarius*	Carpintero Bataraz Patagónico	Striped Woodpecker	
506	*Dryobates passerinus*	Carpintero Oliva Chico	Little Woodpecker	
507	*Dryobates frontalis*	Carpintero Oliva Yungueño	Dot-fronted Woodpecker	
508	*Campephilus robustus*	Carpintero Grande	Robust Woodpecker	
509	*Campephilus melanoleucos*	Carpintero Garganta Negra	Crimson-crested Woodpecker	
510	*Campephilus leucopogon*	Carpintero Lomo Blanco	Cream-backed Woodpecker	
511	*Campephilus magellanicus*	Carpintero Gigante	Magellanic Woodpecker	
512	*Dryocopus lineatus*	Carpintero Garganta Estriada	Lineated Woodpecker	
513	*Dryocopus schulzi*	Carpintero Negro	Black-bodied Woodpecker	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
514	*Celeus galeatus*	Carpintero Cara Canela	Helmeted Woodpecker	
515	*Celeus lugubris*	Carpintero Copete Pajizo	Pale-crested Woodpecker	
516	*Celeus flavescens*	Carpintero Copete Amarillo	Blond-crested Woodpecker	
517	*Piculus chrysochloros*	Carpintero Ojo Blanco	Golden-green Woodpecker	
518	*Piculus aurulentus*	Carpintero Dorado Verdoso	White-browed Woodpecker	
519	*Colaptes rubiginosus*	Carpintero Dorado Gris	Golden-olive Woodpecker	
520	*Colaptes melanochloros*	Carpintero Real	Green-barred Woodpecker	
521	*Colaptes pitius*	Carpintero Pitío	Chilean Flicker	
522	*Colaptes rupicola*	Carpintero Andino	Andean Flicker	
523	*Colaptes campestris*	Carpintero Campestre	Campo Flicker	
CARIAMIFORMES **Cariamidae**				
524	*Cariama cristata*	Chuña Patas Rojas	Red-legged Seriema	
525	*Chunga burmeisteri*	Chuña Patas Negras	Black-legged Seriema	
FALCONIFORMES **Falconidae**				
526	*Herpetotheres cachinnans*	Guaicurú	Laughing Falcon	
527	*Micrastur ruficollis*	Halcón Montés Chico	Barred Forest-Falcon	
528	*Micrastur semitorquatus*	Halcón Montés Grande	Collared Forest-Falcon	
529	*Spiziapteryx circumcincta*	Halconcito Gris	Spot-winged Falconet	
530	*Caracara plancus*	Carancho	Crested Caracara	
531	*Phalcoboenus megalopterus*	Matamico Andino	Mountain Caracara	
532	*Phalcoboenus albogularis*	Matamico Blanco	White-throated Caracara	
533	*Phalcoboenus australis*	Matamico Grande	Striated Caracara	
534	*Milvago chimachima*	Chimachima	Yellow-headed Caracara	
535	*Milvago chimango*	Chimango	Chimango Caracara	
536	*Falco sparverius*	Halconcito Colorado	American Kestrel	
537	*Falco rufigularis*	Halcón Negro Chico	Bat Falcon	
538	*Falco deiroleucus*	Halcón Negro Grande	Orange-breasted Falcon	
539	*Falco femoralis*	Halcón Plomizo	Aplomado Falcon	
540	*Falco peregrinus*	Halcón Peregrino	Peregrine Falcon	Mn-Mp
PSITTACIFORMES **Psittacidae**				
541	*Psilopsiagon aymara*	Catita Serrana Grande	Gray-hooded Parakeet	
542	*Psilopsiagon aurifrons*	Catita Serrana Chica	Mountain Parakeet	
543	*Bolborhynchus orbygnesius*	Catita Andina	Andean Parakeet	N R
544	*Myiopsitta monachus*	Cotorra	Monk Parakeet	
545	*Brotogeris chiriri*	Catita Chiriri	Yellow-chevroned Parakeet	
546	*Pionopsitta pileata*	Catita Cabeza Roja	Pileated Parrot	
547	*Pionus maximiliani*	Loro Maitaca	Scaly-headed Parrot	
548	*Amazona vinacea*	Loro Vinoso	Vinaceous-breasted Parrot	
549	*Amazona tucumana*	Loro Alisero	Tucuman Parrot	
550	*Amazona pretrei*	Charao	Red-spectacled Parrot	R
551	*Amazona aestiva*	Loro Hablador	Turquoise-fronted Parrot	
552	*Amazona mercenarius*	Loro Nuca Escamada	Scaly-naped Parrot	V
553	*Forpus xanthopterygius*	Catita Enana	Cobalt-rumped Parrotlet	
554	*Pyrrhura frontalis*	Chiripepé Cabeza Verde	Maroon-bellied Parakeet	
555	*Pyrrhura molinae*	Chiripepé Cabeza Parda	Green-cheeked Parakeet	
556	*Enicognathus ferrugineus*	Cachaña	Austral Parakeet	
557	*Enicognathus leptorhynchus*	Choroy	Slender-billed Parakeet	N V
558	*Cyanoliseus patagonus*	Loro Barranquero	Burrowing Parakeet	
559	*Anodorhynchus glaucus*	Guacamayo Azul	Glaucous Macaw	R
560	*Eupsittula aurea*	Calacante Frente Dorada	Peach-fronted Parakeet	
561	*Aratinga nenday*	Ñanday	Nanday Parakeet	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
562	*Primolius maracana*	Maracaná Lomo Rojo	Blue-winged Macaw	R
563	*Primolius auricollis*	Maracaná Cuello Dorado	Yellow-collared Macaw	
564	*Ara militaris*	Guacamayo Verde	Military Macaw	
565	*Ara chloropterus*	Guacamayo Rojo	Red-and-green Macaw	R
566	*Thectocercus acuticaudatus*	Calancate Cabeza Azul	Blue-crowned Parakeet	
567	*Psittacara mitratus*	Calancate Cara Roja	Mitred Parakeet	
568	*Psittacara leucophthalmus*	Calancate Ala Roja	White-eyed Parakeet	Mp
PASSERIFORMES **Thamnophilidae**				
569	*Hypoedaleus guttatus*	Batará Goteado	Spot-backed Antshrike	
570	*Batara cinerea*	Batará Gigante	Giant Antshrike	
571	*Mackenziaena leachii*	Batará Pintado	Large-tailed Antshrike	
572	*Mackenziaena severa*	Batará Copetón	Tufted Antshrike	
573	*Taraba major*	Chororó	Great Antshrike	
574	*Biatas nigropectus*	Batará Pecho Negro	White-bearded Antshrike	
575	*Thamnophilus doliatus*	Choca Listada	Barred Antshrike	
576	*Thamnophilus ruficapillus*	Choca Corona Rojiza	Rufous-capped Antshrike	
577	*Thamnophilus caerulescens*	Choca Corona Negruzca	Variable Antshrike	
578	*Dysithamnus mentalis*	Choca Amarilla	Plain Antvireo	
579	*Herpsilochmus atricapillus*	Tiluchi Plomizo	Black-capped Antwren	
580	*Herpsilochmus rufimarginatus*	Tiluchi Ala Rojiza	Rusty-winged Antwren	
581	*Myrmorchilus strigilatus*	Batará Estriado	Stripe-backed Antbird	
582	*Drymophila rubricollis*	Tiluchi Colorado	Bertoni's Antbird	
583	*Drymophila malura*	Tiluchi Estriado	Dusky-tailed Antbird	
584	*Terenura maculata*	Tiluchi Enano	Streak-capped Antwren	
585	*Pyriglena leucoptera*	Batará Negro	White-shouldered Fire-eye	
Melanopareiidae				
586	*Melanopareia maximiliani*	Gallito de Collar	Olive-crowned Crescentchest	
Conopophagidae				
587	*Conopophaga lineata*	Chupadientes	Rufous Gnateater	
Grallariidae				
588	*Grallaria varia*	Chululú Pintado	Variegated Antpitta	
589	*Grallaria albigula*	Chululú Cabeza Rojiza	White-throated Antpitta	
590	*Cryptopezus nattereri*	Chululú Chico	Speckle-breasted Antpitta	
Rhinocryptidae				
591	*Psilorhamphus guttatus*	Gallito Overo	Spotted Bamboowren	
592	*Rhinocrypta lanceolata*	Gallito Copetón	Crested Gallito	
593	*Teledromas fuscus*	Gallito Arena	Sandy Gallito	E
594	*Pteroptochos castaneus*	Huet-huet Castaño	Chestnut-throated Huet-huet	
595	*Pteroptochos tarnii*	Huet-huet	Black-throated Huet-huet	
596	*Scelorchilus rubecula*	Chucao	Chucao Tapaculo	
597	*Eugralla paradoxa*	Churrín Grande	Ochre-flanked Tapaculo	
598	*Scytalopus pachecoi*	Churrín Plomizo	Planalto Tapaculo	
599	*Scytalopus magellanicus*	Churrín Andino	Magellanic Tapaculo	
600	*Scytalopus superciliaris*	Churrín Ceja Blanca	White-browed Tapaculo	E
601	*Scytalopus zimmeri*	Churrín de Zimmer	Zimmer's Tapaculo	N
Formicariidae				
602	*Chamaeza campanisona*	Tovaca Parda	Short-tailed Antthrush	
603	*Chamaeza ruficauda*	Tovaca Colorada	Rufous-tailed Antthrush	
Furnariidae				
604	*Sclerurus scansor*	Raspahojas	Rufous-breasted Leaftosser	
605	*Geositta tenuirostris*	Caminera Picuda	Slender-billed Miner	
606	*Geositta cunicularia*	Caminera Estriada	Common Miner	Mp
607	*Geositta punensis*	Caminera Puneña	Puna Miner	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
608	*Geositta rufipennis*	Caminera Colorada	Rufous-banded Miner	
609	*Geositta antarctica*	Caminera Patagónica	Short-billed Miner	Mp
610	*Geositta isabellina*	Caminera Grande	Creamy-rumped Miner	
611	*Sittasomus griseicapillus*	Tarefero	Olivaceous Woodcreeper	
612	*Dendrocincla turdina*	Arapasú	Plain-winged Woodcreeper	
613	*Dendrocolaptes picumnus*	Trepador Colorado	Black-banded Woodcreeper	
614	*Dendrocolaptes platyrostris*	Trepador Oscuro	Planalto Woodcreeper	
615	*Xiphocolaptes albicollis*	Trepador Garganta Blanca	White-throated Woodcreeper	
616	*Xiphocolaptes major*	Trepador Gigante	Great Rufous Woodcreeper	
617	*Xiphorhynchus fuscus*	Chinchero Enano	Lesser Woodcreeper	
618	*Campylorhamphus trochilirostris*	Picapalo Colorado	Red-billed Scythebill	
619	*Campylorhamphus falcularius*	Picapalo Oscuro	Black-billed Scythebill	
620	*Drymornis bridgesii*	Chinchero Grande	Scimitar-billed Woodcreeper	
621	*Lepidocolaptes angustirostris*	Chinchero Chico	Narrow-billed Woodcreeper	
622	*Lepidocolaptes falcinellus*	Chinchero Escamado	Scalloped Woodcreeper	
623	*Xenops minutus*	Picolezna Chico	Plain Xenops	
624	*Xenops rutilans*	Picolezna Rojizo	Streaked Xenops	
625	*Pygarrhichas albogularis*	Picolezna Patagónico	White-throated Treerunner	
626	*Ochetorhynchus andaecola*	Bandurrita Cola Castaña	Rock Earthcreeper	
627	*Ochetorhynchus ruficaudus*	Bandurrita Pico Recto	Straight-billed Earthcreeper	
628	*Ochetorhynchus phoenicurus*	Bandurrita Patagónica	Band-tailed Earthcreeper	
629	*Tarphonomus harterti*	Bandurrita Boliviana	Bolivian Earthcreeper	N R
630	*Tarphonomus certhioides*	Bandurrita Chaqueña	Chaco Earthcreeper	
631	*Furnarius rufus*	Hornero	Rufous Hornero	
632	*Furnarius cristatus*	Hornerito Copetón	Crested Hornero	
633	*Lochmias nematura*	Macuquito	Sharp-tailed Streamcreeper	
634	*Phleocryptes melanops*	Junquero	Wren-like Rushbird	
635	*Limnornis curvirostris*	Pajonalera Pico Curvo	Curve-billed Reedhaunter	
636	*Upucerthia saturatior*	Bandurrita de Bosque	Patagonian Forest Earthcreeper	N (CT)
637	*Upucerthia dumetaria*	Bandurrita Esteparia	Scale-throated Earthcreeper	Mp
638	*Upucerthia validirostris*	Bandurrita Andina	Buff-breasted Earthcreeper	
639	*Cinclodes fuscus*	Remolinera Parda	Buff-winged Cinclodes	Mp
640	*Cinclodes antarcticus*	Remolinera Malvinera	Blackish Cinclodes	
641	*Cinclodes comechingonus*	Remolinera Serrana	Cordoba Cinclodes	E Mp
642	*Cinclodes albiventris*	Remolinera Acanelada	Cream-winged Cinclodes	N (CT)
643	*Cinclodes oustaleti*	Remolinera Chica	Gray-flanked Cinclodes	Mp
644	*Cinclodes atacamensis*	Remolinera Castaña	White-winged Cinclodes	
645	*Cinclodes patagonicus*	Remolinera Araucana	Dark-bellied Cinclodes	
646	*Heliobletus contaminatus*	Picolezna Estriado	Sharp-billed Treehunter	
647	*Philydor atricapillus*	Ticotico Cabeza Negra	Black-capped Foliage-gleaner	
648	*Anabacerthia amaurotis*	Ticotico Ceja Blanca	White-browed Foliage-gleaner	R
649	*Anabacerthia lichtensteini*	Ticotico Ocráceo	Ochre-breasted Foliage-gleaner	
650	*Syndactyla rufosuperciliata*	Ticotico Estriado	Buff-browed Foliage-gleaner	
651	*Dendroma rufa*	Ticotico Grande	Buff-fronted Foliage-gleaner	
652	*Clibanornis dendrocolaptoides*	Tacuarero	Canebrake Groundcreeper	
653	*Automolus leucophthalmus*	Ticotico Ojo Blanco	White-eyed Foliage-gleaner	
654	*Aphrastura spinicauda*	Rayadito	Thorn-tailed Rayadito	
655	*Sylviorthorhynchus desmursii*	Colilarga	Des Murs's Wiretail	
656	*Sylviorthorhynchus yanacensis*	Coludito Ocráceo	Tawny Tit-Spinetail	
657	*Leptasthenura fuliginiceps*	Coludito Canela	Brown-capped Tit-Spinetail	
658	*Leptasthenura platensis*	Coludito Copetón	Tufted Tit-Spinetail	
659	*Leptasthenura aegithaloides*	Coludito Cola Negra	Plain-mantled Tit-Spinetail	Mp
660	*Leptasthenura setaria*	Coludito de los Pinos	Araucaria Tit-Spinetail	
661	*Phacellodomus rufifrons*	Espinero Frente Rojiza	Rufous-fronted Thornbird	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
662	*Phacellodomus striaticeps*	Espinero Andino	Streak-fronted Thornbird	
663	*Phacellodomus sibilatrix*	Espinero Chico	Little Thornbird	
664	*Phacellodomus maculipectus*	Espinero Serrano	Spot-breasted Thornbird	
665	*Phacellodomus striaticollis*	Espinero Pecho Manchado	Freckle-breasted Thornbird	
666	*Phacellodomus ruber*	Espinero Grande	Greater Thornbird	
667	*Anumbius annumbi*	Leñatero	Firewood-gatherer	
668	*Coryphistera alaudina*	Crestudo	Lark-like Brushrunner	
669	*Asthenes dorbignyi*	Canastero Rojizo	Creamy-breasted Canastero	
670	*Asthenes baeri*	Canastero Chaqueño	Short-billed Canastero	
671	*Asthenes hudsoni*	Espartillero Pampeano	Hudson's Canastero	
672	*Asthenes anthoides*	Espartillero Austral	Austral Canastero	
673	*Asthenes maculicauda*	Espartillero Estriado	Scribble-tailed Canastero	
674	*Asthenes sclateri*	Espartillero Serrano	Puna Canastero	
675	*Asthenes modesta*	Canastero Pálido	Cordilleran Canastero	
676	*Asthenes pyrrholeuca*	Canastero Coludo	Sharp-billed Canastero	Mp
677	*Asthenes heterura*	Canastero Quebradeño	Maquis Canastero	
678	*Limnoctites rectirostris*	Pajonalera Pico Recto	Straight-billed Reedhaunter	
679	*Limnoctites sulphuriferus*	Curutié Ocráceo	Sulphur-bearded Reedhaunter	
680	*Cranioleuca pyrrhophia*	Curutié Blanco	Stripe-crowned Spinetail	
681	*Cranioleuca obsoleta*	Curutié Oliváceo	Olive Spinetail	
682	*Pseudasthenes humicola*	Canastero Estriado	Dusky-tailed Canastero	R
683	*Pseudasthenes patagonica*	Canastero Patagónico	Patagonian Canastero	E
684	*Pseudasthenes steinbachi*	Canastero Castaño	Steinbach's Canastero	E
685	*Spartonoica maluroides*	Espartillero Enano	Bay-capped Wren-Spinetail	Mp
686	*Pseudoseisura lophotes*	Cacholote Castaño	Brown Cacholote	
687	*Pseudoseisura gutturalis*	Cacholote Pardo	White-throated Cacholote	E
688	*Certhiaxis cinnamomeus*	Curutié Colorado	Yellow-chinned Spinetail	
689	*Schoeniophylax phryganophilus*	Chotoy	Chotoy Spinetail	
690	*Synallaxis scutata*	Pijuí Canela	Ochre-cheeked Spinetail	
691	*Synallaxis cinerascens*	Pijuí Negruzco	Gray-bellied Spinetail	
692	*Synallaxis ruficapilla*	Pijuí Corona Rojiza	Rufous-capped Spinetail	
693	*Synallaxis spixi*	Pijuí Plomizo	Spix's Spinetail	
694	*Synallaxis albescens*	Pijuí Cola Parda	Pale-breasted Spinetail	Mp
695	*Synallaxis frontalis*	Pijuí Frente Gris	Sooty-fronted Spinetail	
696	*Synallaxis azarae*	Pijuí Ceja Canela	Azara's Spinetail	
Pipridae				
697	*Chiroxiphia boliviana*	Bailarín Yungueño	Yungas Manakin	N
698	*Chiroxiphia caudata*	Bailarín Azul	Swallow-tailed Manakin	
699	*Manacus manacus*	Bailarín Blanco	White-bearded Manakin	
700	*Pipra fasciicauda*	Bailarín Naranja	Band-tailed Manakin	
Cotingidae				
701	*Phytotoma rutila*	Cortarramas	White-tipped Plantcutter	Mp
702	*Phytotoma rara*	Rara	Rufous-tailed Plantcutter	Mp
703	*Phibalura flavirostris*	Tesorito	Swallow-tailed Cotinga	R Vi
704	*Pyroderus scutatus*	Yacutoro	Red-ruffed Fruitcrow	
705	*Procnias nudicollis*	Pájaro Campana	Bare-throated Bellbird	R Vi
Tityridae				
706	*Tityra inquisitor*	Tueré Chico	Black-crowned Tityra	Ma
707	*Tityra cayana*	Tueré Grande	Black-tailed Tityra	Ma
708	*Tityra semifasciata*	Tueré Enmascarado	Masked Tityra	N
709	*Schiffornis virescens*	Flautín	Greenish Schiffornis	
710	*Xenopsaris albinucha*	Tijerilla	White-naped Xenopsaris	Ma
711	*Pachyramphus viridis*	Anambé Verdoso	Green-backed Becard	
712	*Pachyramphus castaneus*	Anambé Castaño	Chestnut-crowned Becard	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
713	*Pachyramphus polychopterus*	Anambé Negro	White-winged Becard	Ma
714	*Pachyramphus validus*	Anambé Grande	Crested Becard	Ma
Oxyruncidae				
715	*Oxyruncus cristatus*	Picoagudo	Sharpbill	N R
Tyrannidae				
716	*Piprites chloris*	Bailarín Verde	Wing-barred Piprites	
717	*Piprites pileata*	Bailarín Castaño	Black-capped Piprites	R
718	*Platyrinchus mystaceus*	Picochato Enano	White-throated Spadebill	
719	*Corythopis delalandi*	Mosquitero	Southern Antpipit	
720	*Phylloscartes eximius*	Mosqueta Media Luna	Southern Bristle-Tyrant	
721	*Phylloscartes ventralis*	Mosqueta Carasucia	Mottle-cheeked Tyrannulet	
722	*Phylloscartes paulista*	Mosqueta Oreja Negra	São Paulo Tyrannulet	N R
723	*Phylloscartes sylviolus*	Mosqueta Cara Canela	Bay-ringed Tyrannulet	
724	*Mionectes rufiventris*	Ladrillito	Gray-hooded Flycatcher	
725	*Leptopogon amaurocephalus*	Mosqueta Corona Parda	Sepia-capped Flycatcher	
726	*Tolmomyias sulphurescens*	Picochato Grande	Yellow-olive Flycatcher	
727	*Myiornis auricularis*	Mosqueta Enana	Eared Pygmy-Tyrant	
728	*Hemitriccus diops*	Mosqueta de Anteojos	Drab-breasted Pygmy-Tyrant	
729	*Hemitriccus obsoletus*	Mosqueta Pecho Pardo	Brown-breasted Pygmy-Tyrant	R
730	*Hemitriccus margaritaceiventer*	Mosqueta Ojo Dorado	Pearly-vented Tody-Tyrant	
731	*Poecilotriccus plumbeiceps*	Mosqueta Cabeza Canela	Ochre-faced Tody-Flycatcher	
732	*Todirostrum cinereum*	Mosqueta Pico Pala	Common Tody-Flycatcher	N
733	*Hirundinea ferruginea*	Birro Colorado	Cliff Flycatcher	
734	*Pyrrhomyias cinnamomeus*	Birro Chico	Cinnamon Flycatcher	Ma
735	*Stigmatura budytoides*	Calandrita	Greater Wagtail-Tyrant	
736	*Inezia inornata*	Piojito Picudo	Plain Tyrannulet	Ma
737	*Euscarthmus meloryphus*	Barullero	Fulvous-crowned Scrub-Tyrant	Mp
738	*Camptostoma obsoletum*	Piojito Silbón	Southern Beardless-Tyrannulet	
739	*Elaenia flavogaster*	Fiofío Copetón	Yellow-bellied Elaenia	
740	*Elaenia spectabilis*	Fiofío Grande	Large Elaenia	Ma
741	*Elaenia albiceps*	Fiofío Silbón	White-crested Elaenia	Ma
742	*Elaenia parvirostris*	Fiofío Pico Corto	Small-billed Elaenia	Ma
743	*Elaenia mesoleuca*	Fiofío Oliváceo	Olivaceous Elaenia	Ma
744	*Elaenia strepera*	Fiofío Plomizo	Slaty Elaenia	Ma
745	*Elaenia chiriquensis*	Fiofío Belicoso	Lesser Elaenia	R Ma
746	*Elaenia obscura*	Fiofío Oscuro	Highland Elaenia	
747	*Elaenia sordida*	Fiofío Paranaense	Small-headed Elaenia	N (CT)
748	*Myiopagis caniceps*	Fiofío Ceniciento	Gray Elaenia	
749	*Myiopagis viridicata*	Fiofío Corona Dorada	Greenish Elaenia	Ma
750	*Suiriri suiriri*	Suiriri Gris	Suiriri Flycatcher	
751	*Capsiempis flaveola*	Mosqueta Ceja Amarilla	Yellow Tyrannulet	
752	*Phyllomyias burmeisteri*	Mosqueta Pico Curvo	Rough-legged Tyrannulet	
753	*Phyllomyias virescens*	Mosqueta Corona Oliva	Greenish Tyrannulet	
754	*Phyllomyias sclateri*	Mosqueta Corona Gris	Sclater's Tyrannulet	
755	*Phyllomyias fasciatus*	Mosqueta Olivácea	Planalto Tyrannulet	Ma
756	*Phaeomyias murina*	Piojito Pardo	Mouse-colored Tyrannulet	Ma
757	*Mecocerculus hellmayri*	Piojito de los Pinos	Buff-banded Tyrannulet	Ma
758	*Mecocerculus leucophrys*	Piojito Gargantilla	White-throated Tyrannulet	
759	*Anairetes flavirostris*	Cachudito Pico Amarillo	Yellow-billed Tit-Tyrant	Mp
760	*Anairetes parulus*	Cachudito Pico Negro	Tufted Tit-Tyrant	Mp
761	*Polystictus pectoralis*	Tachurí Canela	Bearded Tachuri	Mp
762	*Culicivora caudacuta*	Tachurí Coludo	Sharp-tailed Tyrant	
763	*Pseudocolopteryx sclateri*	Doradito Copetón	Crested Doradito	Mp
764	*Pseudocolopteryx acutipennis*	Doradito Oliváceo	Subtropical Doradito	Mp

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
765	*Pseudocolopteryx dinelliana*	Doradito Pardo	Dinelli's Doradito	Ec Mp
766	*Pseudocolopteryx flaviventris*	Doradito Pampeano	Warbling Doradito	Mp
767	*Pseudocolopteryx citreola*	Doradito Limón	Ticking Doradito	N (CT) Mp
768	*Serpophaga nigricans*	Piojito Gris	Sooty Tyrannulet	
769	*Serpophaga subcristata*	Piojito Tiquitiqui	White-crested Tyrannulet	
770	*Serpophaga griseicapilla*	Piojito Trinador	Straneck's Tyrannulet	Ec Mp
771	*Attila phoenicurus*	Burlisto Cabeza Gris	Rufous-tailed Attila	R Ma
772	*Legatus leucophaius*	Tuquito Chico	Piratic Flycatcher	Ma
773	*Ramphotrigon megacephalum*	Picochato Cabezón	Large-headed Flatbill	
774	*Pitangus sulphuratus*	Benteveo	Great Kiskadee	
775	*Pitangus lictor*	Benteveo Pico Fino	Lesser Kiskadee	V
776	*Machetornis rixosa*	Picabuey	Cattle Tyrant	
777	*Megarynchus pitangua*	Pitanguá	Boat-billed Flycatcher	Ma
778	*Myiodynastes chrysocephalus*	Benteveo de Barbijo	Golden-crowned Flycatcher	N Ma
779	*Myiodynastes maculatus*	Benteveo Rayado	Streaked Flycatcher	Ma
780	*Myiozetetes cayanensis*	Benteveo Ala Rojiza	Rusty-margined Flycatcher	N V
781	*Myiozetetes similis*	Benteveo Mediano	Social Flycatcher	
782	*Conopias trivirgatus*	Benteveo Chico	Three-striped Flycatcher	
783	*Empidonomus varius*	Tuquito Rayado	Variegated Flycatcher	Ma
784	*Empidonomus aurantioatrocristatus*	Tuquito Gris	Crowned Slaty Flycatcher	Ma
785	*Tyrannus melancholicus*	Suiriri Real	Tropical Kingbird	Ma
786	*Tyrannus savana*	Tijereta	Fork-tailed Flycatcher	Ma
787	*Tyrannus tyrannus*	Suiriri Boreal	Eastern Kingbird	Mn
788	*Casiornis rufus*	Burlisto Castaño	Rufous Casiornis	
789	*Sirystes sibilator*	Suiriri Silbón	Sibilant Sirystes	
790	*Myiarchus tuberculifer*	Burlisto Corona Negra	Dusky-capped Flycatcher	Ma
791	*Myiarchus swainsoni*	Burlisto Pico Canela	Swainson's Flycatcher	Ma
792	*Myiarchus ferox*	Burlisto Pico Negro	Short-crested Flycatcher	Ma
793	*Myiarchus tyrannulus*	Burlisto Cola Castaña	Brown-crested Flycatcher	
794	*Colonia colonus*	Yetapá Negro	Long-tailed Tyrant	
795	*Myiophobus fasciatus*	Mosqueta Estriada	Bran-colored Flycatcher	Ma-Mp
796	*Colorhamphus parvirostris*	Peutrén	Patagonian Tyrant	Mp
797	*Ochthoeca oenanthoides*	Pitajo Canela	d'Orbigny's Chat-Tyrant	
798	*Ochthoeca leucophrys*	Pitajo Gris	White-browed Chat-Tyrant	
799	*Sublegatus modestus*	Suiriri Pico Corto	Southern Scrub-Flycatcher	Ma
800	*Pyrocephalus rubinus*	Churrinche	Vermilion Flycatcher	Mp
801	*Fluvicola albiventer*	Viudita Lomo Negro	Black-backed Water-Tyrant	Mp
802	*Fluvicola nengeta*	Viudita Enmascarada	Masked Water-Tyrant	N
803	*Arundinicola leucocephala*	Lavandera	White-headed Marsh Tyrant	
804	*Gubernetes yetapa*	Yetapá Grande	Streamer-tailed Tyrant	
805	*Heteroxolmis dominicana*	Monjita Dominica	Black-and-white Monjita	
806	*Alectrurus tricolor*	Yetapá Chico	Cock-tailed Tyrant	R
807	*Alectrurus risora*	Yetapá de Collar	Strange-tailed Tyrant	
808	*Lessonia rufa*	Sobrepuesto Austral	Austral Negrito	Mp
809	*Lessonia oreas*	Sobrepuesto Andino	Andean Negrito	
810	*Hymenops perspicillatus*	Pico de Plata	Spectacled Tyrant	Mp
811	*Knipolegus cabanisi*	Viudita Plomiza	Plumbeous Black-Tyrant	
812	*Knipolegus cyanirostris*	Viudita Pico Celeste	Blue-billed Black-Tyrant	Mp
813	*Knipolegus striaticeps*	Viudita Chaqueña	Cinereous Tyrant	Mp
814	*Knipolegus aterrimus*	Viudita Trinadora	White-winged Black-Tyrant	Mp
815	*Knipolegus hudsoni*	Viudita Chica	Hudson's Black-Tyrant	Ec Ma
816	*Satrapa icterophrys*	Suiriri Amarillo	Yellow-browed Tyrant	Mp
817	*Muscisaxicola maculirostris*	Dormilona Chica	Spot-billed Ground-Tyrant	Mp
818	*Muscisaxicola juninensis*	Dormilona Puneña	Puna Ground-Tyrant	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
819	*Muscisaxicola cinereus*	Dormilona Cenicienta	Cinereous Ground-Tyrant	Mp
820	*Muscisaxicola flavinucha*	Dormilona Fraile	Ochre-naped Ground-Tyrant	Ma
821	*Muscisaxicola rufivertex*	Dormilona Gris	Rufous-naped Ground-Tyrant	Mp
822	*Muscisaxicola maclovianus*	Dormilona Cara Negra	Dark-faced Ground-Tyrant	Mp
823	*Muscisaxicola albilora*	Dormilona Ceja Blanca	White-browed Ground-Tyrant	Mp
824	*Muscisaxicola capistratus*	Dormilona Canela	Cinnamon-bellied Ground-Tyrant	Mp
825	*Muscisaxicola frontalis*	Dormilona Frente Negra	Black-fronted Ground-Tyrant	Ma
826	*Cnemarchus rufipennis*	Birro Gris	Rufous-webbed Bush-Tyrant	
827	*Pyrope pyrope*	Diucón	Fire-eyed Diucon	
828	*Xolmis velatus*	Monjita Rabadilla Blanca	White-rumped Monjita	N R
829	*Xolmis irupero*	Monjita Blanca	White Monjita	
830	*Nengetus cinereus*	Monjita Gris	Gray Monjita	Mp
831	*Neoxolmis coronatus*	Monjita Coronada	Black-crowned Monjita	Ec Mp
832	*Neoxolmis salinarum*	Monjita Salinera	Salinas Monjita	E
833	*Neoxolmis rubetra*	Monjita Castaña	Rusty-backed Monjita	Ec Mp
834	*Neoxolmis rufiventris*	Monjita Chocolate	Chocolate-vented Tyrant	Mp
835	*Agriornis montanus*	Gaucho Serrano	Black-billed Shrike-Tyrant	
836	*Agriornis albicauda*	Gaucho Andino	White-tailed Shrike-Tyrant	R
837	*Agriornis lividus*	Gaucho Grande	Great Shrike-Tyrant	
838	*Agriornis micropterus*	Gaucho Pardo	Gray-bellied Shrike-Tyrant	Mp
839	*Agriornis murinus*	Gaucho Chico	Lesser Shrike-Tyrant	Ec Mp
840	*Myiotheretes striaticollis*	Birro Grande	Streak-throated Bush-Tyrant	
841	*Cnemotriccus fuscatus*	Mosqueta Ceja Blanca	Fuscous Flycatcher	Mp
842	*Lathrotriccus euleri*	Mosqueta Parda	Euler's Flycatcher	Ma
843	*Sayornis nigricans*	Viudita de Río	Black Phoebe	
844	*Empidonax alnorum*	Mosqueta Boreal	Alder Flycatcher	Mn
845	*Contopus cooperi*	Burlisto Oliváceo	Olive-sided Flycatcher	N V Mn
846	*Contopus fumigatus*	Burlisto Copetón	Smoke-colored Pewee	
847	*Contopus virens*	Burlisto Boreal	Eastern Wood-Pewee	V Mn
848	*Contopus cinereus*	Burlisto Chico	Tropical Pewee	
849	*Muscipipra vetula*	Viudita Coluda	Shear-tailed Gray Tyrant	Vi
850	*Tachuris rubrigastra*	Tachurí Sietecolores	Many-colored Rush Tyrant	
Vireonidae				
851	*Cyclarhis gujanensis*	Juan Chiviro	Rufous-browed Peppershrike	
852	*Hylophilus poicilotis*	Chiví Coronado	Rufous-crowned Greenlet	
853	*Vireo chivi*	Chiví-chiví	Chivi Vireo	Ma
Corvidae				
854	*Cyanocorax cyanomelas*	Urraca Morada	Purplish Jay	
855	*Cyanocorax caeruleus*	Urraca Azul	Azure Jay	
856	*Cyanocorax chrysops*	Urraca Criolla	Plush-crested Jay	
Hirundinidae				
857	*Pygochelidon cyanoleuca*	Golondrina Barranquera	Blue-and-white Swallow	Mp
858	*Pygochelidon melanoleuca*	Golondrina de Collar	Black-collared Swallow	
859	*Alopochelidon fucata*	Golondrina Cabeza Rojiza	Tawny-headed Swallow	Mp
860	*Orochelidon andecola*	Golondrina Andina	Andean Swallow	
861	*Stelgidopteryx ruficollis*	Golondrina Ribereña	Southern Rough-winged Swallow	Mp
862	*Progne tapera*	Golondrina Parda	Brown-chested Martin	Ma
863	*Progne subis*	Golondrina Purpúrea	Purple Martin	N V Mn
864	*Progne chalybea*	Golondrina Doméstica	Gray-breasted Martin	Ma
865	*Progne elegans*	Golondrina Negra	Southern Martin	Ma
866	*Tachycineta albiventer*	Golondrina Ala Blanca	White-winged Swallow	
867	*Tachycineta leucorrhoa*	Golondrina Ceja Blanca	White-rumped Swallow	Mp
868	*Tachycineta leucopyga*	Golondrina Patagónica	Chilean Swallow	Mp
869	*Riparia riparia*	Golondrina Zapadora	Bank Swallow	Mn

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
870	*Hirundo rustica*	Golondrina Tijerita	Barn Swallow	Ma-Mn
871	*Petrochelidon pyrrhonota*	Golondrina Rabadilla Canela	Cliff Swallow	Mn
Troglodytidae				
872	*Troglodytes aedon*	Ratona	House Wren	
873	*Troglodytes cobbi*	Ratona Malvinera	Cobb's Wren	E
874	*Troglodytes solstitialis*	Ratona Ceja Blanca	Mountain Wren	
875	*Cistothorus platensis*	Ratona Aperdizada	Grass Wren	Mp
876	*Campylorhynchus turdinus*	Ratona Grande	Thrush-like Wren	
Polioptilidae				
877	*Polioptila lactea*	Tacuarita Blanca	Creamy-bellied Gnatcatcher	
878	*Polioptila dumicola*	Tacuarita Azul	Masked Gnatcatcher	
Donacobiidae				
879	*Donacobius atricapilla*	Angú	Black-capped Donacobius	
Cinclidae				
880	*Cinclus schulzii*	Mirlo de Agua	Rufous-throated Dipper	
Turdidae				
881	*Catharus maculatus*	Zorzalito Overo	Speckled Nightingale-Thrush	
882	*Catharus fuscescens*	Zorzalito Colorado	Veery	N V Mn
883	*Catharus ustulatus*	Zorzalito Boreal	Swainson's Thrush	Mn
884	*Turdus falcklandii*	Zorzal Patagónico	Austral Thrush	Mp
885	*Turdus flavipes*	Zorzal Azulado	Yellow-legged Thrush	R Ma
886	*Turdus leucomelas*	Zorzal Sabiá	Pale-breasted Thrush	
887	*Turdus fumigatus*	Zorzal Chocolate	Cocoa Thrush	N R
888	*Turdus rufiventris*	Zorzal Colorado	Rufous-bellied Thrush	
889	*Turdus amaurochalinus*	Zorzal Chalchalero	Creamy-bellied Thrush	
890	*Turdus nigriceps*	Zorzal Cabeza Negra	Andean Slaty Thrush	Ma
891	*Turdus subalaris*	Zorzal Campana	Blacksmith Thrush	Ma
892	*Turdus chiguanco*	Zorzal Chiguanco	Chiguanco Thrush	
893	*Turdus serranus*	Zorzal Negro	Glossy-black Thrush	
894	*Turdus albicollis*	Zorzal Collar Blanco	White-necked Thrush	
Mimidae				
895	*Mimus thenca*	Tenca	Chilean Mockingbird	N
896	*Mimus patagonicus*	Calandria Mora	Patagonian Mockingbird	Mp
897	*Mimus saturninus*	Calandria Grande	Chalk-browed Mockingbird	
898	*Mimus triurus*	Calandria Real	White-banded Mockingbird	Ec Mp
899	*Mimus dorsalis*	Calandria Castaña	Brown-backed Mockingbird	
Sturnidae				
900	*Acridotheres cristatellus*	Estornino Crestado	Crested Myna	I
901	*Sturnus vulgaris*	Estornino Pinto	European Starling	I
Passeridae				
902	*Passer domesticus*	Gorrión	House Sparrow	I
Motacillidae				
903	*Anthus chii*	Cachirla Chica	Yellowish Pipit	
904	*Anthus furcatus*	Cachirla Uña Corta	Short-billed Pipit	
905	*Anthus chacoensis*	Cachirla Trinadora	Pampas Pipit	Ec
906	*Anthus correndera*	Cachirla Goteada	Correndera Pipit	
907	*Anthus nattereri*	Cachirla Dorada	Ochre-breasted Pipit	
908	*Anthus hellmayri*	Cachirla Pálida	Hellmayr's Pipit	
909	*Anthus bogotensis*	Cachirla Andina	Paramo Pipit	
Fringillidae				
910	*Chloris chloris*	Verderón	European Greenfinch	I
911	*Carduelis carduelis*	Cardelino	European Goldfinch	I
912	*Spinus crassirostris*	Cabecitanegra Picudo	Thick-billed Siskin	
913	*Spinus magellanicus*	Cabecitanegra	Hooded Siskin	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
914	*Spinus atratus*	Negrillo	Black Siskin	
915	*Spinus uropygialis*	Cabecitanegra Andino	Yellow-rumped Siskin	
916	*Spinus barbatus*	Cabecitanegra Austral	Black-chinned Siskin	Mp
917	*Chlorophonia cyanocephala*	Tangará Cabeza Celeste	Golden-rumped Euphonia	Vi
918	*Chlorophonia cyanea*	Tangará Bonito	Blue-naped Chlorophonia	
919	*Euphonia chlorotica*	Tangará Garganta Negra	Purple-throated Euphonia	
920	*Euphonia chalybea*	Tangará Picudo	Green-throated Euphonia	
921	*Euphonia violacea*	Tangará Amarillo	Violaceous Euphonia	
922	*Euphonia pectoralis*	Tangará Alcalde	Chestnut-bellied Euphonia	
Passerellidae				
923	*Chlorospingus flavopectus*	Frutero Yungueño	Common Chlorospingus	
924	*Rhynchospiza dabbenei*	Cachilo Yungueño	Yungas Sparrow	N (CT)
925	*Rhynchospiza strigiceps*	Cachilo Chaqueño	Chaco Sparrow	Ec
926	*Ammodramus humeralis*	Cachilo Ceja Amarilla	Grassland Sparrow	
927	*Arremon torquatus*	Cerquero Vientre Blanco	White-browed Brushfinch	
928	*Arremon dorbignii*	Cerquero Musgoso	Moss-backed Sparrow	N (CT)
929	*Arremon flavirostris*	Cerquero de Collar	Saffron-billed Sparrow	
930	*Zonotrichia capensis*	Chingolo	Rufous-collared Sparrow	Mp
931	*Atlapetes fulviceps*	Cerquero Cabeza Castaña	Fulvous-headed Brushfinch	
932	*Atlapetes citrinellus*	Cerquero Amarillo	Yellow-striped Brushfinch	E
Icteridae				
933	*Dolichonyx oryzivorus*	Charlatán	Bobolink	Mn
934	*Leistes superciliaris*	Pecho Colorado	White-browed Meadowlark	Mp
935	*Leistes defilippii*	Loica Pampeana	Pampas Meadowlark	Mp
936	*Leistes loyca*	Loica	Long-tailed Meadowlark	Mp
937	*Psarocolius decumanus*	Yapú	Crested Oropendola	
938	*Cacicus solitarius*	Boyero Negro	Solitary Black Cacique	
939	*Cacicus chrysopterus*	Boyero Ala Amarilla	Golden-winged Cacique	
940	*Cacicus haemorrhous*	Boyero Cacique	Red-rumped Cacique	
941	*Icterus croconotus*	Matico	Orange-backed Troupial	Mp
942	*Icterus pyrrhopterus*	Boyerito	Variable Oriole	
943	*Molothrus rufoaxillaris*	Tordo Pico Corto	Screaming Cowbird	
944	*Molothrus oryzivorus*	Tordo Gigante	Giant Cowbird	
945	*Molothrus bonariensis*	Tordo Renegrido	Shiny Cowbird	
946	*Amblyramphus holosericeus*	Federal	Scarlet-headed Blackbird	
947	*Curaeus curaeus*	Tordo Patagónico	Austral Blackbird	
948	*Gnorimopsar chopi*	Chopí	Chopi Blackbird	
949	*Agelaioides badius*	Tordo Músico	Grayish Baywing	
950	*Agelasticus cyanopus*	Varillero Negro	Unicolored Blackbird	
951	*Agelasticus thilius*	Varillero Ala Amarilla	Yellow-winged Blackbird	
952	*Chrysomus ruficapillus*	Varillero Congo	Chestnut-capped Blackbird	Mp
953	*Xanthopsar flavus*	Tordo Amarillo	Saffron-cowled Blackbird	
954	*Pseudoleistes guirahuro*	Pecho Amarillo Grande	Yellow-rumped Marshbird	
955	*Pseudoleistes virescens*	Pecho Amarillo	Brown-and-yellow Marshbird	
Parulidae				
956	*Geothlypis aequinoctialis*	Arañero Cara Negra	Masked Yellowthroat	Mp
957	*Setophaga ruticilla*	Arañero Americano	American Redstart	N V Mn
958	*Setophaga pitiayumi*	Pitiayumí	Tropical Parula	
959	*Setophaga striata*	Arañero Estriado	Blackpoll Warbler	V Mn
960	*Myiothlypis flaveola*	Arañero Pico Pálido	Flavescent Warbler	
961	*Myiothlypis leucoblephara*	Arañero Silbón	White-browed Warbler	
962	*Myiothlypis signata*	Arañero Ceja Amarilla	Pale-legged Warbler	
963	*Myiothlypis rivularis*	Arañero Ribereño	Riverbank Warbler	
964	*Myiothlypis bivittata*	Arañero Coronado Grande	Two-banded Warbler	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
965	*Basileuterus culicivorus*	Arañero Coronado Chico	Golden-crowned Warbler	
966	*Myioborus brunniceps*	Arañero Corona Rojiza	Brown-capped Redstart	
Cardinalidae				
967	*Piranga flava*	Fueguero	Hepatic Tanager	Mp
968	*Piranga olivacea*	Fueguero Boreal	Scarlet Tanager	N V Mn
969	*Habia rubica*	Fueguero Morado	Red-crowned Ant-Tanager	
970	*Pheucticus aureoventris*	Rey del Bosque	Black-backed Grosbeak	
971	*Amaurospiza moesta*	Reinamora Enana	Blackish-blue Seedeater	
972	*Cyanoloxia glaucocaerulea*	Reinamora Chica	Glaucous-blue Grosbeak	Mp
973	*Cyanoloxia brissonii*	Reinamora Grande	Ultramarine Grosbeak	
Thraupidae				
974	*Nemosia pileata*	Frutero Cabeza Negra	Hooded Tanager	
975	*Catamblyrhynchus diadema*	Diadema	Plushcap	R
976	*Hemithraupis guira*	Saíra Dorada	Guira Tanager	
977	*Conirostrum speciosum*	Saí Celeste	Chestnut-vented Conebill	
978	*Conirostrum binghami*	Saí Grande	Giant Conebill	N R
979	*Sicalis citrina*	Jilguero Cola Blanca	Stripe-tailed Yellow-Finch	R
980	*Sicalis lutea*	Jilguero Puneño	Puna Yellow-Finch	
981	*Sicalis uropygialis*	Jilguero Cara Gris	Bright-rumped Yellow-Finch	
982	*Sicalis luteocephala*	Jilguero Corona Gris	Citron-headed Yellow-Finch	
983	*Sicalis auriventris*	Jilguero Grande	Greater Yellow-Finch	
984	*Sicalis olivascens*	Jilguero Oliváceo	Greenish Yellow-Finch	
985	*Sicalis mendozae*	Jilgero del Monte	Monte Yellow-Finch	N (CT) E
986	*Sicalis lebruni*	Jilguero Austral	Patagonian Yellow-Finch	
987	*Sicalis flaveola*	Jilguero Dorado	Saffron Finch	
988	*Sicalis luteola*	Misto	Grassland Yellow-Finch	
989	*Phrygilus atriceps*	Comesebo Cabeza Negra	Black-hooded Sierra Finch	
990	*Phrygilus gayi*	Comesebo Andino	Gray-hooded Sierra Finch	Mp
991	*Phrygilus patagonicus*	Comesebo Patagónico	Patagonian Sierra Finch	
992	*Geospizopsis unicolor*	Yal Plomizo	Plumbeous Sierra Finch	
993	*Geospizopsis plebejus*	Yal Chico	Ash-breasted Sierra Finch	
994	*Rhopospina fruticeti*	Yal Negro	Mourning Sierra Finch	Mp
995	*Rhopospina alaudina*	Yal Platero	Band-tailed Sierra Finch	
996	*Rhopospina carbonaria*	Yal Carbonero	Carbonated Sierra Finch	E Mp
997	*Idiopsar dorsalis*	Comesebo Puneño	Red-backed Sierra Finch	
998	*Idiopsar brachyurus*	Yal Grande	Boulder Finch	
999	*Melanodera melanodera*	Yal Austral	White-bridled Finch	
1000	*Melanodera xanthogramma*	Yal Andino	Yellow-bridled Finch	
1001	*Catamenia analis*	Piquitodeoro Chico	Band-tailed Seedeater	Mp
1002	*Catamenia inornata*	Piquitodeoro Grande	Plain-colored Seedeater	
1003	*Diglossa sittoides*	Payador Canela	Rusty Flowerpiercer	
1004	*Haplospiza unicolor*	Afrechero Plomizo	Uniform Finch	
1005	*Volatinia jacarina*	Volatinero	Blue-black Grassquit	Ma
1006	*Tachyphonus coronatus*	Frutero Coronado	Ruby-crowned Tanager	
1007	*Tachyphonus rufus*	Frutero Negro	White-lined Tanager	
1008	*Trichothraupis melanops*	Frutero Corona Amarilla	Black-goggled Tanager	
1009	*Coryphospingus cucullatus*	Brasita de Fuego	Red-crested Finch	
1010	*Ramphocelus carbo*	Fueguero Oscuro	Silver-beaked Tanager	N R
1011	*Ramphocelus bresilius*	Fueguero Escarlata	Brazilian Tanager	V
1012	*Charitospiza eucosma*	Afrechero Canela	Coal-crested Finch	V
1013	*Tersina viridis*	Tersina	Swallow Tanager	Ma
1014	*Cyanerpes cyaneus*	Mielero Patas Rojas	Red-legged Honeycreeper	N V
1015	*Dacnis cayana*	Saí Azul	Blue Dacnis	
1016	*Sporophila lineola*	Corbatita Overo	Lined Seedeater	Ma

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
1017	*Sporophila leucoptera*	Corbatita Blanco	White-bellied Seedeater	Ma
1018	*Sporophila pileata*	Capuchino Boina Negra	Pearly-bellied Seedeater	Ma
1019	*Sporophila iberaensis*	Capuchino Iberá	Ibera Seedeater	N Ma
1020	*Sporophila hypoxantha*	Capuchino Canela	Tawny-bellied Seedeater	Ma
1021	*Sporophila ruficollis*	Capuchino Garganta Café	Dark-throated Seedeater	Ma
1022	*Sporophila palustris*	Capuchino Pecho Blanco	Marsh Seedeater	Ma
1023	*Sporophila hypochroma*	Capuchino Castaño	Rufous-rumped Seedeater	Ma
1024	*Sporophila cinnamomea*	Capuchino Corona Gris	Chestnut Seedeater	Ma
1025	*Sporophila melanogaster*	Capuchino Vientre Negro	Black-bellied Seedeater	N V Ma
1026	*Sporophila angolensis*	Curió	Chestnut-bellied Seed-Finch	
1027	*Sporophila nigricollis*	Corbatita Amarillo	Yellow-bellied Seedeater	V
1028	*Sporophila caerulescens*	Corbatita	Double-collared Seedeater	Ma
1029	*Sporophila falcirostris*	Corbatita Picudo	Temminck's Seedeater	
1030	*Sporophila collaris*	Corbatita Dominó	Rusty-collared Seedeater	
1031	*Saltatricula multicolor*	Pepitero Chico	Many-colored Chaco Finch	
1032	*Saltator coerulescens*	Pepitero Gris	Bluish-gray Saltator	
1033	*Saltator similis*	Pepitero Verdoso	Green-winged Saltator	
1034	*Saltator maxillosus*	Pepitero Picudo	Thick-billed Saltator	
1035	*Saltator aurantiirostris*	Pepitero de Collar	Golden-billed Saltator	
1036	*Saltator fuliginosus*	Pepitero Negro	Black-throated Grosbeak	
1037	*Coryphaspiza melanotis*	Cachilo de Antifaz	Black-masked Finch	R
1038	*Embernagra platensis*	Verdón	Great Pampa-Finch	
1039	*Emberizoides herbicola*	Coludo Grande	Wedge-tailed Grass-Finch	
1040	*Emberizoides ypiranganus*	Coludo Chico	Lesser Grass-Finch	
1041	*Poospiza boliviana*	Monterita Boliviana	Bolivian Warbling Finch	
1042	*Poospiza ornata*	Monterita Canela	Cinnamon Warbling Finch	Ec Mp
1043	*Poospiza whitii*	Sietevestidos Serrano	Black-and-chestnut Warbling Finch	
1044	*Poospiza nigrorufa*	Sietevestidos Pampeano	Black-and-rufous Warbling Finch	
1045	*Poospiza baeri*	Monterita Serrana	Tucuman Mountain Finch	
1046	*Poospizopsis hypochondria*	Monterita Pecho Gris	Rufous-sided Warbling Finch	
1047	*Thlypopsis sordida*	Tangará Gris	Orange-headed Tanager	
1048	*Thlypopsis pyrrhocoma*	Pioró	Chestnut-headed Tanager	
1049	*Thlypopsis ruficeps*	Tangará Alisero	Rust-and-yellow Tanager	Ma
1050	*Microspingus erythrophrys*	Monterita Ceja Rojiza	Rusty-browed Warbling Finch	
1051	*Microspingus cabanisi*	Monterita Litoraleña	Gray-throated Warbling Finch	
1052	*Microspingus torquatus*	Monterita de Collar	Ringed Warbling Finch	Mp
1053	*Microspingus melanoleucus*	Monterita Cabeza Negra	Black-capped Warbling Finch	
1054	*Donacospiza albifrons*	Cachilo Canela	Long-tailed Reed Finch	
1055	*Coereba flaveola*	Mielero	Bananaquit	
1056	*Asemospiza obscura*	Espiguero Pardo	Dull-colored Grassquit	Mp
1057	*Asemospiza fuliginosa*	Espiguero Negro	Sooty Grassquit	
1058	*Lophospingus pusillus*	Soldadito Chaqueño	Black-crested Finch	
1059	*Lophospingus griseocristatus*	Soldadito Gris	Gray-crested Finch	R
1060	*Diuca diuca*	Diuca	Diuca Finch	Mp
1061	*Gubernatrix cristata*	Cardenal Amarillo	Yellow Cardinal	
1062	*Paroaria coronata*	Cardenal Copete Rojo	Red-crested Cardinal	
1063	*Paroaria capitata*	Cardenilla	Yellow-billed Cardinal	
1064	*Stephanophorus diadematus*	Frutero Azul	Diademed Tanager	
1065	*Cissopis leverianus*	Frutero Overo	Magpie Tanager	
1066	*Pipraeidea melanonota*	Saíra de Antifaz	Fawn-breasted Tanager	
1067	*Rauenia bonariensis*	Naranjero	Blue-and-yellow Tanager	Mp
1068	*Pseudosaltator rufiventris*	Pepitero Colorado	Rufous-bellied Mountain Tanager	
1069	*Stilpnia preciosa*	Saíra Castaña	Chestnut-backed Tanager	
1070	*Stilpnia cayana*	Saíra Pecho Negro	Burnished-buff Tanager	

NRO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE INGLÉS	CÓDIGO
1071	*Tangara seledon*	Saíra Arcoiris	Green-headed Tanager	
1072	*Tangara cyanocephala*	Saíra Militar	Red-necked Tanager	V
1073	*Thraupis sayaca*	Celestino	Sayaca Tanager	
1074	*Thraupis palmarum*	Chogüí Oliváceo	Palm Tanager	N

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

Con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas

AVES ARGENTINAS

BirdLife INTERNATIONAL

GRUPO F.A.L.C.O.

En los últimos veinte años, el avance tecnológico, la taxonomía moderna y una creciente masa de nuevos aficionados han revolucionado el mundo de la observación de aves y la ciencia en general. Este libro actualiza la lista de la avifauna argentina y, de este modo, se convierte en una continuación de otros trabajos similares publicados a lo largo de más de un siglo de ornitología regional. Luego de cuatro años de intensa búsqueda bibliográfica, compilación de registros y estudio de especímenes, el elenco de las aves argentinas asciende a 1074 especies. Se incorporan 83 especies nuevas descubiertas o confirmadas durante el periodo 2001-2022, y se detalla el estatus de 123 especies raras o extintas a nivel nacional. Con un claro objetivo revisionista, los autores realizan al mismo tiempo un repaso de nuestra ornitología, rindiendo tributo a personalidades como Burmeister, Lillo, Dabbene, Olrog, Zotta, Partridge y tantos otros. Una obra útil para el observador de aves amateur, el ornitólogo profesional y cualquier persona que pretenda conocer un poco más acerca de la historia detrás de las aves argentinas.

ISBN 978-987-4192-21-9