

Feuille d'exercices n°7

Suites et séries de fonctions

(du lundi 18 février 2013 au vendredi 12 avril 2013)

Exercice 1

Etudier la convergence (simple et uniforme) des suites de fonctions suivantes :

1. $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n} \quad (x \in \mathbb{R})$

2. $f_n(x) = \frac{x}{n(1+x^n)} \quad (x \in \mathbb{R}^+)$

3. $f_n(x) = \frac{x\sqrt{n}}{1+nx^2} \quad (x \in \mathbb{R})$

4. $f_n(x) = xe^{-nx} \quad (x \in \mathbb{R}^+)$

5. $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1+n^2x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$

6. $f_n(x) = \frac{x}{x^2+n} \quad (x \in \mathbb{R})$

7. $f_n(x) = xe^{\frac{x}{n}} \quad (x \in \mathbb{R}^+)$

8. $f_n(x) = nx^2e^{-nx} \quad (x \in \mathbb{R}^+)$

9. $f_n(x) = nx^n(1-x) \quad (x \in [0, 1])$

10. $f_n(x) = \left(\frac{1+nx}{n+x^2}\right)^\alpha \quad (x \in \mathbb{R}^+) \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}_+^*$

Exercice 2

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur $[0, 2]$ par

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$$

1. Etudier la convergence simple de (f_n) sur $[0, 2]$.
2. Etudier la convergence uniforme de (f_n) sur $[0, 2]$.

Exercice 3

1. Montrer que (f_n) la suite de fonctions définie sur $[0, 1]$ par

$$f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x}$$

converge uniformément sur $[0, 1]$ vers une fonction f à déterminer.

2. En déduire la limite de la suite (u_n) définie par

$$u_n = \int_0^1 f_n(x) \, dx$$

Exercice 4

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur $[-1, 1]$ par

$$f_n(x) = \sin(nx)e^{-nx^2} + \sqrt{1 - x^2}$$

1. Montrer que (f_n) converge simplement sur $[-1, 1]$ vers une fonction f à déterminer.
2. Montrer que pour tout $a > 0$, (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, 1]$.
3. Montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Exercice 5

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur $[0, 1]$ par

$$f_n(x) = \frac{nx}{nx + 1}$$

1. Montrer que (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction f à déterminer.
2. Montrer que pour tout $a \in]0, 1[$, (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, 1]$.
3. Etudier la convergence uniforme de (f_n) sur $[0, 1]$.

Exercice 6

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définie par :

$$f_n(x) = \frac{1 + x^{2n+1}}{1 + x^{2n}} \quad (x \in \mathbb{R}^+)$$

1. Montrer que (f_n) converge simplement vers une fonction f à déterminer sur \mathbb{R}^+ .
2. Montrer que (f_n) converge uniformément vers f sur \mathbb{R}^+ .

Exercice 7

Pour tout entier naturel non nul n , on définit les fonctions $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ et $g_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f_n(t) = \frac{n}{n+t} \text{ et } g_n(t) = \frac{n}{(n+t)^2}$$

1. Montrer que (f_n) et (g_n) convergent simplement sur \mathbb{R}^+ .
2. Montrer que (f_n) ne converge pas uniformément sur \mathbb{R}^+ et que (g_n) converge uniformément sur \mathbb{R}^+ .
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur \mathbb{R}^+ les fonctions F_n et G_n par

$$F_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt \text{ et } G_n(x) = \int_0^x g_n(t) dt$$

a. Montrer que $F_n(x) = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$.

- b. En déduire que (F_n) converge simplement sur \mathbb{R}^+ .

La convergence est-elle uniforme ? $\int_0^{+\infty} f_n(t) dt$ est-elle convergente ?

- c. Montrer que (G_n) converge simplement sur \mathbb{R}^+ mais que la convergence n'est pas uniforme.

$\int_0^{+\infty} g_n(t) dt$ est-elle convergente ?

4. A-t-on les égalités suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}^+$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = \int_0^x \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt ?$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n(x) = \int_0^x \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(t) dt ?$$

Exercice 8

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définie par

$$f_n(x) = (-1)^n \frac{x^n}{n} \quad (x \in [0, 1])$$

1. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.
2. Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 9

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définie sur \mathbb{R} par

$$f_n(x) = (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}$$

1. Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur toute partie $[a, b]$ de \mathbb{R} ($a < b$).
2. Montrer que $\sum f_n$ n'est jamais absolument convergente.

Exercice 10

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur \mathbb{R} par

$$f_n(x) = ne^{-nx}$$

1. Montrer que pour tout $a > 0$, $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.
2. $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$?

Exercice 11

Soit la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x} \quad (x \in \mathbb{R}^+)$$

1. Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur \mathbb{R}^+ .
2. Montrer que $\sum f_n$ ne converge pas normalement sur \mathbb{R}^+ .

Exercice 12

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur \mathbb{R}^+ par

$$f_n(x) = xe^{-n^2 x^2}$$

1. Etudier la convergence simple de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .
2. Etudier la convergence normale de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .
3. Etudier la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .

Exercice 13

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur \mathbb{R}^+ par

$$f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}$$

1. Etudier la convergence simple de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .
2. Etudier la convergence normale de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .
3. Etudier la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .

Exercice 14

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur \mathbb{R}^+ par

$$f_n(x) = \frac{nx^2}{n^3 + x^2}$$

1. Etudier la convergence simple de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .
2. Etudier la convergence normale de $\sum f_n$ sur $[0, a]$ où $a > 0$.
3. Etudier la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}^+ .

Exercice 15

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur \mathbb{R} par

$$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n} e^{-x\sqrt{n}}$$

1. Etudier la convergence absolue de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}_+^* .
2. Etudier la convergence simple de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}_+ .
3. Etudier la convergence normale de $\sum f_n$ sur tout intervalle $[a, +\infty[$ où $a > 0$.
4. Etudier la convergence normale de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}_+ .
5. Etudier la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur \mathbb{R}_+ .

Exercice 16

On considère la fonction f , 2π -périodique définie par $f(x) = |x|$ sur $[-\pi, \pi]$.

1. Donner la série de Fourier de f .
2. En déduire $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$
3. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$

Exercice 17

On considère la fonction f , 2π -périodique définie par $f(x) = x^2 - \pi^2$ sur $[-\pi, \pi]$.

1. Donner la série de Fourier de f .

2. Déterminer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

3. Déterminer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$

Exercice 18

On considère la fonction f , 2π -périodique définie par $f(x) = x(\pi - x)$ sur $[0, \pi]$ et prolongée par imparité sur $[-\pi, \pi]$.

1. Donner la série de Fourier de f .

2. En déduire $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)^3}$, $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^6}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^6}$

Exercice 19

On considère la fonction f , 2π -périodique définie par $f(x) = \sin(x)$ sur $[0, \pi]$ et $f(x) = 0$ sur $]\pi, 2\pi]$.

1. Montrer que pour $n \geq 2$, $b_n = 0$.

2. Déterminer la série de Fourier de f .

3. En déduire $\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{1-4p^2}$

Exercice 20

On considère la fonction f , 2π -périodique et impaire définie par $f(x) = 1 - \cos(x)$ sur $[0, \pi[$ et $f(x) = 0$ si $x = \pi$.

1. Donner la série de Fourier de f .

2. En déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$