

长江鱼类食物链

长江鱼类食物链完整，结构十分复杂，典型的食物链包含三类：

1、基础食物链

浮游植物和底栖微藻：作为微型藻类，是长江口盐沼湿地和开放水域的主要初级生产者，为浮游动物和小型鱼类提供能量。

水生植物（如芦苇、水草）：在沿岸和湿地中生长，支持草食性鱼类（如草鱼）的生存。

2、中间食物链

草食性鱼类：例如草鱼，直接以水生植物为食，构成简单食物链（如“水草→草鱼”）。

滤食性动物：如鲢鱼、鳙鱼，以浮游生物为食。

底栖无脊椎动物：如螺类、蟹类（如中华绒螯蟹）摄食藻类和有机碎屑。

3、顶级食物链

鳣鱼：长江食物链顶端物种，体长可达 2 米，以其他鱼类为食。其种群数量直接反映长江中下层鱼类的资源丰富度。

中华鲟/白鲟：中华鲟为底栖肉食性，捕食小型底栖动物；白鲟（已功能性灭绝）曾是最大掠食者，以鱼类为主食，最大个体达 7.5 米。

江豚：位于长江食物链顶端，以小型鱼类（如鲻鱼、虾虎鱼）为主食，偶食虾和螺蛳。

已灭绝的长江白鲟：历史上曾是顶级掠食者，以大型鱼类为食。