

## 模型-评价主题-打分式评价-主成分分析【hxy】

1. 模型名称
2. 适用范围
3. 形式
4. 求解方法
  - 4.1 步骤
  - 4.2 实例
  - 4.3 代码实现
5. 参考资料

## 模型-评价主题-打分式评价-主成分分析【hxy】

### 1. 模型名称

主成分分析 (Principal Components Analysis, PCA)

### 2. 适用范围

常用降维方法，用较少的变量去解释原问题中的大部分变量，尤其适用于将许多相关性很高的变量转化为彼此相互独立或不相关的变量

### 3. 形式

多个评价指标，多种方案

### 4. 求解方法

#### 4.1 步骤

1. 构造原始数据矩阵  $A$

$$A = (a_{ij})_{n \times m} \quad n = \text{number of samples}, m = \text{number of indexes}$$

2. 进行标准化处理

$$\mu_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ij} \quad j = 1, 2, \dots, m$$

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a_{ij} - \mu_j)^2} \quad j = 1, 2, \dots, m$$

$\mu_j$  is the mean value,  $s_j$  is the sample standard deviation

$$\tilde{a}_{ij} = \frac{a_{ij} - \mu_j}{s_j} \quad i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$$

$$\tilde{x}_j = \frac{x_j - \mu_j}{s_j} \quad j = 1, 2, \dots, m$$

$\tilde{x}_j$  is standardized indicator variable

3. 计算相关系数矩阵  $R$

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n \tilde{a}_{ki} \cdot \tilde{a}_{kj}}{n-1} \quad i, j = 1, 2, \dots, m$$

where  $r_{ii} = 1, r_{ij} = r_{ji}$

4. 计算特征值和特征向量

*Eigenvalue*  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_m \geq 0$   
*Eigenvector*  $u_1, u_2, \dots, u_m$

5.

5. 由特征向量组成  $m$  个新的指标变量

$$\begin{aligned} y_1 &= u_{11}\tilde{x}_1 + u_{21}\tilde{x}_2 + \dots + u_{m1}\tilde{x}_m \\ y_2 &= u_{12}\tilde{x}_1 + u_{22}\tilde{x}_2 + \dots + u_{m2}\tilde{x}_m \\ &\dots \\ y_m &= u_{1m}\tilde{x}_1 + u_{2m}\tilde{x}_2 + \dots + u_{mm}\tilde{x}_m \end{aligned}$$

$y_1$  is the first principle component, etc.

通过这个可以看出每个主成分  $y$  与原指标  $x$  之间的关系，明白每个主成分主要是跟什么有关，例如下图

	$\tilde{x}_1$	$\tilde{x}_2$	$\tilde{x}_3$	$\tilde{x}_4$	$\tilde{x}_5$	$\tilde{x}_6$	$\tilde{x}_7$	$\tilde{x}_8$	$\tilde{x}_9$	$\tilde{x}_{10}$
1	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.22	0.12	0.31	0.24
2	-0.19	0.03	0.02	0.01	-0.05	-0.06	0.58	0.70	-0.19	-0.28
3	-0.16	-0.10	-0.09	-0.11	-0.15	-0.16	-0.03	0.35	0.12	0.86
4	-0.10	-0.22	-0.16	-0.16	-0.04	-0.00	0.08	0.07	0.89	0.24

– 从主成分的系数可以看出，

- 第一主成分主要反映了前六个指标（学校数、学生数和教师数方面）的信息，
- 第二主成分主要反映了高校规模和教师中高级职称的比例，
- 第三主成分主要反映了生均教育经费，
- 第四主成分主要反映了国家财政预算内普通高教经费占国内生产总值的比重。 分别以四个主成分的贡献率为权重，构建主成分综合评价模型

6. 计算特征值  $\lambda_j (j = 1, 2, \dots, m)$  的信息贡献率  $b_j$

$$b_j = \frac{\lambda_j}{\sum_{k=1}^m \lambda_k} \quad j = 1, 2, \dots, m$$

$b_j$  is called information contribution rate

7. 计算  $y_1, y_2, \dots, y_p$  的累积贡献率  $\alpha_p$

$$\alpha_p = \frac{\sum_{k=1}^p \lambda_k}{\sum_{k=1}^m \lambda_k}$$

8. 选择前  $p$  个主成分使  $\alpha_p \geq 0.85$  (接近1)

9. 用前 $p$ 个主成分计算综合得分 $Z$

$$\begin{aligned} y_1 &= u_{11}\tilde{x}_1 + u_{21}\tilde{x}_2 + u_{m1}\tilde{x}_m \\ y_2 &= u_{12}\tilde{x}_1 + u_{22}\tilde{x}_2 + u_{m2}\tilde{x}_m \\ &\dots \\ y_p &= u_{1p}\tilde{x}_1 + u_{2p}\tilde{x}_2 + u_{mp}\tilde{x}_m \\ Z &= b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_py_p \end{aligned}$$

10. 根据综合得分 $Z$ 排序

4.2 实例

年份	投资效果系数（无时滞）	投资效果系数（时滞一年）	全社会固定资产交付使用率	建设项目投产率
1984	0.71	0.49	0.41	0.51
1985	0.4	0.49	0.44	0.57
1986	0.55	0.56	0.48	0.53
1987	0.62	0.93	0.38	0.53
1988	0.45	0.42	0.41	0.54
1989	0.36	0.37	0.46	0.54
1990	0.55	0.68	0.42	0.54
1991	0.62	0.9	0.38	0.56
1992	0.61	0.99	0.33	0.57
1993	0.71	0.93	0.35	0.66
1994	0.59	0.69	0.36	0.57
1995	0.41	0.47	0.4	0.54
1996	0.26	0.29	0.43	0.57
1997	0.14	0.16	0.43	0.55
1998	0.12	0.13	0.45	0.59
1999	0.22	0.25	0.44	0.58
2000	0.71	0.49	0.41	0.51

1. 构造原始数据矩阵 $A$

$$A = \begin{pmatrix} 0.71 & 0.49 & 0.41 & 0.51 & 0.46 \\ 0.4 & 0.49 & 0.44 & 0.57 & 0.5 \\ 0.55 & 0.56 & 0.48 & 0.53 & 0.49 \\ 0.62 & 0.93 & 0.38 & 0.53 & 0.47 \\ 0.45 & 0.42 & 0.41 & 0.54 & 0.47 \\ 0.36 & 0.37 & 0.46 & 0.54 & 0.48 \\ 0.55 & 0.68 & 0.42 & 0.54 & 0.46 \\ 0.62 & 0.9 & 0.38 & 0.56 & 0.46 \\ 0.61 & 0.99 & 0.33 & 0.57 & 0.43 \\ 0.71 & 0.93 & 0.35 & 0.66 & 0.44 \\ 0.59 & 0.69 & 0.36 & 0.57 & 0.48 \\ 0.41 & 0.47 & 0.4 & 0.54 & 0.48 \\ 0.26 & 0.29 & 0.43 & 0.57 & 0.48 \\ 0.14 & 0.16 & 0.43 & 0.55 & 0.47 \\ 0.12 & 0.13 & 0.45 & 0.59 & 0.54 \\ 0.22 & 0.25 & 0.44 & 0.58 & 0.52 \\ 0.71 & 0.49 & 0.41 & 0.51 & 0.46 \end{pmatrix}$$

## 2. 进行标准化处理

### a) 均值 $\mu$

$$\mu_j = \frac{1}{17} \sum_{i=1}^{17} a_{ij} \quad j = 1, 2, \dots, 5$$

$$\mu = (0.4724 \quad 0.5435 \quad 0.4106 \quad 0.5565 \quad 0.4759)$$

### b) 标准差 $S$

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{17-1} \sum_{i=1}^{17} (a_{ij} - \mu_j)^2} \quad j = 1, 2, \dots, 5$$

$$S = (0.1974 \quad 0.2731 \quad 0.0404 \quad 0.0353 \quad 0.0267)$$

### c) 标准化指标 $\tilde{A}$

$$\tilde{a}_{ij} = \frac{a_{ij} - \mu_j}{s_j} \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1.2038 & -0.1960 & -0.0146 & -1.3148 & -0.5947 \\ -0.3665 & -0.1960 & 0.7283 & 0.3828 & 0.9031 \\ 0.3933 & 0.0603 & 1.7188 & -0.7489 & 0.5286 \\ 0.7479 & 1.4151 & -0.7574 & -0.7489 & -0.2203 \\ -0.1132 & -0.4523 & -0.0146 & -0.4660 & -0.2203 \\ -0.5691 & -0.6354 & 1.2235 & -0.4660 & 0.1542 \\ 0.3933 & 0.4997 & 0.2331 & -0.4660 & -0.5947 \\ 0.7479 & 1.3052 & -0.7574 & 0.0999 & -0.5947 \\ 0.6973 & 1.6348 & -1.9955 & 0.3828 & -1.7180 \\ 1.2038 & 1.4151 & -1.5003 & 2.9291 & -1.3436 \\ 0.5960 & 0.5363 & -1.2527 & 0.3828 & 0.1542 \\ -0.3159 & -0.2692 & -0.2622 & -0.4660 & 0.1542 \\ -1.0757 & -0.9283 & 0.4807 & 0.3828 & 0.1542 \\ -1.6836 & -1.4043 & 0.4807 & -0.1831 & -0.2203 \\ -1.7849 & -1.5142 & 0.9759 & 0.9486 & 2.4008 \\ -1.2783 & -1.0748 & 0.7283 & 0.6657 & 1.6519 \\ 1.2038 & -0.1960 & -0.0146 & -1.3148 & -0.5947 \end{pmatrix}$$

### 3. 计算相关系数矩阵R

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^{17} \tilde{a}_{ki} \cdot \tilde{a}_{kj}}{17 - 1} \quad i, j = 1, 2, \dots, 5$$

$$R = \begin{pmatrix} 1.0000 & 0.8097 & -0.5764 & -0.1519 & -0.7141 \\ 0.8097 & 1.0000 & -0.7573 & 0.1619 & -0.7005 \\ -0.5764 & -0.7573 & 1.0000 & -0.3225 & 0.6862 \\ -0.1519 & 0.1619 & -0.3225 & 1.0000 & 0.0499 \\ -0.7141 & -0.7005 & 0.6862 & 0.0499 & 1.0000 \end{pmatrix}$$

### 4. 计算特征值和特征向量

$$\begin{array}{l} \text{Eigenvalue} \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_m \geq 0 \\ \text{Eigenvector} \quad u_1, u_2, \dots, u_m \end{array}$$

$$\lambda = (3.1343 \quad 1.1683 \quad 0.3502 \quad 0.2258 \quad 0.1213)$$

$$U = \begin{pmatrix} 0.4905 & -0.2934 & 0.5109 & 0.1896 & -0.6134 \\ 0.5254 & 0.0490 & 0.4337 & -0.1217 & 0.7202 \\ -0.4871 & -0.2812 & 0.3714 & 0.6888 & 0.2672 \\ 0.0671 & 0.8981 & 0.1477 & 0.3863 & -0.1336 \\ -0.4916 & 0.1606 & 0.6255 & -0.5706 & -0.1254 \end{pmatrix}$$

### 5. 由特征向量组成m个新的指标变量

$$\begin{aligned}
y_1 &= 0.4905\tilde{x}_1 + 0.5254\tilde{x}_2 - 0.4871\tilde{x}_3 + 0.0671\tilde{x}_4 - 0.4916\tilde{x}_5 \\
y_2 &= -0.2934\tilde{x}_1 + 0.0490\tilde{x}_2 - 0.2812\tilde{x}_3 + 0.8981\tilde{x}_4 + 0.1606\tilde{x}_5 \\
y_3 &= 0.5109\tilde{x}_1 + 0.4337\tilde{x}_2 + 0.3714\tilde{x}_3 + 0.1477\tilde{x}_4 + 0.6255\tilde{x}_5 \\
y_4 &= 0.1896\tilde{x}_1 - 0.1217\tilde{x}_2 + 0.6888\tilde{x}_3 + 0.3863\tilde{x}_4 - 0.5706\tilde{x}_5 \\
y_5 &= -0.6134\tilde{x}_1 + 0.7202\tilde{x}_2 + 0.2672\tilde{x}_3 - 0.1336\tilde{x}_4 - 0.1254\tilde{x}_5
\end{aligned}$$

$y_1$  is the first principle component, etc.

6. 计算特征值 $\lambda_j (j = 1, 2, \dots, m)$ 的信息贡献率 $b_j(\%)$

$$b_j = \frac{\lambda_j}{\sum_{k=1}^5 \lambda_k} \quad j = 1, 2, \dots, 5$$

$$B = (62.6866 \quad 23.3670 \quad 7.0036 \quad 4.5162 \quad 2.4266)$$

7. 计算 $y_1, y_2, \dots, y_p$ 的累积贡献率 $\alpha_p$

$$\alpha_p = \frac{\sum_{k=1}^p \lambda_k}{\sum_{k=1}^m \lambda_k}$$

$$\alpha = (62.6866 \quad 86.0536 \quad 93.0572 \quad 97.5734 \quad 100.0000)$$

8. 此处选择前3个主成分，累积贡献率达93%，主成分分析效果很好

9. 以前 $p$ 个主成分计算综合得分 $Z$

$$\begin{aligned}
y_1 &= 0.4905\tilde{x}_1 + 0.5254\tilde{x}_2 - 0.4871\tilde{x}_3 + 0.0671\tilde{x}_4 - 0.4916\tilde{x}_5 \\
y_2 &= -0.2934\tilde{x}_1 + 0.0490\tilde{x}_2 - 0.2812\tilde{x}_3 + 0.8981\tilde{x}_4 + 0.1606\tilde{x}_5 \\
y_3 &= 0.5109\tilde{x}_1 + 0.4337\tilde{x}_2 + 0.3714\tilde{x}_3 + 0.1477\tilde{x}_4 + 0.6255\tilde{x}_5 \\
Z &= 0.6269y_1 + 0.2337y_2 + 0.0700y_3
\end{aligned}$$

*For example, for 1984 :*

$$\begin{aligned}
y_1 &= 0.4905 \times 1.2038 + 0.5254 \times (-0.1960) - 0.4871 \times (-0.0146) + \\
&\quad 0.0671 \times (-1.3148) - 0.4916 \times (-0.5947) = 0.6987 \\
\text{Thus } y_1 &= 0.6987, \quad y_2 = -1.6350, \quad y_3 = -0.0416 \\
\text{So } Z &= 0.0531
\end{aligned}$$

10. 根据综合得分 $Z$ 排序

排名	年份	综合得分 $Z$
1	1993	2.4464
2	1992	1.9768
3	1991	1.1123
4	1994	0.8604
5	1987	0.8456
6	1990	0.2258
7	1984	0.0531
8	2000	0.0531
9	1995	-0.2534
10	1988	-0.2662
11	1985	-0.5292
12	1996	-0.7405
13	1986	-0.7789
14	1989	-0.9715
15	1997	-1.1476
16	1999	-1.2015
17	1998	-1.6848

### 4.3 代码实现

[PCA.m](#)

```

clc, clear
% Input data with rows of samples and columns of indexes
a = [0.71 0.49 0.41 0.51 0.46
0.40 0.49 0.44 0.57 0.50
0.55 0.56 0.48 0.53 0.49
0.62 0.93 0.38 0.53 0.47
0.45 0.42 0.41 0.54 0.47
0.36 0.37 0.46 0.54 0.48
0.55 0.68 0.42 0.54 0.46
0.62 0.90 0.38 0.56 0.46
0.61 0.99 0.33 0.57 0.43
0.71 0.93 0.35 0.66 0.44
0.59 0.69 0.36 0.57 0.48

```

```

0.41  0.47  0.40  0.54  0.48
0.26  0.29  0.43  0.57  0.48
0.14  0.16  0.43  0.55  0.47
0.12  0.13  0.45  0.59  0.54
0.22  0.25  0.44  0.58  0.52
0.71  0.49  0.41  0.51  0.46];
% Standardize data
standardized_a = zscore(a);
% Calculate corrcoef matrix
r = corrcoef(standardized_a);
% Calculate eigenvalues y, eigenvectors x, contribution p
[x, y, p] = pcacov(r);
% Construct row vector of +1/-1
f = sign(sum(x));
% Modify the sign of eigenvectors x
x = x .* f;
% Choose the number of principle components
num = 3;
% Calculate the score of each principles
new_y = standardized_a * x(:,(1:num));
% Calculate the comprehensive score z
z = new_y * p(1:num) / 100;
% Sort the score from largest to smallest (index = 1 means year = 1984)
[sorted_z, index] = sort(z, 'descend');

```

## 5. 参考资料

1. [数模官网](#)
2. 《数学建模算法与应用》：P427-P430
3. 第三次培训\_高晓枫老师PPT：P34-P39
4. [Excel相关系数矩阵可视化](#)
5. [R相关系数矩阵可视化](#)
6. [主成分分析（PCA）的推导和应用](#)