

模型-概率统计-连续型概率分布-指数分布

1. 模型名称
2. 适用范围
3. 模型表述
 - 3.1 数字化表述
 - 3.2 累计分布函数
 - 3.3 期望
 - 3.4 方差
4. 图示
5. 例子

模型-概率统计-连续型概率分布-指数分布

1. 模型名称

指数分布 (Exponential Distribution)

2. 适用范围

指数分布是独立事件发生的时间间隔。例如婴儿出生的时间间隔、来电的时间间隔、奶粉销售的时间间隔、网站访问的时间间隔，比如旅客进机场的时间间隔、中文维基百科新条目出现的时间间隔。

指数分布的公式可以从泊松分布推断出来。如果下一个婴儿出生要间隔时间 t ，就等同于 t 之内没有任何婴儿出生

反过来，事件在时间 t 之内发生的概率，就是1减去上面的值(即累计分布函数公式)

指数分布的图形大体如下：随着间隔时间变长，时间的发生概率急剧下降，呈现指数式衰减

3. 模型表述

3.1 数字化表述

如果连续型随机变量 X 具有如下的概率密度函数，

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$,为常数，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作

$$X \sim E(\lambda)$$

3.2 累计分布函数

$$F(x; \lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{for } x \geq 0 \\ 0 & \text{for } x < 0 \end{cases}$$


3.3 期望

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

3.4 方差

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

4. 图示



指数分布示意图

5. 例子


指数分布的公式可以从泊松分布推断出来。如果下一个婴儿出生要间隔时间 t ，就等同于 t 之内没有任何婴儿出生

$$P(X > t) = P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$

反过来，事件在时间 t 之内发生的概率，就是1减去上面的值(即累计分布函数公式)

$$P(X \leq t) = 1 - P(X > t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

指数分布的图形大体如下：随着间隔时间变长，时间的发生概率急剧下降，呈现指数式衰减



https://blog.csdn.net/qq_38984677