



1. Considere la familia de funciones exponenciales discretas:

$$A = \left\{ (\gamma_a(n)) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \gamma_a(n) = a^n u(n), 0 < a < 1 \right\} \quad (1)$$

1. Verifique que el impulso discreto $\delta(n)$ puede ser expresado punto a punto como:

$$\delta(n) = \gamma_a(n) - a \gamma_a(n-1) \quad (2)$$

2. Del punto anterior, muestre que toda señal discreta $x(n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ puede ser descompuesta como:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \gamma_a(n-k) \quad (3)$$

3. Use las propiedades de linealidad e invariancia en el tiempo para expresar la salida $y(n) = \mathcal{T}[x(n)]$ en términos de la entrada $x(n)$ y la señal $g(n) = \mathcal{T}[\gamma_a(n)]$.

Solución:

Resolución 1.1

Sea la familia de funciones exponenciales discretas:

$$A = \left\{ \gamma_a(n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \gamma_a(n) = a^n u(n), 0 < a < 1 \right\}. \quad (4)$$

Queremos verificar que:

$$\delta(n) = \gamma_a(n) - a \gamma_a(n-1). \quad (5)$$

Dado que se busca demostrar lo anterior, tendremos lo siguiente:

$$\gamma_a(n) - a \gamma_a(n-1) = a^n u(n) - a \cdot a^{n-1} u(n-1) \quad (6)$$

$$= a^n u(n) - a^n u(n-1) \quad (7)$$

$$= a^n [u(n) - u(n-1)]. \quad (8)$$

Recordemos que:

$$u(n) - u(n-1) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0, \end{cases} \quad (9)$$

lo cual corresponde exactamente a la definición del impulso discreto $\delta(n)$. Por lo tanto:

$$\delta(n) = \gamma_a(n) - a \gamma_a(n-1). \quad (10)$$

Resolución 1.2

Sabemos que cualquier señal discreta $x(n)$ puede expresarse como:

$$x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \delta(n - k). \quad (11)$$

Sustituyendo la expresión de $\delta(n)$ obtenida en el punto anterior:

$$x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \left[\gamma_a(n - k) - a \gamma_a(n - k - 1) \right] \quad (12)$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \gamma_a(n - k) - a \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \gamma_a(n - k - 1). \quad (13)$$

En la segunda suma hacemos el cambio de variable $k \mapsto k - 1$:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \gamma_a(n - k - 1) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k - 1) \gamma_a(n - k). \quad (14)$$

Por tanto:

$$x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left[x(k) - a x(k - 1) \right] \gamma_a(n - k). \quad (15)$$

Definiendo:

$$c_k = x(k) - a x(k - 1), \quad (16)$$

tenemos finalmente:

$$x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \gamma_a(n - k). \quad (17)$$

Resolución 1.3

Sea el sistema \mathcal{T} lineal e invariante en el tiempo (LTI). Definimos:

$$g(n) = \mathcal{T}[\gamma_a(n)]. \quad (18)$$

La respuesta al impulso del sistema es:

$$h(n) = \mathcal{T}[\delta(n)]. \quad (19)$$

Usando el resultado de 1.1:

$$h(n) = \mathcal{T}[\gamma_a(n) - a \gamma_a(n - 1)] \quad (20)$$

$$= \mathcal{T}[\gamma_a(n)] - a \mathcal{T}[\gamma_a(n - 1)] \quad (21)$$

$$= g(n) - a g(n - 1). \quad (22)$$

Finalmente, como el sistema es LTI:

$$y(n) = (x * h)(n) \quad (23)$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) h(n - k) \quad (24)$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \left[g(n - k) - a g(n - k - 1) \right]. \quad (25)$$

De este modo:

$$y(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) [g(n-k) - a g(n-k-1)]. \quad (26)$$

2. 1. Determine la transformada de Fourier de las siguientes señales y gráfiquela en magnitud y fase:

- $x(t) = \begin{cases} A \cdot e^{-at} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$
- $x(t) = A \cdot e^{-a|t|}$

2. Determine los coeficientes de la serie de Fourier para la siguiente señal:

$$x(t) = 1 + \sin(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) + \cos\left(2\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right) \quad (27)$$

Solución:

Resolución 2.1

Se pide la transformada de Fourier de las funciones dadas, luego por definición:

$$X(F) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi F t} dt \quad (28)$$

Luego se tiene que la primera función se puede expresar en función del escalón unitario $u(t)$:

$$x(t) = A e^{-at} u(t), \quad a > 0.$$

Por definición,

$$X(F) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi F t} dt \quad (29)$$

$$= \int_0^{\infty} A e^{-at} e^{-j2\pi F t} dt \quad (30)$$

$$= A \int_0^{\infty} e^{-(a+j2\pi F)t} dt \quad (31)$$

$$= A \left[\frac{-1}{a+j2\pi F} e^{-(a+j2\pi F)t} \right]_0^{\infty} \quad (32)$$


$$= \frac{A}{a+j2\pi F}. \quad (33)$$

Luego tenemos que el módulo y fase vienen dados por:

$$|X(F)| = \frac{A}{\sqrt{a^2 + (2\pi F)^2}}, \quad (34)$$

$$\angle X(F) = \angle((a+j2\pi F)^{-1}) = -\arctan\left(\frac{2\pi F}{a}\right), \quad (35)$$

Luego gráficamente tenemos que:



(a) Magnitud $|X(F)|$ para $X(F) = \frac{A}{a+j2\pi F}$. Se observa un máximo en $F = 0$ igual a A/a , y la magnitud decae rápidamente para frecuencias altas, mostrando el comportamiento típico de un filtro pasabajo exponencial.

(b) Fase $\angle X(F)$ para $X(F) = \frac{A}{a+j2\pi F}$. La fase parte en 0 para $F = 0$ y varía suavemente desde $+\pi/2$ a $-\pi/2$ al aumentar $|F|$, indicando el retardo de fase introducido por el sistema.

Figura 1: Magnitud y fase de la transformada de Fourier para $x(t) = Ae^{-at}u(t)$. La magnitud tiene máximo en $F = 0$ y la fase varía de $+\pi/2$ a $-\pi/2$ según la frecuencia, mostrando el efecto de la exponencial sobre el espectro.

Sea ahora la siguiente función:

$$x(t) = Ae^{-a|t|}, \quad a > 0,$$

que es par. Separando para $t \geq 0$ y $t < 0$,

$$X(F) = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-a|t|}e^{-j2\pi Ft} dt \quad (36)$$

$$= \int_{-\infty}^0 Ae^{+at}e^{-j2\pi Ft} dt + \int_0^{\infty} Ae^{-at}e^{-j2\pi Ft} dt \quad (37)$$

$$= A \int_{-\infty}^0 e^{(a-j2\pi F)t} dt + A \int_0^{\infty} e^{-(a+j2\pi F)t} dt \quad (38)$$

$$= A \left[\frac{1}{a-j2\pi F} e^{(a-j2\pi F)t} \right]_{-\infty}^0 + A \left[\frac{-1}{a+j2\pi F} e^{-(a+j2\pi F)t} \right]_0^{\infty} \quad (39)$$

$$= \frac{A}{a-j2\pi F} + \frac{A}{a+j2\pi F} = \frac{A((a+j2\pi F) + (a-j2\pi F))}{a^2 + (2\pi F)^2} \quad (40)$$


$$= \frac{2Aa}{a^2 + (2\pi F)^2}. \quad (41)$$

Como $x(t)$ es par, $X(F)$ es real y par:


$$|X(F)| = \frac{2Aa}{a^2 + (2\pi F)^2}, \quad (42)$$

$$\angle X(F) = 0 \quad (\text{para todo } F, \text{ salvo el signo en } F \text{ donde } X(F) > 0). \quad (43)$$

Luego gráficamente tenemos lo siguiente:



(a) Magnitud $|X(F)|$ para $X(F) = \frac{2Aa}{a^2 + (2\pi F)^2}$. Se observa un máximo en $F = 0$ igual a $2A/a$, y la magnitud es real, par y decae para frecuencias altas, mostrando el espectro de una exponencial simétrica.



(b) Fase $\angle X(F)$ para $X(F) = \frac{2Aa}{a^2 + (2\pi F)^2}$. La fase es cero para todo F , lo que indica que la señal original es par y su transformada es completamente real.

Figura 2: Magnitud y fase de la transformada de Fourier para $x(t) = Ae^{-a|t|}$. La magnitud es real y par, con máximo en $F = 0$, y la fase es cero en todo el dominio de frecuencias.

Resolución 2.2

Los coeficientes de la serie de Fourier $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ permiten expresar una señal periódica como combinación lineal de sinusoides complejas. En la forma compleja,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}, \quad (44)$$

donde T es el período fundamental. Los coeficientes se obtienen (sobre cualquier intervalo de longitud T) como

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt. \quad (45)$$

Para convertir senos y cosenos a exponenciales usamos las identidades de Euler:

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}. \quad (46)$$

Dada la señal

$$x(t) = 1 + \sin(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) + \cos\left(2\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right), \quad (47)$$

la escribimos en forma exponencial y agrupamos por armónicos $e^{jk\omega_0 t}$:

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_0 t} + \left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} \right) + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{-j2\omega_0 t} \quad (48)$$

$$= 1 + \left(1 + \frac{1}{2j}\right) e^{j\omega_0 t} + \left(1 - \frac{1}{2j}\right) e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{-j2\omega_0 t}. \quad (49)$$

Identificando término a término con $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$, los coeficientes complejos son:

$$c_0 = 1, \quad (50)$$

$$c_1 = 1 + \frac{1}{2j} = 1 - \frac{j}{2}, \quad (51)$$

$$c_{-1} = 1 - \frac{1}{2j} = 1 + \frac{j}{2}, \quad (52)$$

$$c_2 = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} (1 + j), \quad (53)$$

$$c_{-2} = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} (1 - j), \quad (54)$$

$$c_k = 0 \quad \text{para } |k| \geq 3. \quad (55)$$

Obsérvese que, al ser $x(t)$ real, se cumple la simetría conjugada $c_{-k} = c_k^*$.

3. Para la función sinusoidal rectificada mostrada en la figura 3, calcule los coeficientes de la serie de Fourier, además verifique el cumplimiento del teorema de Parseval.




Figura 3: Función sinusoidal rectificada

Solución:

Resolución 3.1

Sea la *sinusoidal rectificada* de período τ mostrada en la figura. En un período puede describirse como

$$x(t) = A \sin\left(\frac{\pi t}{\tau}\right), \quad 0 \leq t < \tau, \quad (56)$$

y se extiende periódicamente con período τ . Por tanto, su frecuencia fundamental y pulsación son

$$f_0 = \frac{1}{\tau}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{\tau}. \quad (57)$$

Los coeficientes complejos de la serie de Fourier se obtienen con

$$c_k = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau A \sin\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) e^{-j\frac{2\pi}{\tau} kt} dt. \quad (58)$$

Usando las identidades de Euler,

$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}, \quad (59)$$

quedando

$$c_k = \frac{A}{\tau} \int_0^\tau \frac{e^{j\frac{\pi}{\tau}t} - e^{-j\frac{\pi}{\tau}t}}{2j} e^{-j\frac{2\pi}{\tau}kt} dt \quad (60)$$

$$= \frac{A}{2j\tau} \int_0^\tau \left(e^{j\frac{\pi}{\tau}(1-2k)t} - e^{-j\frac{\pi}{\tau}(1+2k)t} \right) dt \quad (61)$$

$$= \frac{A}{2j\tau} \left[\frac{e^{j\frac{\pi}{\tau}(1-2k)t}}{j\frac{\pi}{\tau}(1-2k)} - \frac{e^{-j\frac{\pi}{\tau}(1+2k)t}}{-j\frac{\pi}{\tau}(1+2k)} \right]_{t=0}^{t=\tau}. \quad (62)$$

Como $e^{j\pi(1-2k)} = e^{-j\pi(1+2k)} = -1$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, se obtiene

$$c_k = \frac{A}{2j\tau} \left[\frac{-1-1}{j\frac{\pi}{\tau}(1-2k)} + \frac{-1-1}{j\frac{\pi}{\tau}(1+2k)} \right] = \frac{A}{2j\tau} \left[\frac{-2}{j\frac{\pi}{\tau}(1-2k)} + \frac{-2}{j\frac{\pi}{\tau}(1+2k)} \right] \quad (63)$$

$$= \frac{A}{\pi} \left[\frac{1}{1-2k} + \frac{1}{1+2k} \right] = \frac{A}{\pi} \left(\frac{(1+2k) + (1-2k)}{1-4k^2} \right) = \boxed{\frac{2A}{\pi(1-4k^2)}}. \quad (64)$$

En particular,

$$c_0 = \frac{2A}{\pi}, \quad c_{-k} = c_k \quad (\text{coeficientes reales y pares}). \quad (65)$$

Verificación de Parseval. La potencia promedio en el tiempo es

$$P_x = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau x^2(t) dt = \frac{A^2}{\tau} \int_0^\tau \sin^2\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) dt = \frac{A^2}{2}. \quad (66)$$

En frecuencia,

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{4A^2}{\pi^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1-4k^2)^2} = \frac{4A^2}{\pi^2} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-4k^2)^2} \right]. \quad (67)$$

Usando la identidad conocida

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-4k^2)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{8} - 1 \right), \quad (68)$$

se concluye que

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{4A^2}{\pi^2} \left[1 + \left(\frac{\pi^2}{8} - 1 \right) \right] = \frac{4A^2}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{A^2}{2} = P_x, \quad (69)$$

verificando así la relación de Parseval para esta señal.

4. Dadas dos señales $f(t)$ y $g(t)$ con coeficientes de Fourier c_k y d_k , respectivamente, encuentre los coeficientes de Fourier de la señal $y(t) = f(t)$

Solución:

Resolución 4.1

Sea $f(t)$ y $g(t)$ dos señales T -periódicas con series de Fourier complejas

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad g(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} d_m e^{jm\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \quad (70)$$

Definimos $y(t) = f(t)g(t)$. El n -ésimo coeficiente complejo de y es

$$\beta_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) g(t) e^{-jn\omega_0 t} dt. \quad (71)$$

Sustituyendo las expansiones y permutando suma e integral,

$$\beta_n = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} d_m e^{jm\omega_0 t} \right) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad (72)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_k d_m \left(\frac{1}{T} \int_0^T e^{j(k+m-n)\omega_0 t} dt \right). \quad (73)$$

Usando la ortogonalidad

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{j\ell\omega_0 t} dt = \begin{cases} 1, & \ell = 0, \\ 0, & \ell \neq 0, \end{cases} \quad (74)$$

sólo sobreviven los términos con $k + m - n = 0$, i.e., $m = n - k$. Por tanto,

$$\beta_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k d_{n-k}. \quad (75)$$

Es decir, los coeficientes de Fourier de $y(t) = f(t)g(t)$ son la *convolución discreta* (en el índice) de $\{c_k\}$ y $\{d_k\}$:

$$\beta_n = (c * d)_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k d_{n-k}. \quad (76)$$