

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE  
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA**



**Licenciatura en Estadística**

**Control Estadístico del Paquete R**

**”UNIDAD CUATRO”  
Práctica 17 - Inferencia estadística, Estimación.**

**Alumna:  
Martha Yoana Medina Sánchez**

**Fecha de elaboración  
Santa Ana - 27 de noviembre de 2015**

## 1. INTRODUCCIÓN

La Inferencia Estadística es: El conjunto de métodos estadísticos que permiten deducir (inferir) como se distribuye (comporta) la población en estudio o las relaciones estocásticas entre varias variables de interés a partir de la información suministrada por una muestra aleatoria.

La Inferencia Estadística paramétrica plantea tres tipos de problemas:

- Estimación puntual: en la que pretendemos dar un valor puntual del parámetro.
- Estimación por intervalos: en el que buscamos un intervalo en el que confiamos se encuentre el verdadero valor de  $\theta$  desconocido.
- Contraste de hipótesis: donde buscamos probar una declaración o un supuesto acerca del valor de uno (o más) parámetro(s)  $\theta$ .

Para llevar a cabo lo anterior, se parte del supuesto de que la distribución de la(s) característica(s) que se está estudiando pertenece a una familia conocida de distribuciones, siendo únicamente desconocidos los parámetros que la definen. Por lo regular pertenecen a la familia normal o a cualquiera que pueda obtenerse a partir de ella como lo es: la  $t$  de Student, la Chi-Cuadrado o la  $F$  de Snedecor.

## 2. ESTIMACIÓN PUNTUAL

Un estadístico  $\theta$  estimado es igual a  $f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$  es un estimador adecuado de un parámetro  $\theta$ , si cumple las siguientes propiedades:

- **Insesgadez:** si la esperanza matemática del estimador coincide con el valor del parámetro al cual está intentado estimar  $E[\theta \text{ estimado}] = \theta$ . Es decir, la distribución de probabilidad del estimador se concentra alrededor del valor que intenta predecir.
- **Consistencia:** si el estimador converge en probabilidad al valor del parámetro que está intentado estimar conforme crece el tamaño de la muestra. Es decir si  $\tilde{\theta}_n$  representa el estimador para una muestra de tamaño  $n$ , entonces se dice que  $\tilde{\theta}_n$  es consistente si: el límite de  $n$  cuando tiende a infinito de  $E[\theta \text{ estimado}] = \theta$ .
- **Eficiencia:** si entre todos los posibles estimadores (insesgados o no) que pueden obtenerse es el que tenga la menor varianza posible.

**Se verifica fácilmente que la media muestral (estimador de la media poblacional) cumple estas tres y aún más propiedades.**

## 3. ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA.

La idea de la estimación por intervalos de confianza radica en encontrar dos números reales, digamos  $\tilde{\theta}_1$  y  $\tilde{\theta}_2$ , tales que el parámetro desconocido  $\theta$  que se quiere estimar pertenezca al intervalo formado por dichos valores con probabilidad alta, digamos  $1 - \alpha$ . Es decir;

$$P[\tilde{\theta}_1 \leq \theta \leq \tilde{\theta}_2] = 1 - \alpha$$

Donde  $\tilde{\theta}_1$  y  $\tilde{\theta}_2$  sean valores que dependan únicamente del estimador  $\tilde{\theta}$  y de los valores observados en la muestra  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ .

Se verifica fácilmente que cuando la característica de interés  $X$  sigue una distribución conocida la cual es simétrica (como la normal o la binomial o sus derivadas), y además los estimadores son insesgados los mejores intervalos, en el sentido de su anchura, son los intervalos simétricos alrededor del parámetro a estimar.

Hay que tener en cuenta que  $1 - \alpha$ : es la probabilidad de que parámetro se encuentre en el intervalo antes de extraer la muestra. Una vez seleccionada la muestra esta probabilidad es 1 ó 0, dependiendo de si el parámetro se encuentra o no en el intervalo. En este sentido es que no se habla de probabilidad sino de confianza.

El concepto de confianza puede interpretarse de la siguiente manera: si se repitiera el experimento muestral (se tomarán muchas muestras) muchas veces, en aproximadamente el  $100(1-\alpha)\%$  de los casos se confiaría que los intervalos de confianza encontrados contengan al verdadero valor del parámetro  $\theta$  a estimar.

#### 4. SIMULACIÓN DEL CONCEPTO DE INTERVALO DE CONFIANZA PARA ESTIMAR UN PARÁMETRO.

##### ■ Ejemplo 1:

Sea la variable aleatoria  $X$  = el número de caras obtenidas, al lanzar una moneda balanceada 20 veces. Simulamos 50 muestras para generar intervalos de 95% de confianza y así poder estimar la proporción verdadera de caras ( $p$ ), y encontrar en cuántos de estos intervalos se encuentra el verdadero valor de la proporción.

Entonces  $X$  tiene una distribución binomial con parámetros  $n=20$  y  $p=0.5$ .

La función para generar cada una de las muestras, junto con los límites inferior y superior de los intervalos de confianza se muestra en seguida y le hemos llamado "simulIntProp".

```
simulIntProp <- function(m=5, n=1, p, nivel.conf=0.95)
{
  X <- rbinom(m, n, p)
  # Matriz con 1000 valores aleatorios binomial(n,p), 50 muestras cada una de tamaño 20
  pe <- X/n
  # Calcula la proporción estimada en cada una de las muestras.
  SE <- sqrt(pe*(1-pe)/n)
  # Calcula la desviación estándar estimada en cada una de las muestras.
  alfa <- 1-nivel.conf
  z <- qnorm(1-alfa/2)
  Intervalo <- cbind(pe - z*SE, pe + z*SE)
  # genera los extremos del intervalo de confianza
  nInter <- 0
  # un contador para conocer en cuántos intervalos se encuentra la verdadera proporción.
```

```

for(i in 1:m)
if ((p >= Intervalo[i, 1]) && (p <= Intervalo[i, 2]))
nInter <- nInter + 1
# función que cuenta cuántos intervalos contienen el verdadero valor del parámetro.
return(nInter)
}
n=20; m= 50; p=0.5; nivel.conf=0.95
simulIntProp(m, n, p, nivel.conf)

## [1] 47

Intervalo # para visualizar cada uno de los intervalos generados

##           [,1]      [,2]
## [1,] 0.09916346 0.5008365
## [2,] 0.38529670 0.8147033
## [3,] 0.38529670 0.8147033
## [4,] 0.18529670 0.6147033
## [5,] 0.38529670 0.8147033
## [6,] 0.23196777 0.6680322
## [7,] 0.33196777 0.7680322
## [8,] 0.56022730 0.9397727
## [9,] 0.33196777 0.7680322
## [10,] 0.18529670 0.6147033
## [11,] 0.33196777 0.7680322
## [12,] 0.44096270 0.8590373
## [13,] 0.23196777 0.6680322
## [14,] 0.38529670 0.8147033
## [15,] 0.28086936 0.7191306
## [16,] 0.18529670 0.6147033
## [17,] 0.33196777 0.7680322
## [18,] 0.23196777 0.6680322
## [19,] 0.56022730 0.9397727
## [20,] 0.18529670 0.6147033
## [21,] 0.23196777 0.6680322
## [22,] 0.09916346 0.5008365
## [23,] 0.56022730 0.9397727
## [24,] 0.49916346 0.9008365
## [25,] 0.23196777 0.6680322
## [26,] 0.38529670 0.8147033
## [27,] 0.18529670 0.6147033
## [28,] 0.14096270 0.5590373
## [29,] 0.28086936 0.7191306
## [30,] 0.33196777 0.7680322
## [31,] 0.33196777 0.7680322
## [32,] 0.33196777 0.7680322

```

```
## [33,] 0.23196777 0.6680322
## [34,] 0.44096270 0.8590373
## [35,] 0.28086936 0.7191306
## [36,] 0.38529670 0.8147033
## [37,] 0.23196777 0.6680322
## [38,] 0.38529670 0.8147033
## [39,] 0.23196777 0.6680322
## [40,] 0.28086936 0.7191306
## [41,] 0.28086936 0.7191306
## [42,] 0.23196777 0.6680322
## [43,] 0.49916346 0.9008365
## [44,] 0.28086936 0.7191306
## [45,] 0.09916346 0.5008365
## [46,] 0.23196777 0.6680322
## [47,] 0.38529670 0.8147033
## [48,] 0.38529670 0.8147033
## [49,] 0.23196777 0.6680322
## [50,] 0.28086936 0.7191306


nInter # para visualizar en cuántos de estos intervalos se encuentra la

## [1] 47

# verdadera proporción.
```

Gráfico que muestra los intervalos de confianza de 95% que contienen y no contienen el verdadero valor del parámetro  $p$ .

```
matplot(rbind(pe - z*SE, pe + z*SE), rbind(1:m, 1:m), type="l", lty=1)
abline(v=p)
```



### ■ Ejercicio 1:

Sea la variable aleatoria  $X$  = el número que se obtiene al lanzar un dado no cargado 30 veces. Simular 56 muestras para generar intervalos de 95 % de confianza para estimar el promedio ( $\mu$ ), y encontrar cuántos de estos intervalos contiene el valor medio verdadero.

```
simulIntProp <- function(m=5, n=1, p, nivel.conf=0.95)
{
  X <- rbinom(m, n, p)
  # Matriz con 1000 valores aleatorios binomial(n,p), 56 muestras cada una de tamaño 30
  pe <- X/n
  # Calcula la proporción estimada en cada una de las muestras.
  SE <- sqrt(pe*(1-pe)/n)
  # Calcula la desviación estándar estimada en cada una de las muestras.
  alfa <- 1-nivel.conf
  z <- qnorm(1-alfa/2)
  Intervalo <- cbind(pe - z*SE, pe + z*SE)
  # genera los extremos del intervalo de confianza
  nInter <- 0
  # un contador para conocer en cuántos intervalos se encuentra la
  # verdadera proporción.
  for(i in 1:m)
  if ((p >= Intervalo[i, 1]) && (p <= Intervalo[i, 2]))
  nInter <- nInter + 1
  # función que cuenta cuántos intervalos contienen el verdadero valor del parámetro.
  return(nInter)
}
n=30; m= 56; p=0.17; nivel.conf=0.95
simulIntProp(m, n, p, nivel.conf)

## [1] 51

Intervalo # para visualizar cada uno de los intervalos generados

##           [,1]      [,2]
## [1,] 0.011691522 0.25497514
## [2,] -0.007351649 0.20735165
## [3,] 0.108424383 0.42490895
## [4,] -0.030900702 0.09756737
## [5,] -0.007351649 0.20735165
## [6,] -0.007351649 0.20735165
## [7,] 0.011691522 0.25497514
## [8,] 0.033308009 0.30002532
## [9,] 0.033308009 0.30002532
## [10,] 0.108424383 0.42490895
## [11,] -0.007351649 0.20735165
```

```
## [12,] 0.033308009 0.30002532
## [13,] 0.011691522 0.25497514
## [14,] 0.056864469 0.34313553
## [15,] 0.033308009 0.30002532
## [16,] 0.056864469 0.34313553
## [17,] 0.000000000 0.00000000
## [18,] 0.033308009 0.30002532
## [19,] 0.164646492 0.50202017
## [20,] 0.011691522 0.25497514
## [21,] 0.081984476 0.38468219
## [22,] 0.011691522 0.25497514
## [23,] 0.081984476 0.38468219
## [24,] -0.007351649 0.20735165
## [25,] 0.164646492 0.50202017
## [26,] 0.056864469 0.34313553
## [27,] 0.011691522 0.25497514
## [28,] 0.033308009 0.30002532
## [29,] -0.007351649 0.20735165
## [30,] 0.011691522 0.25497514
## [31,] 0.081984476 0.38468219
## [32,] 0.011691522 0.25497514
## [33,] -0.030900702 0.09756737
## [34,] 0.081984476 0.38468219
## [35,] 0.108424383 0.42490895
## [36,] 0.136017648 0.46398235
## [37,] 0.033308009 0.30002532
## [38,] 0.033308009 0.30002532
## [39,] 0.056864469 0.34313553
## [40,] 0.056864469 0.34313553
## [41,] 0.108424383 0.42490895
## [42,] 0.033308009 0.30002532
## [43,] 0.033308009 0.30002532
## [44,] 0.108424383 0.42490895
## [45,] 0.056864469 0.34313553
## [46,] 0.056864469 0.34313553
## [47,] -0.022594020 0.15592735
## [48,] 0.081984476 0.38468219
## [49,] 0.056864469 0.34313553
## [50,] 0.011691522 0.25497514
## [51,] 0.011691522 0.25497514
## [52,] 0.000000000 0.00000000
## [53,] 0.056864469 0.34313553
## [54,] 0.081984476 0.38468219
## [55,] -0.007351649 0.20735165
## [56,] 0.081984476 0.38468219
```

nInter # para visualizar en cuántos de estos intervalos se encuentra la



```
## [1] 51
```

```
# verdadero valor medio.
```