

Kontrolný zoznam sebahodnotenia: 6 oblastí na posúdenie možných príčin nedostatku

Ak cítite chronickú únavu, nestabilitu hmotnosti, výkyvy nálady a analýzy ukazujú „všetko v norme“, tento kontrolný zoznam vám pomôže systémovo posúdiť možné príčiny nedostatku, vrátane hormonálnej nerovnováhy, deficitov alebo systémových porúch. Toto nenahradí medicínsku diagnostiku, ale pomôže vám lepšie porozumieť svojmu stavu a pripraviť sa na konzultáciu.

Dôležité: niektoré lieky (napríklad biotín) môžu skresliť výsledky analýz, najmä štítnej žľazy. Spomenite užívané lieky pri konzultácii.

1. Hormóny štítnej žľazy

Príznaky na kontrolu:

- Cítite neustálu únavu, aj po spánku?
- Všímate si suchosť kože, vypadávanie vlasov alebo pocit zimy?
- Začali sa u vás častejšie objavovať zápchy alebo problémy s koncentráciou?

Ak zaznamenávate niekoľko z týchto príznakov, odporúča sa vyšetriť: TSH (hormón regulujúci štítnu žľazu), voľný T3, voľný T4, protilátky proti tyreoperoxidáze (anti-TPO) a proti tyreoglobulínu (anti-TG, na zistenie autoimunitných problémov štítnej žľazy).

Prečo je to dôležité: Štítna žľaza reguluje metabolizmus, energiu a náladu. Anti-TPO a anti-TG pomáhajú odhaliť autoimunitnú tyreoiditídu (napríklad Hashimotovú chorobu).

Poznámka: Normálne hodnoty závisia od laboratória, ale napríklad TSH je obvykle v rozmedzí 0,4–4,0 mIU/ml. Opakované analýzy sa odporúčajú po 6–8 týždňoch pri odchýlkach.

2. Nadobličky a kortizol

Príznaky na kontrolu:

- Je pre vás ťažké ráno sa prebudiť, aj po dlhom spánku?
- Pociťujete túžbu po sladkom alebo slanom počas dňa?
- Trápia vás úzkosť alebo problémy so spánkom?

Ak zaznamenávate niekoľko z týchto príznakov, odporúča sa vyšetriť: Kortizol (hormón stresu, lepšie kontrolovať v dennom moči alebo slinách na 4 miestach; v krvi — ráno 7:00–9:00 a večer

16:00–18:00), DHEA-S (hormón nadobličiek). ACTH (regulátor kortizolu) a dexametazónový test (na vylúčenie Cushingovho syndrómu) sa ordinujú podľa indikácií.

Prečo je to dôležité: Nadobličky zodpovedajú za stresovú odolnosť a energiu. Nerovnováha kortizolu môže spôsobovať slabosť a emocionálnu nestabilitu.

Poznámka: Normy kortizolu závisia od denného času (ráno: 7–25 µg/dl v krvi). Opakované testy — po 4–6 týždňoch podľa potreby.

3. Úroveň železa a feritín

Príznaky na kontrolu:

- Všímate si bledosť kože alebo častú dýchavicu?
- Lámové nechty alebo vypadávanie vlasov?
- Cítite závrat alebo slabosť pri fyzickej záťaži?

Ak zaznamenávate niekoľko z týchto príznakov, odporúča sa vyšetriť: Feritín (zásoby železa v organizme), sérové železo, transferín, celková viazavosť železa (TIBC — ukazovateľ, ako organizmus viaže železo).

Prečo je to dôležité: Feritín je najcitlivejší marker skrytého deficitu železa, ktorý znižuje dodávku kyslíka do tkanív, spôsobujúc slabosť.

Poznámka: Feritín je obvykle v norme 30–200 ng/ml (u žien) a 40–300 ng/ml (u mužov). Opakované analýzy — po 8–12 týždňoch po korekcii.

4. Vitamíny a mikroelementy

Príznaky na kontrolu:

- Cítite chronickú únavu alebo podráždenosť bez príčiny?
- Trápia vás svalové kŕče alebo sudorce?
- Často chorejete kvôli slabej imunite?

Ak zaznamenávate niekoľko z týchto príznakov, odporúča sa vyšetriť: Vitamín D (25(OH)D — ukazovateľ úrovne vitamínu D), vitamín B12, kyselina listová, horčík, zinok, selén (dôležitý pre štítnu žľazu), vitamín B6. Pri nízkom B12 môže byť odporúčaná analýza na homocysteín alebo metylmalónovú kyselinu (na vylúčenie skrytého deficitu B12).

Prečo je to dôležité: Deficit týchto látok narušuje prácu nervovej sústavy, metabolizmus a imunitu. Selén je obzvlášť dôležitý pre štítnu žľazu.

Poznámka: Norma vitamínu D: 30–100 ng/ml; B12: 200–900 pg/ml. Opakované analýzy — po 3–6 mesiacoch po korekcii.

5. Pohlavná hormonálna sústava

Pre ženy

Príznaky na kontrolu:

- Máte nepravidelný menštruačný cyklus alebo bolestivé menštruácie?
- Všímate si prudké výkyvy nálady alebo zníženie libida?
- Pozorujete nevysvetliteľný nárast hmotnosti?

Ak zaznamenávate niekoľko z týchto príznakov, odporúča sa vyšetriť: Estradiol, progesterón, testosterón, LH, FSH (na 3.–5. a 21.–23. deň cyklu), antimüllerov hormón (AMH — ukazovateľ zásoby vajíčok). Pre ženy 45+ — FSH na posúdenie perimenopauzy.

Prečo je to dôležité: Nerovnováha pohlavných hormónov ovplyvňuje náladu, hmotnosť, spánok a celkovú pohodu. Analýzy v určité dni cyklu zabezpečujú presné výsledky.

Poznámka: Normy závisia od fázy cyklu (napríklad estradiol: 30–400 pg/ml vo folikulárnej fáze). Opakované analýzy — po 1–2 cykloch.

Pre mužov

Príznaky na kontrolu:

- Cítite zníženie libida alebo problémy s erekciou?
- Všímate si úbytok svalovej hmoty alebo chronickú únavu?
- Trápia vás podráždenosť alebo zníženie energie?

Ak zaznamenávate niekoľko z týchto príznakov, odporúča sa vyšetriť: Celkový a voľný testosterón, LH, FSH, estradiol, globulíny viažuce pohlavné hormóny (SHBG — proteín regulujúci dostupnosť hormónov).

Prečo je to dôležité: Testosterón reguluje energiu, svalovú hmotu, libido a náladu. Nerovnováha môže súvisieť s nízkou hladinou testosterónu alebo prebytkom estrogénov.

Poznámka: Norma celkového testosterónu: 300–1000 ng/dl (u mužov). Opakované analýzy — po 3–6 mesiacoch.

6. Celkový stav organizmu

Príznaky na kontrolu:

- Pociťujete neustály smäd alebo skoky hmotnosti?
- Cítite chronickú únavu alebo bolesti kĺbov?
- Všímavate si zhoršenie celkovej pohody bez jasných príčin?

Ak zaznamenávate niekoľko z týchto príznakov, odporúča sa vyšetriť: Kompletné vyšetrenie krvi, glukóza, inzulín (na výpočet HOMA-IR — index ukazujúci, ako organizmus reaguje na inzulín), HbA1c (priemerná hladina cukru za 2–3 mesiace), lipidový profil, markery zápalu (CRP), kreatinín, rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR — ukazovateľ funkcie obličiek), ALT, AST (enzýmy pečene), celkový proteín, albumín.

Prečo je to dôležité: Systémové poruchy, ako je inzulínová rezistencia (vysoký HOMA-IR môže poukazovať na riziko diabetu), chronický zápal, poruchy funkcie obličiek alebo pečene, môžu byť skrytou príčinou nedostatku.

Poznámka: Norma HbA1c: <5,7%; kreatinín: 0,6–1,2 mg/dl. Opakované analýzy — po 3–6 mesiacoch.

Ako používať kontrolný zoznam

1. **Zapíšte si príznaky:** Ved'te si denník príznakov 1–2 týždne, zaznamenávajte, čo vás trápi najviac.
2. **Vykonajte analýzy:** Obráťte sa na laboratórium na vykonanie uvedených analýz. Ženy upresnite fázu cyklu a oznámte užívané lieky.
3. **Získajte konzultáciu:** Na interpretáciu výsledkov a ďalšie kroky sa spojte so mnou cez WhatsApp/Telegram, aby sme prediskutovali vaše príznaky a analýzy.
4. **Začnite jednoduchými krokmi:** Normalizujte spánok, stravu a úroveň stresu na podporu organizmu.

Čo ďalej?

Ak cítite, že s organizmom niečo nie je v poriadku, neignorujte príznaky. Únava, výkyvy nálady alebo zmeny hmotnosti môžu súvisieť s hormonálnou nerovnováhou, deficitom mikroelementov, chronickým stresom alebo inými systémovými poruchami. Napíšte mi na WhatsApp/Telegram — pomôžem vám vyriešiť vaše príznaky, analyzovať výsledky a navrhnúť plán na zlepšenie vašej pohody.

Dr.Erkin