

Protokol laboratórneho screeningu pri problémoch s úbytkom hmotnosti od Dr.Erkin (ordinuje sa pri primárnom vyšetrení a následnom monitoringu)

1. POVINNÉ MINIMUM (primárny screening)

1.1. Celkový stav organizmu

- Kompletné vyšetrenie krvi
- Kompletné vyšetrenie moču
- Kreatinín, močovina

1.2. Metabolizmus sacharidov

- Glukóza nalačno (8–12 h lačnenia)
- Glykovaný hemoglobín (HbA1c)

1.3. Inzulínová rezistencia

- Inzulín nalačno (spolu s glukózou)
- Výpočet HOMA-IR (vypočítavam sám)

1.4. Funkcia štítnej žľazy

- TSH (tyreotropný hormón)
- Voľný T4 (tyroxín)

1.5. Lipidový metabolizmus

- Celkový cholesterol, LDL, HDL, Triglyceridy (nalačno)

1.6. Funkcia pečene

- ALT, AST, GGT

1.7. Vitamínový status

- Vitamín D (25-OH D3)

1.8. Instrumentálna diagnostika

- UZ orgánov brušnej dutiny (pečeň, žlčník, podžalúdková žľaza)

- **Bioimpedančná analýza** — zloženie tela (% tuku, viscerálny tuk, svalová hmota)

2. DOPLNKOVÉ VYŠETRENIA (podľa klinických indikácií, po konzultácii)

2.1. Štítna žľaza

- **Voľný T3**
- **Protilátky proti TPO**

2.2. Zápal a metabolizmus železa

- **C-reaktívny proteín (CRP)**
- **Feritín**
- **Vitamín B12**

2.3. Pohlavné hormóny (ženy)

Indikácie: porucha cyklu, hirsutizmus, PCOS

- Celkový testosterón
- Voľný testosterón
- DHEA-S
- LH, FSH
- Prolaktín

Odber — 3.–5. deň cyklu

2.4. Pohlavné hormóny (muži)

Indikácie: zníženie libida, erektilná dysfunkcia, gynekomastia

- Celkový testosterón (ráno 8–10 h)
- Voľný testosterón (ak je celkový hraničný)
- DHEA-S

2.5. Funkcia nadobličiek

Indikácie: centrálna obezita, strie, slabosť, Cushing

- Ranný kortizol
- Denná exkrécia voľného kortizolu (moč)

2.6. Špeciálne markery

- **Leptín** — pri výraznej obezite (BMI >35)

3. PERIODICITA KONTROLY

- **Primárne vyšetrenie:** kompletný komplex
- **Následne:**
 - Po 3 mesiacoch: glukóza, HbA1c, lipidy, pečeňové testy
 - Po 6 mesiacoch: TSH, bioimpedancia
 - Raz ročne: kompletný komplex
- Ak je cieľ dosiahnutý: kontrola každých 6 mesiacov

4. PRÍPRAVA NA ANALÝZY

- Lačnenie 8–12 hodín (glukóza, inzulín, lipidy)
- Ranný odber (8–10 hodín) — hormóny
- Vylúčiť stres pre kortizol
- Ženy — fáza cyklu pri hormónoch

5. PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA

- Začnite s povinným minimom
- Doplnkovo — podľa indikácií
- Vyhýbajte sa „screeningu kvôli screeningu“
- Interpretáciu robím sám

 **Poznámka:** Rozsah vyšetrenia sa určuje individuálne s ohľadom na anamnézu, kliniku a možnosti pacienta.

Dr.Erkin