

STRATÉGIA REHABILITÁCIE

Meno a priezvisko pacienta:

Kód pacienta:

Dátum:

Miesto realizácie:

1. Východisková klinická a funkčná evaluácia

Cieľ: Stanoviť základnú úroveň zdravia, funkčnosti a potrieb pacienta pre vypracovanie personalizovaného plánu v súlade s ICF (WHO).

• Diagnóza (MKN-10 + stručný opis):

- Primárna diagnóza: [napr. G81.0 — Hemiplégia po ischemickej cievnej mozgovej príhode, pravostranná slabosť].
- Stručný opis: [napr. Cievna mozgová príhoda v povodí strednej mozgovej tepny, 2 mesiace dozadu, afázia, obmedzenie pohyblivosti].

• Súčasné ochorenia:

- [napr. E11.2 — Diabetes mellitus 2. typu, I10 — Arteriálna hypertenzia].
- Zohľadnenie komorbidít: [napr. Kontrola glukózy a tlaku pre bezpečnú rehabilitáciu].

• Hlavné sťažnosti pacienta (podľa VAS stupnice, ak je to vhodné - vizuálno-analógová stupnica bolesti):

- [napr. Bolesť v pravom ramene (6/10), ťažkosti s chôdzou, problémy s rečou].
- Subjektívne priority: [napr. Želanie samostatne sa pohybovať a komunikovať s rodinou].

• Počiatočný funkčný stav podľa ICF (WHO):

- Pohyb: [napr. b730 — Obmedzenie svalovej sily v pravej ruke/nohe, úroveň 3 (mierny)].
- Reč: [napr. b167 — Narušenie expresívnej reči, úroveň 4 (ťažký)].
- Kognícia: [napr. b164 — Mierne narušenie pamäti, úroveň 1].
- Sebaobsluha: [napr. d510 — Ťažkosti s obliekaním, úroveň 3].

• Emocionálny stav a motivácia:

- Hodnotenie podľa stupnice HADS: [napr. Úzkosť 8/21, depresia 10/21].
- Motivácia: [napr. Vysoká — snaha o nezávislosť].
- Psychosociálny kontext: [napr. Podpora rodiny, ale finančné obmedzenia].

2. Rizikové faktory a bezpečnosť

Cieľ: Minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť procedúr.

- **Kontraindikácie k metódam:**

- Absolútne: [napr. Aktívna infekcia pre hydroterapiu v termálnych vodách Piešťany].
- Relatívne: [napr. Nestabilná angina pectoris pre intenzívne fyzické zaťaženie].

- **Plán riadenia rizík:**

- Kardiomonitoring počas LTV (pulz, tlak).
 - Protokol núdzových situácií: [napr. Okamžité zastavenie procedúry pri závratí].
 - Kritériá na zastavenie procedúr: [napr. Zvýšenie CRP > 10 mg/l, zvýšenie bolesti > 8/10 podľa VAS].
-

3. Rehabilitačná prognóza

Cieľ: Posúdiť potenciál obnovy so zohľadnením biomedicínskych, sociálnych a behaviorálnych faktorov.

- **Potenciál obnovy:**

- [Vysoký / Mierny / Obmedzený].
- Zdôvodnenie: [napr. Včasné začatie rehabilitácie, mladý vek, absencia kognitívnych porúch].

- **Obmedzujúce faktory:**

- Biomedicínske: [napr. Spasticita, riziko kontraktúr].
- Sociálne: [napr. Obmedzený prístup k doprave v Piešťanoch].
- Behaviorálne: [napr. Nízka adherencia k domácim cvičeniam].

- **Motivačné zdroje:**

- [napr. Želanie vrátiť sa do práce, podpora rodiny].
 - Úloha rodiny: [napr. Vzdelávanie príbuzných v starostlivosti].
-

4. Ciele rehabilitácie (podľa SMART: konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo obmedzené)

Krátkodobé (1–4 týždne): • [napr. Znížiť bolesť v ramene z 6/10 na 3/10]. • [napr. Zvýšiť ROM v lakťovom kĺbe o 15°]. • [napr. Vyslovovať 10 slov s jasnou artikuláciou].

Strednodobé (1–3 mesiace): • [napr. Chodiť s palicou 50 m bez pomoci]. • [napr. Samostatne sa obliekať s minimálnou podporou]. • [napr. Skladať jednoduché vety na komunikáciu].

Dlhodobé (3–12 mesiacov): • [napr. Vrátiť sa k čiastočnému zamestnaniu (RTW-protokol)]. • [napr. Dosiahnuť Barthel Index $\geq$ 80]. • [napr. Účasť na rodinných podujatiach bez obmedzení].

5. Plán intervencií podľa oblastí

Cieľ: Integrovať dôkazové metódy, miestne zdroje a inovácie.

Oblasť	Hlavné opatrenia	Frekvencia / Trvanie
Lekárska podpora		
Farmakologická podpora		
Fyzikálna terapia	LTV (cvičenia na silu, rovnováhu), hydrokinezioterapia v termálnych vodách Piešťany, robotizované trenažéry (Lokomat), biofeedback systémy.	5x/týždeň, 60 min/sedenie, 4–8 týždňov.
Ergoterapia	Tréning domáчих zručností (obliekanie, príprava jedla), adaptívne nástroje (lyžica so zhrubnutou rukoväťou), obnova jemnej motoriky.	3x/týždeň, 45 min/sedenie, 6 týždňov.
Logopédia a kognitívny tréning	Cvičenia na artikuláciu, obnova reči, kognitívny tréning (CogniFit, tDCS pre neurostimuláciu).	4x/týždeň, 30–45 min/sedenie, 8 týždňov.
Psychologická podpora	KBT pre prácu s úzkosťou, arteterapia, motivačné poradenstvo, rodinná terapia.	1–2x/týždeň, 60 min/sedenie, 12 týždňov.
Technologické inovácie	VR pre tréning rovnováhy, nositeľné zariadenia (Fitbit pre monitoring aktivity), telerehabilitácia (Zoom, aplikácia Neurorehabilitation), AI-analýza pohybových vzorov, exoskelety.	Podľa indikácií, 2–3x/týždeň, 30–60 min/sedenie.
Sociálna podpora	Vzdelávanie rodiny v starostlivosti, úprava domácnosti (rampy, madlá), zapojenie do komunít Piešťany (skupiny podpory).	1x/2 týždne, konzultácie 60 min.

Vzájomné pôsobenie liekov s rehabilitáciou: • [napr. Užívanie baklofenu 1 hodinu pred LTV na zníženie spasticity]. • [napr. Monitoring vplyvu antidepresív na motiváciu].

6. Biomarkery a laboratórny monitoring

Cieľ: Zabezpečiť objektívnu kontrolu stavu a personalizáciu terapie.

7. Etapovitosť obnovy

Cieľ: Zabezpečiť postupnú obnovu s kontinuitou medzi úrovňami starostlivosti.

Etapa	Miesto / Podmienky	Cieľ etapy	Plánované trvanie
Akútna		Stabilizácia, prevencia komplikácií (preležaniny, trombózy).	1–2 týždne.
Subakútna		Aktívna obnova funkcií (pohyb, reč).	4–12 týždňov.
Rekonvalescenčná		Upevnenie zručností, zvýšenie nezávislosti.	3–6 mesiacov.
Udržovacia	Domov / telerehabilitácia	Prevenca regresu, udržanie kvality života (EQ-5D $\geq$ 0.8).	6–12 mesiacov a ďalej.

8. Kritériá a stupnice hodnotenia účinnosti

Cieľ: Objektívne zmerať pokrok a kvalitu života.

• **Funkčné stupnice:**

- Barthel Index: [napr. 40/100 → Cieľ: 80/100].
- FIM: [napr. 60/126 → Cieľ: 100/126].
- Berg Balance Scale: [napr. 20/56 → Cieľ: 40/56].

• **Kvalita života:**

- EQ-5D: [napr. 0.5 → Cieľ: 0.8].
- SF-36: [napr. Fyzický komponent 30 → Cieľ: 50].
- Rodinné dotazníky: [napr. Zarit Burden Interview pre hodnotenie záťaže rodiny].

• **Špecifické stupnice:**

- [napr. MMSE pre kognitívne funkcie: 22/30 → 26/30].
- [napr. Ashworth Scale pre spasticitu: 3 → 1].

• **Subjektívne ukazovatele:** [napr. CSQ-8 pre spokojnosť, zníženie bolesti podľa VAS].

Sociálna reintegrácia: • RTW-protokoly: [napr. Čiastočný návrat do práce po 6 mesiacoch]. • Úprava pracoviska: [napr. Ergonomická stolička]. • Hobby a voľný čas.

9. Telerehabilitácia

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť pre pacientov s obmedzenou mobilitou alebo z iných krajín.

• **Technické zabezpečenie:**

- Internet: minimálne 10 Mbit/s, stabilné pripojenie.
- Vybavenie: smartphone/tablet, aplikácia Neurorehabilitation, Fitbit.
- Školenie: inštrukcia pacienta a rodiny (video, PDF).

• **Protokoly diaľkového sledovania:**

- Videokonzultácie: 30 min.
 - Monitoring: denné nahrávanie údajov (pulz, kroky).
 - Núdzová komunikácia: horúca linka.
-

12. Osobitné úvahy

Cieľ: Zohľadniť individuálne a kultúrne aspekty.

• **Sociálny kontext / podpora:**

- [napr. Pacient žije s rodinou, aktívna podpora].
- [napr. Účasť v skupinách podpory].

• **Kultúrna adaptácia:**

- Náboženské osobitosti: [napr. Zohľadnenie času modlitieb pre arabských pacientov].
- Dietetické obmedzenia: [napr. Halal diéta].
- Rodové preferencie: [napr. Ženská fyzioterapeutka].
- Jazykové bariéry: prispôbené materiály.

• **Osobitné želania pacienta:**

- [napr. Využívanie termálnych kúpeľov na relaxáciu].
-

Meno: Dr. Erkin

Telefón / Email: +421 940 270 511