

# ISIMA - Théorie Des Jeux

## TP1 de Théorie Des Jeux

Decembre 2025

Erkin Tunc BOYA

### 1 Ex1

Il y a deux joueurs  $A$  et  $B$ . Chacun possède trois jetons : un rouge, un blanc et un bleu. C'est un jeu à deux joueurs, à somme nulle : si la valeur est  $> 0$ , c'est un gain pour  $A$  et une perte du même montant pour  $B$ , et réciproquement. Pour chaque issue, la somme des gains des deux joueurs est donc toujours égale à 0. Pour commencer, les joueurs sélectionnent chacun un de leurs jetons et les exhibent simultanément.

Ils déterminent alors leur gain :

Lien entre couleurs	gain
rouge bat blanc	50
blanc bat bleu	40
bleu bat rouge	30
même couleur	0

#### 1.1 Modélisation du jeu

On considère les stratégies pures suivantes pour chaque joueur (ordre dans lequel il utilise ses jetons) :

##### 1.1.1 Les stratégies

- 1 = (rouge, blanc, bleu)
- 2 = (rouge, bleu, blanc)
- 3 = (blanc, rouge, bleu)
- 4 = (blanc, bleu, rouge)
- 5 = (bleu, rouge, blanc)
- 6 = (bleu, blanc, rouge)

La matrice de gains (pour le joueur  $A$ ) est alors :

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	120	-120	0
2	0	0	120	0	0	-120
3	0	-120	0	0	0	120
4	-120	0	0	0	120	0
5	120	0	0	-120	0	0
6	0	120	-120	0	0	0

Exemple : case  $i = 1, j = 4$ .

La stratégie 1 du joueur  $A$  est (rouge, blanc, bleu), la stratégie 4 du joueur  $B$  est (blanc, bleu, rouge).

- Coup 1 : rouge (A) contre blanc (B)  $\rightarrow$  rouge bat blanc  $\rightarrow +50$ .
  - Coup 2 : blanc (A) contre bleu (B)  $\rightarrow$  blanc bat bleu  $\rightarrow +40$ .
  - Coup 3 : bleu (A) contre rouge (B)  $\rightarrow$  bleu bat rouge  $\rightarrow +30$ .
- Ainsi, le gain total du joueur A est

$$50 + 40 + 30 = 120,$$

d'où  $a_{1,4} = 120$ .

## 1.2 Stratégie pure

On calcule d'abord les bornes classiques :

$$V^- = \max_i \min_j a_{ij}, \quad V^+ = \min_j \max_i a_{ij}.$$

Pour chaque stratégie pure  $i$  de  $A$ , le joueur  $B$  peut toujours choisir une colonne qui donne à  $A$  une perte de  $-120$ . Ainsi, pour chaque ligne  $i$ , on a

$$\min_j a_{ij} = -120.$$

On en déduit :

$$V^- = \max_i \min_j a_{ij} = -120.$$

De même, pour chaque stratégie pure  $j$  de  $B$ , le joueur  $A$  peut choisir une ligne qui lui garantit un gain de 120. Par conséquent,

$$\max_i a_{ij} = 120 \quad \text{pour chaque colonne } j.$$

D'où :

$$V^+ = \min_j \max_i a_{ij} = 120.$$

Ainsi,

$$V^- \neq V^+ \quad \Rightarrow \quad \text{pas de point selle et pas de solution en stratégies pures.}$$

## 1.3 Stratégies mixtes

Une stratégie mixte est un vecteur de probabilités.

Pour le joueur A :

$$X = (x_1, \dots, x_6), \quad x_i \geq 0 \text{ pour tout } i = 1, \dots, 6, \quad \sum_{i=1}^6 x_i = 1.$$

Pour le joueur B :

$$Y = (y_1, \dots, y_6), \quad y_j \geq 0 \text{ pour tout } j = 1, \dots, 6, \quad \sum_{j=1}^6 y_j = 1.$$

Dans notre modélisation, il n'existe pas de point selle puisque

$$V^- \neq V^+.$$

Nous cherchons donc des stratégies mixtes  $X^*$  et  $Y^*$  telles que l'espérance de gain du joueur A soit maximisée et celle de B minimisée.

**Programme du joueur A (maximiseur, en ligne).** On cherche une stratégie mixte

$$X = (x_1, \dots, x_6)$$

et une valeur garantie  $g$ . Pour que  $X$  soit acceptable pour le joueur A, il faut que, contre chaque stratégie pure  $j$  du joueur B, l'espérance de gain de A soit au moins égale à  $g$  :

$$E(X, j) = \sum_{i=1}^6 a_{ij}x_i \geq g.$$

En utilisant successivement les colonnes de la matrice de gains, on obtient les six contraintes suivantes :

$$\begin{cases} -120x_4 + 120x_5 \geq g, \\ -120x_3 + 120x_6 \geq g, \\ 120x_2 - 120x_6 \geq g, \\ 120x_1 - 120x_5 \geq g, \\ -120x_1 + 120x_4 \geq g, \\ -120x_2 + 120x_3 \geq g, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, 6. \end{cases}$$

L'objectif du joueur A est

$$\max g$$

sous ces contraintes.

La résolution (par exemple via OPL) donne :

$$g^* = 0, \quad x_1^* = x_4^* = x_5^* = \frac{1}{3}, \quad x_2^* = x_3^* = x_6^* = 0.$$

Ainsi, la stratégie optimale du joueur A est

$$x^* = \left( \frac{1}{3}, 0, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0 \right)^T, \quad v = g^* = 0.$$

**Vérification.** Pour cette stratégie  $X^*$ , on vérifie que, pour chaque colonne  $j$ ,

$$E(X^*, j) = 0 = g^*.$$

Chaque contrainte est donc satisfaite ou saturée, ce qui confirme que  $X^*$  est optimale.

**Programme du joueur B (minimiseur, en colonne).** Le joueur B cherche une stratégie mixte

$$Y = (y_1, \dots, y_6)$$

et une valeur  $h$  telles que, pour chaque stratégie pure  $i$  de A, l'espérance de gain de A ne dépasse pas  $h$  :

$$E(i, Y) = \sum_{j=1}^6 a_{ij}y_j \leq h.$$

En utilisant les lignes de la matrice de gains, on obtient les six contraintes :

$$\begin{cases} 120 y_4 - 120 y_5 \leq h, \\ 120 y_3 - 120 y_6 \leq h, \\ -120 y_2 + 120 y_6 \leq h, \\ -120 y_1 + 120 y_5 \leq h, \\ 120 y_1 - 120 y_4 \leq h, \\ 120 y_2 - 120 y_3 \leq h, \\ y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 = 1, \\ y_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, 6. \end{cases}$$

L'objectif du joueur B est :

$$\min h.$$

En résolvant ce programme linéaire, on obtient :

$$h^* = 0.$$

Une solution optimale pour le joueur B est :

$$y_1^* = y_4^* = y_5^* = \frac{1}{3}, \quad y_2^* = y_3^* = y_6^* = 0.$$

**Justification.** On vérifie que, pour chaque ligne  $i$ ,

$$E(i, Y^*) = 0 = h^*.$$

Toutes les contraintes sont satisfaites ou saturées, ce qui confirme que  $Y^*$  est optimale. De plus, la matrice du jeu est antisymétrique (chaque gain non nul apparaît avec son opposé), ce qui explique que les stratégies optimales de  $A$  et  $B$  coïncident.

**Question (c).** Dans l'énoncé, on suppose que le joueur maximisateur utilise aussi souvent les trois combinaisons suivantes :

- (i) Bleu – Rouge – Blanc,
- (ii) Blanc – Bleu – Rouge,
- (iii) Rouge – Blanc – Bleu.

Dans notre numérotation des stratégies pures, ces combinaisons correspondent respectivement aux stratégies 5, 4 et 1. Ainsi, jouer chacune de ces trois stratégies avec probabilité  $1/3$  revient à jouer la stratégie mixte :

$$X = \left( \frac{1}{3}, 0, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0 \right).$$

Or, cette stratégie est exactement la solution optimale obtenue dans le programme linéaire du joueur A :

$$x_1^* = x_4^* = x_5^* = \frac{1}{3}, \quad x_2^* = x_3^* = x_6^* = 0.$$

De plus, pour cette stratégie, l'espérance de gain contre chacune des stratégies pures du joueur B vaut :

$$E(X, j) = 0, \quad \forall j = 1, \dots, 6.$$

C'est donc bien la meilleure valeur que le joueur A peut garantir, c'est-à-dire

$$v = 0.$$

Ainsi, le fait de jouer les trois combinaisons proposées avec la même fréquence assure au joueur A un gain espéré maximal, égal à la valeur du jeu.

## 2 Ex2 Jeu de Domino

Le joueur  $X$  choisit une configuration de dominos parmi les 7 possibles sur une grille  $2 \times 3$  (cases blanches). Le joueur  $Y$  choisit simultanément une case parmi les 6 cases de la grille.

Si la configuration choisie par  $X$  recouvre la case annoncée par  $Y$ , alors  $Y$  gagne ; sinon, c'est  $X$  qui gagne.

C'est un jeu à somme nulle : si la valeur est  $> 0$ , c'est un gain pour  $X$  et une perte du même montant pour  $Y$ , et réciproquement. On code par exemple :

$$\text{gain de } X = \begin{cases} +1 & \text{si } X \text{ gagne,} \\ -1 & \text{si } Y \text{ gagne.} \end{cases}$$

### 2.1 Modélisation

Il y a 7 configurations différentes possibles pour  $X$ , donc 7 lignes dans la matrice de jeu. Les 6 colonnes correspondent aux 6 cases que le joueur  $Y$  peut annoncer (numérotées de 1 à 6).

Pour chaque configuration  $i$  et chaque case  $j$ , on définit le gain de  $X$  par

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si la configuration } i \text{ recouvre la case } j, \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cela conduit à la matrice de gains suivante (pour le joueur  $X$ ) :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

### 2.2 Stratégie pure

On calcule d'abord les bornes classiques :

$$V^- = \max_i \min_j a_{ij}, \quad V^+ = \min_j \max_i a_{ij}.$$

Pour chaque ligne du joueur  $X$ , on remarque que la configuration choisie ne recouvre pas au moins une case proposée par  $Y$ , ce qui donne toujours une issue défavorable de  $-1$ . Ainsi :

$$\min_j a_{ij} = -1 \quad \text{pour chaque } i = 1, \dots, 7.$$

D'où :

$$V^- = \max(-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1) = -1.$$

De même, pour chaque colonne  $j$ , il existe toujours au moins une configuration de  $X$  qui recouvre cette case, ce qui donne un gain de  $+1$ . Autrement dit :

$$\max_i a_{ij} = 1 \quad \text{pour chaque } j = 1, \dots, 6.$$

On en déduit :

$$V^+ = \min(1, 1, 1, 1, 1, 1) = 1.$$

On a donc :

$$V^- \neq V^+ \quad \Rightarrow \quad \text{pas de point selle et pas de solution en stratégies pures.}$$

### 2.3 Stratégies mixtes et résolution du jeu

Comme il n'existe pas de point selle en stratégies pures, on étudie le jeu en stratégies mixtes. Le joueur  $X$  choisit une distribution

$$X = (x_1, \dots, x_7), \quad x_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^7 x_i = 1,$$

et le joueur  $Y$  choisit

$$Y = (y_1, \dots, y_6), \quad y_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^6 y_j = 1.$$

L'espérance de gain pour  $X$  est

$$E(X, Y) = XAY^T.$$

Nous cherchons des stratégies mixtes optimales  $X^*$  et  $Y^*$  ainsi que la valeur du jeu  $v$  telles que

$$\max_X \min_Y E(X, Y) = \min_Y \max_X E(X, Y) = v.$$

#### Résolution numérique

En résolvant les programmes linéaires correspondants (par exemple avec OPL), on obtient la valeur du jeu :

$$v = 0.333333333$$

Autrement dit, aucun des deux joueurs ne peut garantir un gain strictement positif en jouant de manière optimale.

Une solution optimale pour le joueur  $X$  est :

$$X^* = \left(0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right).$$

Une solution optimale pour le joueur  $Y$  est :

$$Y^* = \left(0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right).$$

La résolution (par exemple via OPL) donne :

$$g^* = 0.333333333, \quad x_2^* = x_4^* = x_6^* = \frac{1}{3}, \quad x_1^* = x_3^* = x_5^* = 0.$$

#### Interprétation

Les deux joueurs n'utilisent pas toutes leurs stratégies de manière uniforme. Chacun joue uniquement les stratégies du support optimal  $\{2, 4, 6\}$  avec probabilité  $1/3$  chacune.

La résolution numérique donne la valeur du jeu :

$$v = \frac{1}{3}.$$

Comme  $v > 0$ , le jeu avantage le joueur  $X$  : il peut garantir une espérance de gain de  $1/3$  contre toute stratégie du joueur  $Y$ , tandis que  $Y$  ne peut pas réduire cette espérance en dessous de  $1/3$ .

Les stratégies mixtes optimales sont :

$$X^* = \left(0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right), \quad Y^* = \left(0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right).$$

Ces stratégies constituent un point selle en stratégies mixtes, et la valeur du jeu est  $v = \frac{1}{3}$ .

### Exercice 3

#### a) Les 3 stratégies possibles pour chaque entreprise

1. **Simultané (S)** : L'entreprise améliore les deux produits en même temps. Les deux seront prêts au bout de 12 mois.
2. **Produit 1 puis produit 2 (P12)** : L'entreprise commence par améliorer le produit 1 qui sort au bout de 9 ou 10 mois, puis le produit 2 **9 mois après le premier**.
3. **Produit 2 puis produit 1 (P21)** : L'entreprise commence par améliorer le produit 2 qui sort au bout de 9 ou 10 mois, puis le produit 1 **9 mois après le premier**.

#### b) Matrices des gains par produit

En utilisant les règles de l'énoncé :

- Gain de 8 % si A et B sortent simultanément.
- Gain de 20, 30, 40 % si A est en avance de 2, 6 ou 8 mois.
- Perte de 4, 10, 12, 14 % si B est en avance de 1, 3, 7 ou 10 mois.

On peut alors construire les deux matrices de gains pour l'entreprise A, une pour chaque produit, en fonction des stratégies choisies par A et B (S, P12, P21).

##### Produit 1 – Gains de A

Stratégie A \ Stratégie B	S	P12	P21
S	0,08	0,20	0,30
P12	0,20	-0,04	0,40
P21	-0,12	-0,14	-0,04

TABLE 1 – Matrice des gains de l'entreprise A pour le Produit 1

##### Produit 2 – Gains de A

Stratégie A \ Stratégie B	S	P12	P21
S	0,08	0,30	-0,10
P12	-0,12	-0,04	-0,14
P21	0,20	0,40	-0,04

TABLE 2 – Matrice des gains de l'entreprise A pour le Produit 2

En s'appuyant sur l'énoncé : Pour chaque type de produit, si les deux entreprises proposent leur modèle amélioré simultanément, A augmente son offre des ventes totales futures dans ce produit de 8% (c'est-à-dire que sa part passe de 25% à 33%). De la même manière, A augmente son offre de 20, 30 et 40% du total si le produit est disponible respectivement 2, 6 et 8 mois plus tôt que B. D'autre part, A perd 4, 10, 12 et 14% du total si B propose le produit respectivement 1, 3, 7 et 10 mois plus tôt.

On a donc deux entreprises, A et B, qui se partagent le marché.

Si l'entreprise A gagne une part, B la perd exactement et inversement.

Stratégie A \ Stratégie B	S	12	21
S	$0,08 \cdot Q_1 + 0,08 \cdot Q_2$	$-0,10 \cdot Q_1 + 0,30 \cdot Q_2$	$0,30 \cdot Q_1 - 0,10 \cdot Q_2$
12	$0,20 \cdot Q_1 - 0,12 \cdot Q_2$	$-0,04 \cdot (Q_1 + Q_2)$	$0,40 \cdot Q_1 - 0,14 \cdot Q_2$
21	$-0,12 \cdot Q_1 + 0,20 \cdot Q_2$	$-0,14 \cdot Q_1 + 0,40 \cdot Q_2$	$-0,04 \cdot (Q_1 + Q_2)$

### d) Existence d'un point selle

Pour savoir si une stratégie stable existe pour A et B, on cherche un **point selle**. Un point selle correspond à une situation où aucun joueur ne peut améliorer son gain en changeant de stratégie, tant que l'autre reste sur la sienne.

#### Cas 1 : $Q_1 = Q_2 = x$

Si les deux produits ont la même quantité, on remplace  $Q_1$  et  $Q_2$  par  $x$  dans la matrice des gains de l'entreprise A :

Stratégie A \ Stratégie B	S	12	21
S	0,16x	0,20x	0,20x
12	0,08x	-0,08x	0,26x
21	0,08x	0,26x	-0,08x

TABLE 3 – Matrice des gains de l'entreprise A pour  $Q_1 = Q_2 = x$

Les bornes du jeu sont :

$$V^+ = \min_j \max_i a_{ij} = 0,16x, \quad V^- = \max_i \min_j a_{ij} = 0,16x$$

Comme  $V^+ = V^-$ , il existe un **point selle**. La stratégie stable est que **les deux entreprises choisissent S (simultané)**.

#### Cas 2 : $Q_1 = Q_2/2 = x$

Si le produit 1 représente la moitié du produit 2, on remplace  $Q_1 = x$  et  $Q_2 = 2x$ . La matrice devient :

Stratégie A \ Stratégie B	S	12	21
S	0,12x	0,05x	0,25x
12	0,14x	-0,06x	0,33x
21	-0,02x	0,06x	-0,06x

TABLE 4 – Matrice des gains de l'entreprise A pour  $Q_1 = Q_2/2 = x$

Calcul des bornes :

$$V^+ = \min_j \max_i a_{ij} = 0,06x, \quad V^- = \max_i \min_j a_{ij} = 0,05x$$

Ici  $V^+ \neq V^-$ , donc **il n'existe pas de point selle**. Aucune stratégie pure n'est stable dans ce cas.