

1.

Лямбда-выражения называются альфа-эквивалентными, если их можно альфа-преобразовать (изменить имена связанных переменных) в одно выражение. В предложенных примерах:

1.  $\lambda xy.xz [x := m, y := n] = \lambda mn.mz$  (вариант  $b$ )
2.  $\lambda xy.xxy [x := a, y := b] = \lambda a(\lambda b).aab$  (вариант  $c$ )
3.  $\lambda xyz.zx [x := t, y := o, z := s] = \lambda tos.st$  (вариант  $b$ )

2.

Комбинаторы - замкнутые выражения (не содержащие свободных переменных). Из предложенных в задании вариантов комбинаторами являются:

$\lambda x.xxx$  (вариант 1),  $\lambda xyz.xu(zx)$  (вариант 3),  $\lambda xyz.xu(zxu)$  (вариант 4)

3.

1.  $\lambda x.xxx$

Исходное выражение находится в бета-нормальной форме.

2.  $(\lambda z.zz)(\lambda y.yy) = (\lambda y.yy)(\lambda y.yy)$

Полученное выражение альфа-эквивалентно исходному  $\Rightarrow$  исходное выражение нельзя редуцировать к бета-нормальной форме.

3.  $(\lambda x.xxx)z = zzz$

К полученному выражению нельзя применить бета-редукцию  $\Rightarrow$  оно в бета-нормальной форме.

4.

1.  $(\lambda abc.cba)zz(\lambda wv.v) = (\lambda wv.v)zz = z$
2.  $(\lambda xy.xyy)(\lambda a.a)b = (\lambda a.a)bb = bb$
3.  $(\lambda y.y)(\lambda x.xx)(\lambda z.zq) = (\lambda x.xx)(\lambda z.zq) = (\lambda z.zq)(\lambda z.zq) = (\lambda z.zq)q = qq$
4.  $(\lambda z.z)(\lambda z.zz)(\lambda z.zy) = (\lambda z.z)[z := y](\lambda z.zz)[z := x](\lambda z.zy) = (\lambda z.zy)(\lambda z.zy)$  (см. 3) =  $yy$
5.  $(\lambda xy.xyy)(\lambda y.y)[y := z]y = (\lambda z.z)yy = yy$
6.  $(\lambda a.aa)(\lambda b.ba)c = (\lambda b.ba)(\lambda b.ba)c = (\lambda b.ba)ac = aac$
7.  $(\lambda xyz.xz(yz))[z := m](\lambda x.z)[x := k](\lambda x.a) = \lambda m.(\lambda k.z)m((\lambda x.a)m) = \lambda m.za$