

Glossary

Глоссарий

1. Introduction (Введение)

Данный документ содержит определения терминов, используемых в проектной документации системы управления клиникой Sleeving (SCMS). Глоссарий предназначен для обеспечения единого понимания терминологии всеми участниками проекта: командой разработки, тестировщиками, заказчиком и аудиторами.

1.1 Purpose (Назначение)

Назначение документа — предоставить централизованный справочник терминов, аббревиатур и определений, используемых во всех документах проекта SCMS (Vision, SRS, SDP, SAD, TestPlan, RiskList).

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к проекту разработки корпоративной информационной системы для элитной клиники переноса сознания в Бей-Сити (2384 год). Используется всеми участниками проекта: разработчиками, тестировщиками, аналитиками, менеджерами и заказчиком.

1.3 References (Ссылки)

- Ричард Морган, «Видоизменённый углерод» — литературный источник концепции.
- Документ «Vision (Концепция)» проекта SCMS.
- Документ «SRS (Спецификация требований)» проекта SCMS.

1.4 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 содержит определения терминов, сгруппированных по категориям: термины предметной области (Мир Видоизменённого углерода), роли и пользователи, технические термины.

2. Definitions (Определения)

2.1 Термины предметной области

2.1.1 Cortical Stack (Кортикальный стек)

Устройство размером с монету, имплантируемое в затылок. Хранит сознание на квантовом уровне. Является единственным носителем цифровой личности человека. При физической смерти тела стек может быть извлечён и перенесён в новое тело (sleeve).

2.1.2 DHF (Digital Human Freight)

Цифровые данные человеческого сознания, хранящиеся в кортикальном стеке. DHF включает полную квантовую запись личности, воспоминаний и нейронных связей. Передача DHF осуществляется через процедуру needlecast.

2.1.3 Meth

Сверхбогатый клиент клиники (от «Мафусаил» — библейский долгожитель). Владелец множества стеков и тел, способный жить сотни лет путём смены sleeves. Бюджет процедуры: 2–50 миллионов кредитов.

2.1.4 Needlecast (Нидлкаст)

Процесс передачи DHF из кортикального стека в нейроны нового тела. Выполняется поэтапно: моторика → сенсорика → вегетативные функции → сознание. Длительность: 4–6 часов. Критическая процедура, требующая 100% целостности данных.

2.1.5 Sleeve (Слив)

Клонированное или подобранное тело для переноса сознания. Может быть выращено из ДНК заказчика или подобрано из генетических архивов по параметрам (рост, вес, пол, возраст, физический тип). Культивирование длится 4–8 месяцев.

2.1.6 Sleevng

Общий термин для процедуры переноса сознания из одного тела в другое. Включает: подбор тела, извлечение стека, needlecast, пост-трансферную валидацию и сертификацию.

2.1.7 Stack Shock

Психосоматический шок, возникающий после переноса сознания в новое тело. Симптомы: фрагментация личности, диссонанс восприятия, отторжение физиологии. Диагностируется Psychosurgeon в течение 72-часовой валидации.

2.1.8 Бей-Сити

Место действия проекта — мегаполис 2384 года, где расположена элитная клиника sleevng. Манипуляции с DHF строго регулируются законодательством, но Meths имеют особый статус благодаря своему положению в обществе.

2.1.9 Протекторат

Внешний надзорный орган Бей-Сити, контролирующий соблюдение законодательства в сфере манипуляций с сознанием и DHF. Проводит аудит клиник, требует сертифицированные отчёты о процедурах переноса.

2.1.10 Генетические архивы

Внешние базы данных клонированных тел. Поставщики sleeves для клиники. Работают по контракту с предоплатой 30% за культивирование тела.

2.1.11 Сертификация совместимости

Процедура подтверждения успешности переноса сознания, выполняемая Psychosurgeon по завершении 72-часовой валидации. Результат — сертификат в формате PDF с реквизитами клиники, ID клиента, датами процедур и QR-кодом для проверки подлинности Протекторатом. Сертификат является юридически значимым документом, подтверждающим легальность и успешность процедуры sleevng.

2.2 Роли и пользователи

2.2.1 Sleeve Broker

Сотрудник клиники, специализирующийся на подборе и подготовке тел. Обязанности: поиск клонов в генетических архивах, проверка генетической чистоты, резервирование sleeve за клиентом, ведение медицинской истории тел.

2.2.2 Needlecaster

Технический специалист клиники, выполняющий физический перенос стека. Обязанности: извлечение стека, проверка квантовой целостности DHF, проведение needlecast, мониторинг параметров в реальном времени.

2.2.3 Psychosurgeon

Врач клиники, специализирующийся на психосоматической совместимости. Обязанности: 72-часовое наблюдение после переноса, диагностика stack shock, сертификация совместимости, блокировка выпуска клиента при осложнениях.

2.2.4 Администратор

Сотрудник с полным доступом к системе. Обязанности: управление учётными записями и ролями, просмотр аудит-логов, онбординг новых клиентов, управление контрактами и оплатами, генерация отчётов.

2.2.5 NDA (Non-Disclosure Agreement)

Соглашение о неразглашении, подписываемое Meth перед началом работы с клиникой. Обеспечивает полную конфиденциальность данных клиента.

2.3 Технические термины

2.3.1 FR (Functional Requirement)

Функциональное требование — описание конкретной функции, которую система должна выполнять. В документации SRS каждое требование имеет уникальный идентификатор вида FR-XXX-YY.

2.3.2 RBAC (Role-Based Access Control)

Ролевая модель разграничения доступа. Определяет набор разрешений для каждой роли: Meth (только свои данные), Sleeve Broker (каталог тел, резервирование), Needlecaster (стек, процедуры), Psychosurgeon (медицинские данные, сертификация), Администратор (полный доступ).

2.3.3 SCMS (Sleeving Clinic Management System)

Разрабатываемая корпоративная информационная система управления клиникой sleeving. Включает внешний портал для Meth и внутренний портал для персонала.

2.3.4 Audit Log (Аудит-лог)

Неизменяемый журнал всех операций в системе. Фиксирует: дату/время, пользователя, действие, сущность, IP-адрес. Доступен только администратору. Используется для расследования инцидентов и аудита Протекторатом.

2.3.5 Квантовое шифрование

Метод защиты данных DHF с использованием квантовых алгоритмов. Применяется при хранении и передаче данных сознания.

2.3.6 2FA (Two-Factor Authentication)

Двухфакторная аутентификация — метод входа в систему, требующий двух независимых подтверждений личности: логин/пароль + биометрический ключ. Используется для доступа Meth к личному кабинету.

2.3.7 MTTR (Mean Time To Recovery)

Среднее время восстановления системы после сбоя. Для SCMS целевой показатель: не более 15 минут.

2.3.8 Uptime

Показатель доступности системы. Для SCMS: 95% в рабочее время клиники (допустимый downtime 18 суток/год для планового обслуживания).