

Teste de Análise Matemática III/Cálculo Diferencial e Integral III

10 Novembro 2018 - duração 1h30m

*Indique a sua versão do teste na folha de rosto do caderno de exame.
Justifique convenientemente as respostas às questões que não são de escolha múltipla.*

Versão A

1. (a) Resolva o PVI $y' = \frac{3}{t}y + t^4e^{2t} - 4t^2$, $y(1) = 4e^2$, para $t > 0$.
(b) Resolva a EDO $y' = \frac{6(1+y^3)}{ty^2}$ para $t > 0$, indicando os intervalos de definição das soluções.
(c) Encontre a solução geral da EDO $y'' + y = 4\cos^2 t$.
 2. Determine a solução geral do sistema $x' = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -5 & -8 \end{bmatrix} x$.
 3. Para cada uma das questões seguintes, indique sem justificar, qual é a resposta correcta (escreva apenas A,B,C ou opte por não responder):
 - (a) Existe uma solução $y(t)$ da EDO $y'' - 4y' + 5y = 2te^{2t}$ da forma (onde $a, b \in \mathbb{R}$):
A: $y(t) = e^{2t} \cos t + (at + b)e^{2t}$. B: $y(t) = e^{2t} \cos t + ae^{2t} \sin t + be^{2t}$. C: $y(t) = e^{-2t} + t(at + b)e^{2t}$.
 - (b) A mudança de variáveis $u = \frac{y}{t}$ transforma a EDO $2\frac{y}{t}y' - (\frac{y}{t})^2 + 1 = 0$ em:
A: $2uu' = 1 - u^2$. B: $2uu' = (1 - u^2)/t$. C: $2uu' = -(1 + u^2)/t$.
 - (c) As trajectórias $y = y(x)$ ortogonais à família de curvas $y = ce^x$ satisfazem a EDO
A: $y' = -y^{-1}$. B: $y' = -e^{-x}y$. C: $y' = -e^{-x}$.
- (Nota: cada resposta correcta = 0,7 val., cada resposta errada = -0,2 val.)
4. (a) Seja $-1 - \cos(\frac{\pi}{2}x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin(\frac{n\pi}{2}x)$ a série de Fourier de uma função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ seccionalmente contínua e 4-periódica. Calcule:
 - (i) $\int_{-2}^2 g(x) dx$; (ii) o polinómio de Fourier P_3 de ordem 3 de g e a norma quadrática de P_3 em $[-2, 2]$.
- (b) Seja $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ seccionalmente contínua e sejam a_0, a_n, b_n , $n \in \mathbb{N}$, os coeficientes da Fourier de f . Prove que

$$\int_0^\pi (f(x) - f(-x))^2 dx = 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

FIM

Cotações propostas: 4 + 1,9 + 2,1 + 2 (Total: 10 valores)

Série de Fourier de $f \in SC([-L, L])$: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\frac{n\pi}{L}x) + b_n \sin(\frac{n\pi}{L}x)$.

Identidade de Parseval: para $f \in SC([-L, L])$, $\|f\|^2 = \int_{-L}^L f(x)^2 dx = L \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right)$.