

第3章 一元函数微分学的概念

(简单?再看一眼)题目[1]:导数定义与等价无穷小综合代换

设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}$

主要思路:[看到 $f(0)=0$ 意味着可以放在任何地方][看到 $f'(0)$ 就应该考虑导数][$f'(0)$ 可不是0]

[1]按照目的构造:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x) - f(0)}{(1-\cos x) - 0} \cdot \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(0) \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)}$$

[2]等价无穷小代换:

(1) $\ln(1+u) \sim u$:

$$\ln(1-x \sin x) \sim -x \sin x \sim -x^2$$

(2) $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

[3]极限拆分与综合计算:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(1-\cos x) - f(0)}{1-\cos x} \cdot \frac{1-\cos x}{-x^2} \right] = f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{-x^2} = -\frac{1}{2}f'(0)$$

[注]:切勿对抽象函数 $f(1-\cos x)$ 盲目使用洛必达法则, 因为未指明 $f'(x)$ 在0的邻域内连续, 必须严格使用导数定义

(中等)题目[2]:连续但不可导函数乘积的可导性判定模型

设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x=a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则一定有A

(A) $g(a) = 0$

(B) $g(a) \neq 0$

(C) $g'(a) = 0$

(D) $g(a)$ 可以为任意实数

主要思路:[凑定义和条件,尽可能使用条件]or[直接在a处, $g(a) = 0$ 直接把 $\varphi(a)$ 的不可导消了]

[1]用导数定义展开 $F'(a)$:

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a}$$

分母是 $x-a$,需要继续凑出 $x-a$:

$$\frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(x) + g(a)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a} = \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \varphi(x) + g(a) \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}$$

[2]分析出现矛盾:

第一部分极限存在:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \varphi(x) = g'(a) \varphi(a)$$

[已知 $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续]

第二部分极限存在: $\lim_{x \rightarrow a} g(a) \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} = g(a) \varphi'(a)$ [但 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处不可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续]

因此必有 $g(a) = 0$

[核心模型]: 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 若 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处必可导, 且 $f'(a) = \varphi(a)$

(简单?再看一眼) 题目[3]: 利用已知极限反求导数值

设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f'(1)$ 的值为(D)

(A) 2

(B) -2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{2}$

答案: (D)

主要思路: [不能无穷小换元, 只能换元至 $x \rightarrow 1$, 化为导数定义微商形式]

[1] 变量代换: 令 $t = 3 - x$, 当 $x \rightarrow 2$ 时, $t \rightarrow 1$, 即 $x - 1 = (3 - t) - 1 = 1 - (t - 1)$

[2] 等价无穷小化简分子:

当 $t \rightarrow 1$ 时, $t - 1 \rightarrow 0$, 因为 $\ln(1 + u) \sim u$, 所以:

$$\ln(x - 1) = \ln(1 - (t - 1)) \sim -(t - 1)$$

[3] 因为 $f(1) = 0$, 分母直接放一个, 同时凑一个 $f'(1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x - 1)}{f(3 - x)} \sim \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-(t - 1)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{\frac{f(t) - f(1)}{t - 1}} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{f'(1)} = 2$$

, 所以能得到

$$f'(1) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t) - f(1)}{t - 1} = -\frac{1}{2}$$

(简单) 题目[4]: 复合函数微商极限界定

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{4}$

主要思路: [分子是平方, 数值也可以平方, 直接构造]

[1] 注意到 $f^2(0) = (\sqrt{2})^2 = 2$, 故分子为平方差: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - f^2(0)}{x - 0}$

[2] 平方差拆开!:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \cdot [f(x) + f(0)] \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [f'(0) \cdot [f(x) + f(0)]]$$

导数定义!: 由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导必连续, 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \sqrt{2}$

[3]结论:故原极限为:

$$\sqrt{2} \cdot [\sqrt{2} + \sqrt{2}] = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4$$

(简单?再看一眼)题目[5]:利用定义+夹逼定理

设 $f(x) = \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$, $f(0) = 0$, 则 $f'_+(0) = \underline{\quad 1 \quad}$

答案:1

主要思路:[分段点在0处,求原点右导数必须老老实实用导数定义! 看到 x 被夹在区间两项之间,立刻联想到夹逼准则]

[1]由右导数定义列出极限表达式:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

[2]构造极限表达式,然后夹逼定理:

已知自变量区间:

$$\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$$

取倒数翻转不等号:

$$n^2 \leq \frac{1}{x} < (n+1)^2$$

全式同乘以正数 $f(x) = \frac{1}{n^2}$ (凑出微商 $\frac{f(x)}{x}$):

$$\frac{1}{n^2} \cdot n^2 \leq \frac{f(x)}{x} < \frac{1}{n^2} \cdot (n+1)^2$$

两边展开化简, 得到精巧的夹逼区间:

$$1 \leq \frac{f(x)}{x} < \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

[3]夹逼准则取极限:

左侧不等式:

$$1 \leq \frac{f(x)}{x}$$

右侧不等式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = 1$$

根据夹逼定理,得到结论:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$$

(简单?再看一眼)题目[6]:对数复合导数定义的逆向构造

设可导函数 $f(x) > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \underline{\frac{f'(0)}{f(0)}}$

答案: $\frac{f'(0)}{f(0)}$

主要思路:[基于分子,把n放到分母变成1/n][看到 $\ln(A/B)$ 拆成 $\ln A - \ln B$][导数定义]

[1]对数性质拆分与连续化变量代换:

利用对数商的性质 $\ln \frac{A}{B} = \ln A - \ln B$, 并将乘数 n 移至分母变成 $\frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f(\frac{1}{n}) - \ln f(0)}{\frac{1}{n}}$$

换元法:令自变量 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0^+$, 原式转化:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0}$$

[2]识别函数导数定义:

设辅助复合函数 $g(x) = \ln f(x)$, 因为 $f(x) > 0$ 且可导, 所以 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处亦必可导

所以即求:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x}$$

直接计算 $g'(0)$:

$$g'(x) = [\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)} \implies g'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)}$$

(高频核心)题目[7]:绝对值函数在零点处的可导性充要判据

设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 则一定有(B)

(A) $f(0) = 0, f'(0) = 0$

(B) $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$

(C) $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$

(D) $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$

主要思路:[几何法最简单,如果 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ 就会穿过x轴,形成V,从而形成尖点]

(简单?再看一眼)题目[8]:切线方程与切点判定

设函数 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{\ln x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的切线方程为 $\underline{y = 2x - 1}$

答案: $y = 2x - 1$ (或 $2x - y - 1 = 0$)

主要思路:[切线方程:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

,需要

$$f'(1)$$

]分母 $\ln 1 = 0$,极限存在说明分子极限必为0, 结合连续性锁定切点(1,1);分母等价无穷小 $\ln x \sim x-1$ 立刻凑出导数斜率 $k=f'(1)=2$,点斜式收工!]

[1]首先求出点

$$(1, f(1))$$

:

当 $x \rightarrow 1$ 时, 分母 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = \ln 1 = 0$,极限为非0常数,所以分子极限必然为0,所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

$f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 所以函数值等于极限值,得到点(1,1)

[2]求切线斜率 $k = f'(1)$:**[单独写出来看不出任何关系!!是等价无穷小带出来的,原式就是斜率]**

当 $x \rightarrow 1$ 时, $x - 1 \rightarrow 0$, 由等价无穷小公式:

$$\ln x = \ln(1 + (x - 1)) \sim x - 1$$

将分母等价替换, 立刻还原导数定义式:

$$k = f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$$

[3]点斜式写出切线方程:由点斜式公式 $y - y_0 = k(x - x_0)$:

$$y - 1 = 2(x - 1)$$

,即

$$y = 2x - 1$$

(记不住)题目[9]:函数的增量与微分的高阶无穷小本质

设函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = (D)$

(A) $f'(1)$

(B)1

(C) ∞

(D)0

主要思路:[函数增量=微分线性主部+高阶无穷小, 即

$$\Delta y - dy = o(\Delta x)$$

,以及线性主部:

$$df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$$

]

[1]写出一元函数可导与可微的等价定义:**[简单写出来!公式要记住]**

在一元函数中, 可导与可微完全等价。由 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 知其在 $x = 1$ 处必可微。

函数值增量定义为:

$$\Delta f(1) = f(1 + \Delta x) - f(1) = f'(1)\Delta x + o(\Delta x)$$

其中线性主部即为微分:

$$df(1) = f'(1)\Delta x$$

[2]两者相减求差值:

$$\Delta f(1) - df(1) = [f'(1)\Delta x + o(\Delta x)] - f'(1)\Delta x = o(\Delta x)$$

[3]代入极限求值:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

(经典必考,标准流程)题目[10]:分段函数在分界点处的连续、可导与导函数连续性

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 则 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处(D)}$$

(A)不连续

(B)连续,但不可导

(C)可导,但导函数不连续

(D)可导,且导函数连续

主要思路:[分界点三步法:一算极限判连续,二用定义算导数,三对求导公式取极限判导函数连续!][经典振荡模型 $x^\alpha \sin(1/x^\beta)$][第一步不成立后面都不成立,不连续->不可导->导函数不连续]

[1]第一步连续性:

函数在分界点处的取值: $f(0) = 0^2 = 0$

求左极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$$

求右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$, 所以在 $x=0$ 处连续!

[2]第二步导数存在性:

求左导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

求右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

因为 $f'_-(0) = f'_+(0) = 0$, 所以 $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 0$ (函数在 $x=0$ 处可导)!

[3]第三步导函数 $f'(x)$ 在 0 的连续性:

先求分段点外部 ($x \neq 0$) 的导函数解析式:

当 $x < 0$ 时: $f'(x) = (x^2)' = 2x$

当 $x > 0$ 时:

$$f'(x) = (x^3)' \sin \frac{1}{x} + x^3 \left(\sin \frac{1}{x} \right)' = 3x^2 \sin \frac{1}{x} + x^3 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) = 0 - 0 = 0 \text{ [两项均为无穷小乘有界量]}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$ (导函数极限值等于原点导数值), 故导函数在 $x = 0$ 处亦连续!

(高频核心)题目[11]:绝对值函数在零点处的可导性充要判据

设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, $f(x) = \varphi(x)|\ln(1+x)|$, 则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的(A)

(A)充分必要条件

(B)充分非必要条件

(C)必要非充分条件

(D)既非充分又非必要条件

主要思路:[这种题直接看后面函数是否产生尖点,有尖点,那么前面等于0就是充要条件][脱绝对值看看穿没穿 $y=0$]

设 $g(x) = \ln(1+x)$, $g(0) = 0$ 且 $g'(0) = 1 \neq 0$, 因此 $|g(x)| = |\ln(1+x)|$ 在 $x = 0$ 处产生尖点,充要条件秒了

形式化描述:对于 $f(x) = \varphi(x)|g(x)|$, 由导数定义:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)g(x)}{x} = \varphi(0)g'(0) = \varphi(0)$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\varphi(x)g(x)}{x} = -\varphi(0)g'(0) = -\varphi(0)$$

可导充要条件是 $f'_+(0) = f'_-(0) \iff \varphi(0) = -\varphi(0) \iff \varphi(0) = 0$

(简单?再看一眼)题目[12]:凑定义,分步长

设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{2f'(x_0)}$

答案: $2f'(x_0)$

主要思路:[看到后面极限式直接想凑定义][应该就是求两部分极限][难点在于脱离题目构建元定义,然后代入]

[1]分子加减项 $f(x_0)$ 裂项凑定义:

$$\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$$

[2]求第一部分[再次凑定义]:

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 且 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \right]$$

$f(x)$ 在 x_0 处可导, 第一部分趋于 $f'(x_0)$, 后一部分等价无穷小趋于 1:

$$f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$$

[3] 求第二部分极限[再次凑定义, 自变量增量为 $-x_n$]:

标准形式是 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 这里是 $f(x_0) - f(x_0 - x_n)$:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} \cdot \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}}$$

考察前半部分(自变量增量 $-x_n \rightarrow 0$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} = f'(x_0)$$

考察后半部分系数极限(代入 $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = 1$$

故第二部分极限亦为: $f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$

[4] 两项极限合并相加: 原式 $= f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0)$

(简单) 题目[13]: 奇函数原点导数与线性参数拆分

设 $f(x)$ 为在 $x = 0$ 处可导的奇函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{(t-5)f'(0)}$

答案: $(t-5)f'(0)$

奇函数 $f(0) = 0$, 凑它的定义

原式分子两项分别减去 $f(0) = 0$ 并拆成两项:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(tx) - f(0)}{x} - 5 \frac{f(x) - f(0)}{x} \right]$$

第一项自变量增量为 tx , 分母凑一个 t 并乘回 t :

$$\frac{f(tx) - f(0)}{x} = t \cdot \frac{f(tx) - f(0)}{tx}$$

代入求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[t \cdot \frac{f(tx) - f(0)}{tx} - 5 \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x} \right] = tf'(0) - 5f'(0) = (t-5)f'(0)$$

(中等) 题目[14]: 最值函数的分段分界点不可导性分析

设 $f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$, 则 $a = \underline{2}$

答案: 2

主要思路:[解题:导数值不存在,一般就在分段函数的分界点(左右端大小不一致)][可以直接写:画出来有尖点]

[1]求原函数:

令两函数相等:

$$2x = x^2 \implies x^2 - 2x = 0 \implies x(x - 2) = 0$$

在开区间(0, 4)内, 唯一的内部交点为 $x = 2$ 。

分段函数为:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 2 \\ x^2, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

[3]直接讨论 $x = 2$ 处的左右导数(定义法):

$$f(2) = 2^2 = 4$$

左导数(来自 $f(x) = 2x$):

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2(x - 2)}{x - 2} = 2$$

右导数(来自 $f(x) = x^2$):

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 2) = 4$$

因为 $f'_-(2) = 2 \neq 4 = f'_+(2)$, 左右导数不相等, 故 $f'(2)$ 不存在!

(综合大题) 题目[15]:含参数极限函数定义、全域连续性与可导性充要条件

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a, b 的关系

主要思路:[没有思路...但要先求 $f(x)$][连续性/可导性,先列式]

[1]先求 $f(x)$ 就是先求后面这一坨极限:要讨论 $e^{n(x-1)}$:**[注意在此参考系下,x都是常数]**

(1)当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n(x - 1) \rightarrow +\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$

抓大头:同除最高阶无穷大 $e^{n(x-1)}$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + (ax + b)e^{-n(x-1)}}{5e^{-n(x-1)} + 1} = \frac{x^2 + 0}{0 + 1} = x^2$$

(x^2 其实是一个常数)

(2)当 $x = 1$ 时, $x - 1 = 0$, $e^{n(0)} = e^0 = 1$ 恒为常数:

$$f(1) = \frac{1^2 \cdot 1 + a(1) + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

(3)当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n(x - 1) \rightarrow -\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$:

$$f(x) = \frac{x^2 \cdot 0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax + b}{5}$$

综上所述，函数的分段显式表达式为：

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1 \\ \frac{ax+b}{5}, & x < 1 \end{cases}$$

[2]讨论 $f(x)$ 的连续性：

秒之：在 $x \neq 1$ 的区间上， x^2 与 $\frac{ax+b}{5}$ 均为初等函数，恒连续。

唯一的可疑点为分界点 $x = 1$ ，计算左右极限与函数值：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax+b}{5} = \frac{a+b}{5} \end{aligned}$$

$$f(1) = \frac{1+a+b}{6}$$

函数在 $x = 1$ 处连续 $\iff$ 左极限 = 右极限 = 函数值：

$$1 = \frac{a+b}{5} = \frac{1+a+b}{6}$$

解方程：

$$\frac{a+b}{5} = 1 \implies a+b = 5$$

此时 $\frac{1+a+b}{6} = \frac{1+5}{6} = 1$ ，等式完全相融成立。

连续性结论[1]：当 $a+b = 5$ 时， $f(x)$ 在全实数域 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续；

连续性结论[2]：当 $a+b \neq 5$ 时，左极限 $\neq$ 右极限，在 $x = 1$ 处产生跳跃间断点。

[3]讨论 $f(x)$ 的可导性：

因为可导必连续，若 $a+b \neq 5$ ，函数在 $x = 1$ 处不连续，必不可导。

连续的前提 $a+b = 5$ 下，用导数定义检验 $x = 1$ 处的左右导数：

右导数：

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$$

左导数：

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{ax+b}{5} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax + (5-a) - 5}{5(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(x-1)}{5(x-1)} = \frac{a}{5}$$

(代入 $b = 5 - a$)

函数在 $x = 1$ 处可导 $\iff$ 左导数等于右导数：

$$f'_+(1) = f'_-(1) \iff 2 = \frac{a}{5} \implies a = 10$$

代入 $b = 5 - a$ 得到:

$$b = 5 - 10 = -5$$

[4]综合结论清晰汇总:

- (1)当 $a = 10$ 且 $b = -5$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 全实数域上处处可导;
- (2)当 $a + b = 5$ 且 $a \neq 10$ 时, $f(x)$ 在全实数域处处连续, 但在 $x = 1$ 处不可导;
- (3)当 $a + b \neq 5$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 必不可导。

[大题通关要诀]:研究分段极限函数的连续与可导, 永远遵循稳准狠的“四步法”:

- (1)指数敛散性分类写出分段解析式 ->
- (2)三式相等解参数定连续 ->
- (3)连续前提下导数定义算左右导数定可导 ->
- (4)分类结论梳理成清晰条目不丢一分!