

2027

2027 考研数学 (二) 核心讲义

全国硕士研究生招生考试 · 统考数学 (二) 核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

第九章一元积分学的计算

——课后精选练习题与全过程推导——

编著团队: EscoffierZhou

目标院校: 中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律: 手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本: 2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

1	9.Homework	1
1.1	习题 9.1: 积分方程求导与反求不定积分	1
1.2	习题 9.2: 常数设元法求解积分方程	1
1.3	习题 9.3: 变限积分洛必达法则与重要极限	2
1.4	习题 9.4: 原函数与导数乘积的分部积分	2
1.5	习题 9.5: 根式代换消根与反三角分部积分	3
1.6	习题 9.6: 根式代换与反正切反常积分	3
1.7	习题 9.7: 三角代换脱根与正切分部积分	4
1.8	习题 9.8: 分部积分法与换元法双解比较	4
1.9	习题 9.9: 分段函数不定积分常数连续性拼接	5
1.10	习题 9.10: 三角有理式分段换元与奇异点跨越陷阱	6
1.11	习题 9.11: 导数逆运算识别与定积分快速计算	7
1.12	习题 9.12: 区间再现公式标准应用	8
1.13	习题 9.13: 对称区间奇偶拆项与有理换元	8
1.14	习题 9.14: 分段函数定积分计算	9
1.15	习题 9.15: 含绝对值被积函数的变限积分解析式	10
1.16	习题 9.16: 积分方程换元求导与微分方程求解	10
1.17	习题 9.17: 含参绝对值变限积分的导数	11

1 9.Homework

1.1 习题 9.1: 积分方程求导与反求不定积分

若 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 求 $\int \frac{1}{f(x)} dx$ 。

【思路点拨】对已知不定积分两端求导还原被积表达式 $x f(x)$, 解出 $f(x)$ 倒数后凑微分求原函数

分步推导与答题规范

[1] 两边求导解出 $x f(x)$:

对 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$ 两端对 x 求导:

$$x f(x) = (\arcsin x + C)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

[2] 求 $\frac{1}{f(x)}$ 的表达式:

两边取倒数并调整:

$$\frac{1}{f(x)} = x \sqrt{1-x^2}$$

[3] 凑微分计算积分:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{f(x)} dx &= \int x \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int (1-x^2)^{\frac{1}{2}} d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C_1 = -\frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C_1 \end{aligned}$$

1.2 习题 9.2: 常数设元法求解积分方程

若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$ 。

【思路点拨】定积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 是一个常数, 在已知方程两端同时在 $[0, 1]$ 上积分, 建立一元一次线性代数方程直接解出定积分常数

分步推导与答题规范

[1] 等式两端在 $[0, 1]$ 上求积分:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \int_0^1 x^3 dx$$

[2] 分别计算两已知定积分:

$$-\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}; \quad -\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}。$$

[3] 解代数方程:

记 $A = \int_0^1 f(x) dx$, 代入得:

$$A = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}A \implies \frac{3}{4}A = \frac{\pi}{4} \implies A = \frac{\pi}{3}$$

故 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{3}$ 。

1.3 习题 9.3: 变限积分洛必达法则与重要极限

计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_c^x (1 - \frac{1}{t})^t e^{et} dt}{e^{ex}}$ 。

【思路点拨】 极限属于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 应用洛必达法则对分子分母求导, 结合重要极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{t})^t = e^{-1}$ 求解

分步推导与答题规范

[1] 洛必达法则求导:

分子求导: $\frac{d}{dx} \int_c^x (1 - \frac{1}{t})^t e^{et} dt = (1 - \frac{1}{x})^x e^{ex}$ 。

分母求导: $(e^{ex})' = e \cdot e^{ex}$ 。

[2] 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \frac{1}{x})^x e^{ex}}{e \cdot e^{ex}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \frac{1}{x})^x}{e}$$

[3] 代入第二重要极限:

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{x})^x = e^{-1}$:

$$= \frac{e^{-1}}{e} = \frac{1}{e^2}$$

1.4 习题 9.4: 原函数与导数乘积的分部积分

设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 求 $\int x f'(x) dx$ 。

【思路点拨】 被积函数含 $f'(x)$, 运用分部积分法将其转移给 x , 再利用已知原函数关系还原

分步推导与答题规范

[1] 分部积分转换结构:

$$\int x f'(x) dx = \int x d[f(x)] = x f(x) - \int f(x) dx$$

[2] 由已知原函数确定各部分:

已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 故:

$$\int f(x) dx = \ln^2 x + C_1$$

求导得: $f(x) = (\ln^2 x)' = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x}$ 。

[3] 代入化简:

$$x f(x) = x \cdot \frac{2 \ln x}{x} = 2 \ln x$$

代入分部积分式:

$$= 2 \ln x - \ln^2 x + C$$

1.5 习题 9.5: 根式代换消根与反三角分部积分

计算不定积分 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$ 。

【思路点拨】 被积函数中含有 $\sqrt{x}$, 令 $t = \sqrt{x}$ 消除根号, 转化为反三角标准分部积分

分步推导与答题规范

[1] 根式代换消根:

令 $t = \sqrt{x}$ ($t > 0$), 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$ 。

$$\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{\arcsin t}{t} \cdot 2t dt = 2 \int \arcsin t dt$$

[2] 分部积分计算:

$$\begin{aligned} 2 \int \arcsin t dt &= 2t \arcsin t - 2 \int t d(\arcsin t) = 2t \arcsin t - 2 \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= 2t \arcsin t + \int (1-t^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-t^2) = 2t \arcsin t + 2\sqrt{1-t^2} + C \end{aligned}$$

[3] 回代 $t = \sqrt{x}$:

$$= 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + C$$

1.6 习题 9.6: 根式代换与反正切反常积分

计算反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$ 。

【思路点拨】 根号下为线性单项 $x-2$, 令 $t = \sqrt{x-2}$ 消除根式, 换元后转化为标准反正切函数在无穷远处的极限

分步推导与答题规范

[1] 根式换元:

令 $t = \sqrt{x-2}$, 则 $x = t^2 + 2$, $dx = 2t dt$ 。

换元: 当 $x = 2$ 时 $t = 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow +\infty$ 。

分母代换: $(x+7)\sqrt{x-2} = (t^2+2+7)t = (t^2+9)t$ 。

[2] 列出新积分式并求极限:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \int_0^{+\infty} \frac{2t dt}{(t^2+9)t} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2+3^2}$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3} \right]_0^b = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{3}$$

1.7 习题 9.7: 三角代换脱根与正切分部积分

计算不定积分 $\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx$ ($a > 0$)。

【思路点拨】 令 $t = \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}$, 反解出 $x = a \tan^2 t$, 利用三角导数将复杂的反三角积分转化为三角有理式分部积分

分步推导与答题规范

[1] 换元脱壳:

令 $t = \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}$, 则 $\sin t = \sqrt{\frac{x}{a+x}}$ 。

两边平方: $\sin^2 t = \frac{x}{a+x} \implies x(1 - \sin^2 t) = a \sin^2 t \implies x = a \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = a \tan^2 t$ 。

求微分: $dx = d(a \tan^2 t)$ 。

[2] 分部积分计算:

$$\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx = \int t d(a \tan^2 t) = at \tan^2 t - a \int \tan^2 t dt$$

由于 $\tan^2 t = \sec^2 t - 1$:

$$= at \tan^2 t - a \int (\sec^2 t - 1) dt = at \tan^2 t - a(\tan t - t) + C$$

$$= at(\tan^2 t + 1) - a \tan t + C = at \sec^2 t - a \tan t + C$$

[3] 回代 x :

由 $\tan^2 t = \frac{x}{a}$, 知 $\tan t = \sqrt{\frac{x}{a}}$, $\sec^2 t = 1 + \frac{x}{a} = \frac{a+x}{a}$ 。

代入整理得:

$$= a \cdot \frac{a+x}{a} \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} - a \sqrt{\frac{x}{a}} + C = (a+x) \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} - \sqrt{ax} + C$$

1.8 习题 9.8: 分部积分法与换元法双解比较

求不定积分 $\int \frac{\arctan e^x}{e^x} dx$ 。

【思路点拨】 提供两种标准解法: 方法一直接利用分部积分法将 e^{-x} 移入微分; 方法二令 $e^x = t$ 化为有理代数式分部积分

分步推导与答题规范

[1] 方法一 (分部积分法):

$$\begin{aligned}\int \frac{\arctan e^x}{e^x} dx &= -\int \arctan e^x d(e^{-x}) = -e^{-x} \arctan e^x + \int e^{-x} d(\arctan e^x) \\ &= -e^{-x} \arctan e^x + \int e^{-x} \cdot \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = -e^{-x} \arctan e^x + \int \frac{1}{1+e^{2x}} dx\end{aligned}$$

分子改写凑微分:

$$\int \frac{1}{1+e^{2x}} dx = \int \left(1 - \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}\right) dx = x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+e^{2x})}{1+e^{2x}} = x - \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x})$$

合并得:

$$= -e^{-x} \arctan e^x + x - \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C$$

[2] 方法二 (换元法):

令 $e^x = t$, 则 $x = \ln t$, $dx = \frac{1}{t} dt$.

$$\begin{aligned}\int \frac{\arctan e^x}{e^x} dx &= \int \frac{\arctan t}{t^2} dt = -\int \arctan t d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= -\frac{1}{t} \arctan t + \int \frac{1}{t(1+t^2)} dt = -\frac{1}{t} \arctan t + \int \left(\frac{1}{t} - \frac{t}{1+t^2}\right) dt \\ &= -\frac{1}{t} \arctan t + \ln t - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + C\end{aligned}$$

回代 $t = e^x$:

$$= -\frac{1}{e^x} \arctan e^x + x - \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C$$

1.9 习题 9.9: 分段函数不定积分常数连续性拼接

求不定积分 $\int \max\{1, |x|\} dx$.

【思路点拨】 先将分段函数严格拆分, 分段求出每段上的原函数, 根据原函数处处可导必处处连续的性质, 在分界点处严格联立解出各积分常数的约束关系

分步推导与答题规范

[1] 拆分被积函数:

$$f(x) = \max\{1, |x|\} = \begin{cases} -x, & x < -1 \\ 1, & -1 \leq x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在整个实数域 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 因此必存在处处可导的连续原函数 $F(x)$ 。

[2] 分段积分并设立待定常数:

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + C_1, & x < -1 \\ x + C_2, & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} + C_3, & x > 1 \end{cases}$$

[3] 利用分界点处连续性拼接常数:

- 在 $x = -1$ 处连续: $\lim_{x \rightarrow -1^-} F(x) = F(-1)$:

$$-\frac{(-1)^2}{2} + C_1 = -1 + C_2 \implies -\frac{1}{2} + C_1 = -1 + C_2 \implies C_2 = C_1 + \frac{1}{2}$$

- 在 $x = 1$ 处连续: $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = F(1)$:

$$\frac{1^2}{2} + C_3 = 1 + C_2 \implies \frac{1}{2} + C_3 = 1 + C_2 \implies C_3 = C_2 + \frac{1}{2} = C_1 + 1$$

[4] 令 $C_1 = C$ 给出最终统一形式:

$$\int \max\{1, |x|\} dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + C, & x < -1 \\ x + \frac{1}{2} + C, & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} + 1 + C, & x > 1 \end{cases}$$

1.10 习题 9.10: 三角有理式分段换元与奇异点跨越陷阱

求定积分 $\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$ 。

【思路点拨】区间 $[0, \frac{3}{4}\pi]$ 跨过了余弦零点 $x = \frac{\pi}{2}$, 若用正切代换 $t = \tan x$, 正切函数在 $\frac{\pi}{2}$ 处趋于无穷大断开, 必须严格在 $\frac{\pi}{2}$ 处拆成两段分别换元

分步推导与答题规范

[1] 拆分区间避开正切无定义点:

$$\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$$

[2] 分子分母同除以 $\cos^2 x$ 凑微分:

$$\frac{1}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x + 1} dx = \frac{d(\tan x)}{\tan^2 x + 2}$$

[3] 分别计算两段定积分:

- 第一段: $x \in [0, \frac{\pi}{2})$, 令 $t = \tan x$, 从 0 变到 $+\infty$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + (\sqrt{2})^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

- 第二段: $x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$, 令 $t = \tan x$, 从 $-\infty$ 变到 -1 :

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{dt}{t^2 + (\sqrt{2})^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_{-\infty}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\arctan \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

[4] 两段求和:

$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\pi - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

1.11 习题 9.11: 导数逆运算识别与定积分快速计算

计算定积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} dx$ 。

【思路点拨】 遇到结构复杂的积分, 先观察是否为基本初等复合函数乘积的导数形式, 通过乘积求导法则逆运算直接还原原函数

分步推导与答题规范

[1] 考察复合函数导数:

考察函数 $G(x) = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x}$ 的导数:

$$\begin{aligned} G'(x) &= \left(e^{\frac{x}{2}} \right)' \sqrt{\cos x} + e^{\frac{x}{2}} (\sqrt{\cos x})' = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x} + e^{\frac{x}{2}} \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}} \\ &= \frac{e^{\frac{x}{2}}}{2} \left(\frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} \right) \end{aligned}$$

[2] 锁定被积函数原函数:

原被积函数恰好等于 $2G'(x)$:

$$e^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} = \frac{d}{dx} \left(2e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x} \right)$$

[3] 代入上下限求值:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} dx &= \left[2e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2e^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos \frac{\pi}{2}} - 2e^{\frac{\pi}{8}} \sqrt{\cos \frac{\pi}{4}} = 0 - 2e^{\frac{\pi}{8}} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = -2 \cdot 2^{-\frac{1}{4}} e^{\frac{\pi}{8}} = -2^{\frac{3}{4}} e^{\frac{\pi}{8}} \end{aligned}$$

1.12 习题 9.12: 区间再现公式标准应用

计算定积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 。

【思路点拨】经典的消 x 模型, 令 $x = \pi - t$ 应用区间再现公式, 两式相加除以二转化为对称三角凑微分

分步推导与答题规范

[1] 区间再现换元:

令 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$ 。换限后:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t) \sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} dt = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - I \end{aligned}$$

[2] 移项合并:

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

[3] 凑微分计算:

$$\begin{aligned} 2I &= -\pi \int_0^{\pi} \frac{d(\cos x)}{1 + \cos^2 x} = -\pi [\arctan(\cos x)]_0^{\pi} \\ &= -\pi [\arctan(-1) - \arctan(1)] = -\pi \left[-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right] = -\pi \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

解得: $I = \frac{\pi^2}{4}$ 。

1.13 习题 9.13: 对称区间奇偶拆项与有理换元

求定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x+1}{1+\sqrt[3]{x^2}} dx$ 。

【思路点拨】在对称区间 $[-1, 1]$ 上将分子拆为奇函数项与偶函数项, 奇项积分为 0, 偶项变为两倍半区间积分后再用根式代换

分步推导与答题规范

[1] 拆项利用奇偶性:

$$\int_{-1}^1 \frac{x+1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx = \int_{-1}^1 \frac{x}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx + \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx$$

因第一项被积函数为奇函数, 在对称区间 $[-1, 1]$ 上积分为 0; 第二项被积函数为偶函数:

$$= 0 + 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx$$

[2] 根式代换消分母指数:

令 $x = u^3$, 则 $dx = 3u^2 du$ 。换限: $x = 0 \Rightarrow u = 0$; $x = 1 \Rightarrow u = 1$ 。

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx &= 2 \int_0^1 \frac{3u^2}{1+u^2} du = 6 \int_0^1 \frac{u^2+1-1}{1+u^2} du \\ &= 6 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+u^2}\right) du = 6[u - \arctan u]_0^1 = 6\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = 6 - \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

1.14 习题 9.14: 分段函数定积分计算

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+\sin x}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0 \end{cases}, \text{ 求 } \int_{-1}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx.$$

【思路点拨】在分界点 $x = 0$ 处拆分积分区间, 左侧做指数凑微分, 右侧利用同角三角函数共轭分子化简

分步推导与答题规范

[1] 拆分区间:

$$\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x} dx$$

[2] 计算负半轴指数积分:

分子分母同乘 e^{-x} :

$$\int_{-1}^0 \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = -[\ln(e^{-x}+1)]_{-1}^0 = -\ln 2 + \ln(e+1) = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$$

[3] 计算正半轴三角积分:

分子分母同乘 $1 - \sin x$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - \sec x \tan x) dx = [\tan x - \sec x]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= (1 - \sqrt{2}) - (0 - 1) = 2 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

[4] 求和:

$$= \ln \left(\frac{1+e}{2} \right) + 2 - \sqrt{2}$$

1.15 习题 9.15: 含绝对值被积函数的变限积分解析式

设 $x \geq -1$, 求变限积分函数 $F(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$.

【思路点拨】绝对值拐点为 $t = 0$ 与 $t = 1$, 根据上限 x 所处位置分区间讨论去绝对值计算

分步推导与答题规范

[1] 当 $-1 \leq x < 0$ 时:

$t \in [-1, x] \subseteq [-1, 0]$, 故 $|t| = -t$:

$$F(x) = \int_{-1}^x (1 + t) dt = \left[t + \frac{t^2}{2} \right]_{-1}^x = \left(x + \frac{x^2}{2} \right) - \left(-1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$$

[2] 当 $0 \leq x < 1$ 时:

$$F(x) = \int_{-1}^0 (1 + t) dt + \int_0^x (1 - t) dt = \frac{1}{2} + \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_0^x = -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$$

[3] 当 $x \geq 1$ 时:

$$F(x) = \int_{-1}^1 (1 - |t|) dt + \int_1^x (1 - t) dt = 1 + \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_1^x = 1 + \left(x - \frac{x^2}{2} \right) - \frac{1}{2} = -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$$

[4] 综合结论:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$$

1.16 习题 9.16: 积分方程换元求导与微分方程求解

求连续函数 $f(x)$, 使其满足积分方程 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$.

【思路点拨】换元令 $u = tx$ 把自变量 x 提至积分上限, 两端关于 x 求导建立一阶微分方程求解

分步推导与答题规范

[1] 换元分离自变量:

当 $x \neq 0$ 时, 令 $u = tx$, 则 $dt = \frac{du}{x}$:

$$\int_0^1 f(tx) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$$

原积分方程改写为:

$$\int_0^x f(u) du = xf(x) + x^2 \sin x$$

[2] 两端对 x 求导:

$$f(x) = f(x) + xf'(x) + 2x \sin x + x^2 \cos x$$

化简得:

$$xf'(x) + 2x \sin x + x^2 \cos x = 0$$

因 $x \neq 0$ 且函数连续, 同除以 x :

$$f'(x) = -2 \sin x - x \cos x$$

[3] 积分还原 $f(x)$:

$$f(x) = \int (-2 \sin x - x \cos x) dx = 2 \cos x - \int x d(\sin x)$$

$$= 2 \cos x - \left(x \sin x - \int \sin x dx \right) = 2 \cos x - x \sin x - \cos x + C = \cos x - x \sin x + C$$

其中 C 为任意实常数。

1.17 习题 9.17: 含参绝对值变限积分的导数

设 $f(x) = \int_0^1 t|t-x| dt$, 求 $f'(x)$ 。

【思路点拨】 根据 x 与区间 $[0, 1]$ 的相对位置分三段去绝对值化为代数多项式, 再逐段求导

分步推导与答题规范

[1] 当 $x \leq 0$ 时:

对任意 $t \in [0, 1]$, 都有 $t-x \geq 0$, 故 $|t-x| = t-x$:

$$f(x) = \int_0^1 t(t-x) dt = \int_0^1 (t^2 - xt) dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}x \implies f'(x) = -\frac{1}{2}$$

[2] 当 $0 < x < 1$ 时:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x t(x-t) dt + \int_x^1 t(t-x) dt \\ &= \left[\frac{xt^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^x + \left[\frac{t^3}{3} - \frac{xt^2}{2} \right]_x^1 = \frac{x^3}{6} + \left(\frac{1}{3} - \frac{x}{2} + \frac{x^3}{6} \right) = \frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

求导得:

$$f'(x) = x^2 - \frac{1}{2}$$

[3] 当 $x \geq 1$ 时:

对任意 $t \in [0, 1]$, 都有 $t - x \leq 0$, 故 $|t - x| = x - t$:

$$f(x) = \int_0^1 t(x - t) dt = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \implies f'(x) = \frac{1}{2}$$

[4] 检查分界点处导数连续性:

- 在 $x = 0$ 处: $f'_-(0) = -\frac{1}{2}$, $f'_+(0) = 0^2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$; - 在 $x = 1$ 处: $f'_-(1) = 1^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $f'_+(1) = \frac{1}{2}$ 。
故 $f'(x)$ 在全实数域连续, 统一写作:

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & x \leq 0 \\ x^2 - \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x \geq 1 \end{cases}$$