

CASO CLÍNICO – ATLS

Hoje pela manhã aconteceu um acidente automobilístico na Av. Paulista, onde um carro perdeu o controle e colidiu em um caminhão da limpeza urbana que estava parado. O SAMU 192 foi acionado para a ocorrência e você faz parte da equipe. O condutor, sexo masculino, 25 anos, apresenta como queixa principal dor intensa em região abdominal. Ao Exame Físico encontrava-se lúcido, muito agitado (chorando e gritando de dor), dispneico, acianótico, pele fria e pegajosa, um pouco sudoreico, hipotenso, com pulsos periféricos de difícil palpação. ACV: RCR 2T, bulhas normofonéticas. FC: 130 bpm, PA: 70x50 mmHg. AP: Murmúrio vesicular universalmente audível, ausência de ruídos adventícios. Abdome: plano, com escoriações e hematoma em regiões do epigástrio e hipocôndrio esquerdo. A palpação superficial e a descompressão eram dolorosas em toda a sua extensão. Apresentava também aumento da tensão abdominal.

QUESTÃO 01 - A partir das informações presentes no caso, qual a conduta completa a ser tomada neste caso? Responda descrevendo o passo a passo da prestação de socorro, considerando o protocolo de atendimento inicial do politraumatizado, recomendado pelo Advanced Trauma Life Support (ATLS).

CONTINUAÇÃO DO CASO (...) Durante os procedimentos o paciente evoluiu rapidamente com agitação psicomotora, perda da consciência, bradicardia, pulsos centrais e periféricos impalpáveis, tornando-se bastante sudoreico, com extrema palidez cutaneomucosa, evoluindo para parada cardiorrespiratória. Respondeu às manobras de reanimação, foi iniciada reposição volêmica e o paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico.

QUESTÃO 02 - Considerando a cinemática do trauma, os sinais e sintomas, a apresentação clínica e a evolução do caso qual o provável diagnóstico desse paciente? Causado por qual motivo? Justifique e especifique sua resposta.