Clasificación TNM de cáncer de mama

Fuente: GPC de tratamiento de cáncer de mama (Cuadro 2), basada en AJCC 2010 (7.ª ed.). La M y la agrupación por estadio no vienen en la GPC; se agregaron de AJCC 7.ª ed.

T: tumor primario

T	Criterio
TX	No se puede evaluar el tumor
T0	Sin evidencia de tumor primario
Tis	Carcinoma in situ (CDIS, CLIS, o enfermedad de Paget del pezón sin carcinoma subyacente)
T1	**≤ 20 mm**
T1mi	≤ 1 mm
T1a	> 1 y ≤ 5 mm
T1b	> 5 y ≤ 10 mm
T1c	> 10 y ≤ 20 mm
T2	**> 20 y ≤ 50 mm**
T3	**> 50 mm**
T4	Cualquier tamaño con extensión a **pared torácica o piel**
T4a	Pared torácica (no cuenta solo la invasión del pectoral)
T4b	Ulceración de la piel, nódulos satélite o edema (**piel de naranja**) sin ser carcinoma inflamatorio
T4c	T4a y T4b juntos
T4d	**Carcinoma inflamatorio**

N: ganglios regionales, clínico

N	Criterio
NX	No evaluables (por ejemplo, ya extirpados)
N0	Sin ganglios regionales palpables
N1	Axilares homolaterales **móviles**
N2a	Axilares **fijos** entre sí o a otras estructuras
N2b	Cadena mamaria interna evidente, **sin** metástasis axilares
N3a	Infraclaviculares homolaterales
N3b	Mamaria interna **y** axilares
N3c	**Supraclaviculares** homolaterales

pN: ganglios, patológico

pN	Criterio
pN0	Sin metástasis histopatológicas. Se subdivide con (i−), (i+), (mol−), (mol+) según inmunohistoquímica o RT-PCR. Las células aisladas son nidos de 0.2 mm o menos
pN1mi	**Micrometástasis**: más de 0.2 mm y no más de 2 mm
pN1a	**1 a 3** ganglios axilares
pN1b	Mamaria interna por biopsia de centinela, sin detección clínica
pN2	**4 a 9** ganglios axilares, o mamaria interna clínicamente aparente sin axilares

pN	Criterio
pN3	**10 o más** ganglios axilares, o infraclaviculares, o supraclavicular positivo, o mamaria interna junto con axilares

M: metástasis a distancia

M	Criterio
M0	Sin metástasis a distancia
M1	**Metástasis a distancia**

Agrupación por estadio (AJCC 7.ª ed.)

Estadio	T	N	M
0	Tis	N0	M0
IA	T1	N0	M0
IB	T0-T1	**N1mi**	M0
IIA	T0-T1	N1	M0
	T2	N0	M0
IIB	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
IIIA	T0-T2	N2	M0
	T3	N1-N2	M0
IIIB	**T4**	N0-N2	M0
IIIC	Cualquier T	**N3**	M0
IV	Cualquier T	Cualquier N	**M1**

Para recordar

- Cortes de tamaño: **20 mm y 50 mm**. T4 no depende del tamaño.
- **N1 es móvil, N2 es fijo.**
- **I y II** son tempranos. **IIIA a IIIC** son localmente avanzados (se inicia con tratamiento sistémico neoadyuvante). **IV** es metastásico.
- En estadio I o IIB solo se piden estudios adicionales si hay signos de metástasis. En IIIA se completa con estudio de tórax, abdomen superior y óseo.