Cervicovaginitis

Siglas de uso frecuente. Los términos se desarrollan al inicio de cada sección; las siglas se reservan para las menciones inmediatas.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
VB	Vaginosis bacteriana	CVV	Candidosis vulvovaginal
ITS	Infección de transmisión sexual	VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana
KOH	Hidróxido de potasio	NAAT	Prueba de amplificación de ácidos nucleicos
CDC	Centers for Disease Control and Prevention	GPC	Guía de práctica clínica del IMSS
DIU	Dispositivo intrauterino	RPM	Rotura prematura de membranas

1. Conceptos generales

1.1 Definición

La cervicovaginitis infecciosa es la inflamación de la mucosa vaginal, y a menudo del cuello uterino, causada sobre todo por tres agentes: bacterias (vaginosis bacteriana), hongos del género *Candida* y el protozoo *Trichomonas vaginalis*. Se manifiesta por uno o más de los siguientes datos: aumento de la secreción vaginal, prurito, ardor, irritación, disuria, dispareunia y mal olor.[1]

Dentro de este concepto se distinguen dos situaciones con un mecanismo diferente:

- **Vaginitis y vaginosis:** afectan a la vagina. La vaginosis bacteriana no es propiamente una inflamación: es un desequilibrio de la flora en el que proliferan bacterias anaerobias y desaparecen los lactobacilos, por lo que la vagina pierde su acidez (pH mayor de 4,5) sin signos inflamatorios.[1,2]
- **Cervicitis:** afecta al epitelio cilíndrico del endocérvix y se debe sobre todo a *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*, que son infecciones de transmisión sexual. Se reconoce por un exudado endocervical purulento o mucopurulento o por un sangrado endocervical que se provoca con facilidad al pasar un hisopo.[3]

1.2 Flora y secreción vaginal normales

En condiciones normales predominan los lactobacilos, que mantienen un pH vaginal de 3,5 a 4,5. La secreción fisiológica varía con los cambios hormonales antes y después de la ovulación, por lo que no requiere tratamiento. Se considera anormal la secreción lechosa o blanquecina, amarillenta, fétida (con olor a pescado), pruriginosa o acompañada de ardor genital.[1] *Candida* forma parte de la flora normal de la vulva y la vagina, y entre el 10 y el 15% de las mujeres sin síntomas están colonizadas; su presencia sin síntomas no requiere estudios ni tratamiento.[2]

1.3 Frecuencia y repercusión

Las infecciones genitales son una de las primeras causas de consulta. La vaginosis bacteriana es la causa más frecuente de vaginitis infecciosa y la candidosis vulvovaginal, la segunda. Alrededor del 75% de las mujeres tendrá al menos un episodio de candidosis en su vida, y del 5 al 10%, candidosis recurrente.[1,2]

Hasta el 60% de las infecciones genitales son asintomáticas. Su importancia radica en que aumentan el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, de complicaciones del embarazo (como la rotura prematura de membranas), de adquirir el VIH y de infertilidad.[1]

---

2. Abordaje de la mujer con flujo vaginal anormal

2.1 Interrogatorio

Los síntomas por sí solos no distinguen las causas de vaginitis, por lo que el diagnóstico se apoya en la exploración y en el estudio microscópico o microbiológico.[1,2] El interrogatorio recoge:[1]

- **Características del flujo:** cantidad, color, consistencia, olor y síntomas asociados (prurito, ardor, disuria, dispareunia, dolor pélvico).
- **Historia sexual:** número de parejas, cambio reciente de pareja y uso de condón, para estimar el riesgo de una infección de transmisión sexual.
- **Factores predisponentes:** duchas vaginales, diabetes, uso reciente de antibióticos o corticoides, inmunodepresión y embarazo.
- **Cuerpos extraños:** un tampón o un condón retenidos pueden causar flujo anormal y deben descartarse.

2.2 Exploración

Toda mujer con flujo anormal persistente se explora. La exploración incluye la palpación abdominal en busca de dolor, la inspección de la vulva, la especuloscopia de las paredes vaginales y del cuello, la descripción de la secreción (cantidad y

consistencia) y el tacto bimanual.[1,2]

- **Cuello uterino:** si está alterado, se revalora después del tratamiento; si la alteración persiste, se solicitan citología cervical y cultivo y se refiere al segundo nivel.[1]
- **Cervicitis:** ante un episodio nuevo se valoran los signos de enfermedad inflamatoria pélvica.[3]

2.3 Pruebas diagnósticas

Tabla 1. Pruebas de consultorio para el diagnóstico de la vaginitis.[1,2,3,4]

Prueba	Técnica	Interpretación
pH vaginal	Tira de pH sobre la secreción de la pared lateral de la vagina	Normal de 3,5 a 4,5. Mayor de 4,5 en la vaginosis bacteriana y a menudo en la tricomoniasis; en la candidosis suele ser normal
Prueba de aminas	Se añade KOH al 10% a la secreción	Un olor a pescado orienta a vaginosis bacteriana
Examen en fresco con solución salina	Microscopía inmediata de la secreción	Células clave (células epiteliales cubiertas de bacterias) en la vaginosis; tricomonas móviles en la tricomoniasis, con una sensibilidad de alrededor del 60%
Examen en fresco con KOH al 10%	El KOH destruye las células y deja ver los hongos	Levaduras, hifas o pseudohifas en la candidosis
Tinción de Gram	Frotis teñido de la secreción	Es la referencia para la vaginosis bacteriana; según los criterios de Hay e Ison, el grado 1 es normal (predominan los lactobacilos), el 2 es intermedio y el 3 es vaginosis (predominan *Gardnerella* o *Mobiluncus*)
Cultivo para *Candida*	Siembra de la secreción	Identifica la especie; se reserva para la candidosis complicada o recurrente
NAAT	Muestra vaginal o endocervical, u orina	Es la prueba de elección para tricomonas, *Chlamydia* y gonococo
Citología cervicovaginal	Papanicolaou	Puede revelar vaginosis, tricomonas o *Candida* como hallazgo; es complementaria

Orden de las pruebas. En las formas leves, el pH vaginal es útil; en las moderadas o graves, se solicita el estudio microscópico (examen en fresco, Gram o citología) acompañado de los hallazgos clínicos para quien lo interprete. Si no se dispone de microscopía, las formas no complicadas pueden tratarse de forma empírica según la clínica, con vigilancia de la respuesta.[1,2] Los cultivos bacterianos no se piden ante la sospecha de vaginosis, porque la flora es polimicrobiana y su resultado no orienta el tratamiento.[2]

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de las vaginitis infecciosas.[1,2]

Rasgo	Vaginosis bacteriana	Candidosis vulvovaginal	Tricomoniasis
Agente	Anaerobios (*Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Prevotella*, *Mobiluncus*) con pérdida de lactobacilos	*Candida albicans* (85 a 95%), *C. glabrata* y otras	*Trichomonas vaginalis*
Flujo	Homogéneo, fluido, blanco o grisáceo, con olor a pescado	Blanco, espeso y grumoso ("como requesón"), adherente, sin mal olor	Abundante, amarillo-verdoso, espumoso, fétido
Síntomas	Por lo general, ninguno además del flujo y el olor; sin dolor ni prurito	Prurito frecuente, ardor vulvar, disuria y dispareunia	Disuria, dispareunia, dolor pélvico bajo
Signos	Sin inflamación de la vagina ni de la vulva	Eritema y edema vulvovaginal, fisuras, excoriaciones y lesiones satélite	Vaginitis intensa, eritema vulvar y cuello en fresa (puntilleo rojo)
pH vaginal	Mayor de 4,5	Normal	Habitualmente mayor de 4,5
Transmisión sexual	Se asocia a la actividad sexual, pero no se trata a la pareja de rutina	No se transmite sexualmente	Es una ITS: se trata a la pareja

3. Vaginosis bacteriana

3.1 Mecanismo y factores de riesgo

La vaginosis bacteriana se produce cuando los lactobacilos son sustituidos por un crecimiento excesivo de bacterias anaerobias. Al desaparecer los lactobacilos, la vagina pierde su acidez y el pH supera 4,5; las aminas que producen los anaerobios explican el olor a pescado.[1,2] Se asocia a las duchas vaginales, al cunnilingus receptivo, al cambio reciente de pareja sexual, al tabaquismo y a otras infecciones de transmisión sexual, por lo que se aconseja evitarlos.[1]

3.2 Diagnóstico

Clínica. Flujo vaginal fluido, blanco o grisáceo, con olor a pescado, sin dolor, prurito ni irritación.[1]

Criterios de Amsel. El diagnóstico clínico requiere al menos tres de estos cuatro criterios:[3,4]

- flujo fino y homogéneo;

- células clave en más del 20% de las células epiteliales del examen en fresco;
- pH vaginal mayor de 4,5;
- prueba de aminas positiva (olor a pescado al añadir KOH al 10%).

Tinción de Gram. Es la prueba de referencia; se interpreta con la escala de Nugent o con los grados de Hay e Ison (tabla 1).[1,3]

3.3 Tratamiento

Indicaciones. Se tratan las mujeres sintomáticas, las asintomáticas que van a someterse a un procedimiento quirúrgico y las asintomáticas que desean tratarse. Con síntomas característicos y bajo riesgo de infección de transmisión sexual, el tratamiento empírico puede iniciarse sin pruebas.[1]

Tabla 3. Tratamiento de la vaginosis bacteriana.[1,3]

Tipo	Esquema
Recomendado	Metronidazol, 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días
Recomendado	Metronidazol en gel al 0,75%, un aplicador (5 g) intravaginal al día durante 5 días
Recomendado	Clindamicina en crema al 2%, un aplicador (5 g) intravaginal al acostarse durante 7 días
Alternativo	Clindamicina, 300 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días
Alternativo	Clindamicina en óvulos de 100 mg, intravaginal al acostarse durante 3 días
Alternativo	Tinidazol, 2 g por vía oral al día durante 2 días, o 1 g al día durante 5 días
Alternativo	Secnidazol, 2 g por vía oral en dosis única

Precauciones.

- La GPC recomienda evitar el alcohol durante el tratamiento con metronidazol por el riesgo de reacción similar a la del disulfiram.[1]
- La GPC desaconseja la clindamicina durante la lactancia.[1]

Pareja. No se estudia ni se trata de rutina, aunque puede considerarse según el criterio clínico.[1] Un ensayo de 2025 en parejas heterosexuales monógamas mostró que tratar también al varón (metronidazol oral y crema de clindamicina en la piel del pene durante 7 días) redujo la recurrencia a las 12 semanas del 63 al 35% (anexo A).[5]

Probióticos. La GPC permite considerarlos cuando se documenta la ausencia o disminución de lactobacilos, si se dispone del recurso.[1]

3.4 Embarazo

Vaginosis sintomática. Se trata, porque se asocia a aborto, parto pretérmino, rotura prematura de membranas y endometritis. El metronidazol oral es de elección, sobre todo si hay antecedente de parto pretérmino o de rotura prematura de membranas; con

alergia o intolerancia se usa clindamicina en crema vaginal al 2% durante 7 días o clindamicina oral, 300 mg cada 12 horas durante 7 días.[1]

Vaginosis asintomática. La GPC de 2014 recomienda tratarla para prevenir la rotura prematura de membranas. Las guías posteriores (ACOG, CDC, USPSTF y SOGC) desaconsejan buscarla y tratarla de rutina en la embarazada asintomática, porque su tratamiento no ha reducido el parto pretérmino (anexo A).[6]

---

4. Candidosis vulvovaginal

4.1 Definición y factores de riesgo

La candidosis vulvovaginal es la infección del epitelio estrogenizado de la vagina y el vestíbulo por levaduras del género *Candida*, que puede extenderse a los labios y a la región inguinal. *Candida albicans* causa del 85 al 95% de los casos; le sigue *C. glabrata*.[2]

Factores de riesgo. El embarazo es el único que se ha correlacionado de forma consistente: la progesterona aumenta el glucógeno vaginal, que sirve de nutriente a la levadura, y los estrógenos aumentan su adherencia al epitelio. Se citan también, con evidencia menos consistente, la diabetes mal controlada, la inmunodepresión (incluido el tratamiento con corticoides), los antibióticos sistémicos, los anticonceptivos, la obesidad y el periodo premenstrual. La humedad, el calor, la maceración y la fricción también la favorecen.[1,2]

Transmisión. Su incidencia aumenta con el inicio de la actividad sexual, pero no se ha demostrado que se transmita sexualmente; por eso no se trata a la pareja ni se exige abstinencia.[1,2]

4.2 Clínica y clasificación

Clínica. Prurito vulvar, ardor o dolor vaginal, dispareunia y disuria, con un flujo blanco, espeso y grumoso, adherente y sin mal olor. A la exploración hay eritema y edema vulvovaginal, fisuras, excoriaciones y lesiones satélite. Los síntomas suelen empeorar la semana previa a la menstruación.[1,2]

Clasificación. Distinguir la forma no complicada de la complicada decide el tratamiento y la referencia:[1,2]

- **No complicada:** episodio esporádico (menos de 4 al año), síntomas leves o moderados, probablemente por *C. albicans*, en una mujer inmunocompetente.
- **Complicada:** forma grave (eritema vulvar extenso, edema, excoriaciones y fisuras), recurrente, por especies distintas de *C. albicans*, o en una mujer con diabetes, inmunodepresión, VIH, desnutrición o embarazo.

- **Recurrente:** 4 o más episodios sintomáticos y documentados en un año, con resolución entre ellos (anexo A).
- **Crónica:** síntomas persistentes, sin remisión entre los episodios.

4.3 Diagnóstico

Examen en fresco. Se toma una muestra de las paredes vaginales para observarla con solución salina y con KOH al 10%, o con tinción de Gram, en busca de levaduras en gemación, hifas o pseudohifas. Si se dispone del recurso, debe solicitarse siempre ante la sospecha.[2]

Cultivo. Es indispensable en la candidosis complicada, porque identifica la especie: *C. glabrata* no responde a los azoles. En la no complicada es preferible, pero no imprescindible.[2]

Sin recursos de laboratorio. La forma no complicada puede tratarse de forma empírica, vigilando la respuesta; la complicada se envía al siguiente nivel. El autotratamiento y el tratamiento empírico basado solo en los síntomas no bastan para establecer el diagnóstico, por lo que una falta de respuesta obliga a confirmar la causa.[2]

4.4 Tratamiento de la forma no complicada

Los azoles alivian los síntomas y negativizan el cultivo en el 80 a 90% de las pacientes, sin diferencias de eficacia entre la vía oral y la vaginal ni entre los esquemas cortos y los largos. La elección depende de la preferencia de la paciente, las contraindicaciones, las alergias y el costo. Los azoles tópicos son más eficaces que la nistatina.[2]

Tabla 4. Tratamiento de la candidosis vulvovaginal no complicada.[1,2]

Vía	Esquema
Oral	Fluconazol, 150 mg en dosis única (primera línea)
Oral	Itraconazol, 200 mg cada 12 horas durante 1 día
Vaginal	Clotrimazol en comprimido vaginal de 500 mg en dosis única o de 200 mg al día durante 3 días
Vaginal	Miconazol en óvulo de 1200 mg en dosis única o de 400 mg al día durante 3 días; o crema al 2%, una aplicación diaria durante 7 días
Vaginal	Isoconazol en óvulo de 600 mg en dosis única
Vaginal	Nistatina, 100 000 UI en óvulo o tableta vaginal al día durante 14 días

Efectos adversos. Los azoles tópicos causan ardor o irritación local en el 1 al 10% de los casos, lo que debe considerarse si los síntomas persisten, y pueden dañar los condones y diafragmas de látex. Los orales causan en ocasiones náusea, dolor abdominal y cefalea, y rara vez elevan las enzimas hepáticas; el itraconazol produce más efectos adversos que el fluconazol.[1,2]

4.5 Tratamiento de la forma complicada

Candidosis grave. Fluconazol, 150 mg por vía oral, con una segunda dosis a las 72 horas.[2]

Enfermedad de base (diabetes, VIH, corticoides). Se controla la enfermedad subyacente y se evitan los esquemas cortos: nistatina vaginal durante 14 días, o fluconazol de 100, 150 o 200 mg cada tercer día por tres dosis (días 1, 4 y 7). En la mujer con VIH los esquemas no difieren de los de la mujer sin VIH.[2]


Candidosis recurrente. Se busca una enfermedad subyacente y una especie distinta de *C. albicans*, y se trata en dos fases:[2]

- **Inducción:** hasta lograr la remisión micológica, con terapia tópica de 7 a 14 días (nistatina 14 días, o 21 días si es *C. glabrata*) o fluconazol de 100, 150 o 200 mg cada tercer día por tres dosis.
- **Mantenimiento:** fluconazol de 100, 150 o 200 mg una vez por semana durante 6 meses. Si no es posible, itraconazol 200 mg cada 12 horas un día al mes, o clotrimazol tópico 200 mg dos veces por semana, durante 6 meses.
- **Resultado:** al terminar el mantenimiento, casi el 91% está en remisión, pero en los 6 meses siguientes recae más de la mitad. Un esquema de fluconazol decreciente durante un año logró una eficacia del 77%.

Especies distintas de *C. albicans*. Los azoles fallan con frecuencia frente a *C. glabrata*. Se usa nistatina vaginal durante 21 días; el ácido bórico vaginal (600 mg al día durante 7 a 21 días según la guía) logra curaciones de hasta el 70% y no se usa en el embarazo.[2,7]

Ketoconazol oral. La GPC de 2014 lo incluía en la candidosis recurrente; la FDA limitó su uso en 2013 por hepatotoxicidad grave y no debe ser un tratamiento de primera línea (anexo A).[1,8]

Remedios no probados. No hay ensayos que apoyen el aceite de árbol de té, el ajo, el yogur ni las duchas vaginales; las duchas se han asociado en estudios observacionales a enfermedad inflamatoria pélvica, endometritis y embarazo ectópico.[2]



Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la candidosis vulvovaginal de la GPC IMSS-609-19. Las notas indican: (1) prurito vulvar, flujo blanco y grumoso, edema, escoriaciones o fisuras; (2) examen en fresco y cultivo si se dispone del recurso; (3) en el embarazo la única opción institucional es la nistatina vaginal; (4) en la forma por enfermedad subyacente, la inducción con nistatina dura 21 días.

4.6 Embarazo y lactancia

- **Asintomática:** la embarazada colonizada sin síntomas no requiere tratamiento.[1]
- **Sintomática:** solo se usan azoles tópicos durante 7 días, porque los orales se han asociado a aborto y malformaciones. En el IMSS la opción disponible es la nistatina vaginal durante 14 días.[2,7]
- **Azoles orales:** la GPC los contraindica en el embarazo y la lactancia.[1]

4.7 Referencia y seguimiento

- **Al segundo nivel (ginecología):** la candidosis no complicada tratada empíricamente sin respuesta, para establecer el diagnóstico etiológico; la complicada sin recursos de laboratorio; las mujeres con VIH; y las infecciones por especies distintas de *C. albicans* que no responden.[1,2]

- **Al tercer nivel (infectología):** la candidosis recurrente o complicada cuando no se puede identificar la especie ni estudiar la resistencia.[2]
- **Seguimiento:** se orienta a la paciente para que vuelva si los síntomas persisten o recurren. La candidosis grave puede incapacitar para las actividades diarias y laborales, y justifica de 1 a 3 días de incapacidad.[1]

---

5. Tricomoniasis

5.1 Clínica y diagnóstico

Trichomonas vaginalis es un protozoo de transmisión sexual. Produce un flujo abundante, amarillento o amarillo-verdoso, espumoso y fétido, con disuria si afecta a la uretra, dolor pélvico bajo, dispareunia, vulvovaginitis con edema y eritema, y un cuello uterino con puntilleo rojo ("en fresa"). Puede ser asintomática.[1,2]

Por qué importa. Al ser una infección de transmisión sexual, su diagnóstico debe ser confiable por sus implicaciones para la paciente y su pareja. En el embarazo se asocia a parto pretérmino, rotura prematura de membranas y bajo peso al nacer, y en la mujer con VIH aumenta la transmisión del virus; en los casos recurrentes se investiga la infección por VIH.[1,6,9]

Diagnóstico. El examen en fresco detecta tricomonas móviles con una sensibilidad de alrededor del 60%, por lo que un resultado negativo no la descarta. Pueden detectarse también en la citología, por cultivo, con pruebas rápidas de antígeno o de ADN, y con NAAT, que es la prueba más sensible. Si la citología o el frotis informan tricomonas y no hay prueba confirmatoria, se trata.[1,3]

5.2 Tratamiento

El tratamiento es sistémico (oral), porque el metronidazol en gel vaginal no es eficaz contra las tricomonas.[1,3]

Tabla 5. Tratamiento de la tricomoniasis.[1,3,9]

Situación	Esquema
Mujer, incluida la embarazada	Metronidazol, 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días
Varón	Metronidazol, 2 g por vía oral en dosis única
Alternativa	Tinidazol o secnidazol, 2 g por vía oral en dosis única

En la mujer, el esquema de 7 días redujo a la mitad la persistencia de la infección frente a la dosis única de 2 g, que la GPC de 2014 aún incluía como opción (anexo A).[9]

Pareja y prevención de la reinfección.[1]

- La pareja o parejas reciben tratamiento simultáneo.

- No se mantienen relaciones sexuales, ni genitales ni orales, hasta que ambos completen el tratamiento y estén asintomáticos.
- Se recomienda el uso de preservativo.

Seguimiento. La paciente se revalora en un plazo no mayor de 3 meses, porque la reinfección alcanza el 17%. Si el tratamiento falla, se comprueba el cumplimiento, se descarta que la paciente haya vomitado el metronidazol, se busca una reinfección y se confirma que la pareja se trató.[1]

Lactancia y alcohol. La GPC indica suspender la lactancia durante el tratamiento con metronidazol y hasta 12 a 24 horas después de terminarlo, y evitar el alcohol por la reacción similar a la del disulfiram.[1]

---

6. Cervicitis por *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*

6.1 Clínica y diagnóstico

Clínica. La infección por *Chlamydia* es asintomática en alrededor del 75% de las mujeres y del 50% de los varones, lo que dificulta su control. Cuando da síntomas, produce ardor al orinar, dolor en hipogastrio, prurito y escozor vaginal durante el coito y un flujo amarillento.[1] La cervicitis se reconoce por un exudado endocervical purulento o mucopurulento, o por un sangrado endocervical que se provoca con facilidad; ante un episodio nuevo se valora la enfermedad inflamatoria pélvica y se buscan ambos agentes.[3]

Diagnóstico. Las NAAT en muestra vaginal, endocervical o de orina son las pruebas de elección para *Chlamydia* y gonococo. La mujer con sospecha de infección de transmisión sexual se estudia además para sífilis.[1,3] En el embarazo se busca la clamidia en las menores de 25 años y en las mayores con factores de riesgo.[6]

6.2 Tratamiento

Tabla 6. Tratamiento de la cervicitis por *Chlamydia* y gonococo.[1,3,10]

Infección	Fuera del embarazo	En el embarazo
Chlamydia trachomatis	Recomendado: doxiciclina, 100 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días. Alternativas: azitromicina, 1 g por vía oral en dosis única, o levofloxacino, 500 mg al día durante 7 días	Azitromicina, 1 g por vía oral en dosis única; alternativa: amoxicilina, 500 mg cada 8 horas durante 7 días. La doxiciclina y las quinolonas están contraindicadas
Neisseria gonorrhoeae	Ceftriaxona, 500 mg por vía intramuscular en dosis única (1 g si la paciente pesa 150 kg o más)	Igual
Gonococo sin descartar *Chlamydia*	Se añade doxiciclina durante 7 días	Se añade azitromicina, 1 g en dosis única

La GPC de 2014 situaba la azitromicina y la doxiciclina como primera línea y la eritromicina, el levofloxacino y el ofloxacino como alternativas; los CDC (2021) prefieren la doxiciclina por su mayor eficacia (anexo A).[1,3]

Pareja y seguimiento.[1,3,6]

- La pareja recibe tratamiento.
- En la embarazada con clamidia se comprueba la curación a las 3 o 4 semanas y se repite la prueba a los 3 meses; en la gonorrea se repite la prueba a los 3 meses.
- Se promueve el preservativo para prevenir nuevas infecciones.

---

7. Situaciones especiales

Tabla 7. Tratamiento de la cervicovaginitis durante el embarazo.[1,2,3,6]

Infección	Conducta
Vaginosis bacteriana sintomática	Metronidazol oral; alternativa, clindamicina oral o en crema vaginal durante 7 días
Vaginosis bacteriana asintomática	No se busca ni se trata de rutina
Candidosis sintomática	Azoles tópicos durante 7 días (en el IMSS, nistatina vaginal durante 14 días); sin azoles orales
Candidosis asintomática	No se trata
Tricomoniasis	Metronidazol, 500 mg cada 12 horas durante 7 días; tratamiento de la pareja
Chlamydia	Azitromicina, 1 g en dosis única; curación comprobada a las 3 o 4 semanas
Gonorrea	Ceftriaxona, 500 mg intramuscular en dosis única

Mujer con VIH. Se refiere al segundo nivel. Los esquemas para la candidosis son los mismos que sin VIH, y la tricomoniasis se busca de forma sistemática por su efecto sobre la transmisión del virus.[1,2,6]

Diabetes. El tratamiento de la candidosis incluye el control de la glucemia y esquemas no cortos.[2]

Dispositivo intrauterino. La GPC de 2014 sugiere cambiar de método en la mujer con vaginosis bacteriana y DIU (anexo A).[1]

---

8. Integración: secuencia de decisiones

1. **Valorar el flujo:** interrogar sus características, la historia sexual y los factores predisponentes; descartar un cuerpo extraño.
2. **Explorar:** vulva, paredes vaginales, cuello uterino y tacto bimanual; ante una cervicitis, valorar los signos de enfermedad inflamatoria pélvica.
3. **Medir el pH y hacer el examen en fresco:** pH mayor de 4,5 con células clave y prueba de aminas positiva orienta a vaginosis; pH normal con levaduras o hifas, a candidosis; tricomonas móviles, a tricomoniasis.
4. **Buscar infecciones de transmisión sexual:** si hay factores de riesgo o cervicitis, NAAT para *Chlamydia*, gonococo y tricomonas, y prueba de sífilis.
5. **Tratar según la causa:** vaginosis con metronidazol o clindamicina; candidosis no complicada con fluconazol oral o un azol tópico; tricomoniasis con metronidazol de 7 días y tratamiento de la pareja; clamidia con doxiciclina (azitromicina en el embarazo); gonorrea con ceftriaxona.
6. **Adaptar al embarazo:** tratar la vaginosis sintomática, usar solo azoles tópicos para la candidosis y evitar doxiciclina y quinolonas.
7. **Referir:** VIH, falta de respuesta, candidosis complicada sin laboratorio, especies distintas de *C. albicans* y cuello uterino alterado que persiste tras el tratamiento.
8. **Seguir:** revalorar la tricomoniasis antes de 3 meses, comprobar la curación de la clamidia en el embarazo y pedir a la paciente que vuelva si los síntomas persisten o recurren.


Anexo A. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla A1. Discrepancias entre las fuentes y las recomendaciones posteriores.[1,2,3,5,6,8,10,11]

Tema	Fuente o recomendación previa	Recomendación posterior verificada	Implicación
Metronidazol en dosis única de 2 g para la vaginosis	GPC 2014: opción de primera línea	CDC 2021: no figura entre los esquemas recomendados ni alternativos	Usar el esquema de 7 días
Vaginosis asintomática en el embarazo	GPC 2014: tratarla para prevenir la rotura prematura de membranas	ACOG, CDC, USPSTF y SOGC: no buscarla ni tratarla de rutina, porque no reduce el parto pretérmino	Tratar solo la sintomática
Tratamiento de la pareja en la vaginosis	GPC 2014 y CDC 2021: no de rutina	Ensayo de 2025: tratar al varón de una pareja monógama redujo la recurrencia	Puede considerarse en la vaginosis recurrente; las guías aún no lo han incorporado
Tricomoniasis en la mujer	GPC 2014: metronidazol 500 mg cada 12 horas 7 días o 2 g en dosis única; en el embarazo, 2 g en dosis única	CDC 2021 y GPC de control prenatal 2022: 7 días en todas las mujeres, incluidas las embarazadas	Usar el esquema de 7 días
Clamidia	GPC 2014: azitromicina o doxiciclina como primera línea	CDC 2021: doxiciclina 7 días de elección; azitromicina como alternativa y de elección en el embarazo	Preferir doxiciclina fuera del embarazo
Gonorrea	No figura en las fuentes	CDC 2020: ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única	Aplicar el esquema de los CDC
Ketoconazol oral en la candidosis recurrente	GPC 2014: inducción y mantenimiento con ketoconazol	FDA 2013: no debe ser de primera línea por hepatotoxicidad grave; la GPC de 2019 ya no lo incluye	Usar fluconazol
Definición de candidosis recurrente	GPC 2019: 4 o más episodios al año	Consenso de expertos de 2022 que cita las guías de los CDC: 3 o más episodios en un año	Con 3 episodios en un año, estudiar y valorar la pauta de recurrente
Candidosis no complicada	GPC 2014 (cuadro 2): “mujer no inmunocompetente”	GPC 2019: mujer previamente sana	Se trata de un error de la guía de 2014: la forma no complicada ocurre en la mujer inmunocompetente
pH en la candidosis	GPC 2014 (cuadro 1): mayor de 4,5	Las demás fuentes: pH normal	Un pH mayor de 4,5 orienta a vaginosis o tricomoniasis

Tema	Fuente o recomendación previa	Recomendación posterior verificada	Implicación
Chlamydia como “vaginitis”	GPC 2014: la incluye entre las vaginitis	CDC: produce cervicitis (y uretritis)	Buscarla ante cervicitis o factores de riesgo de ITS
Vaginosis y DIU	GPC 2014: sugerir cambio de método	No figura en las demás guías revisadas	No justifica por sí misma retirar el DIU
Cultivo en la sospecha de ITS	Algoritmo de la GPC 2014: cultivos para *Chlamydia* y gonococo	CDC 2021: NAAT de elección	Usar NAAT si se dispone de ellas

Anexo B. Esquema institucional de la GPC de 2014



Algoritmo de abordaje de la paciente con descarga vaginal anormal de la GPC de vaginitis infecciosa (IMSS, 2014). ETS: enfermedad de transmisión sexual; DOC: detección oportuna de cáncer (citología cervical).

Lectura actual.[1,3]

- La búsqueda de *Chlamydia* y gonococo se hace hoy con NAAT, no con cultivo.

- Los “algoritmos 2, 3 y 4” a los que remite corresponden a los tratamientos de las secciones 3 a 6, con los esquemas actualizados del anexo A.
- La revaloración del cuello uterino tras el tratamiento y la referencia si sigue alterado se mantienen.

Referencias

1. Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en el primer nivel de atención. Guía de Referencia Rápida. México: CENETEC; 2014.
2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de candidosis vulvovaginal en mujeres mayores a 12 años de edad. Guía de Evidencias y Recomendaciones. GPC-IMSS-609-19. México: CENETEC; 2019.
3. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1-187.
4. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen KC, Eschenbach D, Holmes KK. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983;74(1):14-22.
5. Vodstrcil LA, Plummer EL, Fairley CK, et al. Male-partner treatment to prevent recurrence of bacterial vaginosis. N Engl J Med. 2025;392(10):947-957.
6. Lockwood CJ, Magriples U. Prenatal care: Initial assessment. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025.
7. Nyirjesy P, Brookhart C, Lazenby G, Schwebke J, Sobel JD. Vulvovaginal candidiasis: a review of the evidence for the 2021 Centers for Disease Control and Prevention of Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines. Clin Infect Dis. 2022;74(Suppl 2):S162-S168.
8. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA limits usage of Nizoral (ketoconazole) oral tablets due to potentially fatal liver injury and risk of drug interactions and adrenal gland problems. 26 de julio de 2013.
9. Instituto Mexicano del Seguro Social. Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo. GPC-IMSS-028-22. México: CENETEC; 2022.
10. St Cyr S, Barbee L, Workowski KA, et al. Update to CDC’s treatment guidelines for gonococcal infection, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(50):1911-1916.
11. Topical treatment of recurrent vulvovaginal candidiasis: an expert consensus. 2022. PMC8812501.