

1-4	5	6	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Tabela do operador $\vec{\nabla}$:

$f = f(x, y, z)$ e $g = g(x, y, z)$ são funções escalares;

$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ e $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$ são funções vetoriais.

1.	$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla}f + \vec{\nabla}g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla}f) \cdot \vec{F} + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla}f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} - \vec{G}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) -$ $-(\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} + \vec{F}(\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} +$ $+\vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$
14.	$\vec{\nabla}\varphi(r) = \varphi'(r)\hat{r}$

Curvatura, torção e aceleração:

Nome	Fórmula
Vetor normal	$\vec{N} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)\ }$
Vetor binormal	$\vec{B} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }$
Curvatura	$\kappa = \left\ \frac{d\vec{T}}{ds} \right\ = \left\ \frac{\frac{d\vec{T}}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \right\ = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau = \left\ \frac{d\vec{B}}{ds} \right\ = \left\ \frac{\frac{d\vec{B}}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \right\ $
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$

Equações de Frenet-Serret:

$\frac{d\vec{T}}{ds}$	=	$\kappa\vec{N}$
$\frac{d\vec{N}}{ds}$	=	$-\kappa\vec{T} \quad +\tau\vec{B}$
$\frac{d\vec{B}}{ds}$	=	$-\tau\vec{N}$

- **Questão 1** (0.5 ponto cada item) Considere a hélice circular não uniforme dada por:

$$\vec{r}(t) = \cos(t)\vec{i} + \sin(t)\vec{j} + e^t\vec{k}, \quad -\infty < t < \infty.$$

Marque a resposta correta para cada coluna.

Normal unitário em $t = 0$:

- () $\vec{N}(0) = \frac{\sqrt{3}}{3} (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$
 () $\vec{N}(0) = \frac{\sqrt{6}}{6} (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$
 () $\vec{N}(0) = \frac{\sqrt{6}}{4} (-\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k})$
 () $\vec{N}(0) = \frac{\sqrt{3}}{3} (-2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$
 () $\vec{N}(0) = \frac{\sqrt{6}}{6} (-2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$

Binormal unitário em $t = 0$:

- () $\vec{B}(0) = \frac{\sqrt{3}}{3} (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$
 () $\vec{B}(0) = \frac{\sqrt{6}}{6} (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$
 () $\vec{B}(0) = \frac{\sqrt{6}}{4} (-\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k})$
 () $\vec{B}(0) = \frac{\sqrt{3}}{3} (-2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$
 () $\vec{B}(0) = \frac{\sqrt{6}}{6} (-2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$

Curvatura em $t = 0$:

- () $\kappa(0) = \frac{\sqrt{6}}{2}$
 () $\kappa(0) = \frac{\sqrt{6}}{4}$
 () $\kappa(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 () $\kappa(0) = \frac{2}{3}$
 () $\kappa(0) = \frac{1}{3}$

Torção em $t = 0$:

- () $\tau(0) = \frac{\sqrt{6}}{2}$
 () $\tau(0) = \frac{\sqrt{6}}{4}$
 () $\tau(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 () $\tau(0) = \frac{2}{3}$
 () $\tau(0) = \frac{1}{3}$

- **Questão 2** (0.5 ponto cada item) Uma abelha viaja sobre uma trajetória $\vec{r}(t)$ com velocidade $\vec{r}'(t) = \vec{v}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + \vec{k}$, $0 \leq t \leq 1$. Sabendo que a abelha passa pelo ponto $(1, 1, 1)$ em $t = 0$, marque a resposta correta para cada coluna.

Posição da abelha $\vec{r}(t)$

- () $\vec{r}(t) = \frac{t^2}{2}\vec{i} + \frac{t^3}{3}\vec{j} + t\vec{k}$
 () $\vec{r}(t) = \left(\frac{t^2}{2} + 1\right)\vec{i} + \left(\frac{t^3}{3} + 1\right)\vec{j} + (t + 1)\vec{k}$
 () $\vec{r}(t) = \left(\frac{t^2}{2} + 1\right)\vec{i} + \left(\frac{t^3}{3} + 1\right)\vec{j} + t\vec{k}$
 () $\vec{r}(t) = \frac{t^2}{2}\vec{i} + \frac{t^3}{3}\vec{j} + \vec{k}$
 () $\vec{r}(t) = \vec{i} + 2t\vec{j}$

Componente tangencial da aceleração a_T

- () $a_T = \frac{1+t}{\sqrt{t^2+t+1}}$
 () $a_T = \frac{t+2t^2}{\sqrt{t^3+t^2+t}}$
 () $a_T = \frac{1+t^2}{\sqrt{t^4+t^2+t}}$
 () $a_T = \frac{t+2t^3}{\sqrt{t^4+t^2+1}}$
 () $a_T = \frac{1+2t}{\sqrt{t^2+t+1}}$

- **Questão 3** (0.5 ponto cada item) Considere a superfície fechada limitada pelos plano $x = \pm 2$, $y = \pm 2$ e $z = \pm 2$, orientada para fora, e o campo $\vec{F} = -2(z^2 + 1)xy\vec{i} + (z^2 + 1)y^2\vec{j} + xyz^2\vec{k}$.

Divergente

- () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = -2(z^2 + 1)xy + (z^2 + 1)y^2 + xyz^2$
 () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = -2(z^2 + 1)x + xyz^2$
 () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = -2(z^2 + 1)x + xyz$
 () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = -(z^2 + 1)y + 2xyz$
 () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 2xyz$

Integral de superfície

- () $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0$
 () $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 4$
 () $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 8$
 () $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 16$
 () $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 24$

• **Questão 4** (0.5 ponto cada item) A figura ao lado apresenta o corte $z = 0$ de um campo $\vec{F}(x, y) = F_1(x, y)\vec{i}$ e as seguintes quatro curvas orientadas: C_1 é um círculo, C_2 é um segmento de reta, C_3 é uma elipse e C_4 é a união de dois segmentos de reta. Considere também a esfera S_1 centrada na origem, raio 2 e orientada para fora e o plano S_2 dado por $x = 0, -2 \leq y \leq 2, -2 \leq z \leq 2$, orientado no sentido de \vec{i} . Marque a resposta correta para cada coluna.

Integral de linha:

☐ $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} > 0$

☐ $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

☐ $\int_{C_4} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

☐ $\int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r} < 0$

☐ $\int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r} > \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Integral de Superfície:


☐ $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0$

☐ $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS > \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS > 0$

☐ $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS < 0$

☐ $\iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS < 0$

☐ $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS > \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0$



Curvatura:

☐ A curvatura é uma constante para cada curva.

☐ A curvatura é zero para C_1 e C_2 .

☐ A curvatura não é constante para C_1 e C_3

☐ Os pontos de maior e menor curvatura estão sobre a curva C_3

☐ A curvatura sobre C_2 cresce da esquerda para direita.

Rotacional:

☐ $\nabla \times \vec{F} \cdot \vec{k} > 0$ em todos os pontos.

☐ $\nabla \times \vec{F} \cdot \vec{k} < 0$ em todos os pontos.

☐ $\nabla \times \vec{F} \cdot \vec{k} = 0$ em todos os pontos.

☐ $\nabla \times \vec{F} \cdot \vec{i} > 0$ em todos os pontos

☐ $\nabla \times \vec{F} \cdot \vec{j} > 0$ em todos os pontos

• **Questão 5** (1.0 ponto) Sejam a_N e a_T indicam as acelerações normal e tangencial, respectivamente. Prove algebricamente a expressão dada por:

$$\|\vec{a}\|^2 = a_N^2 + a_T^2$$

onde \vec{a} é o vetor aceleração. Faça uma interpretação geométrica.

• **Questão 6** (3.0 pontos) Considere o campo vetorial $\vec{F} = xz\vec{i} + x\vec{j} + \frac{y^2}{2}\vec{k}$, a superfície S_1 formada pelo parabolóide $z = 1 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$ e a superfície S_2 formada pelo cone $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, ambas orientada no sentido positivo do eixo z .

a) (1.5) Calcule as seguintes integrais de superfície:

$$\iint_{S_1} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

e

$$\iint_{S_2} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS.$$

convertendo-as em integrais duplas iteradas (sem usar o teoremas de Stokes).

b) (1.0) Use o teorema de Stokes para justificar o resultado do item a).

c) (0.5) Usando o resultado do item a) e o teorema do Stokes, é possível calcular o valor da integral

$$\iint_D (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS.$$

onde D é disco unitário no plano xy dado por $z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$?