

1-6	7	8	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:


- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas


- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente..

COORDENADAS CILÍNDRICAS E ESFÉRICAS

a) Coordenadas cilíndricas : ρ, ϕ, z



b) Coordenadas esféricas : r, θ, ϕ









<p>Cone elíptico: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$</p> 	<p>Elipsóide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$</p> 
<p>Parabolóide Elíptico: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$</p> 	<p>Parabolóide Hiperbólico: $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$</p> 
<p>Hiperbolóide de uma folha: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$</p> 	<p>Hiperbolóide de duas folhas: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$</p> 

Tabela do operador $\vec{\nabla}$:

$f = f(x, y, z)$ e $g = g(x, y, z)$ são funções escalares;

$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ e $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$ são funções vetoriais.


1.	$\vec{\nabla} (f + g) = \vec{\nabla} f + \vec{\nabla} g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla} (fg) = f\vec{\nabla} g + g\vec{\nabla} f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla} f) \cdot \vec{F} + f (\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla} f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ <p>onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano</p>
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} - \vec{G} (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) -$ $- (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} + \vec{F} (\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla} (\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla}) \vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla}) \vec{G} +$ $+ \vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$

Algumas fórmulas:

Nome	Definição
Curvatura	$\kappa = \left\ \frac{d\vec{T}}{ds} \right\ = \left\ \frac{\frac{d\vec{T}}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \right\ = \frac{\ \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau = \left\ \frac{d\vec{B}}{ds} \right\ = \left\ \frac{\frac{d\vec{B}}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \right\ $
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$


- **Questão 1** (1.0 ponto) Uma abelha se desloca com velocidade escalar constante ao longo de sua trajetória. Em um determinado instante sua velocidade (em m/s) é dada pelo vetor $\vec{v} = 2\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}$. Sabendo que o módulo da aceleração neste instante vale 2 m/s^2 , assinale a alternativa que melhor aproxima o valor da norma do vetor $\vec{a} \times \vec{v}$
- () 49. () 9.
- () 21. () 4
- () 14. () 0

- **Questão 2** (1.0 ponto) Considere a curva contida no plano xy representada no gráfico abaixo. Pode-se afirmar que



- () A curvatura é crescente com o afastamento da origem.
- () A curvatura é decrescente com o afastamento da origem.
- () A curvatura é nula em 12 pontos da curva.
- () A curvatura é nula em todos os pontos.
- () A curvatura é não nula mas sempre constante.

- **Questão 3** (1.0 pontos) Considere o campo vetorial \vec{F} dado abaixo. Pode-se afirmar que:



- () O divergente do campo assume valores positivos e negativos, mas não passa por zero.
- () O divergente do campo assume valores positivos e negativos, inclusive zero.
- () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$ em todos os pontos.
- () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} > 0$ em todos os pontos.
- () $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} < 0$ em todos os pontos.

- **Questão 4** (1.0 ponto) Considere o campo escalar dado por

$$g = \sin(x + y + z) + x^2$$

e os campos vetoriais dados por

$$\vec{F} = \cos(x)e^z\vec{i} + \sin(x)e^z\vec{k} \quad \text{e} \quad \vec{G} = \vec{\nabla}g$$

Assinale a alternativa **FALSA**:

- () $\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{0}$
- () $\vec{\nabla} \cdot \vec{G} = 0$.
- () $\vec{\nabla} \times \vec{G} = \vec{0}$.
- () Existe f tal que $\vec{F} = \vec{\nabla}f$.
- () \vec{F} é um campo com divergência nula.
- **Questão 5** (1.0 ponto) A torção da curva $\vec{r} = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t^3\vec{k}$ no ponto $t = 1$ é
- () $\frac{3}{76}$.
- () $\frac{6}{\sqrt{19}}$.
- () $\frac{3}{19}$.
- () $-\frac{3}{76}$.
- () $-\frac{6}{\sqrt{19}}$.
- () $-\frac{3}{19}$.

- **Questão 6** (1.0 ponto) Considere as seguintes duas superfícies abertas:

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad z \geq 0.$$

$$S_2 : x^2 + y^2 \leq 4, \quad z = 0.$$

ambas orientadas de forma que $\vec{n} \cdot \vec{k} \geq 0$, ou seja, componente vertical da normal não negativa. Também considere a região do espaço V limitada superiormente por S_1 e inferiormente por S_2 . Pode-se afirmar que, para o campo vetorial $\vec{F} = e^{x+y+z}\vec{i} + ye^x\vec{j} + e^y\vec{k}$, vale:

$$() \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$

$$() \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS < 0.$$

$$() \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV.$$

$$() \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV = 0.$$

$$() \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS - \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV.$$

- **Questão 7** (2.0 ponto) Use o teorema de Stokes para calcular a circulação dada por $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$, onde C é triângulo de vértices $V_1 = (0, 0, 0)$, $V_2 = (1, 0, 0)$, $V_3 = (1, 1, 1)$ orientado no sentido $V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_1$ e $\vec{v} = y\vec{i} + xz^2\vec{j} + xy^2\vec{k}$.

• **Questão 8** (2.0 ponto) Considere o campo $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + e^z\vec{k}$ e S a superfície composta inferiormente por $z = x^2 + y^2$ e superiormente por $\{(x, y, z); x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$ orientada para fora. Calcule o fluxo de \vec{F} através da superfície fechada S usando:

- a) Usando uma parametrização direta da superfície, isto é, sem usar o Teorema da Divergência;
- b) Usando o Teorema da Divergência.