

### Ayudantía 13 - MAT1610

1. (a) Determine el área de la región comprendida entre las funciones  $f(x) = x^3$  y  $g(x) = -x^3 + x$ .  
(b) Determine el área de la región  $R$  con  $r = \{(x, y) | y \leq x^2 + 1 \wedge y \geq x^2 - 9 \wedge y \leq 3 - x\}$


**Solución:**


- (a) Note que cada función involucrada es una función impar, y  $x^3 = -x^3 + x$  si  $2x^3 - x = x(2x^2 - 1) = 0$ , es decir, si  $x = 0 \vee 2x^2 - 1 = 0$ , esto es, si  $x = 0 \vee x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}$ . Entonces, las funciones son impares y se intersectan en el origen y en los extremos de un intervalo simétrico respecto al origen, entonces el área  $A$  es:

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} (-x^3 + x - x^3) dx \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} (-2x^3 + x) dx \\ &= 2 \left( -\frac{x^4}{2} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} \\ &= 2 \left( -\frac{1}{8} + \frac{1}{4} - 0 \right) \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Así, el valor del área es  $\frac{1}{4}$  unidades de área.

Idea gráfica:





(b) La región  $R$  se muestra en la figura

Note que  $3 - x = x^2 - 9 \Leftrightarrow x^2 + x - 12 = 0 \Leftrightarrow (x + 4)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = -4 \vee x = 3$  y  
 $3 - x = x^2 + 1 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = -2 \vee x = 1$

Entonces, una forma de calcular el área

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-4}^3 (3 - x - (x^2 - 9))dx - \int_{-2}^1 (3 - x - (x^2 + 1))dx \\
 &= \int_{-4}^3 (12 - x - x^2)dx - \int_{-2}^1 (2 - x - x^2)dx \\
 &= \left( 12x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-4}^3 - \left( 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 \\
 &= \frac{343}{6} - \frac{9}{2} \\
 &= \frac{158}{3}
 \end{aligned}$$

El valor del área es  $\frac{158}{3}$  unidades de área.

2. Sea  $R$  la región acotada por la parábola  $y = x - x^2$  y el eje  $x$ .


(a) Determine el área de la región  $R$ .

(b) ¿Existe una recta que pasa por el origen que divide a la región  $R$  en dos partes de igual área? ¿Cuál es la pendiente de la recta?


**Solución:**

(a) El área,  $A_R$  de la región  $R$  es:

$$A_R = \int_0^1 (x - x^2)dx = \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$



- (b) La mitad del área es  $\frac{1}{12}$ . Si existe la recta solicitada, tiene ecuación del tipo  $y = mx$ . el valor de  $m$  debe ser positivo, para que pueda dividir la región en dos regiones de igual área y pasar por el origen. Sea  $(a, b)$  el punto de intersección de la recta y la parábola.



Note que  $m = \frac{b}{a}$ , y que  $b = a - a^2$ , entonces,  $m = \frac{a-a^2}{a} = 1 - a$

$$A_1 = \int_0^a (x - x^2 - mx) dx = \int_0^a (x - x^2 - (1 - a)x) dx = \int_0^a (ax - x^2) dx$$

Así,

$$A_1 = \left( \frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} = \frac{a^3}{6}$$

Entonces, para que el área de la región superior  $A_1$ , corresponda a la mitad del área, debe ocurrir que  $\frac{a^3}{6} = \frac{1}{12}$ , es decir,  $a = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ .

Por lo tanto, El valor de la pendiente es  $m = 1 - \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ .


3. Calcular el volumen de un cono circular truncado, cuya altura es  $h$ , base inferior  $R$  y radio superior  $r$ , como se muestra en la figura.



**Solución:**

Note que el cono circular truncado puede obtenerse al rotar alrededor del eje  $x$  el área del trapecio de altura  $h$ , base menor  $r$  y base mayor  $R$ , como en la figura

Note el área del trapecio se asocia al área bajo la recta que pasa por los puntos  $(0, r)$  y  $(h, R)$ ,



entre 0 y  $h$ . Dicha recta tiene ecuación  $y = mx + r$  con  $m = \frac{R-r}{h-0} = \frac{R-r}{h}$ , entonces,

$$V = \int_0^h \pi(mx + r)^2 dx = \pi \int_0^h (mx + r)^2 = \pi \left. \frac{(mx + r)^3}{3m} \right|_0^h = \frac{(mh + r)^3}{3m} - \frac{(r)^3}{3m}$$

Por lo tanto,

$$V = \frac{\pi}{3m} ((mh + r)^3 - r^3) = \frac{\pi}{3 \frac{R-r}{h}} ((R - r + r)^3 - r^3) = \frac{\pi h}{3(R-r)} (R^3 - r^3) = \frac{\pi h}{3} (R^2 + rR + r^2)$$

Así, el volumen de un cono circular truncado, cuya altura es  $h$ , base inferior  $R$  y radio superior  $r$  es  $V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + rR + r^2)$  unidades de volumen.

4. Determinar el volumen del sólido generado por la rotación del área limitada por las curvas asociadas a  $-y^2 - 1 = x$  y la recta  $x = -2$  alrededor de la recta  $x = -2$

**Solución:**

Puntos de Intersección:  $-y^2 - 1 = -2 \Leftrightarrow y^2 = 1 \Leftrightarrow y = \pm 1$ , es decir, los puntos son  $(-2, -1)$ ,  $(-2, 1)$ .

$$\begin{aligned}
 V &= \int_{-1}^1 \pi(-y^2 - 1 - (-2))^2 dy \\
 &= 2\pi \int_{-1}^1 (-y^2 + 1)^2 dy \\
 &= 2\pi \int_{-1}^1 (y^4 - 2y^2 + 1) dy \\
 &= \pi \left( \frac{y^5}{5} - 2\frac{y^3}{3} + y \right) \Big|_{-1}^1 \\
 &= \left( \frac{16\pi}{15} \right)
 \end{aligned}$$

Así el volumen es  $\frac{16\pi}{15}$  unidades de volumen.

Idea gráfica

