

Pauta Interrogación 3 - MAT1610

1. Calcule la siguiente suma

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} e^{1/n} + \frac{2}{n^2} e^{2/n} + \frac{3}{n^2} e^{3/n} + \dots + \frac{n-1}{n^2} e^{(n-1)/n} \right)$$

Solución:

Observe que

$$\frac{1}{n^2} e^{1/n} + \frac{2}{n^2} e^{2/n} + \frac{3}{n^2} e^{3/n} + \dots + \frac{n-1}{n^2} e^{(n-1)/n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2} e^{k/n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} e^{k/n} \cdot \frac{1}{n} = \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{x_k} \Delta x$$

donde $0 = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n = 1$ corresponden a una partición regular del intervalo $[0, 1]$, por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} e^{1/n} + \frac{2}{n^2} e^{2/n} + \frac{3}{n^2} e^{3/n} + \dots + \frac{n-1}{n^2} e^{(n-1)/n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{x_k} = \int_0^1 x e^x dx.$$

Por otra parte, para calcular $\int_0^1 x e^x dx$ usamos integración por partes, haciendo $u = x$ y $dv = e^x dx$, tenemos que

$$\int_0^1 x e^x dx = x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$$

por lo tanto, el límite pedido es 1.

Distribución de puntajes:

- (1 punto) Por reescribir correctamente la suma usando la notación de sumatoria.
- (0.5 puntos) Por reconocer y separar Δx .
- (0.5 puntos) Por escribir un x_k adecuado.
- (0.5 puntos) Por encontrar una función adecuada.
- (0.5 puntos) Por obtener un intervalo de integración correcto.
- (1 punto) Por transformar la suma de Riemann correctamente en una integral.
- (1 punto) Por aplicar correctamente la integración por partes.
- (0.5 puntos) Por terminar de integrar y evaluar.
- (0.5 puntos) Por el resultado correcto, a partir de un desarrollo correcto.

2. a) Determine

$$\int \frac{2x^2 + x + 4}{x^3 + 4x} dx$$

Solución:

Observe que, usando fracciones parciales

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 + x + 4}{x^3 + 4x} dx &= \int \frac{2x^2 + x + 4}{x(x^2 + 4)} dx = \int \frac{1}{x} + \frac{x+1}{x^2+4} dx \\ &= \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{x}{x^2+4} dx + \int \frac{1}{x^2+4} dx \\ &= \ln|x| + \frac{1}{2} \ln(x^2+4) + \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C \end{aligned}$$

Distribución de puntajes:

- (0.5 puntos) Por factorizar y usar fracciones parciales.
- (0.5 puntos) Por encontrar los valores correctos de las constantes.
- (0.5 puntos) Por determinar correctamente la primera integral.
- (0.5 puntos) Por determinar correctamente la segunda integral.
- (0.5 puntos) Por determinar correctamente la tercera integral.
- (0.5 puntos) Por agregar la constante de integración.

b) Calcule

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$$

Solución:

Usamos la sustitución $x = \sec(\theta)$, con lo cual $dx = \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$ y entonces

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx &= \int_0^{\pi/3} \frac{\sqrt{\sec^2(\theta)-1}}{\sec(\theta)} \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta = \int_0^{\pi/3} \sqrt{\tan^2(\theta)} \tan(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/3} |\tan(\theta)| \tan(\theta) d\theta = \int_0^{\pi/3} \tan^2(\theta) d\theta = \int_0^{\pi/3} (\sec^2(\theta) - 1) d\theta \\ &= (\tan(\theta) - \theta) \Big|_0^{\pi/3} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

Distribución de puntajes:

- (0.6 puntos) Por plantear una sustitución adecuada.
- (0.6 puntos) Por reescribir correctamente el integrando en términos de la nueva variable.
- (0.6 puntos) Por cambiar correctamente los límites de integración (o por volver a la variable original).
- (0.6 puntos) Por integrar correctamente.
- (0.6 puntos) Por evaluar y obtener el resultado correcto.

3. a) Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 1} \int_1^x \frac{e^{t^2}}{x-1} dt$$

Solución:

Observe que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \int_1^x \frac{e^{t^2}}{x-1} dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x e^{t^2} dt}{(x-1)}$$

que es un límite de la forma $0/0$, usando L'Hopital y TFC tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x e^{t^2} dt}{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{x^2} = e$$

Distribución de puntajes:

- (0.5 puntos) Por reescribir el límite en la forma $0/0$.
- (0.5 puntos) Por justificar (o al menos mencionar) el uso de L'H.
- (0.5 puntos) Por justificar (o al menos mencionar) el uso del TFC.
- (0.5 puntos) Por aplicar correctamente la regla de L'H.
- (0.5 puntos) Por aplicar correctamente el TFC.
- (0.5 puntos) Por obtener el valor del límite.

b) Demuestre que

$$\frac{3}{29} \leq \int_0^3 \frac{1}{2+x^3} dx \leq \frac{3}{2}$$

Solución:

Observe que la función $f(x) = \frac{1}{1+x^3}$ es decreciente en el intervalo $[0, 3]$, por lo tanto

$$\frac{1}{29} = f(3) \leq f(x) \leq f(0) = \frac{1}{2}$$

luego, como el intervalo de integración tiene largo tres, tenemos que:

$$\frac{3}{29} \leq \int_0^3 \frac{1}{2+x^3} dx \leq \frac{3}{2}$$

Distribución de puntajes:

- (1 punto) Por indicar que la función es decreciente en el intervalo.
- (1 punto) Por acotar correctamente la función.
- (1 punto) Por llegar justificadamente a la desigualdad pedida.

4. Sea \mathcal{R} la región acotada por la parábola de ecuación $y = x - x^2$ y el eje X .

a) Determine el área de la región \mathcal{R} .(2 ptos.)

Solución:

El área de la región \mathcal{R} está dada por

$$A(\mathcal{R}) = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Distribución de puntajes:

- (0.5 puntos) Por graficar correctamente la región (o por mencionar las intersecciones con el eje x y justificar que la parábola queda por sobre el eje x). Si no se cumple ninguno de los criterios anteriores pero la integral está bien planteada, se asigna igualmente este puntaje.
- (0.5 puntos) Por plantear correctamente el integrando.
- (0.5 puntos) Por plantear correctamente los límites de integración.
- (0.5 puntos) Por integrar, evaluar y obtener el valor correcto del área.

b) Determine el volumen del sólido obtenido al rotar la región \mathcal{R} en torno a la recta $x = 4$.(4 ptos)

Solución:

El volumen del sólido está dado por

$$V = \int_0^1 2\pi(4 - x)(x - x^2) dx = 2\pi \int_0^1 x^3 - 5x^2 + 4x dx = 2\pi \left(\frac{x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{7\pi}{6}$$

Distribución de puntajes:

- (0.5 puntos) Por hacer un bosquejo que incluya (al menos) el eje de rotación y la región \mathcal{R} . Si la integral que permite calcular el volumen está completamente bien planteada, se asigna igualmente este puntaje.
- (0.8 puntos) Por plantear correctamente el radio del cascarón.
- (0.8 puntos) Por plantear correctamente la altura del cascarón.
- (0.8 puntos) Por plantear correctamente ambos límites de integración.
- (0.3 puntos) Por integrar correctamente.
- (0.3 puntos) Por evaluar correctamente.
- (0.5 puntos) Por llegar al valor correcto del volumen.

