

Ejercicios Ex.: EYP1025-1027 Modelos Probabilísticos

Profesor: R. Arellano

Ayudantes: D. Gálvez; A. Díaz

Ejercicio 1: Sean $X_1, \dots, X_n$, n variables aleatorias independientes cada una con distribución $\text{Exp}(\lambda)$.

- Encuentre las fd marginales de $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ y $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.
- Obtenga la fd conjunta de $(X_{(1)}, X_{(n)})$.
- Determine la f.d de $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ e indique su valor esperado.
- Sea $T = \sum_{i=1}^n X_i$. Obtenga la distribución condicional de $T|X_1 = x_1$, y con éste resultado encuentre la distribución condicional de $X_1|T = t$. (*Hint: Note que $Z = X_1 + Z$, donde $X_1 \sim \exp(\lambda)$ y $Z = \sum_{i=2}^n X_i \sim \text{Gama}(n-1, \lambda)$ y son independientes. Luego, pruebe que*

$$f_{T|X_1=x_1}(t) = \begin{cases} f_Z(t - x_1) & \text{si } t > x_1 > 0, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Ejercicio 2: Considere la siguiente distribución de probabilidades del vector aleatorio (X, Y) :

$y \backslash x$	1	2	3
2	0.1	0.2	0.1
4	0.1	0.2	0.3

- Encuentre las distribución marginal de X y la distribución condicional de Y dado $X = x$ para cada $x = 1, 2, 3$.
- Pruebe que $P(Y = y) = E\{P(Y = y | X)\}$ para cada $y = 2, 4$.
- Calcule $E(Y|X = x)$ y $\text{Var}(Y|X = x)$ para cada valor posible de x .
- Calcule $E(Y)$ y $\text{Var}(Y)$.
- Verifique las relaciones: $E(Y) = \sum_{x=1}^3 E(Y|X = x)p_X(x)$ y $\text{Var}(Y) = \sum_{x=1}^3 (x - E(Y|X = x))^2 p_X(x) + \sum_{x=1}^3 (E(Y|X = x) - E(Y))^2 p_X(x)$.

Ejercicio 3: Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes cada una con distribución normal estándar. Sean $Y_1 = X_1$ e $Y_2 = X_1 + X_2$.

- Encuentre la distribución conjunta de Y_1 e Y_2 , y pruebe que $Y_2|Y_1 = y_1 \sim N(y_1, 1)$.
- Muestre $Y_2 \sim N(0, 2)$. Verifique que $E(Y_2) = E\{E(Y_2|X_1)\}$ y $\text{Var}(Y_2) = \text{Var}\{E(Y_2|X_1)\} + E\{\text{Var}(Y_2|X_1)\}$.
- Encuentre la distribución condicional de $Y_1|Y_2 = y_2$ e indique su media y su varianza.

Ejercicio 4: Sea (X, Y) un vector aleatorio con fd dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 24x^2/y^3, & 0 < x < 1, y > 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Pruebe que X e Y son variables aleatorias independientes.
- (a) Calcule $E(XY)$ y $P(XY > 1)$.
- (b) Encuentre la fd conjunta de $U = X$ y $V = XY$, y la fd condicional de V dado $U = u$.
- (c) Calcule $E(V|U = u)$. ¿Qué puede sobre la existencia de $\text{Var}(V|U = u)$? Discuta.

Ejercicio 5: Sean X_1 y X_2 va con fd conjunta dada por:

$$p(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{36}, & x_1 = 1, 2, 3; x_2 = 1, 2, 3, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Encuentre la fp conjunta de $Y_1 = X_1 X_2$ e $Y_2 = X_2$.
- (b) Encuentre la fp marginal de Y_1 e indique su media y su varianza.
- (c) Encuentre la fp condicional de Y_2 dado $Y_1 = y_1$ e indique su media y su varianza para cada valor posible de y_1 .
- (d) Muestre que $E(Y_2) = E\{E(Y_2|Y_1)\}$.

Ejercicio 6: Sean X , Y y Z variables aleatorias con fd conjunta

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 8xyz, & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

- (a) Calcule $P(X < Y < Z)$.
- (b) Encuentre las distribuciones de $U = \max\{X, Y, Z\}$ y $V = \min\{X, Y, Z\}$.
- (c) Calcule $E(U - V)$ y discuta sobre el calculo de $\text{Var}(U - V)$.

Ejercicio 7: Sean X_1 , X_2 y X_3 variables aleatorias independientes cada una con la misma densidad, digamos:

$$f(x) = \begin{cases} 5x^4, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

- (a) Encuentre el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas de (X_1, X_2, X_3) .
- (b) Encuentre la fd condicional de (X_1, X_2) dado $X_3 = x_3$.
- (b) Encuentre la fd y la función de distribución de $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

Ejercicio 8: Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes con distribución de Poisson con parámetros λ_1 y λ_2 , respectivamente. Encuentre la distribución condicional X_2 dado $X_1 + X_2 = x$ e indique su media y su varianza para cada valor posible de x .

Ejercicio 9: Sea X e Y variables aleatorias tales que $Y \mid X = x \sim \text{Poisson}(x)$ y $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$. Obtenga la distribución condicional de X dado $Y = y$ e indique su media y su varianza.

Ejercicio 10: Sea X y Y variables aleatorias tales que $Y \mid X = x \sim \text{Bin}(x, p)$ y $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Pruebe que $Y \sim \text{Poisson}(\lambda p)$.

Ejercicio 11: Sean X e Y variables aleatorias reales definidas en un mismo espacio de probabilidad, y h una función real valorada tal que $h(Y)$ sea una variable aleatoria. Si $E\{h(Y)\}$ existe, muestre que $E\{h(Y)\} = E\{E(h(Y)|X)\}$.

Ejercicio 12: Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2)^T$ un vector aleatorio con distribución normal bivariada con vector de medias $\mu = (\mu_1, \mu_2)^T$ y matriz de varianzas-covarianzas $\Sigma = (\sigma_{ij})$, para $i, j = 1, 2$.

(a) Escriba la fd y la fgm del vector aleatorio $\mathbf{X} = (X_1, X_2)^T$.

(b) Indique las distribuciones marginales.

(c) Pruebe que $X_2|X_1 = x_1 \sim N(\mu_{2.1}, \sigma_{2.1}^2)$, donde $\mu_{2.1} = \mu_2 + \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1^2}(x_1 - \mu_1)$ es la función de regresión de X_2 dado $X_1 = x_1$ y $\sigma_{2.1}^2 = \sigma_2^2 - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_1^2}$ es la respectiva varianza condicional, la cual no depende de x_1 .

(c) Intente extender el resultado en (c) al caso de la distribución normal multivariada $N_n(\mu, \Sigma)$.

Ejercicio 13: Sea (X, Y) un vector aleatorio con fd dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y < \infty, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

(a) Encuentre la distribución condicional de Y dado $X = x$.

(b) Encuentre la función de regresión Y sobre X .

(c) Muestre que la varianza de Y dado $X = x$ no depende de x .

Ejercicio 14: El número de clientes que llegan a un supermercado en una hora hábil es una variable aleatoria con media 100 y desviación estándar 20. Cada cliente, independiente de los otros, gasta una cantidad aleatoria de dinero con media \$100 y desviación estándar \$50. Encuentre la media y la desviación estándar de la cantidad de dinero gastado durante una hora hábil.

Ejercicio 15: Sean $N, X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes, donde $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y $X_1, X_2, \dots$ son iid $U(0, \theta)$.

(a) Sea $Y = \sum_{i=1}^N X_i$. Calcule $E(Y)$ y $\text{Var}(Y)$.

(b) Sean $Y = \max\{X_1, \dots, X_N\}$ y $Z = \min\{X_1, \dots, X_N\}$. Encuentre la media y varianza de Y y Z . ¿Es posible calcular sus varianzas? Discuta.