

Unidad II: Lógica de Primer Orden

Isomorfismos y definibilidad sobre una estructura

Clase 12 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

La noción de isomorfismo

Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{0, s\}$ donde 0 es constante y s función unaria.

Sean las $\mathcal{L}$ -estructuras $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{A}}, s^{\mathfrak{A}})$ y $\mathfrak{B} = (B, 0^{\mathfrak{B}}, s^{\mathfrak{B}})$ tal que:

- $B = \{a\}^*$.
- $0^{\mathfrak{B}} = \varepsilon$.
- $s^{\mathfrak{B}}(a^n) = a^{n+1}$ para todo $n \geq 0$.

¿Son similares estas estructuras?

La noción de isomorfismo

Idea:

Dos estructuras son **isomorfas** si son idénticas excepto por sus dominios.

Definición:

Sea un vocabulario $\mathcal{L}$ y dos $\mathcal{L}$ -estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ con dominios A y B .

Decimos que $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son **isomorfas**, denotado como $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$, si existe una biyección $h : A \rightarrow B$ tal que:

- Para cada constante $c \in \mathcal{L}$, se tiene $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$.
- Para cada función n -aria $f \in \mathcal{L}$ y elementos $a_1, \dots, a_n \in A$, se tiene:

$$h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

- Para cada relación m -aria $R \in \mathcal{L}$ y elementos $a_1, \dots, a_m \in A$, se tiene:

$$(a_1, \dots, a_m) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_m)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$

Decimos que la biyección $h : A \rightarrow B$ es un **isomorfismo** de $\mathfrak{A}$ a $\mathfrak{B}$.

La noción de isomorfismo: ejemplos

Considere las estructuras anteriores $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{A}}, s^{\mathfrak{A}})$ y $\mathfrak{B} = (B, 0^{\mathfrak{B}}, s^{\mathfrak{B}})$ con:

- $B = \{a\}^*$.
- $0^{\mathfrak{B}} = \varepsilon$.
- $s^{\mathfrak{B}}(a^n) = a^{n+1}$ para todo $n \geq 0$.

La biyección $h: \mathbb{N} \rightarrow B$ tal que $h(n) = a^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ es un **isomorfismo**:

- $h(0^{\mathfrak{A}}) = h(0) = a^0 = \varepsilon = 0^{\mathfrak{B}}$.
- $h(s^{\mathfrak{A}}(n)) = h(n+1) = a^{n+1} = s^{\mathfrak{B}}(a^n) = s^{\mathfrak{B}}(h(n))$.

Concluimos que $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son **isomorfas**.

La noción de isomorfismo: ejemplos

- Sean $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{A}}, 1^{\mathfrak{A}}, +^{\mathfrak{A}}, <^{\mathfrak{A}})$ y $\mathfrak{B} = (B, 0^{\mathfrak{B}}, 1^{\mathfrak{B}}, +^{\mathfrak{B}}, <^{\mathfrak{B}})$, donde B es el conjunto de los números pares y los demás símbolos se definen de la manera usual.

¿Son $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ isomorfos?

- ¿Qué pasa en el caso anterior si agregamos la multiplicación?

- Sean $\mathfrak{M} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{M}}, 1^{\mathfrak{M}}, s^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}, \cdot^{\mathfrak{M}}, <^{\mathfrak{M}})$ y $\mathfrak{Z} = (\mathbb{Z}, 0^{\mathfrak{Z}}, 1^{\mathfrak{Z}}, s^{\mathfrak{Z}}, +^{\mathfrak{Z}}, \cdot^{\mathfrak{Z}}, <^{\mathfrak{Z}})$.

¿Son $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{Z}$ isomorfos?

- Sea $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, 0^{\mathfrak{R}}, 1^{\mathfrak{R}}, s^{\mathfrak{R}}, +^{\mathfrak{R}}, \cdot^{\mathfrak{R}}, <^{\mathfrak{R}})$. ¿Son $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{R}$ isomorfos?

El teorema de isomorfismo: versión oraciones

Teorema:

Si $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son $\mathcal{L}$ -estructuras isomorfas, entonces para cada $\mathcal{L}$ -oración φ :

$$\mathfrak{A} \models \varphi \text{ si y sólo si } \mathfrak{B} \models \varphi.$$

Consecuencia:

La lógica de primer orden **no** puede distinguir dos estructuras isomorfas.

El teorema de isomorfismo: versión general

Teorema de isomorfismo:

Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos $\mathcal{L}$ -estructuras isomorfas con dominios A y B .

Sea $h : A \rightarrow B$ un isomorfismo de $\mathfrak{A}$ a $\mathfrak{B}$, y σ una asignación para $\mathfrak{A}$.

Entonces para cada $\mathcal{L}$ -fórmula φ :

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi \text{ si y sólo si } (\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \models \varphi.$$

Antes de demostrar este teorema, veamos algunas aplicaciones.

Poder expresivo de LPO

¿Qué se puede expresar en LPO?

Dos posibles formas de abordar esta pregunta:

- Definibilidad sobre una estructura:

Dada una $\mathcal{L}$ -estructura fija $\mathfrak{A}$ con dominio A .

¿Qué relaciones sobre A son definibles usando $\mathcal{L}$ -fórmulas en LPO?

Ejemplo: Dada $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, +^{\mathfrak{A}})$.

¿Es definible el 0? ¿es definible la relación $\leq$? ¿es definible la multiplicación?

- Definibilidad de clases de estructuras:

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$ fijo.

¿Qué clases de $\mathcal{L}$ -estructuras son definibles con $\mathcal{L}$ -oraciones en LPO?

Ejemplo: Dado el vocabulario de grafos dirigidos $\mathcal{L} = \{E\}$.

¿Es definible la clase de grafos que contienen un ciclo dirigido de largo 3?

¿Es definible la clase de grafos 3-coloreables?

Definibilidad sobre una estructura

Recordatorio:

Escribimos $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ si las variables libres de φ son $\{x_1, \dots, x_k\}$.

Notación:

Si $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$ y $\sigma(x_i) = a_i$ para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, entonces escribimos $\mathfrak{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$.

Definición:

Sea una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A y $S \subseteq A^k$ una relación sobre A de aridad $k \geq 1$. Decimos que S es **definible** en $\mathfrak{A}$ si existe una $\mathcal{L}$ -fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ tal que:

$$S = \{(a_1, \dots, a_k) \in A^k \mid \mathfrak{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_k)\}.$$

Definibilidad sobre una estructura: ejemplos

Defina las siguientes relaciones sobre $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, +^{\mathfrak{A}})$.

- El número 0.

$$\varphi_0(x) = \forall y (x + y = y)$$

- La relación menor que $<$.

$$\varphi_{<}(x, y) = \exists z (x + z = y \wedge x \neq y)$$

- La relación sucesor.

$$\varphi_{succ}(x, y) = \varphi_{<}(x, y) \wedge \neg \exists z (\varphi_{<}(x, z) \wedge \varphi_{<}(z, y))$$

- El número 1.

$$\varphi_1(x) = \forall y (\varphi_0(y) \rightarrow \varphi_{succ}(y, x))$$

Definibilidad sobre una estructura: ejemplos

Defina las siguientes relaciones sobre $\mathfrak{A} = (\mathbb{R}, +^{\mathfrak{A}}, \cdot^{\mathfrak{A}})$.

- El número 0.

$$\varphi_0(x) = \forall y (x + y = y)$$

- Los reales no negativos.

$$\varphi_{\geq 0}(x) = \exists y (y \cdot y = x)$$

- La relación menor o igual que $\leq$.

$$\varphi_{\leq}(x, y) = \exists z (\varphi_{\geq 0}(z) \wedge x + z = y)$$

Definibilidad e isomorfismos

Defina las siguientes relaciones sobre $\mathfrak{A} = (\mathbb{R}, +^{\mathfrak{A}})$.

- La multiplicación.

$$\varphi(x, y, z) = ?$$

¿Cómo demostramos que una relación **no** es definible?

Podemos usar el teorema de isomorfismo!

Estrategia:

- Asumir por contradicción que existe una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ que define la relación sobre $\mathfrak{A}$.
- Escoger un isomorfismo h adecuado de $\mathfrak{A}$ a $\mathfrak{A}$.
- Por el teorema de isomorfismo, se tiene que

$$\mathfrak{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_k) \iff \mathfrak{A} \models \varphi(h(a_1), \dots, h(a_k))$$

Derivar una contradicción desde ahí.

Definibilidad e isomorfismos

Veamos que la multiplicación no es definible sobre $\mathfrak{A} = (\mathbb{R}, +^{\mathfrak{A}})$.

Por contradicción, supongamos que existe una fórmula $\varphi(x, y, z)$ tal que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi(a, b, c) \iff a \cdot b = c$$

Definamos $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como $h(x) = \frac{x}{2}$.

- h es un isomorfismo de $\mathfrak{A}$ a $\mathfrak{A}$.
- Por el teorema de isomorfismo, para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$, se cumple que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi(a, b, c) \iff \mathfrak{A} \models \varphi(h(a), h(b), h(c)).$$

- Pero tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi(2, 2, 4)$ y $\mathfrak{A} \not\models \varphi(h(2), h(2), h(4))$.
Obtenemos una contradicción.

Ejercicios:

- Demuestre que la suma no es definible en $(\mathbb{R}, \cdot)$.
- Demuestre que la suma no es definible en $(\mathbb{N}, \cdot)$.
- ¿Se puede usar el teorema de isomorfismo para mostrar que la multiplicación no es definible en $(\mathbb{N}, +)$?

El teorema de isomorfismo: demostración

Para demostrar el teorema de isomorfismo usaremos inducción.

Sea un vocabulario $\mathcal{L}$ y dos $\mathcal{L}$ -estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ con dominios A y B .

Primero demostraremos el siguiente lemma:

Lema:

Si σ es una asignación para $\mathfrak{A}$ y $h : A \rightarrow B$ es un isomorfismo de $\mathfrak{A}$ a $\mathfrak{B}$, entonces $\widehat{h \circ \sigma} = h \circ \hat{\sigma}$.

Recordatorio:

si τ es asignación, $\hat{\tau}$ es su extensión al conjunto de $\mathcal{L}$ -términos.

Demostración del lema

Lema:

Si σ es una asignación para $\mathfrak{A}$ y $h : A \rightarrow B$ es un isomorfismo de $\mathfrak{A}$ a $\mathfrak{B}$, entonces $\widehat{h \circ \sigma} = h \circ \hat{\sigma}$.

Demostración:

Por inducción en los $\mathcal{L}$ -términos:

- Para cada constante $c \in \mathcal{L}$:

$$\widehat{h \circ \sigma}(c) = c^{\mathfrak{B}} = h(c^{\mathfrak{A}}) = h(\hat{\sigma}(c)) = (h \circ \hat{\sigma})(c).$$

- Para cada variable x :

$$\widehat{h \circ \sigma}(x) = (h \circ \sigma)(x) = h(\sigma(x)) = h(\hat{\sigma}(x)) = (h \circ \hat{\sigma})(x).$$

Demostración del lema

Lema:

Si σ es una asignación para $\mathfrak{A}$ y $h : A \rightarrow B$ es un isomorfismo de $\mathfrak{A}$ a $\mathfrak{B}$, entonces $\widehat{h \circ \sigma} = h \circ \hat{\sigma}$.

Demostración:

Por inducción en los $\mathcal{L}$ -términos:

- Para cada función n -aria $f \in \mathcal{L}$ y $\mathcal{L}$ -términos $t_1, \dots, t_n$:

Si $\widehat{h \circ \sigma}(t_i) = (h \circ \hat{\sigma})(t_i)$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces

$$\begin{aligned}\widehat{h \circ \sigma}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{B}}(\widehat{h \circ \sigma}(t_1), \dots, \widehat{h \circ \sigma}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{B}}((h \circ \hat{\sigma})(t_1), \dots, (h \circ \hat{\sigma})(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{B}}(h(\hat{\sigma}(t_1)), \dots, h(\hat{\sigma}(t_n))) \\ &= h(f^{\mathfrak{A}}(\hat{\sigma}(t_1), \dots, \hat{\sigma}(t_n))) \\ &= h(\hat{\sigma}(f(t_1, \dots, t_n))) \\ &= (h \circ \hat{\sigma})(f(t_1, \dots, t_n))\end{aligned}$$

El teorema de isomorfismo: demostración

Aplicaremos inducción sobre las $\mathcal{L}$ -fórmulas φ :

- Si $\varphi = t_1 = t_2$, entonces:

$$\begin{aligned} &(\mathfrak{A}, \sigma) \models t_1 = t_2 \\ &\iff \\ &\hat{\sigma}(t_1) = \hat{\sigma}(t_2) \\ &\iff \\ &h(\hat{\sigma}(t_1)) = h(\hat{\sigma}(t_2)) \\ &\iff \\ &(h \circ \hat{\sigma})(t_1) = (h \circ \hat{\sigma})(t_2) \\ &\iff \\ &\widehat{h \circ \sigma}(t_1) = \widehat{h \circ \sigma}(t_2) \\ &\iff \\ &(\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \models t_1 = t_2 \end{aligned}$$

El teorema de isomorfismo: demostración

Aplicaremos inducción sobre las $\mathcal{L}$ -fórmulas φ :

- Si $\varphi = R(t_1, \dots, t_n)$, entonces:

$$\begin{aligned}(\mathfrak{A}, \sigma) &\models R(t_1, \dots, t_n) \\&\iff \\(\hat{\sigma}(t_1), \dots, \hat{\sigma}(t_n)) &\in R^{\mathfrak{A}} \\&\iff \\(h(\hat{\sigma}(t_1)), \dots, h(\hat{\sigma}(t_n))) &\in R^{\mathfrak{B}} \\&\iff \\((h \circ \hat{\sigma})(t_1), \dots, (h \circ \hat{\sigma})(t_n)) &\in R^{\mathfrak{B}} \\&\iff \\(\widehat{h \circ \sigma}(t_1), \dots, \widehat{h \circ \sigma}(t_n)) &\in R^{\mathfrak{B}} \\&\iff \\(\mathfrak{B}, h \circ \sigma) &\models R(t_1, \dots, t_n)\end{aligned}$$

El teorema de isomorfismo: demostración

Aplicaremos inducción sobre las $\mathcal{L}$ -fórmulas φ :

Supongamos que la propiedad se cumple para ψ y θ .

■ Si $\varphi = \neg\psi$, entonces:

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$$

$$\iff$$

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \psi$$

$$\iff$$

$$(\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \not\models \psi$$

$$\iff$$

$$(\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \models \varphi$$

El teorema de isomorfismo: demostración

Aplicaremos inducción sobre las $\mathcal{L}$ -fórmulas φ :

Supongamos que la propiedad se cumple para ψ y θ .

■ Si $\varphi = \psi \wedge \theta$, entonces:

$$\begin{aligned} &(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi \\ &\iff \\ &(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi \text{ y } (\mathfrak{A}, \sigma) \models \theta \\ &\iff \\ &(\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \models \psi \text{ y } (\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \models \theta \\ &\iff \\ &(\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \models \varphi \end{aligned}$$

El teorema de isomorfismo: demostración

Aplicaremos inducción sobre las $\mathcal{L}$ -fórmulas φ :

Supongamos que la propiedad se cumple para ψ y θ .

- Suponga que $\varphi = \exists x \psi$.

Sólo vamos a demostrar una dirección. La otra dirección se demuestra de la misma forma pero considerando h^{-1} en lugar de h .

Si $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$, entonces existe $a \in A$ tal que $(\mathfrak{A}, \sigma[x/a]) \models \psi$.

Por hipótesis de inducción: Existe $a \in A$ tal que $(\mathfrak{B}, h \circ \sigma[x/a]) \models \psi$.

Tenemos que $h \circ \sigma[x/a] = (h \circ \sigma)[x/h(a)]$.

Luego, existe $b \in B$ tal que $(\mathfrak{B}, (h \circ \sigma)[x/b]) \models \psi$.

Concluimos que $(\mathfrak{B}, h \circ \sigma) \models \varphi$.

Esto concluye la demostración del teorema de isomorfismo.

(¿por qué basta tomar $\neg, \wedge$ y $\exists$?)