

GPI: lazo abierto y margen de fase variando $k_0$, $k_1$ y $k_2$ (planta sin retardo)
a · Magnitud de $C(s)\,G(s)$, variación de $k_0$
b · Magnitud de $C(s)\,G(s)$, variación de $k_1$
c · Magnitud de $C(s)\,G(s)$, variación de $k_2$
magnitud [dB]
nominal: MF = 65,8°
$k_0$ = 1/4 × nominal: MF = 75,8°
$k_0$ = 1/2 × nominal: MF = 72,4°
$k_0$ = 2 × nominal: MF = 54,2°
$k_0$ = 4 × nominal: MF = 37,7°
$k_1$ = 1/4 × nominal: MF = 29,8°
$k_1$ = 1/2 × nominal: MF = 50,9°
$k_1$ = 2 × nominal: MF = 61,7°
$k_1$ = 4 × nominal: MF = 49,3°
$k_2$ = 1/4 × nominal: MF = 21,4°
$k_2$ = 1/2 × nominal: MF = 43,3°
$k_2$ = 2 × nominal: MF = 71,2°
$k_2$ = 4 × nominal: MF = 66,7°
d · Fase de $C(s)\,G(s)$, variación de $k_0$
e · Fase de $C(s)\,G(s)$, variación de $k_1$
f · Fase de $C(s)\,G(s)$, variación de $k_2$
fase [°]
frecuencia [rad/h]