

# SRVAE math

Etienne Bardet

May 2025

## 1 Introduction

## 2 Equation

Nous voulons maximiser  $p(x)$  sachant les variables latentes  $u, z$  et  $y$ . La formulation de la log probabilité est la suivante :

$$p(x) = E_{q(w)}\left[\frac{p(x, w)}{q(w)}\right] \quad (1)$$

Commençons par réexprimer la loi jointe :

$$p(x, w) = p(x|y, u, z)p(z|y, u)p(y|u)p(u) \quad (2)$$

Nous pouvons négliger la dépendance en  $u$  pour  $x$  car les informations sont redondantes avec  $y$ . Nous avons également :

$$q(w|x) = q(z|y, x, u)q(u|x, y)q(y|x) \quad (3)$$

Or il n'y a aucun apport d'information de  $x$  sur  $u$  sachant  $x, y$ . Nous considérons également la transition  $y|x$  comme déterministe. Ainsi, nous avons :

$$q(w|x) \approx q(z|y, x)q(u|y)q(y|x) \quad (4)$$

On a donc l'elbo suivant :

$$\begin{aligned} \log(p(x)) &\geq E_{q(z|y, x)}(\log(p(x|y, z))) + E_{q(z|y, x)q(u|y)}(\log(p(z|y, u))) \\ &\quad + E_{q(u|y)}(\log(p(y|u))) + E_{q(u|y)}(\log(p(u))) - E_{q(z|y, x)q(u|y)}(\log(q(z|y, x))) \\ &\quad - E_{q(u|y)}(\log(q(u|y))) \end{aligned} \quad (5)$$

On peut regrouper les termes suivants :

$$\begin{aligned} &E_{q(z|y, x)q(u|y)}(\log(p(z|y, u))) - E_{q(z|y, x)q(u|y)}(\log(q(z|y, x))) \\ &= E_{q(u|y)}[q(z|y, x)\log(\frac{p(z|y, u)}{q(z|y, x)})] \\ &= -E_{q(u|y)}[q(z|y, x)\log(\frac{q(z|y, x)}{p(z|y, u)})] \end{aligned} \quad (6)$$

On retrouve donc une divergence de Kullback-Leibler :

$$-E_{q(u|y)}[q(z|y, x) \log(\frac{q(z|y, x)}{p(z|y, u)})] = -E_{q(u|y)}(\mathcal{KL}(q(z|y, x)||p(z|y, u))) \quad (7)$$

Ici on peut simplifier la dépendance en y pour z car on considère que y n'apporte pas plus d'information que x, d'où :

$$-\mathcal{KL}(q(z|y, x)||p(z|y, u)) \approx -\mathcal{KL}(q(z|x)||p(z|y, u)) \quad (8)$$

De même on a :

$$\begin{aligned} -E_{q(u|y)q(y|x)}(\log(q(u|y))) + E_{q(u|y)q(y|x)}(\log(p(u))) = \\ -E_{q(y|x)}(q(u|y) \log(\frac{q(u|y)}{p(u)})) = -E_{q(y|x)}(\mathcal{KL}(q(u|y)||p(u))) \end{aligned} \quad (9)$$

Il reste donc :

$$ELBO = E_{q(z|y, x)}(\log(p(x|y, z))) + E_{q(u|y)}(\log(p(y|u))) - \mathcal{KL}(q(u|y)||p(u)) - \mathcal{KL}(q(z|x)||p(z|y, u)) \quad (10)$$

Notons d'ailleurs qu'avec un décodeur Gaussien :

$$p(x|y, z) = \mathcal{N}(\hat{x}, \gamma_1^2) \quad p(y|u) = \mathcal{N}(\hat{y}, \gamma_2^2) \quad (11)$$

Pour les décodeurs, nous avons donc en log :

$$\log(p(x|y, z)) = -\log((2\pi)^{\frac{k}{2}} \gamma^k) + -\frac{\|x - \hat{x}\|_2^2}{2\gamma^2} \propto -k * \log(\gamma) - \frac{\|x - \hat{x}\|_2^2}{2\gamma^2} \quad (12)$$

On a donc :

$$\begin{aligned} ELBO = -(k * \log(\gamma_1) + E_{q(z|y, x)}(\frac{\|x - \hat{x}\|_2^2}{2\gamma_1^2})) - (k * \log(\gamma_2) + E_{q(u|y)}(\frac{\|y - \hat{y}\|_2^2}{2\gamma_2^2})) \\ - E(\mathcal{KL}(q(u|y)||p(u))) - E(\mathcal{KL}(q(z|x)||p(z|y, u))) \end{aligned} \quad (13)$$

Nous optimisons donc la loss suivante (négative Elbo) :

$$\begin{aligned} -ELBO = k * \log(\gamma_1) + E_{q(z|y, x)}(\frac{\|x - \hat{x}\|_2^2}{2\gamma_1^2}) + k * \log(\gamma_2) + E_{q(u|y)}(\frac{\|y - \hat{y}\|_2^2}{2\gamma_2^2}) \\ + E_{q(y|x)}(\mathcal{KL}(q(u|y)||p(u))) + E_{q(u|y)}(\mathcal{KL}(q(z|x)||p(z|y, u))) \end{aligned} \quad (14)$$

Soit en posant :

$$MSE(x, \hat{x}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \hat{x}_n) \quad (15)$$

On obtient finalement :

$$\begin{aligned} -ELBO = k * \log(\gamma_1) + \frac{k}{2\gamma_1} * MSE(x, \hat{x}) + k * \log(\gamma_2) + \frac{k}{2\gamma_2} * MSE(y, \hat{y}) \\ + E_{q(y|x)}(\mathcal{KL}(q(u|y)||p(u))) + E_{q(u|y)}(\mathcal{KL}(q(z|x)||p(z|y, u))) \end{aligned} \quad (16)$$

Avec k, la dimension des données.