SOME

Sistema de Observación del Mar Equinoccial

INOCAR — Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina

Boletín quincenal para el CN-ERFEN

Condiciones oceanográficas en «Región Niño 1+2» y precipitación costera

Periodo: 15/10/2026 – 29/10/2026
Autor o autora: Dra. María Vera
Fecha de generación: 30/10/2026 22:26
Versión del sistema: 0.1.0-demo

DATOS REALES

Los valores de este documento son datos reales: 1) la temperatura superficial del mar de NOAA OISST v2.1 (NOAA/NCEI, servida por NOAA PSL; llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los últimos ~15 días son preliminares) y el índice Niño 1+2 calculado con ella en la región oficial (0–10° S, 90–80° O). 2) la temperatura del agua en superficie promediada en «Región Niño 1+2» (resumen ejecutivo) y el perfil vertical de temperatura con su capa de mezcla en 2.00° S, 85.00° O, del análisis diario de Copernicus Marine (GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024; E.U. Copernicus Marine Service Information; nunca el pronóstico), llevados a la malla de 0.25° y a los niveles de 0 a 100 m del prototipo; la anomalía en superficie usa la climatología oficial GLORYS12, cuyo periodo efectivo indica el texto. 3) la precipitación de CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UC Santa Barbara), obtenida del servidor del CHC o de su réplica pública en dynamical.org (el mismo producto; «Fuentes y métodos» indica cuál se usó) y llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los días preliminares, si los hay, se indican en el texto y se reemplazarán por la versión final. Cada figura indica su procedencia al pie (RF-12).

1. Resumen ejecutivo

Según NOAA OISST (datos reales), entre el 15/10/2026 y el 29/10/2026, la temperatura superficial del mar en «Región Niño 1+2» promedió 27.1 °C, es decir 5.5 °C por encima de la climatología 1991-2020. El índice Niño 1+2 (NOAA OISST, región 0–10° S, 90–80° O) es +5.34 °C en la semana del 25/10/2026 al 29/10/2026 (semana incompleta: 5 días con dato; datos preliminares): condición El Niño (fase cálida). El índice está en la fase cálida (≥ +0.5 °C) desde la semana del 01/02/2026: 39 semanas consecutivas.

Serie diaria de NOAA OISST (datos reales):

- El valor más alto, 27.4 °C, se registró el 25/10/2026; el más bajo, 26.9 °C, el 15/10/2026.
- El último dato disponible (29/10/2026) es 27.3 °C, es decir 5.7 °C por encima de lo normal para octubre (periodo de referencia 1991-2020).
- El 100 % de los datos del periodo estuvo por encima de la climatología.

Según Copernicus Marine (datos reales del análisis diario), entre el 15/10/2026 y el 26/10/2026 la temperatura del agua en superficie en «Región Niño 1+2» promedió 27.6 °C, es decir 5.7 °C por encima de la climatología 1993-2016 (se pidió 1991-2020). Es una estimación independiente de la de NOAA OISST (otro sistema de análisis y otra climatología de referencia), por lo que sus valores y anomalías pueden diferir.

Perfil de Copernicus Marine (datos reales):

- En el punto 2.00° S, 85.00° O, el 26/10/2026 la temperatura del agua fue 28.0 °C en superficie y 23.1 °C a 100 m.
- La capa de mezcla alcanzó 17 m; por encima de esa profundidad la temperatura del agua es casi uniforme y debajo cambia con rapidez.

En precipitación (CHIRPS v3, datos reales), la provincia con mayor acumulado del periodo fue Esmeraldas (151 mm, +102 mm respecto a lo normal) y la de menor acumulado, Galápagos (0 mm).

2. Temperatura superficial del mar





Figura 1. Temperatura superficial del mar · NOAA OISST v2.1, 15/10/2026 – 29/10/2026 (15 días) · Región Niño 1+2. Fuente: NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público. · Identificador NOAA-OISST-v2.1 · Fecha de corte 29/10/2026.



Fuente: NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público.

Datos reales · NOAA OISST

Figura 2. Anomalía de temperatura superficial del mar · NOAA OISST v2.1, 15/10/2026 – 29/10/2026 (15 días) · Región Niño 1+2 · referencia 1991-2020. Fuente: NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público. Climatología: NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL; DOI 10.25921/RE9P-PT57). · Identificador NOAA-OISST-v2.1 · Fecha de corte 29/10/2026.

Campo	Media	Mínimo	Máximo	Celdas válidas
SST promedio del periodo	27.1 °C	24.8 °C	29.0 °C	954
Anomalía de SST	+5.5 °C	+3.2 °C	+7.1 °C	954

Incluye 15 días con datos preliminares de NOAA OISST (del 15/10/2026 al 29/10/2026), que NOAA/NCEI reemplazará por la versión final unas dos semanas después; sus valores pueden cambiar ligeramente.

3. Evolución de los últimos 12 meses




Figura 3. Serie diaria de SST en «Región Niño 1+2» con climatología mensual (línea discontinua) y anomalías. Fuente: NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público. Climatología: NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL; DOI 10.25921/RE9P-PT57). · Identificador NOAA-OISST-v2.1 · Fecha de corte 29/10/2026.

- Entre el 30/10/2025 y el 29/10/2026 la temperatura superficial del mar promedió 25.6 °C.
- El valor más alto, 28.3 °C, se registró el 09/03/2026; el más bajo, 21.1 °C, el 13/11/2025.
- El último dato disponible (29/10/2026) es 27.3 °C, es decir 5.7 °C por encima de lo normal para octubre (periodo de referencia 1991-2020).
- El 80 % de los datos del periodo estuvo por encima de la climatología.




Figura 4. Índice Niño 1+2 semanal (NOAA OISST v2.1, región 0–10° S, 90–80° O; anomalía respecto de 1991-2020; semanas centradas en el miércoles). Franjas: El Niño (≥ +0.5 °C), neutro, La Niña (≤ −0.5 °C); círculos: semanas incompletas o con días preliminares (la más reciente está incompleta y con datos preliminares). Fuente: NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público. · Identificador NOAA-OISST-v2.1 · Fecha de corte 29/10/2026.

- El índice Niño 1+2 (NOAA OISST, región 0–10° S, 90–80° O) es +5.34 °C en la semana del 25/10/2026 al 29/10/2026 (semana incompleta: 5 días con dato; datos preliminares): condición El Niño (fase cálida).
- La semana anterior (del 18/10/2026 al 24/10/2026; datos preliminares) fue +5.17 °C.
- El índice está en la fase cálida (≥ +0.5 °C) desde la semana del 01/02/2026: 39 semanas consecutivas.

4. Estructura térmica de la columna de agua




Figura 5. Perfil vertical de temperatura (0 a 100 m) en 2.00° S, 85.00° O el 26/10/2026, con la capa de mezcla. Fuente: E.U. Copernicus Marine Service Information; producto GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (DOI 10.48670/moi-00016). · Identificador CMEMS-GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 · Fecha de corte 26/10/2026.

- En el punto 2.00° S, 85.00° O, el 26/10/2026 la temperatura del agua fue 28.0 °C en superficie y 23.1 °C a 100 m.
- La capa de mezcla alcanzó 17 m; por encima de esa profundidad la temperatura del agua es casi uniforme y debajo cambia con rapidez.
- Entre la superficie y los 100 m, la temperatura del agua disminuye 5.0 °C.

Profundidad (m)	0	5	10	20	30	50	75	100
Temperatura (°C)	28.0	28.0	28.0	27.9	27.9	27.1	25.9	23.1

El perfil proviene del análisis diario de Copernicus Marine (datos reales; E.U. Copernicus Marine Service Information), llevado a la malla de 0.25° y a los niveles de 0 a 100 m del prototipo; origen: Copernicus Marine (análisis ANFC): 1 día de análisis NRT.

5. Precipitación acumulada por provincia costera

La precipitación de esta sección son datos reales de CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UC Santa Barbara; Funk et al., 2026), descargados del servidor oficial del CHC y llevados a la malla de 0.25° del prototipo (origen de los días del mapa: servidor del CHC: 11 días). El acumulado normal usa la climatología 1991-2020 calculada con la réplica dynamical.org de CHIRPS v3 (CC BY 4.0).. Incluye 11 días con datos preliminares, que el CHC reemplazará por la versión final; los valores de esos días pueden cambiar.




Figura 6. Precipitación acumulada del periodo 15/10/2026 – 25/10/2026 (mm). Fuente: CHIRPS v3.0, Climate Hazards Center, UC Santa Barbara (Funk et al., 2026). Datos de dominio público; se solicita citar la fuente. · Identificador CHC-CHIRPS-v3.0 · Fecha de corte 25/10/2026.




Figura 7. Acumulado por provincia (barras) frente al acumulado normal 1991-2020 (marcas). Recortes rectangulares aproximados. Fuente: CHIRPS v3.0, Climate Hazards Center, UC Santa Barbara (Funk et al., 2026); climatología calculada con la réplica de dynamical.org (CC BY 4.0). · Identificador CHC-CHIRPS-v3.0 · Fecha de corte 25/10/2026.

Provincia	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Anomalía (mm)	% de lo normal	Días
Esmeraldas	151	49	+102 mm	307 %	11
Manabí	98	6	+92 mm	1 563 %	11
Santa Elena	37	2	+35 mm	1 799 %	11
Guayas	78	5	+73 mm	1 559 %	11
El Oro	32	7	+25 mm	466 %	11
Galápagos	0	0	0 mm	—	11

Aviso: CHIRPS v3 tiene fecha de corte 25/10/2026; el acumulado cubre 11 días del periodo solicitado. Servidor del CHC respondiendo con normalidad (575 ms). La réplica de dynamical.org está disponible como respaldo (final hasta 30/09/2026, preliminar hasta 25/10/2026). Datos finales hasta el 30/09/2026; los últimos 25 días son preliminares (01/10/2026 – 25/10/2026) y se reemplazarán por la versión final cuando el CHC la publique.

Fuentes y métodos

Toda salida del SOME lleva el crédito y el identificador de la fuente (RF-12). Los métodos y periodos de referencia de cada cálculo se documentan a continuación (RNF-03).

Fuente	Identificador	Crédito	Licencia	Fecha de corte
NOAA OISST v2.1 (datos reales)	NOAA-OISST-v2.1	NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público. Climatología: NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL; DOI 10.25921/RE9P-PT57).	Dominio público (Gobierno de los EE. UU.)	29/10/2026

Fuente	Identificador	Crédito	Licencia	Fecha de corte
Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (datos reales)	CMEMS-GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024	E.U. Copernicus Marine Service Information; producto GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (DOI 10.48670/moi-00016). Climatología: GLORYS12, GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030 (DOI 10.48670/moi-00021).	Licencia de uso del Copernicus Marine Service (acceso gratuito con registro); toda salida debe citar «E.U. Copernicus Marine Service Information».	26/10/2026
CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UCSB) (datos reales)	CHC-CHIRPS-v3.0	CHIRPS v3.0, Climate Hazards Center, UC Santa Barbara (Funk et al., 2026); climatología calculada con la réplica de dynamical.org (CC BY 4.0).	Dominio público registrado en Creative Commons (el CHC renuncia a todos los derechos de autor) y publicado con licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); se solicita citar a Funk et al. (2026). Fuente: chc.ucsb.edu/data/chirps3. La réplica de dynamical.org redistribuye el mismo producto con licencia CC BY 4.0.	25/10/2026
Réplica de CHIRPS v3 en dynamical.org (datos reales, mismo producto)	dynamical.org · ucsb-chc-chirps (Zarr/Icechunk)	UCSB Climate Hazards Center CHIRPS version 3.0 data processed by dynamical.org (Funk et al., 2026; DOI 10.15780/G2JQ0P), CC BY 4.0 (réplica pública sin garantía de servicio)	CC BY 4.0	25/10/2026

Referencias de NOAA OISST: Huang, B., C. Liu, V. F. Banzon, E. Freeman, G. Graham, B. Hankins, T. M. Smith y H.-M. Zhang (2020). NOAA 0.25-degree Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST), Version 2.1. NOAA National Centers for Environmental Information. https://doi.org/10.25921/RE9P-PT57 — Huang, B. et al. (2021). Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST) Version 2.1. J. Climate, 34(8), 2923–2939. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-20-0166.1 — Datos consultados por última vez el 30/10/2026.

Referencias de Copernicus Marine: https://doi.org/10.48670/moi-00016 — https://doi.org/10.48670/moi-00021 — Datos consultados por última vez el 30/10/2026.

Referencias de CHIRPS v3: Funk, C., Peterson, P., Harrison, L., et al. (2026). The Climate Hazards Center Infrared Precipitation with Stations, Version 3. Scientific Data, 13, 718. https://doi.org/10.1038/s41597-026-07096-4 — Climate Hazards Center (2025). Climate Hazards Center Infrared Precipitation with Stations version 3 (CHIRPS3) Data Repository. UC Santa Barbara. https://doi.org/10.15780/G2JQ0P — Funk, C. et al. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations — a new environmental record for monitoring extremes. Scientific Data, 2, 150066. https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66 — Datos consultados por última vez el 30/10/2026.

Origen de los datos de NOAA OISST: NOAA OISST v2.1: 15 días preliminares; Climatología de NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL), periodo 1991-2020 (oficial de NOAA); NOAA OISST v2.1: 350 días finales y 15 preliminares.

Origen de los datos de Copernicus Marine: Copernicus Marine (análisis ANFC): 5 días de mejor análisis y 7 de análisis NRT; Climatología oficial de Copernicus Marine (reanálisis GLORYS12, periodo 1993-2016). Se pidió 1991-2020, que Copernicus Marine no publica: se usa 1993-2016. Es otro sistema que el análisis operativo de los datos diarios: parte de la anomalía puede deberse a diferencias entre ambos sistemas; Copernicus Marine (análisis ANFC): 1 día de análisis NRT.

Origen de los datos de CHIRPS v3: Servidor del CHC: 11 días; Climatología 1991-2020 calculada con la réplica dynamical.org de CHIRPS v3 (CC BY 4.0).

Métodos empleados

- **NOAA OISST:** Promedio de los campos diarios de 15/10/2026 – 29/10/2026 (15 días), malla de 0.25°; celdas sin dato (tierra o mar según la variable) en transparente. NOAA OISST v2.1 diario a 0.25° (centros nativos en x.125° y x.375°), obtenido como subconjunto NCSS del servidor THREDDS de NOAA PSL (archivos sst.day.mean.AAAA.nc) o, como respaldo, de los archivos diarios de NOAA NCEI; ambos entregan el mismo producto (comprobado valor a valor). Paso a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato (tierra). Los últimos ~15 días son preliminares: NOAA/NCEI los reemplaza por la versión final y el SOME los vuelve a pedir hasta que lo son. Unidades: °C. Días de esta consulta: 15 preliminares. Incluye 15 días con datos preliminares de NOAA OISST (del 15/10/2026 al 29/10/2026). Visualización suavizada por interpolación entre centros de celda; el valor de cada celda se consulta sin interpolar.
- **NOAA OISST:** Promedio de los campos diarios de 15/10/2026 – 29/10/2026 (15 días). Anomalía = valor − climatología mensual 1991-2020; en cada celda se resta la climatología de esa misma celda y del mismo mes. Climatología de NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL), periodo 1991-2020 (oficial de NOAA). NOAA OISST v2.1 diario a 0.25° (centros nativos en x.125° y x.375°), obtenido como subconjunto NCSS del servidor THREDDS de NOAA PSL (archivos sst.day.mean.AAAA.nc) o, como respaldo, de los archivos diarios de NOAA NCEI; ambos entregan el mismo producto (comprobado valor a valor). Paso a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato (tierra). Los últimos ~15 días son preliminares: NOAA/NCEI los reemplaza por la versión final y el SOME los vuelve a pedir hasta que lo son. Unidades: °C. Días de esta consulta: 15 preliminares. Incluye 15 días con datos preliminares de NOAA OISST (del 15/10/2026 al 29/10/2026). Visualización suavizada por interpolación entre centros de celda; el valor de cada celda se consulta sin interpolar.
- **NOAA OISST:** Promedio espacial simple de las celdas válidas de «Región Niño 1+2» (malla de 0.25°). Agregación diaria. Anomalía = valor − climatología mensual 1991-2020; climatología calculada por promedio de área. Climatología de NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL), periodo 1991-2020 (oficial de NOAA). NOAA OISST v2.1 diario a 0.25° (centros nativos en x.125° y x.375°), obtenido como subconjunto NCSS del servidor THREDDS de NOAA PSL (archivos sst.day.mean.AAAA.nc) o, como respaldo, de los archivos diarios de NOAA NCEI; ambos entregan el mismo producto (comprobado valor a valor). Paso a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato (tierra). Los últimos ~15 días son preliminares: NOAA/NCEI los reemplaza por la versión final y el SOME los vuelve a pedir hasta que lo son. Unidades: °C. Días de esta consulta: 350 finales y 15 preliminares. Incluye 15 días con datos preliminares de NOAA OISST (del 15/10/2026 al 29/10/2026).
- **NOAA OISST:** Índice Niño 1+2 calculado por el SOME con NOAA OISST v2.1 diario (0.25°): media de área (pesos según el coseno de la latitud) de la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 oficial (0–10° S, 90–80° O), respecto de la climatología diaria 1991-2020 de NOAA PSL; promedios semanales de domingo a sábado etiquetados con el miércoles central, como los de NOAA CPC. Umbrales: El Niño ≥ +0.5 °C, La Niña ≤ −0.5 °C. NOAA OISST v2.1: 350 días finales y 15 preliminares. Los días preliminares de NOAA OISST (los últimos ~15) los reemplaza NOAA/NCEI por la versión final unas dos semanas después: el valor de las semanas recientes puede cambiar ligeramente.
- **Copernicus Marine:** Promedio espacial simple de las celdas válidas de «Región Niño 1+2» (malla de 0.25°). Agregación diaria en superficie. Anomalía = valor − climatología mensual 1993-2016 (se pidió 1991-2020); climatología calculada por promedio de área. Climatología oficial de Copernicus Marine (reanálisis GLORYS12, periodo 1993-2016). Se pidió 1991-2020, que Copernicus Marine no publica: se usa 1993-2016. Es otro sistema que el análisis operativo

de los datos diarios: parte de la anomalía puede deberse a diferencias entre ambos sistemas. El periodo se acotó a la fecha de corte de la fuente (26/10/2026). Análisis diario de Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (malla de 1/12°, 50 niveles), leído con el Copernicus Marine Toolbox (copernicusmarine.open_dataset, servicio ARCO) recortando el área, los días y solo los niveles necesarios. Profundidad: cada nivel SOME se interpola linealmente entre los dos niveles del modelo que lo rodean (0 m = nivel de 0.494 m; con dato solo si ambos niveles lo tienen). Horizontal: cada celda SOME de 0.25° es la media de las 3 × 3 celdas de 1/12° cuyo centro cae en ella, si al menos 5 de las 9 tienen dato; si no, sin dato (tierra o fondo). Solo se sirven días de análisis (el último es el miércoles del boletín semanal menos 2 días); el pronóstico no se sirve. Unidades del producto, sin conversión. Días de esta consulta: 5 de mejor análisis y 7 de análisis NRT.

- **Copernicus Marine:** Perfil vertical en la celda de 0.25° más cercana al punto, campo diario del 26/10/2026, niveles 0, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 m. La capa de mezcla proviene de la variable mlotst. La fecha pedida (29/10/2026) es posterior a la fecha de corte de la fuente; se usó la última disponible (26/10/2026). Análisis diario de Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (malla de 1/12°, 50 niveles), leído con el Copernicus Marine Toolbox (copernicusmarine.open_dataset, servicio ARCO) recortando el área, los días y solo los niveles necesarios. Profundidad: cada nivel SOME se interpola linealmente entre los dos niveles del modelo que lo rodean (0 m = nivel de 0.494 m; con dato solo si ambos niveles lo tienen). Horizontal: cada celda SOME de 0.25° es la media de las 3 × 3 celdas de 1/12° cuyo centro cae en ella, si al menos 5 de las 9 tienen dato; si no, sin dato (tierra o fondo). Solo se sirven días de análisis (el último es el miércoles del boletín semanal menos 2 días); el pronóstico no se sirve. Unidades del producto, sin conversión. Días de esta consulta: 1 de análisis NRT.
- **CHIRPS v3:** Acumulado = suma de la precipitación de los días con dato del periodo, solo en las celdas con dato en todos esos días. Promedio de los campos diarios de 15/10/2026 – 25/10/2026 (11 días), malla de 0.25°; celdas sin dato (tierra o mar según la variable) en transparente. El periodo se acotó a la fecha de corte de la fuente (25/10/2026). Recorte de 6.25° S – 6.25° N y 95.25° O – 77.75° O de CHIRPS v3 diario, obtenido por uno de dos caminos que entregan el mismo producto del CHC: (1) el servidor del Climate Hazards Center, leyendo por rangos HTTP solo el recorte del GeoTIFF diario (final «rnl», disgregación diaria con ERA5, a 0.25° nativo; preliminar «sat», disgregación con IMERG, a 0.05°); o (2) la réplica pública de dynamical.org en formato Zarr/Icechunk (final y preliminar a 0.05°, en kg m^{-2} s^{-1} convertidos a mm/día y con los valores redondeados a 8 bits de mantisa, error ≤ 0.2 %). Lo que llega a 0.05° se agrega a 0.25° con la media de las celdas válidas de cada bloque de 5×5 (se exigen al menos 13 de 25). Reproyección a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato. El valor −9999, los NaN y los valores menores que −1 se tratan como sin dato (mar); los negativos pequeños se fijan en 0. Unidades: mm/día. Origen de los días de esta consulta: servidor del CHC: 11 días. Incluye 11 días con datos preliminares de CHIRPS v3, que el Climate Hazards Center reemplazará por la versión final. Visualización suavizada por interpolación entre centros de celda; el valor de cada celda se consulta sin interpolar.
- **CHIRPS v3:** Promedio espacial simple de las celdas válidas de «Esmeraldas» (malla de 0.25°). Agregación diaria. Anomalía = valor − climatología mensual 1991-2020; climatología calculada por promedio de área. Climatología 1991-2020 calculada con la réplica dynamical.org de CHIRPS v3 (CC BY 4.0). El periodo se acotó a la fecha de corte de la fuente (25/10/2026). Recorte de 6.25° S – 6.25° N y 95.25° O – 77.75° O de CHIRPS v3 diario, obtenido por uno de dos caminos que entregan el mismo producto del CHC: (1) el servidor del Climate Hazards Center, leyendo por rangos HTTP solo el recorte del GeoTIFF diario (final «rnl», disgregación diaria con ERA5, a 0.25° nativo; preliminar «sat», disgregación con IMERG, a 0.05°); o (2) la réplica pública de dynamical.org en formato Zarr/Icechunk (final y preliminar a 0.05°, en kg m^{-2} s^{-1} convertidos a mm/día y con los valores redondeados a 8 bits de mantisa, error ≤ 0.2 %). Lo

que llega a 0.05° se agrega a 0.25° con la media de las celdas válidas de cada bloque de 5×5 (se exigen al menos 13 de 25). Reproyección a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato. El valor −9999, los NaN y los valores menores que −1 se tratan como sin dato (mar); los negativos pequeños se fijan en 0. Unidades: mm/día. Origen de los días de esta consulta: servidor del CHC: 11 días. Incluye 11 días con datos preliminares de CHIRPS v3, que el Climate Hazards Center reemplazará por la versión final.

Reporte generado por SOME 0.1.0-demo el 30/10/2026 22:26 para Dra. María Vera (Oceanografía y Meteorología Marina). Datos reales.